

A 7
A
7
168

APOLLONIUS

AC

SERENUS

PROMOTUS

AUCTORE

BARTHOLOMÆO INTIERI

FLORENTINO

Ad Illustrissimum, & Excellentissimum Com.

D. HIERONYMUM

ONERUM CABANILIUM

E Comitibus Trojæ, & Montellæ,

Sancti Marci Marchionem, Ducem S. Johannis Rotundi, Rodi, Candelari, & S. Severi Dominum &c.



NEAPOLI, M.DCCIV.

Ex Typographia Leonardi-Josephi Sellitto.

Superiorum Permissu.

309

1



Excellentissime Princeps.



*Aulò postquam de in-
veniendis infinitis
curvis methodum ex-
cogitavi, meditati-
rem eandem iterato
alia occurrit diluci-
dior, ac perpulcrior, ut assolet de uno in
aliud inventum, ac de una in aliam
veritatem mens nostra progredi. Hanc
tribus ab hinc mensibus excogitatam
ne aliquantisper lateret alios Geometria*

amatores, quæ mihi mens est, semperq;
fuit, in publicam proferre lucem decre-
vi, contra quàm nonnullorum est inge-
nium, præsertim nostri ævi, qui vel mi-
nimum, quod fortassis scire rentur, suis
in præcordijs abscondentes premere sata-
gunt; quemadmodum pecuniarum avari,
& vix sibi tutas divitias credentes,
quas ipsi soli norunt: atque id ea men-
te agunt, ne qua facilitas alijs proveniat
ad quadam intelligenda, quæ non sine
magnolabore ipsi intellexisse ducunt. res
sanè viro ingenuo, nedùm literato indigna.
Tibi nuncupatum volo, Excellentissi-
me Princeps, hoc qualecumque est opu-
sculum eadem de causa, eodemque no-
mine, quo primum illud, quando qui-
dem gemelli videntur fœtus, & conti-
nuò fermè editi. Majora deberem pro
tuis in me collatis jugiter beneficijs, pro-
que animi benevolentia, quam testa-
tam

tam mihi in dies facis, meamque qualemcumque doctrinam mirificè commendas, sicuti nuper cum Illustrissimo D. Paulo Matthia Doria lubentissimè egisti, de meis laboribus, atque adinven-tis verba faciens ; à quo viro in Republica literaria optimè merito non sine admiratione, ac humanitate, qua decet, fuere commendata. At hoc, quod exhibeo arrha instar est majorum, quæ polliceor, Deo conatibus meis annuente ; quicquid enim è paupere ingenio meo prodiverit tibi jure merito omnes acceptum referent, à quo otium omne in hujusmodi res incumbendi mihi partū, ea qua solitus es largitate majorum tuorum munificentia emulatrici in literatos viros, bonasque artes excolendas, cujusmodi etiam ingenij Excellentissimum Ducem CAROLUM ONE-RUM CABANILIUM nobis genui.

Si

*ſi præ reliquis natit tuis tecum, ut ita
dicam, morum comitate, ac magnani-
mitate certantem, cui ferè quantum Ti-
bi debeo, ac reliqua tua domui. Is enim,
ut & alij natu minores mei ſemper ſtu-
dioſiſſimi, ſemperque hortatores uti no-
vi quiddam ederem, benemereri quan-
tum poſſent de re literaria cupientes.
Quamobrem ſerves illos tui imitatores
etiam, atque etiam oro, atque hoc titu-
lo magis ames, quod bonarum artium
amore flagrent. Vale.*

Excellentiæ Tuæ

Neap. xv. Martii 1704.

Addiſſimus Servus
Bartholomæus Intieri.

AMICE LECTOR

OPellam, quam tibi trado, non cupidine gloriæ adductus, neque ad meorum detractorum tela retundenda, Typis committere decrevi, sed malui methodum tribus ab hinc mensibus de infinitarum Curvarum sectionibus à nemine hæctenus, quem sciam, excogitatam indicare; præsertim, quia nunc temporis omnes ferè Geometriæ amore tenentur, cui nedum, at reliquis etiam disciplinis noster Excellentissimus PROREX, licèt variis, gravibusque negotiis, tam exteris, quàm totius Regni occupatus inter horas succisivas operam dare non dedignatur. Tanto autem Principi, si hæc accepta fuisse cogovero, ad alia animum appellam; & præcipuè ad omnibus numeris absolvendum opusculum de *Æquationum* constructione. Unum scias velim cuncta, quæ hic leguntur, toto cælo ab iis, quæ nuper in alio libello edidi differre, neque illa quippiam mihi contulisse ad hæc invenienda: propterea de iis ne ullum hic quidem verbum. Vale.

DEFINITIONES

(Fig. 1.)



S ab aliquo puncto, *A*, in sublimi ad circumferentiam *BHC* recta linea ducatur *AB*, atque in utramque partem producat, & manente puncto *A*, convertatur eadem *AB* circa circumferentiam, quousque ad eum locum redeat, à quo cœpit moveri; Superficiem *BACFE* recta linea *BAE* descriptam, constantēque ex duabus superficiibus *BAC*, *EAF*, ad verticem *A* inter se aptatis, quarum utraque indefinitè augeri potest, voco *Conicam superficiem*; & quidem, *Primam*, si circumferentia *BHC* hujus sit naturæ, ut ducta qualibet perpendiculari, vel applicata *IK* ad diametrum *BC* continuè proportionales sint *BK*, *IK*, *KC*. Hæc autem *Primus Circulus* vocetur.

Secundam verò *Superficiem Conicam* voco, si circumferentia *BHC* hujus naturæ fuerit, ut quadratum *BK* ad quadratum applicatæ *IK* eandem rationem habuerit, ac applicata *IK* ad *KC*. Hæc autem curva *Secundus circulus* vocetur.

Tertiam autem *Superficiem Conicam* voco, si circumferentia *BHC* hujusmodi fuerit naturæ, ut cubus *BK* ad cubum applicatæ *IK* eandem habuerit rationem, quam *IK* ad *KC*. Hæc autem curva *Tertius Circulus* vocetur.

Quartam deniquè, & ita eodem modo in infinitum, voco *Conicam Superficiem*, si circumferentia *BHC* hujus naturæ fuerit, ut quadratoquadratum *BK* ad quadratoquadratum *IK* eandem habuerit rationē, ac eadem applicata *IK* ad *KC*. Hæc verò *Quartus Circulus* vocetur.

Idem dicendum, si ita fuerit *BK* ad applicatam *KI*, ut quadratum *KI*, ad quadratum *KC*; vel ita cubus *IK* ad cubum

A

cubum

2 *Bartholomæi Intic.*

cubum KC , vel quadratoquadratum IK ad quadratoquadratum KC , & ita in infinitum.

Not. Vox circuli modò curvam, modò planum curva inclusum significat.

S C H O L I U M.

Quomodo hæ curvæ describi possint, demonstravi in meo *Aditu*; verùm quia pollicitus sum, nihil eorum, quæ à me in lucem edita sunt, in medium allaturum, uti poterimus ad ipsarum descriptionem methodo à Carolo Renaldino tradita in suo *Geometra Promoto*. Quòd si cui illa Renaldini Methodus non arriserit, non ideo ab his, quæ mox tradam, animum avertere debet, utpotè quæ his curvis egeant; quandoquidem his positis ingens ad novas curvas detegendas campus aperitur. Quin & maximi Geometræ hoc idem fecerunt; Hudenius etenim, referente Schootenio *Miscellaneorum* sectione 22, Solidum secavit, cujus genesis longè hac difficilior existit: mente enim illa tantùm concipi potest, non autem ad praxim revocari; quod in nostris his curvis assumptis non accidit.

I I.

Verticem cujuslibet voco manens punctum A .

I I I.

Axem rectam lineam DA , quæ per punctum A , & D , centrum curvæ BHC , transit.

S C H O L I U M.

SI curva BHC sit primus, vel planus circulus, quid sit centrum patet. In reliquis verò curvis punctum intelligo, quod bifariam dividit diametrum BC , ad quam ordinatim applicatur IK . *Co.*

I V.

Conum autem voco figuram ABC contentam superficie plana BHCL, à curva BHCL inclusa, & conica superficie, quæ inter verticem, & curvæ circumferentiam interjicitur. Et quidem *Primum Conum* voco, si curva BHCL fuerit primus circulus. *Secundum* verò *Conum*, si curva BHC fuerit secundus circulus. *Tertium Conum*, si curva fuerit tertius circulus. *Quartum* denique *Conum*, & ita deinceps, si eadem curva BHC fuerit quartus circulus.

V.

Basim circulum ipsum, cujuscumque generis sit.

V I.

Conorum rectos voco, qui axes habent ad angulos rectos ipsis basibus.

V I I.

Scaloros, qui non ad rectos angulos ipsis basibus axes habent,

V I I I.

(Fig. 2. & 3.)

Omnis curvæ lineæ, vel duarum curvarum CAD, CBD in uno plano existentium *Diametrum* voco rectam lineam FBAE, vel AE, quæ quidem ducta à linea curva CAD, vel à duabus curvis CAD, CBD, omnes lineas CD, quæ in ipsa, vel in ipsis curvis ducuntur cuidam lineæ AS, æquidistantes bifariam dividit.

I. X.

Verticem lineæ rectæ terminum A, qui est in ipsa curva CAD. Si duæ autem curvæ fuerint, *Vertices* puncta A, B, quæ sunt in ipsis curvis, atque in ipsa diametro.

X.

Ordinatum ad diametrum *applicari* dicitur unaquæque æquidistantiarum linearum CE, DE.

X. I.

Axem verò curvæ lineæ, & duarum curvarum rectam lineam, quæ cum fit diameter curvæ lineæ, vel duarum curvarum æquidistantes ad rectos secant angulos.

In præsentiarum his tantùm definitionibus contentus fui, cum ob nimiam temporis angustiam curvas, quas modo tradam excolere, ut animus erat, non potuerim. Culpandus tamen ipse non sum, quippe qui omnia dicere non suscepi, sed genesim tantùm curvarum, quas mox tradam. Puto tamen ingratum non fecisse iis, quibus Geometria cordi est: hac siquidem methodo detecta ad altiora gradum facere quisque proprio Marte potest. Etenim, ut Cartesius ait (*lib. 3. Geom.*) cognitio in materia Mathematicarum progressionum duobus, aut tribus prioribus terminis, reliquos invenire non est difficile.

P R O P O S I T I O I.

(Fig. 4.)

Rectæ lineæ AG, AG, quæ a vertice A, cujuscumque superficiem ad puncta G, G, quæ in superficie conica sunt, ducuntur; in ipsa superficie erunt.

Quo-

Quoniam enim puncta A, G sunt in superficie conica; idcirco recta ipsam describens [*ex prima def. hujus*] trā-
sibit in ipsa conici descriptione per puncta G, G ; adeoque
vel ex ipsa conici generatione, liquet, rectam AG totam in
superficie conica existere. *Q. E. D.*

Coroll. Rectæ à vertice ad puncta, quæ sunt in super-
ficie conica, basis circumferentiæ occurrent, si ulterius
producantur.

P R O P O S I T I O I I,

(*Fig. 5.*)

SI in alterutra superficierum quarumlibet conicarū;
quæ sunt ad verticem, sumantur duo puncta D, E ,
& conjungantur recta linea DE ; atque ex vertice du-
cantur rectæ AD, AE , occurrentes ipsi circumferentiæ
basis in punctis F, G , (*coroll. p. hujus*), ita ut FG , quæ
hæc puncta conjungit perpendicularis sit ad diametrum
 BC ; recta DE intra superficiem tota cadit: quæ verò ul-
tra hæc puncta producit extra cadit.

Quoniam enim FHG perpendicularis est ad diametrum
 BC , tota intra circulum cadet, ac proinde intra superfi-
ciem conicam: ergo (*2.11.*) intra conicam superficiem est
planum trianguli AFG , uti & DE in eodem plano sita.
Q. E. D. Quod verò producta extra superficiem cadat, sa-
tis in aperto est.

S C H O L I U M.

LAtius demonstrari hæc propositio potest, cum verò
quod demonstratum fuit, satis ad ea, quæ sequuntur,
sit, hæc in medium attulisse sufficiat.

PRO-

PROPOSITIO III.

(Fig. 5.)

SI quilibet conus plano ABC per verticem A secetur, sectio triangulum erit.

Nam utraque AB , AC (1. hujus) potest concipi, tanquam recta linea superficiem conicam describens; item (3. 11.) BC est recta, utpotè quæ duorum planorum communis sectio est, nempe circuli subjecti, & plani per axem ducti, ergo figura ABC , triangulum erit Q.E.D.

PROPOSITIO IV.

(Fig. 6.)

SI alterutra superficierum conicarum per verticem oppositarum secetur plano DFE æquidistante ipsi circulo BHC , per cujus periferiam fertur linea recta superficiem conicam describens, planum DFE , quod conica superficie clauditur circulus erit, ejusdem quidem generis, ac ille, qui est basis conii, centrum verò V erit in conii axe AO .

Sit conus ABC secundus, & secetur plano ABC per axem, & per diametrum BC , sectio triangulum erit (3. hujus); tum in sectione DFE sumatur quodlibet punctum F ; junctaque AF producat[ur] [corol. 1. hujus] usque dum occurrat circumferentiæ basis in puncto H . Per rectas autem AB , AH , planum ducatur ABH , secans basis planum recta (3. 11.) BH , planum verò DFE recta DF . Item per rectas AH , AC planum ducatur, secans basis planum [3. 11.] recta HC , planum verò DFE recta linea FE . Quoniam itaque (16. 11.) CB ipsi DE , BH ipsi DF , & CH ipsi FE parallela est, ergo triangulum BHC (10. 11. & 4. 6.) triangulo DFE simile erit; ductisque HL ad BC , & Fl ad DE perpendicularibus, simile erit triangulum
BHL

BLH triangulo DIF, ac propterea ita BL ad LH ut DI ad IF, vel (22.6.) ita quadratum BL ad quadratum LH, ut quadratum DI ad quadratum IF. Eadem ratione: triangulum LHC simile erit triangulo FIE, ac propterea (4.6) ita LH ad LC, ut FI ad IE. Sec' (hyp.) ut quadratum BL ad LH quadratum, ita LH ad LC, ergò ut quadratum DI ad quadratum IF, ita IF ad IE, ac propterea sectio DFE, DE, Secundus circulus erit [Def. 1. hujus]. Eadem ratione de quolibet alio circulo idem demonstrabitur, quod erat demonstrandum.

Quoniam verò, ita est BO ad OC, ut DV ad VE, ideo patet V fore centrum sectioni DEE (Schol. def. 3. hujus) Q.E.D.

Coroll. Ex dictis colligitur DE fore Diametrum circuli DFE cujuscumque generis fuerit.

PROPOSITIO V.

(Fig. 7.)

Si conus quicumque plano ABC per axem, & per diametrum BC secetur, sumatur autem aliquod punctum D in superficie conici, quod non sit in latere trianguli per axem, & ab ipso puncto ducatur recta linea DE parallela cuidam recte MN, quae perpendiculariter ducta sit à circumferentia basis conicae ad trianguli basim, sive diametrum BC, triangulo per axem occurret, & ulterius producta usque ad alteram superficiei conicae partem, bifariam a plano trianguli secabitur.

Conjungatur AD, & protrahatur (coroll. 1. hujus) donec occurrat circumferentiae basis in puncto K, ex quo in eadem basi ducatur recta KHL parallela ad MN, & proinde etiam parallela ad DE; nec nò KL (hyp. 26., & 29. 1.) perpendicularis erit ad BC: quoniam verò BC est etiam in plano trianguli per axem: ergo si ducatur ex vertice A ad punctum H linea AH, hæc erit in plano trianguli per axem,

axem. Jam verò concipiatur triangulum AKH , erit DE in hujus trianguli plano; aliàs enim, si in hoc plano AKH duceretur ex puncto D recta quæpiam parallela basi KH , atque hujusmodi parallela non esset eadem, ac DE , quam ostendimus esse parallelam KH : essent (9.11) duæ lineæ ex eodem puncto emanantes parallelæ inter se, quod fieri nequit: itaque DE est in plano AKH , & ulterius producta [29.1.] incidet in lineam AH , quæ est in plano trianguli per axem. ABC , Q.E. primo loco D .

Deinde verò producat DE , donec occurrat superfici conicæ in puncto G , & quoniam lineæ DEG , KHL sunt in eodem plano AKL , hinc recta AGL erit latus trianguli AKL ; adeoque (29.1. & 4.6.) ita KH ad HL , ut DE ad EG ; sed (ex natura curvæ BKC) KH æquatur HL ; ergo DE æquatur etiam EC Q.E.D.

P R O P O S I T I O VI.

(Fig. 8.)

SI conus quicumque plano ABC per axem, & per diametrum BC secetur, secetur autem & altero plano DFE secante planum basis conicæ secundum rectam lineam DE , quæ sit perpendicularis, vel ad BC basim trianguli per axem, vel ad eam, quæ in directum ipsi constituitur; lineæ KH , KH , quæ in sectione DFE ordinatim applicantur in communi sectione FG plani secantis, & trianguli per axem cadent. Atque si conus sit rectus linea DE , quæ est in basi perpendicularis erit ad FG diametrum sectionis conicæ: sin verò scalenus, nõ semper, nisi cum planum ABC , quod per axem ducitur ad basim conii rectum fuerit.

Quod enim HK plano ABC , & proindè ejus cum plano DFE communi sectioni FG occurrat, & in ipso occurribifariam secetur, id quidem liquet ex præcedenti. Cæterum si conus rectus sit, erit [def.v.] axis perpendicularis

ris

Apoll. Promot.

ris ad ejus basim, adeoque circulus subjectus, plano [18.11] ABC rectus erit; ac proinde (3.def.11.) eadem DE ad lineam FG perpendicularis erit. Eadem autem est ratio, si conus sit scalenus, sed triangulum ABC rectum sit circulo subjecto. Sin verò triangulum ejusmodi rectum non fuerit subjecto circulo, non erit DE ad FG perpendicularis. Nam si DE esset utrique BC, FG perpendicularis, esset etiam (4.11.) eadem DE recta plano ABC; adeoque (18.11.) ipsum planum circuli BDC applicatū lineæ DE rectum esset triangulo ABC contra hypotheseim.

Corol. Hinc (7.def.hujus) recta FG diameter est sectionis DFE, utpote quæ rectas ordinatim applicatas bifariam secat.

P R O P O S I T I O VII.

(Fig. 9.)

SI conus quicumque secetur plano MAN per axem, & per diametrum MN, & secetur altero plano KFI secante basim conicam secundum rectam lineam KLI, quæ ad MN diametrum basis sit perpendicularis; diameter autem FL sectionis conicæ vel æquidistet uni AC laterum trianguli per axem, vel cum ipso extra conicam verticem conveniat, & producantur in infinitum superficies conica, & planum secans KFI. Sectio quoque ipsa conica in infinitum augetur, & ex sectionis conicæ producta in infinitum diametro FL abscindet lineam FG æqualem cuicumque datæ ipsa DFE, quæ ordinatim applicabitur.

Quoniam enim (hypo.) diameter FL cum latere AN ad partes C nunquam convenit; hinc si ipsa ad libitum producat, puta ad G, & per G ducantur DE ad KI, atque BC ad MN parallelæ; erit [15.11.] planum productum per BC, DE parallelum plano MKN; adeoque (4.hujus) in superficie conica ulterius producta circulum efficiet,

B

ejus-

conica diameter FG , sit uni AC laterum trianguli per axem equidistans, & quidem sectus conus primus sit, re-
cta linea KL ordinatim applicata poterit spatium con-
tentum sub linea FL , quæ ordinatim applicatam, & ver-
ticem sectionis interjacet, & Parametro FH , ad quam
nempe linea AF , quæ conici verticem, & verticem se-
ctionis interjacet, habeat eam rationem, quam ad BC
quad. basis trianguli per axem habet rectangulum con-
tentum sub AB , AC reliquis trianguli lateribus.

Si verò conus, qui secatur, secundus fuerit, cujus basis
 BDC hujus naturæ fuerit, ut quadratum CG ad quadr.
 GD eam rationem habeat, quam eadem GD ad GB ; sive,
quod idem est, ut solidum sub CG quad. in GB æquetur
cubo GD , eademque, ut supra, ratione sectio instituat,ur,
cubus rectæ KL ordinatim applicatæ æquabitur solido,
quod continetur sub recta FL , & quad. Param. FH , ad
quod scilicet quadratum eandem habeat rationem qua-
dratum AF , quæ conici, & sectionis verticem interjacet,
quam ad cubum BC solidum sub quad. AB in AC .

Si autem conus tertius fuerit, cujus basis BDC hujus
naturæ fuerit, ut planoplanum, quod continetur sub cu-
bo CG in GB æquetur quadratoquadrato DG , quadra-
toquadratum rectæ KL æquabitur planoplano, quod con-
tinetur sub abscissa FL , & cubo Parametri FH , ad
quem scilicet cubum eandem habeat rationem cubus AF ,
ac ad quadratoquadratum BC planoplanum, quod con-
tinetur sub cubo AB in AC .

Et tandem, si conus eodem, quo supra, modo secandus,
quartus fuerit, cujus basis BDC hujus naturæ sit, ut
planosolidum quod continetur sub quadratoquadrato CG
in GB æquetur quadrato cubo GD , quadrato cubus KL
æquabitur planosolido sub recta LF , & quadratoquadra-
to Parametri FH , ad quod quadratoquadratum eandem
habeat rationem quadratoquadratum AF , ac ad qua-
drato cubum BC planosolidum sub quadratoquadrato
 AB in AC .

S C H O L I U M.

Eodem modo ex quinti, septimi, & aliorum in infinitum conorum sectionibus cæteræ hujus generis curvæ haberi possunt, ut ex modo allatis, atque ex iis, quæ mox afferam manifestum erit. Nec diversa in sequentibus utemur methodo pro earum curvarum genesi, quæ Apollonianam Hyperbolam, atque Ellipsim excedunt. Quare iis gratum me fecisse existimo, qui Geometriæ amore tenentur; idque affirmare jam ausim; etenim cum hæc eadem nunquam satis laudato, æternique nominis Viro, maximo, inquam, Dominico Aulifio, nulli, qui literis insignis fuit, secundo, omnibus verò, qui nunc, vel doctrina, vel morum integritate conspicui sunt, absque injuria præferendo, communicassem, eo, quo præditus est animi candore, certa mihi signa dedit, sibi hæc placuisse, maximèque accepta fuisse, undè stimulos mihi addidit, ut statim hæc in lucem ederem. Pro certo siquidem habeo, omnibus hæc accepta fore, dum illi ingrata non fuerunt, qui primum in his disciplinis, cæterisque scientiis locum tenet. Eos autem rogatos velim, qui nullis rationibus adducti, sed nimia in eos, qui me mordicè carpunt, propensione impulsu, parum benè de me sentiunt, ut æquâ mente hæc perpendant; ab his enim manifestè deduci potest, quid de aliis, quæ paucis ab hinc mensibus in lucem edidi, judicandum sit: etenim ut meam hic mentem aperiam, hanc methodum priori anteponendam puto ob hoc præcipuè, quia plurimæ ab Apollonio concinnatæ demonstrationes his etiam curvis satis eleganter conveniunt, ut ex dicendis colligere erit, & præcipuè cum de tangentibus inveniendis in posterum sermo habebitur. Accedit etiam quod, hæc methodo inventa tot illustrium virorum conatus, maximo nobis laboris, molestiarumque compendio erunt,

erunt, quod quidem plurimi faciendum est.

Hoc autem extra dubium est, eorum respectu; quæ paucis ab hinc mensibus publici juris feci, quæ nunc facio, majorem ingenii aciem redolere, utpote quibus in inveniendis acutiori mente opus fuit, quàm in prioribus.

Demonstratio

Sed jam demonstrationem afferamus, quæ non solum in omnibus modò expositis curvis locum habet, sed etiam ipsissima est, ac Apolloniana: quare eandem huc afferre mihi visum est, juxta methodum ab Elia Astorino Mathematico præstantissimo excogitatam, quæ quidem omnibus, quotquot inventæ usque adhuc fuere, præferenda est.

Per L ducatur MLN parallela ad BC in plano trianguli per axem, erit (15.11.) planum ductum per MN, KL parallelum basi conicæ BDC, adeòque (4. hujus) sectio MKNI circulus erit, & quidem ejusdem naturæ, atque est basis circulus BDC, cujus diameter erit MN, ad quam (10.11.) perpendicularis erit KL, adeoque

Si circulus BDC fuerit	(Primus, KL quad.	(Rectglo sub NL in LM
	Secundus, KL cub.	(Solido sub NL quad. in LM
	Tertius, KL ququad.	(Equab. Plano sub NL cub. in LM
	Quartus, KL qucub.	(Plsolido sub NL ququad. in LM

Atque adeo.

Pro curva ex sectione primi Coni genita.

- [Rectglum sub FL, & FH ad rectglum sub FL;
- [& FA (1.6.)
- [FH ad FA (hyp. & invert.)
- Æquant. [BC quad. ad rectglum sub AC, & AB (23.6.)
- hæ Rat. [BC ad AB, plus BC ad AC (4.6.)
- [NL, sive FO ad FA, plus ML ad FL (23.6.)
- [Rectglum sub NL in LM ad rectglum sub
- [FL, & FA.

Ergo

Ergo (9.5.) Rectglum sub FL in FH æquabitur regio sub ML in LN, cui (*ut prius*) æquatur KL quad. adeòque sibi æquantur KL quad. & rectglum sub abscissa FL, & Param. FH. Q.E.D.

Pro curva ex sectione secundi Coni genita.

Æquant. hæ Rat. [Solid. sub FL in quad. FH ad Solid. sub FL in FA quad. (.32.11.)
 [FH quad. ad FA quad. (*hyp. & invert.*)
 [BC cub. ad Solid. sub BA quad. in AC (30. lib. 6. *Eucl. Borell.*)
 [BC quad. ad AB quad. plus BC ad AC (4.6.)
 [LN quad. five FO quad. ad FA quad. plus ML ad FL
 [Solid. sub LN quad. in ML ad solid. sub FA quad. in FL.

Ergo (9.5.) Solidū sub abscissa FL in quad. FH æquabitur Solid. sub LN quad. in ML, cui, (*ut prius*) æquatur KL cub.; adeòque sibi æquantur KL cub. & Solid. sub abscissa FL, & quadrato Param. FH. Q.E.D.

Pro curva ex sectione tertii Coni genita.

Æquant. hæ Rat. [Planopla. sub FL in cub. FH, ad planopl. sub FL in cub. FA.
 [FH cub. ad FA cub. (*hyp. & invert.*)
 [BC quadquad., ad planopl. sub cub. BA in AC
 [BC cub. ad AB cub. plus BC ad AC (4.6.)
 [LN cub., vel FO cub., ad AF cub., plus ML, ad FL
 [Planopl. sub LN cub., in ML, ad planopl. sub FL in FA cub.

Ergo (9.5.) planoplan. sub FL in cub. FH æquabitur planoplan. sub LN cub. in ML, cui (*ut prius*) æquatur quadra-

draqua dr. KL; adeoque sibi æquantur KL. qu adquad. & planopl. sub abscissa FL in cub. Param. FH. Q.E.D.

Pro curva ex sectione quarti Coni genita.

- Æquant.
hæ Rat.
- [Planosolid. sub FL in quadquad. FH ad planosolid. sub FA quadquad. in FL.
 - [FH quadqua. ad FA quadquad. (*hyp. & inv.*)
 - [BC quadcub. ad planosolid. sub AB quadraquad. in AC.
 - [BC quadquad. ad AB quadquad. plus BC ad AC (4. 6.)
 - [LN quadquad. vel FO quadquad. ad FA quadquad. plus ML ad LF.
 - [Planosolid. sub LN quadquad. in ML, ad planosolid. sub FA quadquad. in LF.

Ergo (9.5.) planosolidum sub quadquad. FH in FL æquabitur planosolid. sub LN quadquad. in ML, cui [*ut prius*] æquatur quadcub. ex LK; adeoque sibi æquantur quadcub. KL, & planosolid. sub abscissa FL, & Param. FH quadquad. Q.E.D.



Demon-

*Demonstratio Recentiorum Analystarum morè
pro secunda Parabola.*

Esto $AB \propto a$.

$BC \propto b$. Fiat propter similit. triangulor. ABC, AFO ;

$CA \propto c$. ut AB ad BC , ita AF ad FO , vel LN

$$FA \propto d. \quad a \text{ --- } b \text{ --- } d \text{ --- } \frac{db}{a}$$

$FL \propto y$. Rursus fiat propter similitudinem triangu-

$LK \propto x$. lorum ACB, FLM .

ut AC ad CB ita FL ad LM .

$$c \text{ --- } b \text{ --- } y \text{ --- } \frac{yb}{c}$$

Multipl. quad. LN , hoc est $\frac{ddb}{aa}$

per LM , hoc est $\frac{yb}{c}$

Fit solidum sub quad. LN in LM æquale cubo LK ,
hoc est $\frac{ddb}{caa} = y \propto x^3$

Hinc si fiat, ut caa ad bbb , ita dd ad quad. FH , quod
vocemus rr , habebitur hujusmodi æquatio $rry \propto xxx$.

Ex qua cognoscitur solidum sub quad. datæ rectæ FH ,
vel $Param.$ in abscissam LF æquari cubo applicatæ LK ,
vel xxx . Hinc ea omnia patent, quæ superius dicta sunt,
videlicet solidum sub quadrato AB in AC eandem ra-
tionem habere ad cubum BC , quam quad. FA ad quad.
 $Param.FH$. **Q.E.D.**

Eadem prorsus ratione operandum non solum in altio-
ribus Parabolis, sed etiam in omnibus curvis, quas dein-
ceps tradam; quod unico exemplo demonstrasse sufficiat.

SCHO-

S C H O L I U M

Hujusmodi autem curvas Apollonii vestigiis inhærens, Parabolas vocandas censui, ob id nempe, quod quadratum, vel cubus, vel quadquad. vel quadcub. &c. applicatæ non excedit, nec deficit, vel à rectglo, vel à solido, vel à plplano, vel à planosolido, &c. cui comparatur; sed vera adest inter ejusmodi quantitates **COMPARATIO**.

Quoniam verò non una tantum, sed indefinitæ Parabolæ generari possunt; ideo eas ordinalibus numeris designare incongruum non erit. Quare Apolloniana, *Prima hujus prop.* vocabitur, quæ verò ex secundi conisectione generatur *Secunda hujus prop.*, & quæ ex tertii conisectione *Tertia: hujus propos.* & ita deinceps,

Cæterum ex supra allatis demonstrationibus manifestè apparet Apollonianam demonstrationem locum habere in omnibus hujus generis Parabolis; etenim paucis immutatis omnia cum eadem conveniunt, ubi enim in Apolloniana, five Prima habetur Quadratum, in Secunda habetur Cubus, in Tertia Quadratoquadratum, in Quarta Quadratocubus, in Quinta Cubocubus, & ita eodè ordine in altioribus. Similiter, ubi in Apolloniana, five Prima habetur Rectangulum, in secunda Solidum, in Tertia Planoplanum, in Quarta Planosolidum, in Quinta Solidosolidum, & ita eodem ordine in altioribus. Quare facillimum cuique erit, hanc demonstrationem ad quamlibet Parabolam accomodare.

PROPOSITIO IX.

(Fig. 9.)

Genesis, & Natura earum Parabolarum, in quibus quadrata, vel cubi, vel quadratoquadrata, &c. applicatarum æquantur reſtangulis ſub abſciſſis inter verticem, & applicatas, in Parametrum, vel ſolidis ſub abſciſſarum quadratis in Parametrum, vel planoplanis ſub abſciſſarum cubis in Parametrum, &c.

SI conus ABC , cujus baſis BDC , hujus naturæ ſit, ut vel reſtangulum ſub BG in GC æquetur quadrato applicatæ GD , vel ſolidum ſub quadrato BG in GC æquetur cubo applicatæ GD , vel planoplanum ſub cubo BG in GC æquetur quadratoquadrato applicatæ GD , plano ABC per axem, & per diametrum BC ſecetur, ſecetur autem & altero plano DFE ſecante baſim conicam ſecundùm reſtam lineam DE , quæ ad diametrum BC ſit perpendicularis, & ſectionis conicæ diameter FG ſit uni AC laterum trianguli per axem æquidistant; reſta linea KL ordinatim applicata,
ſi

Si conus primus fuerit, poterit spatium contentum sub linea FL, quæ verticem sectionis, & ordinatim applicatam interjacet, & Parametro FH, ad quam nempe linea AF, quæ conici, & sectionis vertices interjacet habet eam rationem, quam ad BC quad. basis trianguli per axem habet rectangulum contentum sub AB, & AC reliquis trianguli lateribus.

Si verò conus secundus fuerit, rectæ applicatæ KL cubus æquabitur solido sub quad. FL, & Param. FH, ad quam eandem habet proportionem AF, quam ad BC cub. habet solidum sub AB in quadratum AC lateris paralleli diametro sectionis FG.

Si denique conus tertius fuerit, quad. applicatæ KL æquabitur plano sub cubo FL in Param. FH, ad quam eandem habet rationem AF, quam ad BC quad. habet planum sub cubo AC in AB, & ita in infinitum.

Per L ducatur MLN parallela BC, ergo (15.11.) planum MKNI parallelum plano basis conicæ BDC sectionem efficiet (4. hujus) ejusdem generis, atque est circulus basis BDC; quare

Si circulus BDC fuerit $\left[\begin{array}{l} \text{Primus rectglum MLN} \\ \text{Secund. solid. sub MLq in LN} \\ \text{(Tertius, plplnum sub ML cub. in LN)} \end{array} \right. \text{æquab. } \left. \begin{array}{l} \text{LK quad.} \\ \text{LK cub.} \\ \text{LK ququad.} \end{array} \right.$

Unde in curva ex sectione primi Coni genita.

$\left[\begin{array}{l} \text{Rectglum sub FH in FL, ad rectglum sub AF} \\ \text{in FL (1.6.)} \\ \text{FH ad FA (hyp. & inv.)} \\ \text{BC quad. ad rectglum BAC (23.6.)} \\ \text{BC ad AC, plus BC ad AB [4.6.]} \\ \text{ML ad LF, plus FO, sive LN ad FA [23.6.]} \end{array} \right.$

C 2

Re-

[Rectglum sub ML in LN, ad rectglum sub
[LF in FA.

Ergo (9.5.) rectglum sub FL in FH æquabitur rectglo
sub ML in LN, cui, *ut prius*, æquatur quad. LK, & patet
quod E.D.

Pro curva ex sectione secundi Coni genita.

[Solid. sub FH in FLq., ad solid. sub FA in
[FLq. (25.11.)

[FH ad FA (*hyp. & invert.*

Æquant. [BC cub. ad solid. sub BA in ACq (30. lib. 6.
hæ Rat. [*Euc. & Borell.*

[BCq. ad ACq. plus BC ad BA (4.6.)

[MLq., ad LFq. plus LN, vel FO, ad AF.

[Solid. sub MLq. in LN, ad solid. sub FA in
LFq.

Ergo (9.5.) solidum sub FH in FLq. æquabitur solido
sub MLq. in LN, cui [*ut prius*] æquatur cubus LK, & pa-
tet Q.E.D.

Atque hæc etiam demonstratio locum in altioribus
etiam curvis habet, immutatis tantummodo iis, quæ in
prop. 8. dicta sunt.

Cæterum & hæc curvæ Parabolæ appellationibus
designabuntur ob easdem superius allatas rationes; hoc
unico addito, quod Parabolam, quæ ex primi conii se-
ctione oritur *Primam hujus prop.* vocabo, quæ verò ex
secundi Secundam hujus propositionis, & deinceps.

Atque hisce duabus Propositionibus omnium earum
curvarum Genesim demonstravi. quas Illustrissimis, &
Excellentissimis Dominis D. Dominico Judice Hispaniarum
Magnati, & D. Johanni Michaeli Cabanilio Equitum
C.M. Præfecto in meo *Aditu* dicaveram.

P R O P O S I T I O X.

Fig. 10.

Genesis, & Natura earum Hyperbolarum, in quibus applicatarum quadrata, vel cubi, vel quadratoquadrata, &c. excedunt, vel plana sub abscissis inter verticem, & applicatas, & Parametro, vel solida sub abscissis, & quad. Parametri, vel pl plana sub abscissis, & cubo Parametri, & ita in infinitum.

SI conus *ABC* plano per axem, & per diametrum *BC* secetur, secetur autem & altero plano *DFE* secante h^{is} sim conicam secundum rectam lineam *DE*, quæ perpendicularis sit ad diametrum *BC*, & sectionis diameter *IG* producta, cum latere *AC* trianguli per axem extra conii verticem conveniat in *H*, & quidem conus sectus primus sit, recta lineam *MN* ordinatim applicata poterit spatium, quod continetur sub abscissa *FN*, quæ sectionis verticem, & applicatam interjacet, & Parametro *FL*, ad quam eandem habet proportionem recta lineam *FH*, quæ in directum constituitur.

tuitur diametr o sectionis FG , quam AK quad. lineæ, quæ sectionis diametro FG æquidistans à conii vertice A ad trianguli basim BC ducitur, ad rectangulum basis partibus BK, KC , quæ ab ipsa eadem AK æquidistante fiunt, contentum; unà cum alio spatio, quod sub eadem abscissa FN , & alia recta OX , quæ eandem habet proportionem ad OL , sive abscissam FN , quam Parameter LF , ad FH .

Quòd si conus eadem ratione sectus secundus fuerit. & quidem basis circulus BDC huius sit naturæ, ut cubus applicatæ DG æquetur solido sub quadrato CG in GB , cubus applicatæ MN æquabitur solido sub abscissa FN , & quadrato Parameter FL , a quo quod Parameter quad. eandem habet rationem quad. HF , atque cubus AK ad solidum sub quad. KC , in KB , unà cum alio solido sub eadem abscissa FN , & sub dupla FL , & OX in OX , ad cuius OX quadratum eandem habet rationem quadratum abscissæ FN , atque quadratum FH habet ad quadr. Param. FL .

Si denique conus eadem prorsus ratione secundus, tertius fuerit, & quidem circulus BDC huius sit naturæ, ut quadquadratum DG æquetur plplano sub cubo CG in GB , quadquad. applicatæ MN æquabitur plplano sub abscissa FN , & cubo à recta FL Param., vel NO , & OX , tanquam una, ad quem scilicet cubum FL , vel NO eandem habet rationem cubus HF , atque quadratoquad. raturum AK ad plplanum sub cubo CK in KB ,

KB; ad cubum verò rectæ OX eandem habet proportionem cubus abscissæ FN, quam cubus FH, ad cub. Param. F L.

S C H O L I U M.

Eod em modo cæteræ in infinitum curvæ haberi poterunt, quæ magis, magisque se ordine excedant, modo alius, atque alius deinceps cœtus secandus proponatur; unica verò in qualibet harum ficticiæ demonstrationis est, eaque omnino cum Apolloniana convenit, quare hanc ob causam eandem huc afferre methedo supra laudati Astorini, non piguit.

D E M O N S T R A T I O.

Per N in plano trianguli per eum ducatur RS ad BC parallela, eritque (15.11.) planum ductum per MN, & RS ad basim conii parallelum, ac proinde (4. hujus) circulum efficiet ejusdem naturæ, atque est basis circulus; adeoque.

circulus BDC fuerit	(Primus, MN quad.	€	Rectglo sub RN in NS	
	(Secundus, MN cub.		(Æquab. Solido sub RN	in NS quad,
	(Tertius, MN ququad.	€	Plano sub RN	in NS cub,

Ac propterea constructa figura, ut apparet factum.

Pro curva ex sectione primi Coni genita.

	[Rectglum sub FN, & NH, ad rectglum sub
	[FN, & NX (1.6)
	[NH, ad NX (4.6.)
Æquant.	[FH, ad FL (typ.)
hæ Rat.	[AK quad: , ad rectgulum sub CK in KB
	[(23.6.)
	[AK, ad KC, plus AK ad KB. (4.6.)
	[HN, ad NS, plus FN ad NR (23.6.)
		Re:

[Rectglum: sub FN in HN, ad rectglum sub
[NR in NS

Ergo (7.5.) sibi æquantur rectglum sub FN, & NX,
& rectglum sub NR, & NS, cui (*ut prius*) æquatur
quad.NM. sed rectglum sub FN, & NX est id, quod con-
tinetur sub FN abscissa, & Param: FL, unà cum plano sub
eadem abscissa, & OX, ad quam eadem habet proportio-
nem abscissa FN, vel LO, quam FH, ad Param. FL; er-
go patet quad: applicatæ NM æquari plano sub abscissa,
& Param: unà cum plano sub eadem abscissa, & recta
OX. Q.E.D.

Pro curva ex sectione, secundi Coni genita.

Æquant.
hæ Rat. [Solid. sub FN, in NH quad: ad solid: sub FN,
[in NX quad.
[NH quad: , ad NX quad: (4.6.)
[FH quad: ad FL quad: (*byp.*)
[AK cub: ad solid: sub CK quad: in KB (30.
[*lib. 6. Eucl: Bonell:*
[AK quad: ad CK quad,, plus AK, ad KB
[(4.6.)
[HN quad: ad NS quad: plus FN ad NR
[Solid: sub FN in HN quad: , ad solid: sub
[NS quad: in NR.

Ergo (7.5:) solid: sub FN in NX quad: æquabitur so-
lido sub NS quad: in NR, cui (*ut prius*) æquatur eubus
MN applicatæ; sed solid: sub FN in NX quad: est id, quod
continetur sub FN abscissa in quad: Param. FL, unà cum
solido, quod continetur sub eadē abscissa FN, & rectglo
sub 2NO, & OX, in OX, ad cuius OX qua d: eadē habet
proportionē quad: abscissæ, atque est quad: FH, ad quad:
Parametri FL. ergo patet cubum applicatæ NM æquari
solido sub abscissa. & Parametri quad: una cum alio soli-
sub eadem abscissa, &c. Q.E.D.

Pro curva ex sectione tertii Coni genita.

Æquant. hæ Rat.	[Plplanum sub FN, & HN cub., ad plplanum sub FN, & NX cub.
	[NH cub. ad NX cub. (4.6.)
	[FH cub. ad FL. cub. (hyp.)
	[AK ququad., ad plplan. sub CK cub. in KB.
	[AK cub., ad CK cub., plus AK ad KB.
	[HN cub., ad NS cub., plus FN ad NR.
	[Plplanum sub HN cub. in FN, ad plplanum sub NS cub. in NR.

Ergo [9.5.] plplanū sub FN, & NX cubo æquatur plplano sub NS cubo in RN, cui (ut prius) æquatur ququad. applicatæ MN; sed plplanum sub FN in NX cubū æquatur plplano sub FN abscissa in cubū Param. FL, unā cum recta OX tanquam una linea? ergo patet ququad. applicatæ MN æquari plplano sub abscissa in cubum NX, ut supra. Q.E.D.

S C H O L I U M.

Sed nec ab Apollonio discedere visum est in his curvis nomina imponendo, quare nos etiam *Hyperbolas* vocabimus; quadratum enim, vel cubus, vel ququad. &c. cuiuscumque ex applicatis excedit rectangulum, vel solidum, vel plplanum, &c. sub abscissa, & Parametro, vel sub abscissa, & Parametri quadrato, vel denique sub abscissa, & cubo Param., & ita deinceps.

Quoniam autem numero indefinitæ hæ Hyperbolæ sūt; ideo, ut supra in Parabolis factum est, nominibus ordinabilibus easdem designabimus, quare quæ oritur ex sectione primi conii Hyperbola *Prima huius proposit.* nuncupabitur; quæ verò ex sectione secundi *Secunda huius proposit.* &c.

Illud etiam hoc loco monendum censui, demonstra-

D tio-

tionem, qua pro omnibus his in infinitum curvis opus habemus unicam esse, atq; omnino cum Apolloniana convenire; sat enim est, ubi in Apolloniana habetur quadratum, in secunda hyperbola ponere cubum, in tertia quadratoquadratum, in quarta quadcub., & ita deinceps; ubi verò in Apolloniana habetur planum, vel rectglum, in secunda reponi debet solidum, in tertia plplanum, in quarta plsolidum, & ita deinceps; quæ omnia manifestè apparent ex supra allatis demonstrationibus.

P R O P O S I T I O X I.

(Fig. 10.)

Genesis, & Natura omnium Hyperbolarum, in quibus quadrata, vel cubi, vel quadratoquadrata, &c. applicatarum excedunt, vel plana sub abscissis, & Parametro, vel solida sub abscissarum quadratis, & Parametro, vel planoplane sub ascissarum cubis, & Parametro, &c. & ita deinceps in infinitum.

SI conus plano *ABC* per axem, & per diametrum *BC* secetur, secetur autem & altero plano *DFE* secante basim conicam secundum rectam lineam *DE*, quæ ad basim *BC* trianguli per axem,
 vel

vel ad diametrum sit perpendicularis, & sectionis diameter FG producta cum latere AC trianguli per axem extra conii verticem conveniat in H , recta linea MN ordinatim applicata quadratum, si conus primus sit, æquabitur plano, quod continetur sub abscissa FN in Parametru FL , ad quam ea FH , quæ in directum constituitur diametro sectionis, eam proportionem habet, quam AK quad. lineæ, quæ sectionis diametro FG æquidistans à conii vertice A ad trianguli basim BC ducitur, ad rectangulum basis partibus BK, KC , quæ ab ipsa eadem AK æquidistante fiunt, contentum, unà cum alio plano, quod continetur sub eadem abscissa, & alia linea XO , ad quam eam rationem habet abscissa FN , quam recta HF ad Parametrum FL .

Quòd si conus secundus fuerit, & circulus BDC huius sit naturæ, ut cubus applicatæ DG æquetur solido sub quad. BG in GC , cubus applicatæ MN æquabitur solido, quod continetur sub quad. abscissæ in Param., ad quam eam proportionem habet recta HF , ut supra, quam cubus AK , ad solidum sub quad. BK in KC , unà cum alio solido sub quad. ejusdem abscissæ FN in XO , ad quam XO eam rationem habet abscissa FN , quam FH ad FL Parametrum.

Si denique sectus conus tertius fuerit, & quidē circulus BDC huius sit naturæ, ut quiquad. DG æquetur plplano sub cubo BG in GC ; quiquad. applicatæ MN æquabitur plplano sub cubo abscis-

ſæ FN in Param. FL, ad quam eam rationem habet FH, atque quaquad. AK, ad plplanum ſub cubo BK in KC, unà cum alio plplano ſub cubo abſciſſæ in XO, ad quam ita eſt eadem abſciſſa FN, ut FH ad FL Parametrum.

S C H O L I U M.

Eodem modo; & cæteræ curvæ haberi poterunt, quæ magis, magisque ſe ordine excedunt, modò alius, atque alius deinceps conus ſecundus proponatur.

D E M O N S T R A T I O.

Per N in plano trianguli per axem ducatur RS ad BC parallela, eritque (15. 11.) planum ductum per MN, & RS ad baſim conicam parallelum, ac proinde (4. huius) circulum efficiet ejuſdem naturæ, atque eſt baſis circulus; adeoque

ſi circulus BDC fuerit	(Primus, MN quad.)	(Rectglo ſub MN in NS	
	(Secundus, MN cub.)	((Æquab. Solido ſub RN	In NS quad,
	(Tertius, MN quaquad.)	(Plano ſub RN	in NS cub.)

Adeoque, conſtructa figura, ut apparet.

Pro curva ex ſeſſione primi Coni genita.

Æquant: hæ Rat.	[Rectglum ſub FN, & HN, ad rectglum ſub
		FN, & NX (1.6.)
		HN ad NX (4.6.)
		HF ad FL (hyp.)
		AK quad., ad rectglum ſub BK, & KC
		(23.6.)
[AK ad BK, plus AK ad KC [29. 1. & 4.6.]	
[FN, ad NR, plus HN ad NS [23.6.]	
[Rectglum ſub FN, & HN, ad rectglum ſub	
	NR, & NS.	Er.

Ergo (9.5.) sibi æquantur rectglum sub FN, & NX, & rectglum sub NR, & NS, cui (*ut prius*) æquatur quad: NM. Sed rectglum sub FN, & NX est id, quod continetur sub FN abscissa, & Param: FL, unà cum plano sub eadem abscissa, & OX, ad quam eandem habet proportionem abscissa FN, vel LO, quam FH, ad Param: FL. Ergò patet, quad: applicatæ NM æquari plano sub abscissa, & Param: unà cum alio plano sub eadem abscissa, & recta OX. Q.E.D.

Pro curva ex sectione secundi Coni genita.

Æqu: hæ Rat:	Solid: sub FNq; in HN, ad solid: sub FNq. in
	NX (25.11.)
	HN, ad NX (4.6.)
	HF ad FL (<i>hyp:</i>)
	AK cub: ad solid: sub BKq. in KC (30. lib.6.
	Eucl: Borel:)
	AKq. ad BKq; plus AK ad KC. (29.1. & 4.6.)
	FNq. ad RNq; plus HN ad NS.
	Solid: sub FNq. in HN, ad solid: sub RNq. in
	NS.

Ergo (9.5.) sibi æquantur solid: sub FNq. in NX, & solid: sub RNq, in NS, cui [*ut prius*] æquatur cub. NM. Sed solid: sub FNq. in NX, est solid: sub abscissæ FNq. in Param: FL, unà cum solido sub ejusdem abscissæ FNq. in OX, ad quam ita est abscissa FN, five LO, ut HF ad parametrum LF. Ergo patet cubum applicatæ NM æquari solido sub abscissæ quadrato in Parametrum, unà cum solido sub ejusdem abscissæ quad: & alia recta OX, ut supra dictum est. Q.E.D.

S C H O L I U M.

Su perfluum foret hic alias demonstrationes pro aliis curvis addere, cum omnes ex Apolloniana pēdeant, facillimum.

mumque sit quaslibet concinnare, nil enim immutandum est, quàm verba quadrati in cubum, & plani, vel rectigli in solidum, ut in modò allata demonstratione factum est.

Neceffe etiã est, ut & has curvas *Hyperbolas* vocemus, etenim quadratum, vel cubus, &c. applicatæ excedit, vel planum sub abscissa, & Param.; vel solid: sub abscissæ quad: in Parametrum.

Quoniam autem non unica, sed indefinitæ Hyperbolæ sunt, ideo easdem insuper nominibus ordinalibus designabimus; quare Apolloniana *Prima hujus prop:* dicetur, quæ verò oritur ex sectione secundi conii, *Secunda hujus prop:* dicetur, & quæ ex tertii *Tertia hujus prop:* & ita deinceps in infinitum.

P R O P O S I T I O XII.

(Fig. II.)

Genesis, & Natura Oppositarum Hyperbolarum.

SI quæcumque superficies *BAC, AXQ*, quæ sũt ad verticem, plano *BAQXC* per axem, & per diametrum *BC* alicujus ex basibus secantur, secantur autem & altero plano *DEFOHK* non per verticem, secante basim v.g. *BDC* secundum rectam lineam *DE*, quæ perpendicularis sit ad diametrum *BC*, erit in utraque superficierum sectio *DEF, OHK*, quæ vocatur Hyperbola, altera *propof. 10.*, altera verò *propof. 11.* Et duarum Hyperbolarum diameter *MEHN* eadem erit. Parametri verò *EP, HK* inter se æquales erunt

erunt, si sectiones Primæ Hyperbolæ fuerint: si ve-
rò secundæ, & quidem Hyperbola DEF sit
Secunda propof. 10. Parameter EP ad Parametrũ
HR ita erit, ut HE ad EP; si autem sectiones ge-
nitæ Tertie Hyperbolæ fuerint & quidem Hyper-
bola DEF Tertia Propof. 10. Parameter EP ad
parametrum HR eandem habebit rationem, ac
quadratum HE ad quad. EP; & ita eodem modo.

Nota I. Planum ABC fecans basim BDC per diametrũ
BC fecare etiam basim XKQ secundum rectam lineam
XQ, quæ erit diameter circuli XKQ cujuscumque gene-
ris fuerit.

Nota II. Si solidum sub quad: BM in MC æquetur cubo
applicatæ DM; in circulo XKQ solidum sub quad: QN in
NX æquabitur cubo applicatæ NK, quæ omnia ex propo-
4. huius patent.

His præmissis. Quòd utriusque sectionis diameter sit
eadem, id quidem ex hyp: patet.

Quòd verò cum sectio DEF est Hyperbola prop. 10, al-
tera OHK sit Hyperbola prop: 11: in hunc modũ demon-
strari potest.

Per A ducatur ALY parallela sectionũ diametro MN;
fitque Hyperbola DEF secunda prop: 10. cujus Parameter
EP. Similia [29. 1. & 4.6.] erunt triangula ALC, AYX,
item ALB, AYQ. quare

Æq. hæ Rat.	[HE quad: ad EP quad: [hyp, & 10. huius]
	[AL cub: ad solid: sub CL quad: in BL [30 lib. 6. Euclid. Borel.]
	[AL quad: ad LC quad:, plus AL ad LB [4.6.]
	[AY quad: ad YX quad:, plus AY ad YQ.
	[AY cub: ad solid: sub YX quad: in YQ [11 huius.
	[EH ad HR Param.

Unde patet sectionem OHK Hyperbolam secundam
prop. 11. esse, quod demonstrare opus erat.

Quod si Hyperbola DEF secunda fuerit propof. 11. OHK erit secunda propof. 10. nec dissimilis est demonstratio.

Quodd autem Parametri æquales inter se sint, si Hyperbolæ primæ fuerint, demonstravit Apollonius. Quodd verò, si Hyperbolæ secundæ fuerint, ut supra dictum est. Parameter EP, ad Param. HR eandem rationem habeat, ac HE ad EP, id manifestè dēducitur ex modò allata demonstratione; ab ea enim colligitur, ita esse HE quadratū ad EP quadratum, ut HE ad HR Param: unde continuè proportionales erunt HE, PE, HR; quare erit PE Parameter ad HR Param, ut HE ad EP. Q.E.D.

Si Hyperbola DEF tertia fuerit prop. 10. demonstrabitur ita esse cubum HE ad cubum EP, ut EH ad HR, unde apparet ità esse PE Param. ad RH Param. ut HE quad. ad EP, &c.

SCHOLIUM.

Hæ autem curvæ *Oppositæ Hyperbolæ* Apolloniano more vocari possunt.

PROPOSITIO XIII.

(Fig. 12.)

SI conus quicumque ABC plano per axem, & per diametrum BC secetur, secetur autem & altero plano LEF conveniente cum utroque latere trianguli per axem & quod non sit parallelum plano basis. Planum autem in quo est conus basis BC conveniat cum plano secante secundum rectam lineam EQ: quæ sit perpendicularis ad

ad diametrum BC ad partes G producta, si opus fuerit: sectio LME primus circulus erit: si conus ABC fuerit primus, atque si continue proportionales fuerint BG, GA, GC: intellige autem rectam AG esse in plano trianguli per axem, nec non parallelam LF diametro sectionis productae ad F.

Quod si conus ABC secundus fuerit, ita ut solidum sub quad. CV in VB aequetur cubo applicatae DV, atque eodem modo instituaturs sectio, omnibusque ut supra positis, BG ad GA sit, ut quadratum GA ad GC quadratum, sectio LME secundus circulus erit.

Si denique conus eadem ratione secundus tertius fuerit, ita ut pl. planum sub cubo CV in VB aequetur quad. quadrato applicatae VD, atque ita sit BG ad GA, ut GA cubus ad CG cubum, sectio LME tertius circulus erit, & ita eodem modo in caeteris conis.

Sumpto quolibet puncto M in curva LME applicetur MN, & per N ducatur RNS parallela diametro BC; tum per rectas RS, MN ducatur planum RMS, quod parallelum erit [15.11.] basi conicae; ac propterea (4. hujus) circulum efficiet, cujus diameter RS, applicata vero (10.11.) recta MN, adeoque

Si circulus ABC fuerit,	Primus, MN quad.	(Recto sub RN in NS
	Secundus, MN cub.	Aequab.	Solido sub RN in NS quad,
	Tertius, MN ququad.	(Pl. lano sub RN in NS cub,

Adeoquē si conus primus fuerit

[BG ad GA (4.6.)

[BF ad FL (4.6.)

[RN ad NL [ut prius)

E

BG

Æquant.
hæ Rat. [BG ad GA (*byp.*)
[GA ad CG (4.6.)
[EF ad FC (4.6.)
[EN ad NS.

Ergo (11.5.) ita EN ad NS, ut RN ad NL; quare \cup 16.6
rectglum sub EN in NL æquatur rectglo sub RN in NS,
cui æquatur quad. NM. Ergo rectglum sub EN in NL
æquatur quadrato applicatæ NM; ac propte rea sectio
circulus erit. Q.E.D.

Si Conus secundus fuerit.

Æquant.
hæ Rat. [BG ad GA (4.6.)
[BF ad FL [4.6.]
[RN ad NL [*ut prius*]
[BG ad GA (*byp.*)
[GAq. ad CGq. (4.6. 22.6.)
[EFq. ad FCq. (4.6.)
[ENq. ad NSq.

Ergo (11.5.) ita est RN ad NL; ut EN q. ad NS q. quare
solid. sub EN q. in NL æquabitur solido sub RN in NSq.,
cui (*ut prius*) æquatur cubus applicatæ NM; ergo patet
sectionem LME circulum secundum existere. Q.E.D.

S C H O L I U M.

Eadem demonstratione in altioribus opus est.

Hujusmodi autem sectiones Subcontraria vocentur.

PROPOSITIO XIV.

(Fig. 12.)

Iisdem autem positis, si circulus BDC bujus sit naturæ, ut cubus DV æquetur solido sub quadrato BV in VC, vel quadratum DV æquetur pl plano sub cubo BV in VC, &c. sectio LME circulus erit, & quidem primus, si existente cono ABC primo, ita sit BG ad GA, ut GA ad GC.

Vel circulus secundus erit, si existente cono ABC secundo, ita fuerit BG quadratum ad GA quadratum, ut GA ad CG.

Vel denique tertius circulus erit, si existente tertio cono ABC, ita fuerit BG cubus ad GA cubum, ut BA ad GC, & ita eodem modo in infinitum.

Omnibus enim, ut supra in proposit. 13. constructis.

circulus BDC fuerit	(Primus, MN quad.)	(Recto sub RN in NS
	Secundus MNCub.		Æquab. Solido sub RN in NS quad,
	Tertius, MN ququad.		pl plano sub RN in NS cub,

Æqu. hæ hæ Rat.	[BG ad GA (4.6.)
	[BF ad FL (4.6.)
	[RN ad NL (ut prius)
	[BG ad GA (hyp.)
	[GA ad GC (4.6.)
	[EF ad FC (4.6.)
	[EN ad NS

Ergo ita EN ad NS, ut RN ad NL, ac propterea (16.6.) planum sub EN in NL æquabitur plano sub NS, & RN,

E 2

cui

cui [ut prius] æquatur quadratum MN; ergo planum sub EN in NL æquabitur quadrato MN; unde sectio LME est circulus Q.E.D.

Si conus secundus fuerit.

Æqu. hæ Rat.	{	BG quad:ad GAq. [4. & 22.6.]
		BF quad:ad FL quad: [4.6]
		RN quad:ad NL quad: [ut prius]
		BG quad:ad GA quad: [hypo:]
		GA ad CG [4.6.]
		EF ad FC [4.6.]
	[EN ad NS

Ergo RN quadratum ad quadratum NL, ut EN ad NS. Ergo solidum sub quadrato NL in EN æquabitur solido sub quadrato RN in NS, cui [ut prius] æquatur cubus NM. Ergo solidum sub quadrato NL in NE æquabitur cubo NM, ac propterea sectio LME secundus circulus erit. Q.E.D.

S C H O L I U M.

Hujusmodi etiam sectiones *Subcontrariæ* vocentur.

P R O P O S I T I O X V.

(Fig. 13.)

Genesis, & Natura earum Ellipsium;
 in quibus applicatarum quadrata,
 vel cubi, vel quadratoquadrata, &c.
 deficiunt vel à planis sub abscissis,
 in Parametrū, vel solidis sub abscissis
 in

in Parametri quadratum, vel à plano planis sub abscissis in Parametri cubum, & ita eodem ordine in infinitum:

SI conus plano ABC per axem, & diametrum BC secetur, secetur autem & altero plano FMH conveniente cum utroque latere trianguli per axem, atque secante planum basis conii secundum rectam lineam GP , quæ perpendicularis sit ad diametrum circuli BDC , productam, si opus fuerit, ad partes K , nec subcontrariè ponatur, rectæ lineæ MN ordinatim applicatæ quadratū, æquabitur plano sub abscissa FN , & Parametro FL , ad quam eandem rationem habet diameter FH , atque quadratum AK rectæ parallelæ diametro FH ad planum sub BK , & CK , minus plano sub eadem abscissa FN , vel OX , & rectæ XL , ad quam XL eandem habet proportionem abscissa OX , vel FN , quam diameter FH ad Parametrum FL .

Quòd si conus secūdus fuerit, & circulus BDC huius naturæ, ut solidum sub quadrato CG in GB æquetur cubo applicatæ DG , cubus applicatæ NM æquabitur solido sub abscissa FN , & quadrato rectæ NO , vel FX deficientis à Parametro FL , rectæ LX , ad quam LX ita est abscissa FN , atque diameter FH ad Parametrum FL .

Si

Si denique conus tertius fuerit, & circulus BDC hujus naturæ, ut plplanum sub cubo CG in GB æquetur quaquadrato applicatæ DG; quatum applicatæ NM æquabitur planoplano sub abscissa, & cubo rectæ NO, vel FX, deficientis à Parametro FL rectæ LX, ad quam LX ita est abscissa FN, atque diameter FH ad Parametrũ FL

S C H O L I U M.

Eadẽ ratione ex quarti, quinti, & sexti conii, &c. sectionibus cœteræ in infinitum curvæ magis compositæ haberi possunt. Demonstratio autem unica in omnibus est, atque omnino cum Apolloniana convenit; unde facillimum erit cuilibet propositæ curvæ accomodare.

D E M O N S T R A T I O.

Per N ducatur recta RNS ad BG. parallela: Ergo (15. 11.) planum per RS, NM, parallelum erit basi conii, atque conum secando (4. huius) circulum efficiet, ejusdem quidem naturæ, atque est basis circulus: adeoque

Si circulus BDC fuerit (Primus, MNquad. (Rectglu sub RN in NS
 Secundus, MNcub. (Aequ. Solid, sub RN in NS qua
 Tertius MNququad. (Plplan. sub RN in NS cub,

Ergo pro curva ex primi Coni sectione orta.

- [Rectglum sub HN in FN, ad rectglum sub FN, & NO (1.6.)
- [Equ. hæ NH ad NO (4.6.)
- [Rat. HF ad FL (hypo)
- [AK quad: ad rectglum sub KC in KB (23.6.)
- [AK ad KC, plus KA ad KB.
- [HG ad CG, plus FG ad GB (4.6.)
- [HN ad NS, plus FN ad NR (23.6.)

Rej

[Rectglum sub HN in FN ad rectglum sub NS in NR

Ergo (9. 5.) rectglum sub FN, & NO æquatur rectglo sub NS in NR, cui (*ut prius*) æquatur quadratum NM. Ergo rectglum sub FN, & NO, vel FX æquatur quadrato NM. Sed rectglum sub FN, & NO, vel FX est id, quod continetur sub abscissa FN, & recta FX, deficiente à Parametro FL recta XL, ad quam eandem habet proportionem abscissa FN, vel OX, quam diameter FH ad Parametrum FL? ergo patet Q.E.D.

Pro curva ex sectione secundi Coni orta.

Æqu: hæ
Rat.

- [Solidum sub FN, & quad: NH ad solid: sub FN, & quad:NO.
- [HN quad: ad NO quad: (4. 22. 6.)
- [HF quad: ad FL quad: (*hyp.*)
- [AK cub: ad solid: sub CK quad: in KB (30. lib. 6. Eucl. Bor.)
- [AK quad: ad CK quad: plus AK ad KB (4. & 22. 6.)
- [HG quad: ad CG quad: plus FG ad GB (4. 6.)
- [HN quad: ad NS quad: plus FN ad NR
- [Solid: sub HN quad: in FN ad solid: sub NS quad: in NR.

Ergo (9. 5.) sibi æquantur solidum sub NO quad: & FN, & solidum sub NS quadratum in NR, cui (*ut prius*) æquatur cubus applicatæ NM. Ergo solidum sub quadrato NO, vel FX æquatur cubo applicatæ NM. Sed solidum sub FX quadrato in FN est id, quod continetur sub abscissa FN, & quadrato rectæ FX deficiente à Parametro FL recta XL, ad quam IX ita est quadratum abscissæ, ut diameter FH ad Parametrum FL. Ergo patet, quod E.D.

Pa

Pro curva ex sectione tertii Coni orta.

- Æquant.
hæ Rat.
- [Plplanum sub FN, & cubo NH ad plplanum
 - [sub FN, & cubo NO
 - [Cub: NH ad cub: NO
 - [Cub: HF ad cub: FL [hyp.]
 - [Ququad: AK ad plplanum sub cub: CK in κB
 - [AK cub: ad cub: CK, plus AK ad κB [4.6.]
 - [HG cub: ad CG cub. plus FG ad GB [4.6.]
 - [HN cub. ad NS cub: plus FN ad NR
 - [Plpla. sub HN cub: in FN ad plpla: sub NS
 - [cub: in NR

Ergo [9.5.] sibi æquantur plplanum sub FN, & cubo NO, & planum sub cubo NS in NR, cui [ut prius] æquatur quadratum applicatæ NM. Ergo æquantur plplanum sub cubo NO, vel FX, & ququadratum applicatæ NM. Sed plplanum sub FN, & cubo FX est id quod continetur sub abscissa FN, & cubo rectæ FX, deficientis à Parametro FL recta XL, ad quam LX eandem habet rationem abscissa FN, vel OX, quam diameter FH ad Parametrum. Ergo manifestè apparet, quod D. susceperam.

S C H O L I U M.

Curvas modo descriptas *Ellipses* vocare æquum est, quandoquidem eodem nomine Apollonius usus est, cum quadrata, vel cubi, vel ququadrata, &c. applicatarum deficient à planis, vel solidis, vel plplanis, quibus comparantur.

Quoniam autem non una, sed numero indefinitæ hæ curvæ sunt, ideo easdem ordinalibus nominibus designare necessum puto. Quare quæ oritur ex sectione primi conii *Prima Ellipsis* nuncupabitur, numerumque hujus propositionis addemus. Quæ verò ex secundi sectione

ne

tionem oritur *Secunda hujus propositionis Ellipsis; & quæ ex tertii Tertia, & ita deinceps eodem ordine.*

Atque hoc etiam loco animadvertere licet, demonstrationem, qua usus sum, omnino cum Apolloniana convenire, ubi enim in illa habetur quadratum, in hac habetur cubus, aut quadratoquadratum, &c. ubi verò in Apolloniana habetur rectangulum in hac habetur, vel solidum, vel planum, &c.

PROPOSITIO XVI.

(Fig. 13.)

Genesis, & Natura earum Ellipsium, in quibus quadrata, vel cubi, vel quadratoquadrata, &c. applicatarum deficiunt vel à planis sub abscissis in Parametrum, vel à solidis sub abscissarum quadratis in Parametrum, vel à planoplanis sub abscissarum cubis in Parametrum, &c.

Si conus ABC plano ABC per axem, & per diametrum BC secetur, secetur autem & altero plano FMH conveniente cum utroque latere trianguli, atque secante planum basis conii secundum rectam lineam GP, quæ perpendicularis sit ad diametrum BC productam, si opus fuerit, ad partes K, nec subcontrariè ponatur, rectæ lineæ NM ordinatim applicatæ quadratum, si conus

F pri-

primus fuerit, æquabitur plano sub abscissa, in Parametro FL , ad quam eandem habet rationem diameter FH , quam quadratum AK rectæ parallelæ diametro sectionis FG , ad planum sub CK in KB , minus plano sub eadem abscissa in rectam XL , ad quam ita est eadem abscissa, ut diameter FH ad Parametrum FL .

Quòd si conus secundus fuerit, atque circulus BDC bujus naturæ, ut solidum sub quadrato GB in GC æquetur cubo applicatæ DG , rectæ applicatæ NM cubus æquabitur solido sub abscissæ FN quadrato in Parametrum FL , ad quam eandem rationem habet diameter FH , quam cubus AK ad solidum sub quadrato KB in CK , minus solido sub quadrato abscissæ FN in XL , ad quã XL ita est eadem abscissa FN , ut diameter ad Parametrum.

Si denique conus eadem ratione secundus tertius fuerit, & circulus BDC bujus naturæ, ut plplanum sub BG cubo in CG æquetur ququadrato applicatæ GD , quadratoquadratum applicatæ NM æquabitur plplano sub abscissæ FN cubo in Parametrum FL , ad quam eandem habet rationem diameter FH , quam ququadratum AK ad planoplanum sub cubo BK in CK , minus plplano sub ejusdem FN cubo in LX , ad quam XL ita est abscissa FN , ut diameter FH ad Parametrum FL .

SCHO.

S C H O L I U M.

Eodem prorsus modo in altioribus curvis operandum, ita ut facillimum cuique sit, quamlibet hujus generis curvam invenire.

D E M O N S T R A T I O.

Per N ducatur recta RNS parallela diametro BC: ergo planum ductum per RS, NM parallelum erit plano basis conici, ac propterea sectio RMS circulus erit [4. hujus] ejusdem quidem naturæ, atque est basis circulus: adeoque,

Unde.

Si circulus BDC fuerit (Primus, MNquad. (Re&glo sub RN in NS
 Secundus, MNcub. (Aequ. Solid, sub RN in NS qua.
 Tertius, MNququad. (Plplan. sub RN in NS cub.

Pro curva ex sectione primi conici genita.

[Rectglum sub FN in NH ad rectglum sub
 [FN in NO (1.6.)
 [NH ad NO (4.6.)
 Equ: hæ [HF ad FL (hyp.)
 Rat. [AK quad: ad rectglum sub KB in KC [23.6.]
 [AK ad KB, plus AK ad KC [4.6.]
 [FG ad GB, plus HG ad GC [4.6.]
 [FN ad NR, plus NH ad NS [23.6.]
 [Rectglum sub FN in NH ad rectglum sub
 [NR in NS.

Ergo [9.5.] sibi æquantur rectglum sub FN, & NO, & rectglum sub RN, & NS, cui [ut prius] æquatur quadratum applicatæ NM. Ergo sibi æquantur rectglum sub FN, & NO, & quadratum NM. Sed rectangulum sub FN, & NO est rectglum sub abscissa FN & Parametro FL, minus rectglo sub eadem abscissa FN, vel OX, & recta LX ad quam ita est abscissa OX, ut diameter FH ad Parametrum FL. Ergo patet, Q.E.D.

F 2

Pro

Pro curva ex sectione secundi Coni genita.

- [Solid: sub FN quad: in NH ad solid: sub FN
 quad: in NO
 [NH ad NO (32.11.)
 [HF ad FL (*hyp.*)
 Æquant. hæ Rat. [AK cub: ad solid: sub KB quad: in KC (30.
 lib.6. *Eucl. Bor.*)
 [AX quad: ad KB quad: plus AK ad KC (4.6.)
 [FG quad: ad GB quad: plus HG ad CG (4.6.)
 [FN quad: ad NR quad: plus HN ad NS
 (Solid: sub FN quad: in HN ad solid: sub NR
 [quad: in NS

Ergo (9.5.) sibi æquantur solidum sub FN quadrato in NO, & solidum subquadrato NR in NS, cui (*ut prius*) æquatur cubus applicatæ NM. Ergo sibi æquantur cubus applicatæ NM, & solidum sub quadrato FN, & NO. Sed solidum sub quadrato FN in NO æquatur solido sub quadrato abscissæ FN in Parametrum, minus solido sub ejusdem abscissæ FN quadrato in XL, ad quam ita est abscissa FN. vel OX, ut diameter FH ad Parametrum FL. Ergo patet Q.E.D.

Pro curva ex sectione tertii conii genita.

- [Plplanū sub FN cub: in NH ad plplanum sub
 [cubo FN in NO
 [NH ad NO (4.6.)
 Æquant. hæ Rat. [HF ad FL (*hyp.*)
 [AK ququad: ad plplan. sub KB cub. in KC;
 [AK cub. ad KB cub; plus AK ad KC
 [FG cub. ad GB cub., plus HG ad GC
 [FN cub. ad RN cub: plus HN ad NS
 [Plplanum sub FN cub. in HN ad plplanum
 [sub RN cub: in NS

Er.

Ergo (9.5.) sibi æquantur plplanum sub cubo FN in NO & plplanum sub RN cubo in NS, cui (*ut prius*) æquatur ququadratum applicatæ NM. Ergo sibi æquantur ququadratum applicatæ NM, & plplanum sub cubo FN in NO. Sed plplanum sub cubo FN in NO, vel FX est id quod continetur sub cubo abscissæ FN in Parametrum FL, minus plplano sub cubo FN, vel OX in XL, ad quam XL ita est abscissa FN, vel OX, ut diameter FH ad Parametrum FL. Ergo patet Q.E., D.

S C H O L I U M.

Hæ autem curvæ *Ellipses* vocentur, nam & in his quadrata, vel cubi, vel ququadrata applicatarum, &c, deficient, à planis, vel solidis, vel planoplanis, &c. quibus comparantur.

Quoniam verò & hæ *Ellipses* indefinitæ sunt, ideo numeris ordinalibus easdem designabimus. Quarè Apollonia, vel quæ oritur ex sectione primi conii, *Prima hujus Prop.* vocabitur, quæ verò oritur ex sectione secundi conii *secunda hujus prop.*, & quæ ex tertii *Tertia*, & ita in infinitum eodem ordine.

Notandum hoc loco etiam est, allatam pro his curvis demonstrationem unicam esse, atque omnino cum Apolloniana convenire paucis tantummodo immutatis, ut supra dictum est.

P R O P O S I T I O XVII.

(Fig. 14.)

In Parabola prima prop. 8. quadrata applicatarum EC, FD sunt inter se, ut AE, AF abscissa ab ipsis. In secunda verò ejusdem propos. Parabola cubi

cubi applicatarum EC, FD, sunt inter se, ut eadem abscissæ AE, AF. In tertia autem ejusdem propositionis Parabola, quadrata applicatarum EC, FD sunt inter se, ut eadem abscissæ AE, AF, & ita in infinitum in altioribus.

Pro Prima Parabola, Parametro AG.

[EC quad: ad FD quad: (prop. 8. huius &
[7.5.)
Æquant: [Rectglum sub AE, & AG ad Rectglum sub
hæ Rat. [AF, AG (1.6.)
[AE ad AF, Q.E.D.

Pro secunda Parabola, Parametro AG.

[EC cubus ad FD cubum (8. hujus, & 7.5.)
Æquant. [Solid. sub AG quad. in AE, ad solid: sub AG
hæ Rat. [quad: in AF [32.11.]
[AE ad AF, Q.E.D.

Pro tertia Parabola, Parametro AG.

[EC ququad: ad FD ququad: (8. hujus &
[7.5.)
Aquant. hæ [Plplanum sub AG cub. in AE ad plpla: sub
Rat. [AG cub. in AF.
[AE ad AF, Q.E.D.

PROPOSITIO XVIII.

(Fig. 14.)

In prima Parabola prop. 9. quadrata applicatarum EC, FD sunt inter se, ut ab ipsis abscissæ AE, AF. In secunda Parabola ejusdem 9. propos. ap.

applicatarum EC , FD cubi sunt inter se, ut abscissarum AE , AF quadrata. In tertia denique Parabola ejusdem propositionis ita sunt inter se applicatarum quaquadrata, ut abscissarum AE , AF cubi, & ita eodem ordine in infinitum.

Pro prima Parabola, cujus Parameter AG

[EC quad: ad FD quad. (7. 5. & 9. hujus)
 [Rectglum sub GA , AE ad rectglum sub GA ,
 Æqu. hæ [AF (1. 6.)
 Rat. [AE ad AF . Q.E.D.

Pro secunda Parabola, cujus Parameter AG

[EC cub: ad FD cub: (7. 5. & 9. hujus)
 [Solid: sub GA in AE quad: ad solid: sub GA
 Æqu. hæ [in quad: AF [31. 11.]
 Rat. [AE quad: ad AF quad: Q.E.D.

Pro tertia parabola, cujus Parameter AG

[EC ququad: ad FD ququad: (7. 5. & 9. hujus)
 [Plplan: sub GA in AE cub: ad plplanum sub
 Æqu. hæ [GA in AF cub.
 Rat. [AE cub: ad AF cub: Q.E.D.

P R O P O S I T I O XIX.

(Fig. 15.)

In primis Hyperbolis proposit. 10., & primis Ellipsis proposit. 15. quadrata applicatarum DE , FG , ita sunt ad rectgla contenta sub lineis EB , EA , & GB , GA , ut Parameter AC ad diametr, AB . In Hyperbola autem intellige, AB esse rectam inter oppositas hyperbolas interceptam. Quadrata

ta verò earundem applicatarum inter se sunt, ut prædicta rectangula inter se.

In secundis verò Hyperbolis, atque Ellipsis earundem propositionum, cubi applicatarum DE, FG ad solida sub AE, & quadrato EB, ac sub AG in quadratum GB, ut AC Parametri quadratū ad quadratum AB, cubi verò inter se, ut prædicta solida.

In tertiis denique hyperbolis, atque ellipsis earundem prop., ita applicatarum DE, FG quinquadrata ad plplana sub AE, & cubo EB, & sub AG in cubum GB, ut cubus Parametri AC ad cubum AB: quinquadrata verò prædicta, ut ipsa plplana, & ita in infinitum.

Producantur DE, FG donec occurrant BC productæ in punctis H, K; quare in prima hyperbola, & Ellipsi.

- Æq. hæ
Rat.
- [DE quad: ad rectglum AE, EB (10. vel 15. hujus, & 7.5.)
 - [Rectglum sub AE, EH ad rectglum sub AE, EB (1.6.)
 - [EH ad EB (4.6.)
 - [AC Parameter ad AB, & patet primum.
 - [GK ad GB (1.6.)
 - [Rectglum sub GK in GA ad rectglum sub GA in GB (7.5. & prop. 10. vel 15. hujus
 - [FG quad: ad rectglum sub GA, GB

Atque (alternando) DE quadratum ad FG quadratum, ut rectglum sub AE, EB ad rectglum sub AG, GB. Q.E. secundo loco D.

In secunda hyperbola, & Ellipsi.

- Æqu. hæ
Rat.
- [DE cub: ad solid. sub AE, in BE quad. (7.5. & 10. vel 15. hujus)
 - [Solid. sub AE, in EH quad. ad solid: sub AB in EB quad. EH

- [EH quad: ad EB quad:
 [AC quad: ad AB quad: Q.E. primo loco D.
 Æqu: hæ [GK quad: ad GB quad:
 Rat. [Solid: sub GK quad: in AG ad solid: sub GB
 [quad: in AG (10. & 15 hujus & 7. 5.
 [Cub: FG ad solid: sub AG in GB quad:

Atque [alternando] DE cub: ad FG cubum, ut solidum sub AE in EB quadratum ad solidum sub AG in GB quadratum. Q.E. ultimo loco D.

In Tertia hyperbola, & Ellipsi.

- [DE ququad: ad plpla: sub AE in EB cub: (7.5
 [& 10, vel 15, hujus.
 Æquant. [Solid. sub AE in EH cub: ad plpl. sub AE in
 hæ Rat. [EB cub.
 [EH cub. ad EB cub.
 [AC cub. ad AB cub. Q.E. primo loco D.
 [GK cub. ad GB cub.
 [Plpla: sub AG in GK cub. ad plplan. sub AG
 [in GB cub. (7.5. & 10, vel 15 hujus]
 [FG ququad. ad plplan. sub AG in GB cub.

Atque [alternando] DE ququadratum ad FG ququadratum, ut plplanum sub AE in EB cub: ad plplanum sub AG in GB cub. Q.E. ultimo loco D.

PROPOSITIO XX.

(Fig. 15.)

In primis Hyperbolis prop. 11., & primis Ellipsibus propof. 16. hujus, quadrata applicatarum DE, FG ita sunt ad reſt angula sub AE, EB, & sub AG, & GB, ut Parameter AC ad reſtã AB, quæ oppoſitas ſeſiones interjacet, & earundem applica-

G ta

tarum quadrata sunt inter se, ut praedicta re-
ctangula.

In secundis vero Hyperbolis, & Ellipsis ea-
rundem propos. cubi applicatarum DE, FG ad soli-
da sub quadrato AE in EB, & sub quadrato AG
in GB, ut AC, ad AB, & cubi applicatarum sunt
inter se, ut praedicta solida.

In tertiis denique Hyperbolis, & Ellipsis ita
sunt applicatarum quaquadrata ad plana sub
cubo AE in EB, & sub cubo AG in GB, ut AC ad
AB, & ita eodem modo in infinitum.

Si hyperbola, vel Ellipsis prima fuerit, patet ex antece-
denti.

In secunda Hyperbola, & Ellipsi.

	[DE cub. ad solid. sub quad. AE in EB (7.5. &
	[11. vel 16. hujus)
Æquant.	[Solid. sub AE quad. in EH ad solid. sub AE
hæ Rat.	[quad. in EB
	[EH ad EB
	[AC ad AB Q. E. primo loco D.
	[GK ad GB
	[Solid. sub GK in quad. GA ad solid. sub GB
	[in quad. GA (7.5. & 11. vel 16. hujus)
	[Cub: FG ad solid. sub GB in quad. GA.

Atque [alternando] DE cubus ad cubum FG, ut solidum
sub quadrato AE in EB ad solidum sub quadrato AG in
GB. Q. E. ultimo loco D.

In tertia Hyperbola, & Ellipsi.

	[DE quaquad. ad plplanum sub cub. AE in EB
	[(7.5. & 11. vel 16. hujus)
Æquant.	[Plplan. sub AE cub. in EH ad plplan. sub cub.
hæ Rat.	[AE in EB
	[EH ad EB (4.6.)

AC

[AC ad AB, & patet Q.E primo loco D.

[GK ad GB.

[Plapla. sub Gk in cub. GA ad Plplan. sub GB

[in cub. GA (7.5. & 11. uel 16. hujus.)

[FG cub. ad solid: sub GB in cub. GA.

Atque [alternando] ut quuadratum DE ad quuadratum FG, ita plplanum sub cubo AE in EB ad plplanum sub cubo AG in GB Q.E. ultimo loco D.

L E M M A. Fig. 16.

Recta linea AC indefinita a partes V bifariam dividatur in D, atque infra D, ad partes V sumatur quodlibet punctum, B, dico quadratum AB majorem habere rationem ad rectangulum ADB, quam quadratum AC ad rectangulum ADC.

Quod si AC ita in D secta fuerit, ut AD dupla sit DC, cubus AB ad solidum sub quadrato AD in DB in majori ratione erit, quam cubus AC ad solidum sub quadrato AD in DC.

Quod enim quadratum AB majorem rationem habeat ad rectangulum ADB; quam quadratum AC, &c. ita patet. Dividatur AB bifariam in E; ergo rectangulum AEB majus erit rectangulo ADB; ac propterea in majori ratione erit quadratum AB ad rectangulum ADB, quam ad rectangulum AEB. Sed (4.2.) ut quadratum AB ad rectangulum AEB, ita quadratum AC ad rectangulum ADC. Ergo quadratum AB ad rectangulum ADB in majori ratione erit, quam quadratum AC ad rectangulum ADC. Q.D.E.

Quod vero cubus AB ad solidum sub quadrato AD in DC, &c. majorem rationem habeat, ita patet. Fiat ut AC ad AD, ita AB ad AE, ergo (ex doctrina de Maximis, & Minimis) solidum sub quadrato AE in EB majus erit solido sub

G 2

qua.

quadrato AD in DB , quare in majori ratione erit cubus AB ad solidum sub AD quadrato in DB , quàm ad solidum sub quadrato AE in EB . Sed ut cubus AB ad solidum sub quadrato AE in EB , ita cubus AC ad solidum sub quadrato AD in DC . Ergo cubus AB ad solidum sub quadrato AD in DB in majori ratione erit, quàm cubus AC ad solidum sub quadrato AD in DC . Q.E.D.

S C H O L I U M.

Eadem ratione si AC ita in D secta fuerit, ut AD sit tripla, vel quadrupla, &c. ipsius DC demonstrabitur quaquadratum, vel quocubum, &c. AB in majori ratione esse ad plplanũ, vel plsolidum &c. sub cubo, vel quaquadrato AD in DB , quam quaquadratum, vel quosolidum, &c. AC , ad plplanum, vel plsolidum sub cubo, vel quaquadrato AD in DC , & ita eodem modo in infinitum.

Idem dicendum, si AC ita in D secta fuerit, ut AD sit subdupla, vel subtripla, &c. ipsius DC , nam hoc casu cubus, vel quaquadratum, &c. AB majorem haberet proportionem ad solidum sub AD in quadratũ DB , vel ad plplanum sub AD in DB cubum, quàm cubus, vel quaquadratum AC ad solidum sub AD in quadratum DC , vel ad plplanum sub AD in cubum DC &c. quod monuisse sufficiat.

P R O P O S I T I O XXI.

(Fig. 17.)

Si Parabola DEG prima fuerit prop. 8. hujus, sumtoque in ipsa quolibet puncto E , ducatur ab ipso EC applicata ad diametrum DB , atque AD sit equalis DC inter verticem, & ordinatam EC , recta, quæ per puncta A, E , ducitur, parabolam in puncto E tanget.

Si

Si verò Parabola DEG fuerit secunda ejusdem propositionis, & DA dupla DC , recta AE tanget in puncto E .

Si deniq; Parabola DEG fuerit tertia ejusdem propos. 8. & AD tripla DC , recta AE tanget in semper puncto E .

Eodem modo si DEG fuerit quarta Parabola, & DA quadrupla AC , & si DE fuerit quinta, & DA etiam quintupla DC , & ita in infinitum, AE erit tangens.

Ex quolibet puncto G applicetur ad diametrum DB recta GB occurrens AE productæ, si opus fuerit, in puncto F .

Pro Prima Parabola

Quoniam itaque recta linea AC indefinita ad partes V secta est bifariam in D , sumptumque est punctum B infra D ad partes V , majorem rationem habebit quadratum AB ad rectangulum ADB , quam quadratum AC ad rectangulum ADC , & alternando, in majori ratione erit quadratum AB ad quadratum AC , quam rectangulum ADB ad rectangulum ADC , vel (1.6.) DB ad DC . vel (17. hujus) GB quadratum ad EC quadratum. Ergo quadratum AB ad quadratum AC , vel (4. & 22.6.) quadratum FB ad quadratum EC in majori ratione erit, quam GB quadratum ad quadratum EC . Ergo quadratum FB majus est quadrato GB , ac propterea FG major GB : unde punctum F erit extra parabolam DEG . Q.E.D.

Pro secunda Parabola.

Quoniam recta AC indefinitè producta ad partes V ita in D secta est, ut AD dupla sit ipsius DC , atque infra D ad partes V sumptum est punctum B , cubus AB ad solidum sub quadrato AD in DB majorem rationem habebit, quam cubus AC ad solidum sub eodem quadrato

AD

AD in DC, & altern. cubus AB ad cubum AC majorem proportionem habebit, quàm solidum sub quadrato AD in DB, ad solidum sub quadrato AD in DC, hoc est quam DB, ad DC, vel [17. *hujus*] quam cubus GB ad cubum EC. Sed ut cubus AB ad cubum AC, ita cubus FB ad cubum EC. Ergo cubus FG majorem rationem habebit ad cubum EC, quàm cubus GB ad eundem cubum EC; ac propterea [10.5.] FB major erit GB, unde patet punctum F esse extra Parabolam. Q.E.D.

Pro tertia Parabola.

Quoniam AD tripla est ipsius DC, eodem modo ex *Lemmate ant.* quiquadratū AB maiorē habebit rationē ad quiquadratū AC, sive quiquadratū FB ad quiquadratū EC, quàm plplanum sub cubo AD in DB ad plplanum sub cubo AD in DC, hoc est, quàm DB ad DC, vel (17. *hujus*) quàm quiquadratum GB ad quiquadratum EC. Ergo quiquadratum FB ad quiquadratum EC majorem proportionem habebit, quàm quiquadratum GB ad quiquadratum EC, ac propterea [10.5.] FB maior GB, & punctum F extra Parabolam. Q.E.D.

P R O P O S I T I O XXII.

(Fig. 17.)

Si Parabola DEG fuerit prima propos. 9. hujus, et in ipsa sumatur quodlibet punctum E, à quo applicetur EC ad diametrum DB abscindens rectam DC, cui equalis ponatur DA, & jungantur puncta A, E, recta AEF, hæc parabolam DEG in puncto E tanget.

Si verò Parabola DEG fuerit secunda ejusdem propos. 9. hujus, & DC fuerit dupla DA, AEF erit tangens.

Quòd si Parabola DEG fuerit tertia, & DC tri-

tripla DA, AE erit etiam tangens, & ita eodem ordine in infinitum.

Si Parabola prima fuerit, demonstratum est in antecedenti, AE parabolam tangere in puncto E.

Si verò Parabola secunda fuerit prop. 9. hujus, ita procedet demonstratio. Quoniam AC indefinitè producta ad partes V, ita secta est in D, ut AD subdupla sit ipsius DC, atque in ipsa infra D ad partes V sumptum est punctum B, majorem rationem habebit cubus AB ad solidum sub AD in quadratum DB, quàm cubus AC ad solidum sub AD in quadratum DC, atque *alter* in majori ratione erit cubus AB ad cubum AC, vel FB cubus ad cubum EC, quàm solidum sub AD in quadratum DB, ad solidum sub AD in quadratum DC, vel quàm quadratum DB ad quadratum DC, vel [18. hujus] quàm cubus GB ad cubum EC. Ergo cubus FB ad cubum EC majorem rationem habebit, quàm cubus GB ad cubum EC, ac propterea [10.5.] FB major erit recta GB, & patet punctum F esse extra Parabolam. Q.D.E.

Si autem Parabola DEG fuerit tertia prop. huius, eodem modo (*ex lemmate anteced.*) quiquadratum AB ad quadratoquadratum AC, sive quiquadratum FB ad quadratoquadratum EC majorem rationem habebit, quàm planum sub AD in cubum DB ad planoplanum sub AD in cubum DC, hoc est quàm quiquad. DB ad quiquad. DC, vel (18. hujus) quàm quiquad. GB ad quiquad. EC. Ergo in majori ratione erit quiquad. FB ad quiquad. EC, quàm quadratoquadratum GB ad quadratoquadratum EC. Ergo (10.5.) FB major erit GB, ac propterea punctum F erit extra Parabolam Q.D.O.

S C H O L I U M.

Ex his, quæ in medium attuli, facillima se prodit ratio, qua, cujuscumque Parabolæ datæ tangentes in dato puncto invenire possibile esset, atque adeo ea omnia perage-
re

re, quæ ab Apollonio hac de re tradita sunt: quæ quidem omnia silentio præterire visum est, cum quisque proprio Marte, nulloque negotio perficere possit.

P R O P O S I T I O XXIII.

(Fig. 18.)

Si in prima Hyperbola prop. 10. vel prima Ellipsi prop. 15. sumatur aliquod punctum C, ab eoque recta linea CD ad diametrum BD ordinatim applicetur, & quam proportionem habent lineæ BD, & AD interjectæ inter ordinatim applicatam CD, & sectionum vertices A, B, eandem habeant inter se, BE, AE partes diametri inter vertices, recta linea EC conjungens punctum E in diametro, & punctum C in sectione, sectiones ipsas continget.

Quòd si Hyperbola, aut Ellipsis secunda fuerit earundem propositionum; omnibusque ut supra peractis, fiat ut BD ad 2 AD, ita BE ad EA, recta linea EC conjungens puncta E, C tangens sectiones ipsas erit.

Et si Hyperbola, vel Ellipsis tertia fuerit earundem propositionum, & fiat ut DB ad 3 AD, ita BE ad AE, recta linea conjungens puncta E, C sectiones continget.

Sumto quolibet puncto in CE, ut F, ordinatim applicetur FG ad diametrum BD, sectioni occurrens in H, & per A, & B ducantur AL, BM ad EF parallelæ, & protrahantur CD, BM usquedum sibi mutuò occurrant in puncto K, ducantur etiam rectæ BCX, GCM; igitur

(39.)

(29.1. & 4.6.) similia erunt inter se triagula CBE, & XBA; BCK, XCM; BCN, XCO. Atque hæc omnibus Hyperbolis, & Ellipsis communia sunt. Sed

In prima Hyperbola, & Ellipsi.

Æqu. hæc [BK ad AN (4.6.)
 Rat. [BD ad AD (byp.)
 [BE ad EA (2.6.)
 [BC ad CX
 [BK ad NX.

Ergo (9.5.) sibi æquantur AN, & NX; adeoque [Not. primò.] Rectglū ANX, sive quadratum AN maius est rectglo AOX (ex doctrina de Maximis, & Minimis). Ac propterea majorem proportionem habet NX ad OX, quàm AO ad AN.

[Secundò.] KB ad BM est, ut NX ad OX; nam NO ad KM, ut OC ad CM, vel ut OX ad MB; ergo (alternando, & componendo) erit NX ad OX, ut KB ad BM. Ergo (ex nota 1. præced.) KB ad BM in majori ratione erit, quàm AO ad AN; quare rectglum sub KB, & AN majus erit rectglo sub BM, & AO.

[Tertio.] Quoniam AN ad CE, ita AD ad DE, & ut CE ad KB, ita ED ad DB, erit rectglum sub AN in KB ad quadratum CE, ut rectglum ADB ad quadratum ED. Quare rectglum ADB ad quadratum DE, ut rectglum sub KB, & AN ad quadratum CE. Sed rectglum sub KB, & AN (ex not. 2.) majus est rectglo sub BM, & AO. Ergo majorem proportionem habet rectglum ADB ad quadratum DE, quàm rectglum sub MB, AO ad quadratum CE, vel ob similitudinem triangulorum, quàm rectglum sub AG, & GB ad quadratum GE. Ergo (altern.) erit BDA ad BGA, vel (propositione 19. huius) quadratum CD ad quadratum GH in majori ratione, quàm DE quadratum ad EG, sive, quàm CD ad FG. Ergo [10.5.] HG minor est FG, ac propterea punctum F est extra curvas. Q.D.E.

H

Pro

Pro tertia Hyperbola, & Ellipsi.

Sit ES dimidium S , item CV dimidium VX , ergo.

- [BK ad AN (4.6.)
- [BD ad DA (*byp.*)
- Æqu. hæc [BE ad ES (2.6, & *byp.*)
- Rat. [BC ad CV (4.6.)
- [Bk ad tertiam partem XN

Ergo (9.5.) XN tripla est ipsius NA ac propterea (*Not. Primò*) plplanum sub cubo NX in NA (*ex doctrina de maximis, & minimis*) majus erit plplano sub cubo OX in OA ; undè majorem proportionem habebit cubus NX ad OX cubum, quàm OA ad AN .

(*Secundò*) Ex ijs, quæ suprà demonstrata sunt, cubus KB ad cubum MB , ut cubus NX ad OX cubum. Ergo (*ex nota præced.*) cubus KB ad cubum MB in majori ratione erit, quàm AO ad AN : quare plplanum sub cubo KB in AN majus erit plplano sub cubo MB in AO .

(*Tertio*) Ex supra demonstratis ita erit plplanum sub AN in cubum KB ad ququadratum CE , ut plplanum sub AD in cubum DB ad ququadratum DE . Quare plplanum sub AD in cubum DB ad ququadratum DE majorem rationem habebit, quàm plplanum sub AO in cubum MB ad ququadratum CE , vel quàm plplanum sub AG in cubum GB ad plplanum GE . Undè (*altern.*) plplanum sub DA in cubum DB ad plplanum sub AG in cubum GB ; vel (*propositione 19. huius*) ququadratum CD , ad ququadratum HG majorem proportionem habebit, quàm ququadratum DE ad ququadratum GE , vel quàm ququadratum DC ad ququadratum FG . Ergo (10.5.) HG minor est FG , & patet punctum F esse extra curvas. *Q.E.D.*

P R O P O S I T I O . X X I V .

(Fig. 18.)

Si in prima Hyperbola prop. 11. vel in prima Ellipsi prop. 16. sumatur quodlibet punctum C, ab eoque applicetur CD ad diametrum AB, & quam proportionem habent rectæ BD, AD interjectæ inter applicatam CD, & sectionum vertices A, B; eandem habeant inter se BE, EA partes diametri inter vertices; recta linea EC puncta conjungens, curvas in puncto C tanget.

Si verò hyperbola, aut ellipsis secunda fuerit earundem propositionum, & fiat, ut DB ad dimidiam partem AB, ita BE ad EA; recta EC hyperbolam, aut ellipsim continget.

Et si denique hyperbola, aut ellipsis fuerit tertia earundem propositionum, atque sit BD ad tertiam partem AD, ita BE ad AE; recta EC tangens curvarum erit. Ita in infinitum eadem ratione operandum erit.

Omnibus enim, ut in prop. antecedenti, constructis, quando hyperbola, aut ellipsis est prima, patet propositum ex iis, quæ modò attulimus. Quando autem hyperbola, aut ellipsis est secunda, ita demonstratur. Ob similitudinem triangulorum, ut supra.

[KB ad AN (4.6.)
 Æquant. [BD ad DA (hyp)
 hæ Rat. [BE ad 2EA [4.6.]
 [EBC ad 2CX (4.6.)
 [BK ad 2XN

Ac

propterea (7.5.) AN dupla erit ipsius NX. Unde
(*Not. Primò.*) Solidum sub quadrato AN in NX majus
erit solido sub quadrato AO in OX; atque adeo majorem
proportionem habebit NX ad OX, quàm quadratum AO
ad quadratum AN.

(*Secundò*) Quoniam' ex iis, quæ in anteced: prop: dicta,
& demonstrata sunt, ita est KB ad BM, ut NX ad OX,
erit KB ad BM in majori ratione, quàm quadratum AO
ad quadratum AN, ac propterea solidum sub quadrato
AN in KB majus erit solido sub quadrato AO in BM.

(*Tertiò*) Ita est solidum sub quadrato AN in KB ad cu-
bum CE, ut solidum sub quadrato AD in DB ad cubum
DE. Ergo [ex not. 2.] solidum sub quad. AD in DB ad cubum
DE majorem proportionem habebit, quàm solidum sub
quadrato AO in MB ad cubum CE, vel quàm solidum sub
quadrato AG in GB ad cubum GE. Ergo (*altern.*) solidum
sub quadrato AD in DB majorem proportionem habebit,
ad solidum sub quadrato AG in GB, vel (20. prop. hujus)
cubus CD ad cubum HG majorem proportionem habe-
bit, quàm cubus ED ad cubum EG, vel quàm cubus CD,
ad cubum FG. Ergo (10.5.) HG minor est FG, ac propterea
punctum F erit extra hyperbolam, aut ellipsim. Q.E.D.

Pro tertiâ Hyperbola, aut Ellipsi.

Omnibus ut supra constructis, facillimè demonstrabi-
tur AN triplam esse ipsius NX. Quare.

(*Not. Primò*) Plplanum sub cubo AN in NX majus erit
plplano sub cubo AO in OX, unde majorem proportio-
nem habebit XN ad XO, quàm cubus AO ad cubum AN.

(*Secundò*) Quoniam, ut supra demonstratum est, ita
KB ad BM, ut NX ad OX, erit etiam (*ex not. anteced.*)
KB ad BM in majori ratione, quàm cubus AO ad cubum
AN: quare plplanum sub KB in cubum AN majus erit pl-
plano sub MB in cubum AO.

(*Tertiò*) Ita est plplanum sub cubo AN in KB ad ququa-
dratum CE, ut plplanum sub cubo AD in DB ad ququadra-
tum

tum DE Ergo (ex not. 2. præced.) plplanum sub cubo AD in DB ad ququadratum DE majorē rationē habebit, quàm plplanum sub cubo AO in MB ad ququadratum CE , ve quàm plplanum sub cubo AG in GB ad ququadratum GE Ergo (alternando) plplanum sub cubo AD in DB ad plplanum sub cubo AG in GB , vel (20. huius) ququadratum CD ad ququadratum HG majorē rationem habebit, quàm ququadratum ED ad ququadratum EG , sive quàm ququadratum CD ad ququadratum FG ; ac propterea FG (10. 5.) major erit HG . Unde punctum F erit extra propositas curvas. **Q. E. D.**

S C H O L I U M.

Atque quatuor his propositionibus ea omnia demonstrata sunt, quibus ad inveniendas tangentes omnium Parabolarum, Hyperbolarum, atque Ellipsium opus est. Quæ cum literis mandassem, in ea incidi, quæ habentur in *Geometrica Exercitatione* cardinalis Michaelis Angeli Riccii, eximii sanè GeCoetræ; in qua ea quæ ad tangentes spectant, methodo parùm à mea diversa explicata offendi. An verò in iis, quæ meditatum se ait de infinitarum curvarum genesi, quidquam cum meis inventis commune fueram divinare nō possum; nullus siquidem, quem sciam, illa vidit unquam; nec satis ex eius verbis colligi potest; ait enim loco citato: *Quare pergimus ad reliqua usum præstantissimum habentia ad inveniendas plurium linearum tangentes, figurarum centra gravitatis, & quadraturas, & ad alia, item multa, quæ iusto servamus operi; ubi dabimus novam solidorum conicorum seriem, qui secti exhibent infinitas; uti vocant, hyperbolas, infinitas parabolas, infinitas ellipses, & analogiam servando circulos etiam infinitos.* Maximè autem lætarer, si quid mihi cum tanto viro commune esset. Quid enim mihi iucundius accidere posset, quàm ea sub prima iuventute excogitasse, quæ viro doctissimo, jamque seni, in mentem venissent!

PR O-

P R O B L. I.

Fig. 19.

Sit data recta AB, quæ debeat esse diameter cuiuscumque ex parabolis, ita ut A sit vertex, Parameter autem recta Z, applicatae autem in dato angulo, oportet quæsitam parabolam in plano, in quo est recta AB, delineare.

In subiecto plano, in quo est AB, excitetur planum ipsi perpendiculare incedens per rectam AB, quod sit FDE. Tum in subiecto plano ducatur recta VA faciens cum AB angulum VAB æqualẽ dato, vel ipsius ad duos rectos, complemento. Ex puncto deinde A in plano in sublimi agatur recta AC faciens cum AB angulum CAB æqualem duabus tertiis duorum rectorum, & ponatur AC æqualis datæ rectæ Z. Tum supra AC in plano in sublimi, constituatur triangulum æquilaterum DAC; & per VA, AC ducatur planũ, in quo describatur circulus AOC, aut primus, aut secundus, prout opus fuerit: cuius quidẽ circuli diameter sit AC. Vertice deinde D, circulo AOC, conus describatur DAOC indefinitè productus ad partes EF & per punctum B in plano in sublimi ducatur recta FBE parallela ipsi AC; item in subiecto plano ducatur recta GBH parallela ipsi VA. Ergo [15.11.] planum per rectas GH, FE parallelũ erit plano AOC, ac propterea [4. hujus] sectionẽ faciet in cono ADC producto eiusdẽ naturæ, atq; est circulus AOC. Quia igitur planũ in sublimi DFE perpendicularare est ad subiectũ planum, in quo est AB, recta CA perpendicularis erit ad VA, & quoniam [hyp.] VA ipsi GB, FB ipsi CA parallela est, erit (10.11.) angulus FBG rectus. Planum autem subiectum sectionem faciat GAH. Dico hanc esse parabolam quæsitam iuxta descriptum circulum. Sit enim circulus FGE secundus, ita ut solidam sub quadra-

drato EB in BF sit æquale cubo ordinatæ GB ; dico sectionem GAH secundam Parabolam prop. 8, huius fore. Quoniam enim secundus conus DFE sectus est plano per axem, & per diametrum AC , sive (*4. huius*) FE , secatur item (*hypo.*) altero plano GAH secante basim coni secundum rectam lineam GH , quæ perpendicularis est ad diametrum FE , & sectionis diameter AB æquidistat DE uni laterum trianguli per axem, nam angulus CAB æquatur angulo ACD ; quilibet enim æquatur duabus tertiis duorum rectorum; erit sectio GAH parabola secunda prop. 8. huius, cuius vertex A , diameter AB , applicatæ autem omnes ipsi GB parallelæ in dato angulo. Parameter autem erit recta linea, ad cuius quadratum ita erit quadratum DA , ut cubus FE ad solidum sub quadrato DF in DE , sed cubus FE æquatur solidum sub quadrato DF in DE . Ergo quadratum DA æquatur quadrato Parametri, quare DA , vel (*hypo.*) AC ve Z erit Parameter. Unde factum est. Q.E.F.

P R O B L. II.

Fig. 20.

Data recta linea AB in plano FBH , Hyperbolam quamcumque in eodem plano invenire, ita ut data AB sit diameter inter oppositas Hyperbolas interjecta, Parameter autem sit data recta BC : applicatæ verò sint in angulo dato VBA .

In subiecto plano FBH excitetur planum perpendiculare IDO , atque ex puncto B erigatur in quolibet angulo recta BC æqualis Parametro, jungaturque AC . Tum in plano in sublimi IDO ducatur recta DE parallela ipsi AB , itaut æquentur BE , ED , quod ita facile est, ut demonstrationem afferre necesse non sit, jungaturque BD . Deinde in subiecto plano FBH ducatur recta VB datum angulum

quam cum AB constituens, atque per VB, BC planum agatur, in quo circulus describatur, prout opus fuerit, cuius diameter sit BC. Tum vertice D, basi autem circulo BSC conus describatur DBSC indefinite productus ad partes I, O. Dico hunc conum talem esse, ut sectio facta in ipso à plano FBH sit quaesita hyperbola; cuius diameter BA, Parameter BG; applicatae autem in dato angulo.

Oporteat enim quaesitam Hyperbolam esse secundam propof. 11. hujus.

Sit itaque circulus BSC secundus, ita ut solidum sub quadrato BE in EC aequetur cubo applicatae SE. Tum sumpto quolibet puncto infra B, ut G. Ducatur in plano in sublimi recta IGO parallela BC; item in subjecto plano recta FGH parallela VB. Quoniam itaque FG ipsi VB, & IO ipsi BC parallela est, erit [15. 11.] planum ductum per IO, FG parallelum plano basis conii BSC, & propterea [4. huius] circulum efficiet ejusdem quidem naturae, atque est circulus basis, cuius diameter erit IO. Item, quia planum IDO rectum est ad planum FBH, erit BC perpendicularis ad rectam BV, quare [10. 11.] FG erit etiam perpendicularis ad IO. Unde solidum sub quadrato IG in GO aequabitur cubo rectae FG. Quoniam itaque conus secundus DIO secatur plano DIO per axem, & per diametrum IO, secatur autem & altero plano FBH, sectionem faciente FBH, cuius diameter BG aequidistat [hypo.] rectae DM à conii vertice ad diametrum circuli basis IO, erit sectio FBH, quae hyperbola dicitur, cuius diameter erit BG, quae vero inter oppositas hyperbolas interiicitur, erit recta AB. Quod vero sit secunda propof. 11. cuius Parameter data BC, ita patet. Sumpto in hac hyperbola quolibet puncto, ut L, applicetur LR & per R ducatur NQ parallela IO. Quoniam itaque NQ ipsi BC, & RL ipsi FG, vel VB parallela est [15. 11.] erit planum ductum per NQ, RL parallelum plano IFO, ac
I
pro.

propterea sectio NLQ secundus circulus erit. Quare solidum sub quadrato NR in RQ æquabitur cubo ER . Quoniam autem [ex hyp.] DE æquatur EB , erit etiam [4. 6.] BR æqualis RN ; unde solidum sub quadrato abscissæ BR in RQ æquabitur cubo applicatæ RL . At solidum sub quadrato abscissæ BR in RQ est id, quod continetur sub quadrato BR in BC , vel [34. 1.] RP , unâ cum alio solido sub eiusdem abscissæ quadrato in PQ ; ad quam PQ ita est abscissa BR , vel CP , ut AB ad BC . Quare [11. hujus] sectio FBH hyperbola secunda prop. 11, erit, cujus Parameter BC , applicatæ verò in dato angulo VBG , vel VBA . $Q.E.F.$

P R O B L E M A III.

(Fig. 21. 22. & 23.)

CUM huius problematis solutionem diversam ab Apolloniana investigarem, in aliam veritatem incidere mihi contigit, videlicet fieri posse, ut sectio Cylindrica sit etiam Ellipsis quæcumque, modò diversos Cylindros imaginemur bases habentes circulos supra expostos. Quare lubet propositum solvere problema, conis, atque cylindris adhibitis; ab his enim, quæ afferam, quavis pauca, quæ de quorumcumque cylindrorum sectionibus dici possunt, manifestè apparebunt. Hoc autem præmonere inutile non erit, si cylindrus, quemcūque circulum pro basi habens, plano ipsis basibus parallelo secetur, sectione esse circulum eiusdem quidem naturæ, atque sunt basium circuli. Id autem ex ipsa cylindri genesi patet. Hoc itaque præmissis.

Oporteat datis duabus rectis lineis AB, AC Ellipsim quamcumque invenire, cuius diameter sit AB , Parameter AC , applicatæ in datis angulis, oporteat autem inveniendam Ellipsim esse in plano, in quo est AB :

In subiecto plano, in quo est AB , excitetur planum perpendicularare DEB , vel (*fig. 23.*) $DABC$; in hoc deinde plano in sublimi ducatur recta BD , quemlibet angulum faciens cum AB , sitque BD æqualis BA , iungaturque DA . Tum ex puncto A in sublimi plano ducatur AC parallela BD , atque æqualis dato Parametro, iungaturque BC . Aut itaque rectæ DA , BC supra AC , aut infra convenient, aut parallelæ erunt. Si conveniunt, ducta BG in dato plano faciente datū angulū cū AB , æqualem nempe ei, quæ applicatæ constituunt, per rectas BG , DB planū ducatur DOB , in quo circulus describatur, cuius diameter DB , iuxta Ellipsim quæsitam. Vertice deinde E , circulo DOB , conus describatur $EDOB$. Si autem non conveniunt rectæ DA , BC in plano $DOBG$ circulus DOB describatur, cuius diameter DB , & super hunc circulum Cylindrus constitutur, cuius latera rectæ DA , BC . Dico sectionem ALB facta à subiecto plano, in quo est AB , in conis Ellipsim esse, cuius diameter AB , Parameter AC applicatæ autem in dato angulo. Oporteat enim quæsitam Ellipsim esse secundam propositionis 16. hujus. Circulus DOB huius sit naturæ, ut solidum sub quadrato DT in TB æquetur cubo TO . Et sumto quolibet puncto in sectione, ut L , applicetur recta LI ad diametrum AB , & per L ducatur SV parallela DB , & per SV , LI planum ducatur, quod parallelum erit plano DOB ; etenim LI parallela est BG , ac propterea sectio SLV circulus erit eiusdem naturæ, atque est basis circulus, cuius diameter SV . Item quia planum $DACB$ rectū est subiecto plano ALB , erit GB perpendicularis ad DB , ac propterea (10. 11.) & LI perpendicularis erit ad diametrum SV , atque adeo solidum sub quadrato SI in IV æquabitur cubo applicatæ IL . Quoniam autem ut est [4. 6.] DB ad BA , ita est SI ad IA , & DB (*hyp*) æquatur BA ; ergo SI æquabitur IA , unde solidum sub quadrato abscissæ AI in IV æquabitur cubo applicatæ LI . Sed solidum sub quadrato abscissæ AI in IV æquatur soli-

do sub eiusdem abscissæ AI quadrato in AC , minus solido sub eiusdem abscissæ AI in AF , ad quam AF ita est abscissa AI , ut diameter BA ad AC . Ergo (16. huius) patet sectionem ALB in utroque cono EBD , ellipsim 16. prop. huius esse, cuius diameter AD , Parameter AC . applicatæ autem in dato angulo ABG , nam LI parallela est ipsi BG ; quare factum erit, quod erat faciendum.

Sectionis autem in cylindro $ACCB$ facta secundus circulus erit, quandoquidem solidum sub quadrato AI , in IV æquatur solido sub quadrato AI in IB . Quare solidum sub quadrato AI in IB æquabitur cubo applicatæ IL , & patet fieri posse, ut sectio cylindri scaleni sit etiam circulus eiusdem naturæ, atque est circulus basis.

Ita autem ex cylindro ellipsis quæcumque erri potest
[fig. 24.]

Sit, ut supra. in plano, in quo est AB describenda secunda ellipsis prop. 16. huius; cuius diameter sit AB , parameter AC applicatæ in dato angulo ABG . In plano, in quo est AB erigatur planum perpendiculare $DFBA$ incedens per datam AB . Tum fiat ut CA ad BD , ita BD quadratum ad BA quadratum, & connectatur BD ad quemlibet angulum cum AB in plano in sublimi. Item per BD , BG ducatur planum DOB , in quo describatur circulus DOB , cuius diameter DB , ita ut solidum sub quadrato DT in TB æquetur cubo applicatæ TO . Deinde super hunc circulum construatur cylindrus $DAFB$, cuius unum laterum sit recta, quæ jungit puncta DA . Dico subiectum planum, in quo est AB , sectionem facere ALB , quæ secunda ellipsis erit, ita ut cubus cuiuscumque applicatæ LI æquetur solido sub abscissæ AI quadrato in AC , minus solido sub eiusdem abscissæ AI quadrato in RC , ad quam eandem habet proportionem abscissa AI , quam diameter AB ad AC . Sumpto quolibet puncto, ut L , ab eodem applicetur LI , & per I in subiecto plano ducatur SV , ergo (15 11) planum per SV , IL parallelum erit plano basis cylindri DBO

DOB , unde sectio SLV circulus erit eiusdem naturæ, atque est basis circulus, atque [10, 11.] LI perpendicularis erit ad SV , quæ SV erit diameter circuli, unde solidum sub quadrato SI in IV æquabitur cubo IL . Quare constructa figura, ut apparet, erit.

[Solid. sub quad. AI in IB ad solid. sub AI quad. in IQ
 [BI ad IQ (4.6.)
 Æquant. [BA ad AC (hypo.)
 hæ Rat. [AB cub. ad DB cub.
 [AI cub. ad IS cub. (30. lib. 6. Eucl. Borel.
 [AI quad. ad IS quad. plus AI ad IS (4.6.)
 [AI quad. ad IS quad. plus BI ad IV .
 [Solid. sub AI quad. in BI ad solid. sub IS quad. in IV .
 [

Ergo [7.5.] sibi æquantur solidum sub quadrato AI in IQ , & solidum sub quadrato SI in IV , cui (ut prius) æquatur cubus IL ; Ergo patet solidum sub quadrato abscissæ AI in IQ æquari cubo applicatæ IL . Sed solidum sub quadrato AI in IQ æquatur solido sub quadrato abscissæ IA in AC , minus solido sub quadrato eiusdem abscissæ IA in RC , ad quam RC eandem proportionem habet abscissa AI , vel QR , quàm diameter AB ad AC . Ergo patet sectionem ALB esse ellipsim propositionis 16. huius, cuius diameter est AB , Parameter AC , applicatæ verò in dato angulo $ABG.Q.E.F.$

Atque hæc satis sint ad ea omnia demonstranda, quæ de quorumcumque cylindrorum sectionibus dici possunt; tam cum sectio est circulus, quàm ellipsis; quicumque enim ea benè perceperit, quæ de ellipsis prop. 13. 14. 15. & 16. huius supra demonstrata sunt, facillime, & hæc intelliget; etenim & ipsa demonstratio in omnibus ellipsis tam prop. 15., quàm prop. 16., huius, eadem fere est, atque à modo allata deduci potest.

Quarè non solum Apollonius longè, lateque Promotus mihi

mihī est, sed Serenus ipse, quod ultimæ laudis nō esse, vel ipsos detractores fateri omnino necessum est. Maximas interim eis gratias ago, quandoquidem ipsis me falsò criminantibus impulsus, ea peregi, quæ nunquam fieri posse putaveram, videlicet, ut ex horum, quos inveni, conorum sectionibus tam elegantes haberi possent cujuscumque generis curvæ.

F I N I S.

