




A 546392

N<sup>o</sup>



*Philip Earl Stanhope.*

QA  
35  
M386E  
1.2







ELEMENTA  
SECTIONUM  
CONICARUM

*Conscripta ad usum*

FAUSTINÆ  
PIGNATELLI

Principis Colubranensis, & Tol-  
vensis Ducatus Hæredis

*Edita vero in gratiam*


STUDIOSÆ JUVENTUTIS

AUCTORE

NICOLAO DE MARTINO

Regio Mathematicum Professore

T O M. II.



Excudebat FELIX MOSCA sumptibus CAJETANI  
ELIÆ Superioribus annuentibus NEAPOLI  
M D C C X X I V.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# LIBER V. <sup>3</sup>

## *De Tangentibus, & Secantibus Sectionum Conicarum.*



**D**etrina diametrorum, quibus pollent conicæ sectiones, ad exitum perducta; sequitur modo, ut eam aggrediamur, quæ respicit tangentes, & secantes earundem curvarum. Et tangentem quidem conicæ sectionis eam vocamus rectam lineam, quæ conicæ sectioni subinde occurrit, ut producta tota cadat extra eam. Per contrarium vero secantem appellamus illam, quæ, quum producitur, cadit intra conicam sectionem. Quæ igitur proprietates competant rectis istis, hoc libro breviter ostendemus.

### C A P. I.

*Proprietates, quæ ellipsis tangentibus competunt, ostenduntur.*

I. **C**irca tangentes ellipsis, jam illud <sup>I.</sup> *Proprietates*  
superius ostensum est, quod si ex <sup>duas princ-</sup>  
*vertice alicujus diametri recta linea ducatur* <sup>pales, quæ</sup>  
*ellipsi tan-*  
A 2 or-

4 SECTIONUM CONICARUM

genti compe-  
tunt  
FIG. I.

*ordinatis ejus parallela, ea tangat ellipsim in solo illo vertice. Nunc autem subjungemus, quod in locum, tangente, & ellipsi contentum, nulla alia cadat recta linea.*

Sit enim ellipsis  $AMB$ , cujus  $AB$  sit diameter aliqua,  $AD$  parameter ejus, &  $DAH$  recta, ordinatis ejusdem diametri parallela. Dico, quod sicuti recta  $DAH$  contingit ellipsim in solo vertice  $A$ , ita in locum, contentum tangente, & eadem ellipsi, nulla alia recta linea duci possit ex eodem vertice  $A$ .

Si fieri potest, ducatur recta alia  $AI$ , in qua sumpto puncto quovis  $P$ , agatur per illud recta  $PN$ , ipsi  $DH$  parallela, conveniens cum recta  $BD$  in puncto  $O$ . Et quoniam, propter ellipsim,  $MN$  quadratum est æquale rectangulo  $ANO$ ; erit  $PN$  quadratum majus illo rectangulo. Quare, si extendatur  $NO$  usque in  $S$ , ita ut  $PN$  quadratum sit æquale rectangulo  $ANS$ , & jungatur  $AS$ ; hæc secabit rectam  $BD$  in puncto aliquo  $Q$ .

Ducatur ergo per punctum istud  $Q$  recta  $QI$ , eidem  $AH$  parallela. Et quoniam  $PN$  quadratum est æquale rectangulo  $ANS$ ; erit, ut  $PN$  quadratum ad  $AN$  quadratum, ita rectangulum  $ANS$  ad idem  $AN$  quadratum; sive etiam, ita  $NS$  ad  $AN$ . Sed  $PN$  quadratum est ad  $AN$  quadratum, ut  $IK$  quadratum ad  $AK$  quadratum. Et  $NS$  est ad  $AN$ , ut  $KQ$  ad  $AK$ ; sive etiam, ut rectangulum  $AKQ$  ad  $AK$  quadratum; sive demum, ut  $LK$  quadratum ad  $AK$  quadratum. Quare erit  $IK$  quadratum æquale quadrato, quod fit ex  $LK$ . Quod fieri non potest.

II. Quæ-

II. Quælibet ergo recta linea, quæ ex puncto contactus ducitur infra tangentem, necesse est, ut primo secet ellipsum, tum cadat in locum, tangente, & ellipsi contentum. Hinc autem duo consequuntur, quæ aditum nobis aperient ad ostendendas proprietates omnes, quæ ellipsis tangentibus competunt.

II.  
Corollaria,  
quæ ex dua-  
bus præce-  
dentibus  
proprieta-  
tibus conse-  
quuntur.

Primum est, quod ad unum, idemque punctum ellipsis nonnisi unica tangens duci possit. Nam, si duci possent tangentes duæ; jam una caderet in locum, ellipsi, & tangente altera comprehensum. Quod quidem ostensum est fieri non posse.

Alterum est, quod si recta linea contingat ellipsum in puncto aliquo, ea debeat esse parallela ordinatis illius diametri, quæ pertinet ad illud punctum. Nam aliter, ducta ex eo puncto recta alia, ordinatis iis parallela, foret ista quoque tangens ellipsis; atque adeo ad unum, idemque punctum ellipsis duæ tangentes duci possent. Quod fieri nequit.

III. His jactis principiis, facile modo erit, eas primam tangentis proprietates ostendere, quæ ei competunt, ubi alicui diametro occurrit: Tangens igitur ET, ducta ad punctum E, verticem diametri EF, conveniat cum diametro altera AB in puncto T. Et ducatur, tam ad diametrum AB ordinata EG, quam ad diametrum EF ordinata AO.

III.  
Proprieta-  
tes, quæ per-  
tinent ad  
tangentem  
ellipsi, all-  
cui diame-  
tro occur-  
rentem.  
FIG. 2.

Primo itaque erit, ut CT ad CA, ita CA ad CG. Nam, ex superius ostensis, BG est ad AG, ut FO ad EO; & componendo, AB est ad AG, ut EF ad EO; & capiendo antecedentium dimidia, CA est ad AG, ut CE ad

A 3

EO;

6 SECTIONUM CONICARUM  
 EO; & convertendo, CA est ad CG, ut CE  
 ad CO. Sed, propter parallelas AO, ET, ut est  
 CE ad CO, ita est CT ad CA. Quare erit ex  
 æquali, ut CT ad CA, ita CA ad CG.

Secundo erit, rectangulum AGB æquale  
 rectangulo CGT: adeo, ut AG erit ad CG, ut  
 est TG ad BG. Quum enim CT sit ad CA, ut  
 est CA ad CG; erit CA quadratum æquale  
 rectangulo TCG. Sed CA quadratum est æ-  
 quale rectangulo AGB una cum CG quadra-  
 to. Et rectangulum TCG est æquale rectan-  
 gulo CGT una cum eodem CG quadrato.  
 Quare, dempto communi quadrato ex CG, re-  
 manebit rectangulum AGB æquale rectan-  
 gulo CGT.

Tertio, si AD sit parameter ipsius diame-  
 tri AB, erit, ut EG quadratum ad rectangulum  
 CGT, ita parameter AD ad diametrum AB.  
 Jam enim, propter ellipsim, in hac ratione est  
 EG quadratum ad rectangulum AGB. Sed re-  
 ctangulum AGB ostensum est æquale rectan-  
 gulo CGT. Quare in eadem pariter ratione  
 erit quadratum ordinatæ EG ad rectangulum  
 aliud CGT.

Denique erit rectangulum ATB æquale  
 rectangulo CTG: adeo, ut erit AT ad GT, ut  
 est CT ad BT. Nam idem CT quadratum est  
 æquale, tam duobus rectangulis CTG, TCG,  
 quam rectangulo ATB una cum CA quadra-  
 to. Quare duo rectangula CTG, TCG æqua-  
 lia erunt rectangulo ATB una cum CA qua-  
 drato. Sed, ob rectas continue proportionales  
 CT, CA, CG, quadratum ex CA est æquale  
 rectangulo TCG. Quare etiam rectangulum  
 ATB

**E L E M E N T A.**

**ATB** æquale erit rectangulo **CTG**.

**IV.** Sed facile quoque erit, *conversas harum proprietatum ostendere*. Nimirum primo, quod recta **ET** sit tangens ellipsis, si utique **CT** sit ad **CA**, ut est **CA** ad **CG**. Nam, ex superius ostensis, **BG** est ad **AG**, ut **FO** ad **EO**; & componendo, **AB** est ad **AG**, ut **EF** ad **EO**; & capiendo antecedentium dimidia, **CA** est ad **AG**, ut **CE** ad **EO**; & convertendo, **CA** est ad **CG**, ut **CE** ad **CO**. Sed, ex hypothesis, **CA** est ad **CG**, ut **CT** ad **CA**. Quare erit ex æquali, ut **CT** ad **CA**, ita **CE** ad **CO**: & propterea recta **ET**, velut ipsi **AO** parallela, tangens erit ellipsis.

**IV.**  
*Præcedentium proprietatum conversæ demonstrantur.*  
**Fig. 2.**

Secundo, quod recta **ET** tangat ellipsim in puncto **E**, si fuerit rectangulum **AGB** æquale rectangulo **CGT**; atque adeo, ut **AG** ad **CG**, ita **TG** ad **BG**. Nam, semper ac rectangulum **AGB** est æquale rectangulo **CGT**; addito communi quadrato ex **CG**, erit quoque **CA** quadratum æquale rectangulo **TCG**: proindeque erit, ut **CT** ad **CA**, ita **CA** ad **CG**; & consequenter **ET** tangens erit ellipsis.

Tertio, quod recta **ET** contingat ellipsim in puncto **E**, si fuerit, ut parameter **AD** ad diametrum **AB**, ita quadratum ordinatæ **EG** ad rectangulum **CGT**. Jam enim quadratum ordinatæ **EG** est ad rectangulum **AGB** in illa ratione. Quare, semper ac idem quadratum supponitur habere eandem rationem ad rectangulum **CGT**; erit rectangulum **AGB** æquale rectangulo **CGT**: proindeque recta **ET** tangens erit ellipsis.

Denique, quod recta **ET** sit tangens el-

§ SECTIONUM CONICARUM

ipsis, si fuerit rectangulum  $ATB$  æquale re-  
ctangulo  $CTG$ ; & consequenter, ut  $AT$  ad  
 $GT$ , ita  $CT$  ad  $BT$ . Nam, quum idem  $CT$   
quadratum sit æquale, tam duobus rectxangu-  
lis  $CTG$ ,  $TCG$ , quam rectxangulo  $ATB$  una  
cum  $CA$  quadrato; erunt duo rectxangula  
 $CTG$ ,  $TCG$  æqualia rectxangulo  $ATB$  una  
cum  $CA$  quadrato. Unde, semper ac ponitur  
rectangulum  $ATB$  æquale rectxangulo  $CTG$ ;  
erit quoque  $CA$  quadratum æquale rectxan-  
gulo  $TCG$ : & propterea, quum sit, ut  $CT$   
ad  $CA$ , ita  $CA$  ad  $CG$ ; erit rectxa  $ET$  tangens  
ellipsis.

V.  
Tangen-  
elium sibi  
mutuo oc-  
currentium  
proprietas  
prima.  
FIG. 2.

V. Nunc eas quidem proprietates ostende-  
mus, quæ tangentibus ellipsis sibi mutuo oc-  
currentibus, competunt. Hunc in finem ad duo  
quælibet ellipsis puncta  $A$ , &  $E$  ducantur  
tangentes duæ  $AX$ ,  $EX$ , quæ sibi mutuo oc-  
currant in  $X$ . Extendantur eædem usque do-  
nec conveniant cum diametris  $AB$ ,  $EF$  in  
punctis  $L$ , &  $T$ . Et erit primo, ut  $AX$  ad  
 $LX$ , ita  $EX$  ad  $TX$ .

Ducantur enim ad diametros  $AB$ ,  $EF$   
ordinatæ  $EG$ ,  $AO$ . Et, per superius ostensa,  
erit, ut  $CG$  ad  $CA$ , ita  $CO$  ad  $CE$ . Sed, pro-  
pter tangentem  $ET$ ,  $CG$  est ad  $CA$ , ut est  
 $CA$  ad  $CT$ . Itemque, propter tangentem  $AL$ ,  
 $CO$  est ad  $CE$ , ut est  $CE$  ad  $CL$ . Quare erit  
ex æquali, ut  $CA$  ad  $CT$ , ita  $CE$  ad  $CL$ : &  
propterea, quum duo triangula  $ACL$ ,  $ECT$   
habeant circa angulum communem  $C$  latera  
reciproce proportionalia, erit triangulum  
 $ACL$  æquale triangulo  $ECT$ .

Hinc, dempto communi trapetio  $ACEX$   
erit,

erit quoque triangulum  $ELX$  æquale triangulo  $ATX$ . Unde, quum duo ista triangula habeant angulum  $EXL$  æqualem angulo  $AXT$ ; habebunt quoque latera circum æquales istos angulos reciproce proportionalia; proindeque erit, ut  $AX$  ad  $LX$ , ita  $EX$  ad  $TX$ ; hoc est tangentes duæ  $AL$ ,  $ET$  in eadem ratione sese mutuo secabunt in puncto  $X$ , in quo sibi invicem occurrunt.

VI. Hinc autem *sequitur secundo*, tangentes duas  $AX$ ,  $EX$  eandem cum ordinatis  $EG$ ,  $AO$  rationem habere; adeoque esse, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $EG$  ad  $AO$ .

VI.  
Secunda  
proprietas  
tangentiũ  
sibi invicem  
occurrentium.

FIG. 2.

Est enim, ex superius ostensis, ut  $CO$  ad  $CE$ , ita  $CG$  ad  $CA$ . Sed, propter triangula æquiangula  $COA$ ,  $CET$ ,  $CO$  est ad  $CE$ , ut  $AO$  ad  $ET$ . Pariterque, ob triangula æquiangula  $CGE$ ,  $CAL$ ,  $CG$  est ad  $CA$ , ut  $EG$  ad  $AL$ . Quare erit ex æquali, ut  $EG$  ad  $AL$ , ita  $AO$  ad  $ET$ ; & permutando erit etiam, ut  $EG$  ad  $AO$ , ita  $AL$  ad  $ET$ .

Quia autem ostensum est,  $AX$  esse ad  $LX$ , ut est  $EX$  ad  $TX$ ; addendo antecedentes consequentibus, erit quoque, ut  $AX$  ad  $AL$ , ita  $EX$  ad  $ET$ ; & permutando erit pariter, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $AL$  ad  $ET$ . Unde, quum in eadem ratione rectarum  $AL$ ,  $ET$  sit, tam  $AX$  ad  $EX$ , quam  $EG$  ad  $AO$ ; erit ex æquali, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $EG$  ad  $AO$ .

VII. Atque hinc modo *sequitur alterius*, easdem tangentes  $AX$ ,  $EX$  eandem rationem habere cum conjugatis diametrorum  $AB$ ,  $EF$ , quæ pertinent ad puncta contactus  $A$ , &  $E$ .

VII.  
Tertia pro-  
prietas tan-  
gentium,  
quæ inter se  
mutuo con-  
veniunt.

Nam, per superius ostensa, ordinatæ  $EG$ ,

FIG. 2.

10 SECTIONUM CONICARUM  
 $EG, AO$  sunt, ut conjugatæ diametrorum  $AB, EF$ . Sed tangentes  $AX, EX$  sunt inter se, ut ordinatæ  $EG, AO$ . Quare erit ex æquali, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita conjugata diametri  $AB$  ad conjugatam diametri  $EF$ .

Quemadmodum autem tangentes  $AX, EX$  sunt, ut conjugatæ diametrorum  $AB, EF$ ; ita quadrata tangentium  $AX, EX$  erunt, ut quadrata earundem conjugatarum; atque adeo, ut figuræ ipsarum diametrorum  $AB, EF$ , quibus suarum conjugatarum quadrata sunt æqualia.

Unde modo, sicuti figuræ diametrorum  $AB, EF$  rationem habent compositam ex ipsis diametris, & parametris earundem; ita quoque quadratum tangentis  $AX$  ad quadratum tangentis  $EX$  rationem habebit compositam ex diametro  $AB$  ad diametrum  $EF$ , & ex parametro diametri  $AB$  ad parametrum diametri  $EF$ .

VIII.  
*Quarta  
 proprietas  
 tangentium,  
 quæ sibi in-  
 vicem occur-  
 runt.*  
 FIG. 2.

VIII. Pertinet huc quoque *hæc alia proprietas*, quod si  $AX, EX$  sint duæ tangentes ellipsi, & ducta ex puncto contactus  $A$  diametro  $AB$ , agatur per aliud contactus punctum  $E$  recta  $BE$ , conveniens cum tangente  $AX$  in puncto  $I$ ; quod, inquam,  $AI$  sit duplus ipsius  $AX$ .

Protrahatur enim tangens  $EX$ , usque donec conveniat cum diametro  $AB$  in puncto  $T$ . Tum ducatur ad eandem diametrum ordinata  $EG$ . Et quoniam, propter tangentem  $ET$ , ut est  $BT$  ad  $CT$ , ita est  $GT$  ad  $AT$ ; erit permutando, ut  $BT$  ad  $GT$ , ita  $CT$  ad  $AT$ . Sed, dividendo,  $BG$  est ad  $GT$ , ut  $CA$  ad  $AT$ .



AT. Quare erit rursus permutando, ut BG ad CA, ita GT ad AT.

Jam AI ad AX rationem habet compositam ex AI ad EG, & ex EG ad AX. Sed, ob triangula æquiangula BAI, BGE, AI est ad EG, ut AB ad BG. Itemque, ob triangula æquiangula TGE, TAX, EG est ad AX, ut GT ad AT, sive etiam, ut BG ad CA. Quare AI ad AX rationem habebit compositam ex AB ad BG, & ex BG ad CA.

Patet autem, duas istas rationes componere pariter rationem, quam habet AB ad CA. Quare erit ex æquali, ut AI ad AX, ita AB ad CA; proindeque, sicuti AB dupla est ipsius CA; ita etiam AI dupla erit ipsius AX.

IX. Sed facile est etiam *conversam hujus ostendere*: nimirum, quod si AI sit dupla ipsius AX, & AX sit tangens ellipsis; etiam EX contingere debeat ellipsim in puncto E.

IX.  
Præcedentis  
proprietatis  
conversa  
demonstratur.  
FIG. 2.

Quemadmodum enim AI dupla ponitur ipsius AX, ita AB dupla est ipsius CA. Quare erit, ut AB ad CA, ita AI ad AX. Sed AI ad AX rationem habet compositam ex AI ad EG, & ex EG ad AX; sive etiam ex AB ad BG, & ex GT ad AT. Itaque AB ad CA habebit pariter rationem compositam ex AB ad BG, & ex GT ad AT.

Jam AB ad CA habet quoque rationem compositam ex AB ad BG, & ex BG ad CA. Quare erit, ut BG ad CA, ita GT ad AT; & permutando, ut BG ad GT, ita CA ad AT. Sed componendo BT est ad GT, ut CT ad AT. Itaque rursus permutando erit, ut BT ad CT, ita GT ad AT: & propterea, ex superioribus

12 SECTIONUM CONICARUM  
 rius ostensis, recta ET tangens erit ellipsis.

X.  
 Quia pro-  
 prietas tan-  
 gentium sibi  
 mutuo oc-  
 currentium.  
 FIG. 3.

X. Præterea, ut alias tangentium ellipsis proprietates prosequamur, sint adhuc AX, EX duæ tangentes ellipsis. Et, ducta diametro AB, fit BZ tangens tertia, quæ conveniat cum EX in puncto Z. Sitque demum KL conjugata ipsius AB. Dico, rectangulum ex AX in BZ æquale esse quadrato, quod fit ex CK.

Conveniat namque tangens EX cum diametro AB in puncto T, & cum ejus conjugata KL in puncto V. Ducaturque ex puncto contactus E, tum recta EG ordinata ad diametrum AB, cum recta EH ordinata ad diametrum KL.

Quia igitur ET est tangens ellipsis; erit, ut BT ad CT, ita GT ad AT. Sed, propter triangula æquiangula TBZ, TCV, BT est ad CT, ut BZ ad CV. Itemque, propter triangula æquiangula TGE, TAX, GT est ad AT, ut EG, sive CH ad AX. Quare erit ex æquali, ut BZ ad CV, ita CH ad AX: & propterea rectangulum ex AX in BZ æquale erit rectangulo HCV.

Et quoniam eadem tangens ET occurrit quoque alteri diametro KL in puncto V; erit, ex superius ostensis, ut CH ad CK, ita CK ad CV. Quare rectangulum HCV æquale erit quadrato ex CK. Sed rectangulo HCV ostensum est æquale rectangulum ex AX in BZ. Igitur erit rectangulum ex AX in BZ æquale quadrato, quod fit ex CK.

XI.  
 Theorema  
 de rectangu-  
 lo sub por-  
 tionibus sat.

XI. Ulterius, quemadmodum AB, KL sunt duæ ellipsis conjugatæ diametri, ita sint MR, PS binæ aliæ diametri similiter conju-

gatæ, quæ convenient cum tangente AX in punctis X, & Y. Et *nullo item negotio ostendemus*, quod eidem CK quadrato æquale sit etiam rectangulum ex AX in AY.

*gentis, per  
duas conju-  
gatas abscis-  
sis.*

FIG. 4.

Ductis siquidem, tum ordinatis MN, PQ ad diametrum AB, cum ordinatis AO, AI, ad diametros MR, PS; erit rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum in ratione composita ex MN ad CK, & ex PQ ad CK. Sed, per ea, quæ superius ostensa sunt, MN est ad CK, ut AO, seu CI ad CP. Itemque PQ est ad CK, ut AI, seu CO ad CM. Itaque rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum rationem habebit compositam ex CI ad CP, & ex CO ad CM.

Jam, propter tangentem AY, diametro PS occurrentem in Y, CI est ad CP, ut CP ad CY; sive etiam, ut PQ ad AY. Pariterque, ob tangentem AX, diametro MR occurrentem in X, CO est ad CM, ut CM ad CX; sive etiam, ut MN ad AX. Quare rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum habebit quoque rationem compositam ex PQ ad AY, & ex MN ad AX.

Quoniam autem duæ istæ rationes componunt pariter rationem, quam habet rectangulum ex MN in PQ ad rectangulum ex AX in AY; erit ex æquali, ut rectangulum ex MN in PQ ad rectangulum ex AX in AY, ita idem rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum: & propterea rectangulum ex AX in AY æquale erit quadrato, quod fit ex CK.

XII. Sed *conversum hujus theoremat*

XII.  
*Quod pra-*

*faci-*

eadem  
theoremati  
conuersum  
fit pariter  
verum.

FIG. 4.

facile quoque erit ostendere. Nimirum, quod si  $AB$ ,  $KL$  sint duæ ellipsis diametri conjugatæ, & rectangulum  $XAY$ , contentum sub portionibus tangentis  $XY$ , æquale sit quadrato, quod fit ex  $CK$ ; aliæ binæ diametri  $MR$ ,  $PS$  sint etiam conjugatæ.

Si enim  $PS$  non sit conjugata ipsius  $MR$ , sit ejus conjugata diameter alia  $TV$ , quæ occurrat tangenti  $XY$  in puncto  $W$ . Et quoniam  $MR$ ,  $TV$  sunt duæ ellipsis conjugatæ diametri, quæ conveniunt cum tangente  $XY$  in punctis  $X$ , &  $W$ ; erit rectangulum ex  $AX$  in  $AW$  æquale quadrato, quod fit ex  $CK$ .

Quia autem eidem  $CK$  quadrato positum est æquale rectangulum ex  $AX$  in  $AY$ ; erit rectangulum ex  $AX$  in  $AW$  æquale rectangulo ex  $AX$  in  $AY$ : proindeque portiones duæ  $AW$ ,  $AY$  æquales erunt inter se. Quod quum fieri nequeat, consequens est, ut  $PS$  sit conjugata ipsius  $MR$ .

XIII.  
Theorema  
pro determi-  
natione diam-  
etrorum  
conjugata-  
rum ellipsis.  
FIG. 3.

XIII. Atque hinc modo colligi ulterius potest, quod, si ex extremitatibus diametri  $AB$ , ducantur tangentes duæ  $AX$ ,  $BZ$ , convenientes cum tangente tertia  $ET$  in punctis  $X$ , &  $Z$ , junganturque rectæ  $CX$ ,  $CZ$ ; istæ, ad ellipsem usque productæ, exhibebunt nobis binas ejus diametros conjugatas.

Si enim  $CZ$  producat, usque donec conveniat cum tangente  $AX$  in puncto  $Y$ ; obtriangula æquiangularia  $CBZ$ ,  $CAY$ , erit, ut  $CB$  ad  $BZ$ , ita  $CA$  ad  $AY$ . Unde, quemadmodum æquales sunt duæ  $CB$ ,  $CA$ ; ita æquales erunt pariter duæ  $BZ$ ,  $AY$ : proindeque rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$  æquale erit re.

rectangulo ex AX in AY.

Quum autem ostensum sit rectangulum ex AX in BZ æquale quadrato ex CK; erit eidem CK quadrato æquale pariter rectangulum ex AX in AY. Unde, quum duæ diametri MR, PS abscindant ex tangente XY portiones duas AX, AY, quæ rectangulum continent, æquale quadrato, quod fit ex CK: per ea, quæ modo ostensa sunt, omnino necesse est, ut MR, PS sint duæ ellipsis conjugatæ diametri.

XIV. Cæterum nolim hic silentio prætere-  
 rive, quod si AB sit axis ellipsis, AD parame-  
 ter ejus, & ET aliqua tangens; ducanturque  
 ex puncto contactus E rectæ duæ EG, EH,  
 una perpendicularis ad axem, & altera per-  
 pendicularis ad tangentem; quod, inquam, AB  
 sit ad AD, ut est CG ad GH.

XIV.  
 Tangentia  
 cum axe  
 convenientia  
 proprietat  
 specialit.  
 FIG. 2.

Si enim tangens ET conveniat cum axe AB in puncto T; erit, ex superius ostensis, ut AB ad AD, ita rectangulum CGT ad EG quadratum. Sed, ob triangulum TEH, rectangulum in E, quadratum ex EG est æquale rectangulo HGT. Quare erit quoque, ut AB ad AD, ita rectangulum CGT ad rectangulum HGT: & propterea, quia duo ista rectangula sunt inter se, ut CG ad GH; erit, ex æquali, ut AB ad AD, ita CG ad GH.

Hinc, si AB sit axis major ellipsis, quemadmodum AB major est, quam AD; ita erit CG major, quam GH; proindeque punctum H cadet semper inter punctum G, & centrum ellipsis. Vicissim autem, si AB sit axis minor ellipsis, quemadmodum AB  
 mi.

16 SECTIONUM CONICARUM  
 minor est, quam AD; ita erit etiam CG mi-  
 nor, quam GH: & propterea punctum H ca-  
 det semper ad alteram centri partem relate ad  
 punctum G.

C A P. II.

*Proprietates, quæ secantibus  
 ellipsis competunt, osten-  
 duntur.*

I.  
 De ratione,  
 quam ha-  
 bent rectan-  
 gula, sub  
 secantium  
 segmentis  
 contenta.  
 Primus ca-  
 sus, quum se-  
 cantes sunt  
 diametri el-  
 lipsis.

I. **P** Ræcedenti capite ostensæ sunt  
 proprietates, quæ competunt tan-  
 gentibus ellipsis; nunc eas prosequemur, quæ  
 pertinent ad secantes ejusdem, ostendemusque,  
*quam rationem habeant inter se rectangula,  
 contenta sub segmentis duarum rectarum, quæ  
 sibi mutuo occurrentes, utrinque ad ellipsim  
 terminantur.*

Hic autem varii sunt casus distinguendi,  
 pro diversa qualitate rectarum, quæ sibi mu-  
 tuo occurrunt, & utrinque terminantur ad  
 ellipsim. Primo igitur supponemus, rectas il-  
 las esse *binas diametros ellipsis, & ostende-  
 mus, rectangulum sub segmentis unius esse  
 ad rectangulum sub segmentis alterius in du-  
 plicata ratione ipsarum diametrorum.*

FIG. 5. Sint enim AB, KL duæ quævis ellipsis  
 diametri, quæ sibi mutuo occurrunt in ipso  
 centro C. Dico, rectangulum sub segmentis  
 unius AC, BC, esse ad rectangulum sub seg-  
 mentis alterius KC, LC, ut est quadratum  
 dia-

diametri AB ad quadratum diametri KL.

Nam, quum utraque diameter secta sit bifariam in centro C; erit in ratione ipsarum AB, KL, tam AC ad KC, quam BC ad LC. Sed rectangulum ACB est ad rectangulum KCL in ratione composita ex AC ad KC, & ex BC ad LC. Quare ratio eorundem rectangulorum ACB, KCL duplicata erit diametro- rum AB, KL.

II. Supponemus secundo, *ex rectis, sibi mutuo occurrentibus, unam quidem esse diame- trum, alteram ordinatam ipsius. Et in isto ca- su rectangulum sub segmentis prioris rectæ erit ad rectangulum sub segmentis alterius re- ctæ in duplicata ratione ejus, quam habet dia- meter ad suam conjugatam.*

II.  
Secundus casus, quum ex secantibus una quidem est diameter, altera est ejus ordina- ta.

FIG. 5.

Sit enim AB diameter aliqua ellipsis, cu- jus KL sit conjugata; sitque etiam MO una ex ordinatis ejus diametri, quæ ipsi diametro occurrens in puncto N, utrinque ad ellipsem terminetur. Dico, rectangulum ANB esse ad rectangulum MNO, ut est AB quadratum ad KL quadratum.

Nam recta MO, velut ordinata ipsius AB, bifariam secta est in puncto N. Quare erit MN quadratum æquale rectangulo MNO: & propterea erit, ut rectangulum ANB ad rectangulum MNO, ita idem re- ctangulum ANB ad MN quadratum. Sed re- ctangulum ANB est ad MN quadratum, ut AB quadratum ad KL quadratum. Igitur in hac eadem ratione erit pariter rectangulum ANB ad rectangulum MNO.

III. Supponemus tertio, *rectas sibi mutuo*

III.  
Tertius casus.

Tom. II.

B

OC-

*tas, quum* *duas secantes* *sunt ordinatæ* *ta, qua ad* *duas diame-* *tros conju-* *gatas refe-* *runtur.* *occurrentes esse ordinatas, quæ ad duas diame-* *tros conjugatas referuntur; ostendemusque, re-* *ctangulum sub segmentis unius esse ad rectan-* *gulum sub segmentis alterius in ratione dupli-* *cata reciproca ipsarum diametrorum.*

FIG. 5:

Sint namque AB, KL duæ ellipsis dia-  
metri conjugatæ; fitque etiam MO ordinata  
diametri AB, & EF ordinata diametri KL,  
quæ utrinque ad ellipsem terminatæ, sibi mu-  
tuo occurrant in puncto H. Dico, rectangu-  
lum MHO esse ad rectangulum EHF, ut est  
KL quadratum ad AB quadratum.

Ex puncto E ducatur ad diametrum  
AB ordinata EG. Et quoniam, propter elli-  
psim, KL quadratum est ad AB quadratum,  
tam ut MN quadratum ad rectangulum  
ANB, quam ut EG quadratum ad rectangu-  
lum AGB; erit quoque, ut KL quadratum ad  
AB quadratum, ita differentia quadratorum  
MN, EG ad differentiam rectangulorum  
ANB, AGB.

Jam, propter æquales EG, NH, differen-  
tia quadratorum MN, EG est æqualis rectan-  
gulo MHO. Itemque, quum rectangulum  
ANB æquale sit differentiæ quadratorum CA,  
CN, & rectangulum AGB æquale differentiæ  
quadratorum CA, CG; erit differentia rectan-  
gulorum ANB, AGB æqualis differentiæ qua-  
dratorum CG, CN, quæ tantundem valet, ac  
rectangulum EHF. Unde erit, ut KL qua-  
dratum ad AB quadratum, ita rectangulum  
MHO ad rectangulum EHF.

IV. *Quartus* *casus, quum* *IV. Supponemus quarto, ex rectis, sibi* *in vicem occurrentibus, unam esse diametrum,* *aliam*



*aliam vero ordinatam alterius diametri*. Et quum id contingit, erit rectangulum sub segmentis illius ad rectangulum sub segmentis istius, ut est quadratum prioris diametri ad quadratum conjugatæ alterius diametri.

*duarum secantium una est diameter, & alia ordinata alterius diametri.*

Sit enim AB aliqua ellipsis diameter, cuius conjugata sit KL, & MO una ex eius ordinatis, utrinque ad ellipsim terminata. Sit porro EF diameter alia, quæ conveniat cum ordinata prioris MO in puncto H. Dico, rectangulum EHF esse ad rectangulum MHO, ut est EF quadratum ad KL quadratum.

FIG. 6.

Ducantur namque ex punctis E, H, M rectæ EG, HI, MR, ipsi AB parallelæ, quæ conveniant cum KL in punctis G, I, R. Et, ob triangula æquiangula CEG, CHI, erit, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita EG quadratum ad HI, seu MR quadratum. Sed, propter ellipsim, EG quadratum est ad MR quadratum, ut rectangulum KGL ad rectangulum KRL. Itaque erit ex æquali, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita rectangulum KGL ad rectangulum KRL.

Hinc, coniungendo terminos prioris rationis cum terminis secundæ, erit quoque, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita CK quadratum ad rectangulum KRL una cum CI quadrato. Quumque CG quadratum sit ad CI quadratum, ut est CE quadratum ad CH quadratum; erit rursus ex æquali, ut CE quadratum ad CH quadratum, ita CK quadratum ad rectangulum KRL una cum CI quadrato.

Atque hinc, convertendo, erit ulterius, ut CE quadratum ad differentiam quadrato-

20 SECTIONUM CONICARUM  
 rum CE, CH, ita CK quadratum ad differen-  
 tiam quadratorum CR, Cl. Sed differentia  
 quadratorum CE, CH est æqualis rectangu-  
 lo EHF; & differentia quadratorum CR, Cl,  
 five MN, NH est æqualis rectangulo MHO.  
 Itaque erit, ut CE quadratum ad rectangu-  
 lum EHF, ita CK quadratum ad rectangulum  
 MHO; & permutando, ut CE quadratum  
 ad CK quadratum, five etiam, ut EF quadra-  
 tum ad KL quadratum, ita rectangulum EHF  
 ad rectangulum MHO.

V.  
 Postremus  
 casus, quum  
 secantes sunt  
 ordinata  
 duarum qua-  
 rumvis dia-  
 metrorum.  
 FIG. 7.

V. Supponemus denique, *rectas duas, sibi  
 mutuo occurrentes, ordinatas esse duarum dia-  
 metrorum, quæ inter se nequaquam sunt conju-  
 gatæ.* Et in isto casu rectangula, contenta sub  
 segmentis ipsarum, erunt, ut quadrata, quæ  
 fiunt ex conjugatis earum diametrorum.

Sint enim AB, RS duæ quævis ellipsis  
 diametri; sitque MO una ex ordinatis diame-  
 tri AB, & PQ una ex ordinatis diametri RS.  
 Conveniant autem inter se duæ istæ ordinatæ  
 in puncto H. Dico, rectangulum MHO esse  
 ad rectangulum PHQ, ut est quadratum,  
 quod fit ex conjugata diametri AB, ad qua-  
 dratum, quod fit ex conjugata diametri RS.

Ducatur namque per punctum H diame-  
 ter tertia EF. Et quoniam diameter ista EF se-  
 cat MO, ordinatam diametri AB, in puncto H;  
 erit, ex ostensis, ut rectangulum EHF ad re-  
 ctangulum MHO, ita EF quadratum ad qua-  
 dratum conjugatæ diametri AB. Quumque ea-  
 dem EF secat pariter PQ, ordinatam diametri  
 RS, in puncto H; erit quoque, ut rectangu-  
 lum EHF ad rectangulum PHQ, ita EF qua-  
 dra-

dratum ad quadratum conjugatæ diametri RS. Quare ordinando erit, ut rectangulum MHO ad rectangulum PHQ, ita quadratum ex conjugata diametri AB ad quadratum ex conjugata diametri RS.

VI. Et quidem universale theorema, quod hac in re locum habet, hujusmodi est, quod si intra ellipsim binæ ducantur rectæ lineæ, quæ sese mutuo secant; rectangula, quæ fiunt ex segmentis ipsarum, sint, ut quadrata ex conjugatis earum diametrorum, ad quas rectæ illæ velut ordinatæ referuntur. Et omnia alia theoremata, superius ostensa, sunt tantum casus speciales istius.

VI.  
Theorema  
generale,  
quod hac in  
re locum ha-  
bet, in me-  
dium affertur.

Nam primo, si ductæ rectæ lineæ transeant per centrum, & sint ellipsis diametri; erunt ipsæmet conjugatæ earum diametrorum, ad quas eædem velut ordinatæ referuntur. Unde, vi ejus theorematis generalis, omnino necesse est, ut rectangula sub segmentis ipsarum sint, ut quadrata earundem.

Secundo, si una ex iis rectis sit diameter, & altera ejus ordinata: quemadmodum prior est conjugata illius diametri, ad quam ipsa velut ordinata refertur; sic conjugata ejus diametri, quæ secundam agnoscit tamquam suam ordinatam, est conjugata diametri prioris. Quare, per theorema generale, rectangulum sub segmentis diametri ad rectangulum sub segmentis ordinatæ erit, ut quadratum diametri ad quadratum suæ conjugatæ.

Tertio, si rectæ, sese invicem secantes, sint ordinatæ duarum ellipsis diametrorum conjugatarum; non aliæ erunt conjugatæ dia-

22 SECTIONUM CONICARUM  
 metrorum, ad quas rectæ illæ velut ordi-  
 natæ referuntur, quam eadem diametri, in-  
 verso ordine sumptæ. Unde, per theorema ge-  
 nerale, rectangula, contenta sub segmentis ea-  
 rum ordinatarum, erunt in ratione reciproca  
 duplicata suarum diametrorum.

Denique, si una ex iis rectis sit diameter,  
 & altera sit ordinata alterius diametri; erit  
 ipsa prior recta conjugata illius diametri, ad  
 quam eadem velut ordinata refertur. Unde, ob  
 theorema generale, rectangulum sub segmentis  
 prioris diametri erit ad rectangulum sub seg-  
 mentis ordinatæ alterius diametri, ut est qua-  
 dratum diametri prioris ad quadratum conju-  
 gatæ alterius diametri.

VII.  
 Quod idem  
 theorema fit  
 verum, etiam  
 si una ex se-  
 cantibus  
 vertatur in  
 tangentem.

VII. Fieri autem potest, ut *una ex secan-*  
*tibus tangens evadat*: nimirum, quum puncta  
 duo sectionis coeunt in unum. In isto casu  
 rectangulum sub ejus segmentis vertetur in  
 quadratum ipsius tangentis. Unde inter qua-  
 dratum istud, & rectangulum, sub alterius se-  
 cantis portionibus contentum, eadem adhuc  
 ratio obtinebit.

Quin etiam *verti potest in tangentem*  
*utraque secans*. Et quum id contingit, ambo  
 quidem rectangula, sub secantium portionibus  
 contenta, abibunt in quadrata ipsarum tangen-  
 tium. Ex quo fit, ut inter quadrata, quæ  
 ex tangentibus fiunt, eadem pariter ratio de-  
 beat locum habere.

Et istud quidem jam præcedenti capite  
 speciatim a nobis ostensum fuit. Vidimus  
 enim, quod si fuerint tangentes duæ AX, EX,  
 sibi mutuo occurrentes in X; quadrata ipsa-  
 rum

FIG. 2.

rum eandem habeant rationem inter se, quam quadrata, quæ fiunt ex conjugatis diametro- rum AB, EF.

Ad illud verò quod attinet, nec etiam difficile erit, veritatem ejus speciatim ostende- re. Sed distinguendi sunt tamen duo casus. Primus est, quum secans est parallela diame- tro, quæ pertinet ad punctam contactus. Al- ter est, quum eadem secans ei diametro nequa- quam est parallela.

VIII. Ponamus itaque primo, *secantem parallelam esse diametro, quæ pertinet ad pun- ctum contactus*: adeo nempe, ut existente EH tangente, secans sit recta HO, parallela dia- metro EF. Jamque in hoc casu diameter, ad quam recta MO velut ordinata refertur, erit illa eadem, quæ est conjugata ipsius EF.

VIII.  
Primus casus, quum secans est parallela diametro, quæ pertinet ad punctum contactus.  
FIG. 6.

Sit igitur AB conjugata diametri EF. Quumque vicissim EF sit conjugata ipsius AB, jam illud ostendendum nobis erit, ut EH quadratum sit ad rectangulum MHO, veluti est AB quadratum ad EF quadratum. Istud autem nullo negotio ostendemus sequenti ratione.

Ex puncto M ducatur ad diametrum EF ordinata MR. Et quoniam duæ CE, HN inter se sunt æquales; erit etiam CE quadratum æ- quale quadrato, quod fit ex HN. Sed CE qua- dratum est æquale rectangulo ERF una cum CR quadrato. Et HN quadratum est æquale rectangulo MHO una cum MN, sive eodem CR quadrato. Quare, dempto communi qua- drato ex CR, remanebit rectangulum ERF æquale rectangulo MHO.

Quia autem æqualia sunt quoque qua-  
B 4 dra-

drata, quæ fiunt ex ipsis MR, EH; erit, ut MR quadratum ad rectangulum ERF, ita EH quadratum ad rectangulum MHO. Sed MR quadratum est ad rectangulum ERF, ut AB quadratum ad EF quadratum. Et igitur ex æquali in eadem ratione, quam habet AB quadratum ad EF quadratum, erit quoque EH quadratum ad rectangulum MHO.

IX.  
Alter casus,  
quum secans  
non est pa-  
rallela dia-  
metro, qua  
transit per  
punctum  
contactus.

FIG. 8.

IX. Ponamus secundo, *secantem haud quidem parallelam esse diametro, quæ pertinet ad punctum contactus*; adeo nempe, ut existente EH tangente, secans sit recta HS, quæ occurrit diametro EF. Jamque, si KL sit diameter, ad quam recta TS velut ordinata refertur; ostendendum erit, EH quadratum esse ad rectangulum THS, ut est quadratum conjugatæ diametri EF ad quadratum conjugatæ diametri KL,

Ducatur ex puncto H secans alia HO, quæ ipsi EF sit parallela; sitque AB diameter, quæ ipsam MO velut suam ordinatam agnoscit. Itaque, quum secans HO parallela sit diametro EF, quæ pertinet ad punctum contactus E; erit EH quadratum ad rectangulum MHO, ut est quadratum conjugatæ diametri EF ad quadratum conjugatæ diametri AB.

Quoniam autem HO, HS sunt secantes duæ, quæ velut ordinatæ referuntur ad diametros AB, KL; erit, ex superius ostensis, rectangulum MHO ad rectangulum THS, ut est quadratum conjugatæ diametri AB ad quadratum conjugatæ diametri KL. Quare ordinando erit, ut EH quadratum ad rectangulum THS, ita quadratum ex conjugata

ta diametri EF ad quadratum ex conjugata diametri KL.

X. Fatendum est tamen, *demonstrationem istam baud quidem generalem esse*. Nam fieri potest, ut recta HO, ipsi EF parallela, ellipsim minime secet. Quum id contingit, duci potest recta HO per centrum ellipsis. Jamque obtinebit eadem demonstratio, si, reliquis ut supra manentibus, ostendi possit, EH quadratum esse ad rectangulum MHO, ut est quadratum ex conjugata diametri EF ad quadratum diametri MO. Id vero ostendemus in hunc modum.

X.  
Demonstratio specialis, quando secans est diameter.

FIG. 9.

Sit GI conjugata ipsius EF, ducaturque ex puncto M ad eandem EF ordinata MR. Et quoniam CH quadratum est ad CM quadratum, ut CE quadratum ad CR quadratum; erit convertendo, ut CH quadratum ad rectangulum MHO, ita CE quadratum ad rectangulum ERF. Sed, ob ellipsim, CE quadratum est ad rectangulum ERF, ut est CG quadratum ad MR quadratum. Itaque erit ex æquali, ut CG quadratum ad MR quadratum, ita CH quadratum ad rectangulum MHO.

Quoniam vero MR quadratum est ad EH quadratum, ut CM quadratum ad CH quadratum; erit ex æquo perturbando, ut CG quadratum ad EH quadratum, ita CM quadratum ad rectangulum MHO; & permutando, ut CG quadratum ad CM quadratum, ita EH quadratum ad rectangulum MHO. Sed CG quadratum est ad CM quadratum, ut GI quadratum ad MO quadratum. Itaque erit

ex

ex æquali, ut  $EH$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ , ita  $GI$  quadratum ad  $MO$  quadratum.

**XI.**  
Theorema  
de ratione,  
quam ha-  
bent dua el-  
lipsis tan-  
gentes, rur-  
sus ostendi-  
tur.

**XI.** Atque hinc modo nullo negotio ostendi potest, quod *si dua ellipses tangentes sibi mutuo occurrant, ea sint inter se, veluti conjugatae diametrorum, quae pertinent ad puncta contactus.*

FIG. 9.

Sint enim  $AH$ ,  $EH$  dua ellipses tangentes, quae sibi invicem occurrant in puncto  $H$ . Ducantur ex punctis contactus  $A$ , &  $E$  diametri  $AB$ ,  $EF$ . Dico esse, ut  $AH$  ad  $EH$ , ita conjugata diametri  $AB$  ad conjugatam diametri  $EF$ .

Ducatur namque diameter alia  $MO$ , quae transeat per punctum  $H$ . Et quoniam  $AH$  est tangens, &  $HO$  est secans, transiens per centrum; erit, ut  $AH$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ , ita quadratum ex conjugata diametri  $AB$  ad quadratum ipsius  $MO$ .

Similiter, quia  $EH$  est tangens, &  $HO$  est secans, transiens per centrum; erit, ut rectangulum  $MHO$  ad  $EH$  quadratum, ita  $MO$  quadratum ad quadratum, quod fit ex conjugata diametri  $EF$ .

Hinc ex æquo ordinando erit, ut  $AH$  quadratum ad  $EH$  quadratum, ita quadratum ex conjugata diametri  $AB$  ad quadratum ex conjugata diametri  $EF$ : & propterea tangentes dua  $AH$ ,  $EH$  erunt, ut conjugatae diametrorum  $AB$ ,  $EF$ .

**XII.**  
Alia duo  
theoremata  
ex hactenus  
ostensa de-  
ducuntur.

**XII.** Cæterum ex iis, quae hactenus ostensa sunt, prono alveo fluunt sequentia duo theoremata.

Primum theorema est, quod *si duabus ellip-*



*ellipsis tangentibus parallelae fuerint duae secantes, & conveniant inter se; tum tangentes, cum secantes; rectangula, sub secantium segmentis contenta, sint proportionalia quadratis, quae ex tangentibus fiunt.*

Nam diametri, ad quas duae secantes velut ordinatae referuntur, sunt illae eadem, quae pertinent ad puncta contactus. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se quadrata tangentium, erunt quoque rectangula, quae sub secantium segmentis continentur.

Alterum theorema est, quod si duabus secantibus ellipsi parallelae fuerint binae aliae secantes, & conveniant inter se, tam illae, quam istae; rectangula sub segmentis illarum sint proportionalia rectangulis, quae sub segmentis istarum continentur.

Nam diametri, ad quas duae posteriores secantes velut ordinatae referuntur, sunt illae eadem, quae agnoscunt velut suas ordinatas secantes priores. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se rectangula sub segmentis primatum secantium, erunt quoque rectangula sub segmentis aliarum.

### C A P. III.

*Demonstrantur proprietates,  
quae competunt tangen-  
tibus hyperbolae.*

- I. **C**irca tangentes hyperbolae, jam illud quoque superius ostensum est, I.  
Proprietates  
duae princ. quod

parallelas, quae  
hyperbolae  
tangenti  
competunt.

quod si ex vertice alicujus diametri recta ducatur, ordinatis ejus parallela, ea tangat hyperbolam in solo illo vertice. Nunc autem subjungemus, quod in locum, tangente, & hyperbola contentum, nulla alia cadat recta linea.

Sit enim hyperbola AM, cujus AB sit diameter aliqua, AD parameter ejus, & DAH recta, ordinatis ejusdem diametri parallela. Dico, quod sicuti recta DAH contingit hyperbolam in solo vertice A, ita in locum, contentum tangente, & eadem hyperbola, nulla alia recta linea duci possit ex eodem vertice A.

FIG. 10.

Si fieri potest, ducatur recta alia AI, in qua sumpto puncto quovis P, agatur per illud recta PN, ipsi DH parallela, conveniens cum recta BD in puncto O. Et quoniam, propter hyperbolam, MN quadratum est æquale rectangulo ANO; erit PN quadratum majus illo rectangulo. Quare, si extendatur NO usque in S, ita ut PN quadratum sit æquale rectangulo ANS, & jungatur AS; hæc secabit rectam BD in puncto aliquo Q.

Ducatur ergo per punctum istud Q recta QI, eidem AH parallela. Et quoniam PN quadratum est æquale rectangulo ANS; erit, ut PN quadratum ad AN quadratum, ita rectangulum ANS ad idem AN quadratum; sive etiam, ita NS ad AN. Sed PN quadratum est ad AN quadratum, ut IK quadratum ad AK quadratum. Et NS est ad AN, ut KQ ad AK; sive etiam, ut rectangulum AKQ ad AK quadratum; sive demum, ut LK quadratum ad AK quadratum. Quare erit IK quadratum æquale quadrato, quod fit ex LK.

Quod

Quod fieri non potest.

II. Quælibet ergo recta linea, quæ ex puncto contactus ducitur infra tangentem, necesse est, ut primo secet hyperbolam, tum cadat in locum, tangentem, & hyperbola contentum. Hinc autem duo consequuntur, quæ aditum nobis aperient ad ostendendas proprietates omnes, quæ hyperbolæ tangentibus competunt.

II.  
Corollaria,  
quæ ex duobus  
precedentibus  
proprietatibus  
consequuntur.

FIG. II.

Primum est, quod ad unum, idemque punctum hyperbolæ non nisi unica tangens duci possit. Nam, si duci possent tangentes duæ; jam una caderet in locum, hyperbola, & tangente altera comprehensum. Quod quidem ostensum est fieri non posse.

Alterum est, quod si recta linea contingat hyperbolam in puncto aliquo, ea debeat esse parallela ordinatis illius diametri, quæ pertinet ad illud punctum. Nam aliter, ducta ex eo puncto recta alia, ordinatis iis parallela, foret ista quoque tangens hyperbolæ; atque adeo ad unum, idemque punctum hyperbolæ duæ tangentes duci possent. Quod fieri nequit.

III. His jactis principiis, facile modo erit, eas primum tangentis proprietates ostendere, quæ ei competunt, ubi alicui diametro occurrit. Tangens igitur ET, ducta ad punctum E, verticem diametri EF, conveniat cum diametro altera AB in puncto T. Et ducatur, tam ad diametrum AB ordinata EG, quam ad diametrum EF ordinata AO.

III.  
Proprietates,  
quæ pertinent  
ad tangentem  
hyperbolæ,  
alicui diametro  
occurrentem.

FIG. II.

Primo itaque erit, ut CT ad CA, ita CA ad CG. Nam, ex superius ostensis, BG est ad AG, ut FO ad EO; & dividendo, AB est

est

30 SECTIONUM CONICARUM  
 est ad AG, ut EF ad EO; & capiendo antecedentium dimidia, CA est ad AG, ut CE ad EO; & addendo antecedentes consequentibus, CA est ad CG, ut CE ad CO. Sed, propter parallelas AQ, ET, ut est CE ad CO, ita est CT ad CA. Quare erit ex æquali, ut CT ad CA, ita CA ad CG.

Secundo erit, rectangulum AGB æquale rectangulo CGT; adeo, ut AG erit ad CG, ut est TG ad BG. Quum enim idem CG quadratum æquale sit, tam rectangulo AGB una cum CA quadrato, quam duobus rectangulis CGT, TCG; erit rectangulum AGB una cum CA quadrato æquale duobus rectangulis CGT, TCG. Sed, ob rectas continue proportionales CT, CA, CG, quadratum ex CA est æquale rectangulo TCG. Quare etiam rectangulum AGB æquale erit rectangulo CGT.

Tertio, si AD sit parameter ipsius diametri AB, erit, ut EG quadratum ad rectangulum CGT, ita parameter AD ad diametrum AB. Jam enim, propter hyperbolam, in hac ratione est EG quadratum ad rectangulum AGB. Sed rectangulum AGB ostensum est æquale rectangulo CGT. Quare in eadem pariter ratione erit quadratum ordinatæ EG ad rectangulum aliud CGT.

Quarto erit rectangulum ATB æquale rectangulo CTG; adeo, ut erit AT ad GT, ut est CT ad BT. Nam, ob rectas continue proportionales CT, CA, CG, quadratum ex CA est æquale rectangulo TCG. Sed quadratum ex CA est æquale rectangulo ATB una cum CT quadrato; & rectangulum TCG est æquale  
 le

le rectangulo CTG una cum eodem CT quadrato . Quare, dempto communi quadrato ex CT , remanebit rectangulum ATB æquale re-  
ctangulo CTG.

Denique, si KL sit conjugata ipsius AB, cum qua tangens ET conveniat in puncto V, & ducatur ad eam ordinata EH ; erit , ut CV ad CK , ita CK ad CH . Nam, propter hyperbolam , CK quadratum est ad EG , seu CH quadratum , ut CA quadratum ad rectangu-  
lum AGB ; sive etiam , ut rectangulum TCG ad rectangulum CGT ; sive demum , ut CT ad GT . Sed CT est ad GT, ut CV ad EG, seu CH . Itaque erit ex æquali, ut CK quadratum ad CH quadratum, ita CV ad CH : & propterea tres rectæ CV, CK, CH continue proportionales erunt.

IV. Sed facile quoque erit , *conversas harum proprietatum ostendere* . Nimirum primo, quod recta ET sit tangens hyperbolæ , si utique CT sit ad CA , ut est CA ad CG . Nam, ex superius ostensis, BG est ad AG , ut FO ad EO ; & dividendo , AB est ad AG, ut EF ad EO ; & capiendo antecedentium dimidia , CA est ad AG , ut CE ad EO ; & addendo antecedentes consequentibus , CA est ad CG, ut CE ad CO . Sed, ex hypothesis, CA est ad CG , ut CT ad CA . Quare, erit ex æquali , ut CT ad CA , ita CE ad CO : & propterea recta ET, velut ipsi AO parallela , tangens erit hyperbolæ .

IV.  
Præceden-  
tium pro-  
prietatum  
conversa de-  
monstran-  
tur .

FIG. II.

Secundo, quod recta ET tangat hyperbolam in puncto E , si fuerit rectangulum AGB æquale rectangulo CGT ; atque adeo , ut AG  
ad

ad  $CG$ , ita  $TG$  ad  $BG$ . Nam, semper ac re-  
ctangulum  $AGB$  est æquale rectxangulo  $CGT$ ;  
si utrumque seorsim auferatur ex eodem  $CG$   
quadrato, erit quoque  $CA$  quadratum æqua-  
le rectxangulo  $TCG$ : proindeque erit, ut  $CT$   
ad  $CA$ , ita  $CA$  ad  $CG$ ; & consequenter  $ET$   
tangens erit hyperbolæ.

Tertio, quod rectxa  $ET$  contingat hyper-  
bolam in puncto  $E$ , si fuerit, ut parameter  $AD$   
ad diametrum  $AB$ , ita quadratum ordinatæ  
 $EG$  ad rectxangulum  $CGT$ . Jam enim quadra-  
tum ordinatæ  $EG$  est ad rectxangulum  $AGB$   
in illa ratione. Quare, semper ac idem quadra-  
tum supponitur habere eandem rationem ad  
rectxangulum  $CGT$ ; erit rectxangulum  $AGB$   
æquale rectxangulo  $CGT$ : proindeque rectxa  
 $ET$  tangens erit hyperbolæ.

Quarto, quod rectxa  $ET$  sit tangens hy-  
perbolæ, si fuerit rectxangulum  $ATB$  æquale  
rectxangulo  $CTG$ ; & consequenter, ut  $AT$  ad  
 $GT$ , ita  $CT$  ad  $BT$ : Nam, semper ac ponitur  
rectxangulum  $ATB$  æquale rectxangulo  $CTG$ ;  
addito communi quadrato ex  $CT$ , erit quo-  
que  $CA$  quadratum æquale rectxangulo  $TCG$ ;  
& propterea, quum sit, ut  $CT$  ad  $CA$ , ita  
 $CA$  ad  $CG$ ; erit rectxa  $ET$  tangens hyperbolæ.

Denique, quod rectxa  $ET$  hyperbolam  
contingat in puncto  $E$ , si fuerit, ut  $CV$  ad  $CK$ ,  
ita  $CK$  ad  $CH$ . Nam semper ac  $CV$  est ad  $CK$ ,  
ut  $CK$  ad  $CH$ ; erit quoque ut  $CV$  ad  $CH$ , ita  
 $CK$  quadratum ad  $CH$ , sive  $EG$  quadratum.  
Sed, propter hyperbolam,  $CK$  quadratum est  
ad  $EG$  quadratum, ut  $CA$  quadratum ad re-  
ctxangulum  $AGB$ . Quare erit ex æquali, ut  
 $CA$

CA quadratum ad rectangulum AGB, ita CV ad CH.

Hinc, addendo antecedentes consequentibus, erit etiam, ut CA quadratum ad CG quadratum, ita CV ad VH. Unde, quia CV est ad VH, ut CT ad EH, seu CG; erit rursus ex æquali, ut CA quadratum ad CG quadratum, ita CT ad CG; adeoque, quum sit, ut CT ad CA, ita CA ad CG, erit recta ET tangens hyperbolæ.

V. Nunc eas quidem proprietates ostendemus, quæ tangentibus hyperbolæ sibi mutuo occurrentibus, competunt. Hunc in finem ad duos quælibet hyperbolæ puncta A, & E ducantur tangentes duæ AX, EX, quæ sibi mutuo occurrant in X. Extendantur eadem usque donec conveniant cum diametris AB, EF in punctis L, & T. Et erit primo, ut AX ad LX, ita EX ad TX.

Ducantur enim ad diametros AB, EF ordinatæ EG, AO. Et, per superius ostensa, erit, ut CG ad CA, ita CO ad CE. Sed, propter tangentem ET, CG est ad CA, ut est CA ad CT. Itemque, propter tangentem AL, CO est ad CE, ut est CE ad CL. Quare erit ex æquali, ut CA ad CT, ita CE ad CL: & propterea, quum duo triangula ACL, ECT habeant circa angulum communem C latera reciproce proportionalia, erit triangulum ACL æquale triangulo ECT.

Hinc, dempto communi trapetio CTXL, erit quoque triangulum ELX æquale triangulo ATX. Unde, quum duo ista triangula habeant angulum EXL æqualem angulo

Tom. II.

C

AXT;

V. Tangentibus sibi mutuo occurrentibus proprietates prima. FIG. II.

$AXT$ ; habebunt quoque latera circum æquales istos angulos reciproce proportionalia; proindeque erit, ut  $AX$  ad  $LX$ , ita  $EX$  ad  $TX$ ; hoc est tangentes duæ  $AL$ ,  $ET$  in eadem ratione sese mutuo secabunt in puncto  $X$ , in quo sibi invicem occurrunt.

VI.  
Secunda  
proprietas  
tangenti-  
um  
sibi invicem  
occurren-  
tium.

FIG. I I.

VI. Hinc autem *sequitur secundo*, tangentes duas  $AX$ ,  $EX$  eandem cum ordinatis  $EG$ ,  $AO$  rationem habere; adeoque esse, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $EG$  ad  $AO$ .

Est enim, ex superius ostensis, ut  $CO$  ad  $CE$ , ita  $CG$  ad  $CA$ . Sed, propter triangula æquiangula  $COA$ ,  $CET$ ,  $CO$  est ad  $CE$ , ut  $AO$  ad  $ET$ . Pariterque, ob triangula æquiangula  $CGE$ ,  $CAL$ ,  $CG$  est ad  $CA$ , ut  $EG$  ad  $AL$ . Quare erit ex æquali, ut  $EG$  ad  $AL$ , ita  $AO$  ad  $ET$ ; & permutando erit etiam, ut  $EG$  ad  $AO$ , ita  $AL$  ad  $ET$ .

Quia autem ostensum est,  $AX$  esse ad  $LX$ , ut est  $EX$  ad  $TX$ ; addendo antecedentes consequentibus, erit quoque, ut  $AX$  ad  $AL$ , ita  $EX$  ad  $ET$ ; & permutando erit pariter, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $AL$  ad  $ET$ . Unde, quum in eadem ratione rectarum  $AL$ ,  $ET$  sit, tam  $AX$  ad  $EX$ , quam  $EG$  ad  $AO$ ; erit ex æquali, ut  $AX$  ad  $EX$ , ita  $EG$  ad  $AO$ .

VII.  
Tertia pro-  
prietas tan-  
gentium,  
qua inter se  
mutuo con-  
veniunt.

FIG. I I.

VII. Atque hinc modo *sequitur ulterius*, easdem tangentes  $AX$ ,  $EX$  eandem rationem habere cum conjugatis diametrorum  $AB$ ,  $EF$ , quæ pertinent ad puncta contactus  $A$ , &  $E$ .

Nam, per superius ostensa, ordinatæ  $EG$ ,  $AO$  sunt, ut conjugatæ diametrorum  $AB$ ,  $EF$ . Sed tangentes  $AX$ ,  $EX$  sunt inter se, ut ordinatæ  $EG$ ,  $AO$ . Quare erit ex æquali, ut  
 $AX$



$AX$  ad  $EX$ , ita conjugata diametri  $AB$  ad conjugatam diametri  $EF$ .

Quemadmodum autem tangentes  $AX$ ,  $EX$  sunt, ut conjugatæ diametrorum  $AB$ ,  $EF$ ; ita quadrata tangentium  $AX$ ,  $EX$  erunt, ut quadrata earundem conjugatarum; atque adeo, ut figuræ ipsarum diametrorum  $AB$ ,  $EF$ , quibus suarum conjugatarum quadrata sunt æqualia.

Unde modo, sicuti figuræ diametrorum  $AB$ ,  $EF$  rationem habent compositam ex ipsis diametris, & parametris earundem; ita quoque quadratum tangentis  $AX$  ad quadratum tangentis  $EX$  rationem habebit compositam ex diametro  $AB$  ad diametrum  $EF$ , & ex parametro diametri  $AB$  ad parametrum diametri  $EF$ .

VIII. Pertinet huc quoque *hec alia proprietas*, quod si  $AX$ ,  $EX$  sint duæ tangentes hyperbolæ, & ducta ex puncto contactus  $A$  diametro  $AB$ , agatur per aliud contactus punctum  $E$  recta  $BE$ , conveniens cum tangente  $AX$  in puncto  $I$ ; quod, inquam,  $AI$  sit dupla ipsius  $AX$ .

VIII.  
Quarta  
proprietas  
tangentium,  
qua sibi in-  
vicem occur-  
runt.

FIG. II.

Protrahatur enim tangens  $EX$ , usque donec conveniat cum diametro  $AB$  in puncto  $T$ . Tum ducatur ad eandem diametrum ordinata  $EG$ . Et quoniam, propter tangentem  $ET$ , ut est  $BT$  ad  $CT$ , ita est  $GT$  ad  $AT$ ; erit permutando, ut  $BT$  ad  $GT$ , ita  $CT$  ad  $AT$ . Sed, componendo,  $BG$  est ad  $GT$ , ut  $CA$  ad  $AT$ . Quare erit rursus permutando, ut  $BG$  ad  $CA$ , ita  $GT$  ad  $AT$ .

Jam  $AI$  ad  $AX$  rationem habet compo-

C 2

fitam

fitam ex AI ad EG, & ex EG ad AX. Sed, ob triangula æquiangula BAI, BGE, AI est ad EG, ut AB ad BG. Itemque, ob triangula æquiangula TGE, TAX, EG est ad AX, ut GT ad AT, sive etiam, ut BG ad CA. Quare AI ad AX rationem habebit compositam ex AB ad BG, & ex BG ad CA.

Patet autem, duas istas rationes componere pariter rationem, quam habet AB ad CA. Quare erit ex æquali, ut AI ad AX, ita AB ad CA: proindeque, sicuti AB dupla est ipsius CA; ita etiam AI dupla erit ipsius AX.

IX.  
Præcedentis  
proprietas  
conversa de-  
monstratur.  
FIG. II.

IX. Sed facile est etiam *conversam hujus ostendere*: nimirum, quod si AI sit dupla ipsius AX, & AX sit tangens hyperbolæ; etiam EX contingere debeat hyperbolam in puncto E.

Quemadmodum enim AI dupla ponitur ipsius AX, ita AB dupla est ipsius CA. Quare erit, ut AB ad CA, ita AI ad AX. Sed AI ad AX rationem habet compositam ex AI ad EG, & ex EG ad AX; sive etiam ex AB ad BG, & ex GT ad AT. Itaque AB ad CA habebit pariter rationem compositam ex AB ad BG, & ex GT ad AT.

Jam AB ad CA habet quoque rationem compositam ex AB ad BG, & ex BG ad CA. Quare erit, ut BG ad CA, ita GT ad AT; & permutando, ut BG ad GT, ita CA ad AT. Sed dividendo BT est ad GT, ut CT ad AT. Itaque rursus permutando erit, ut BT ad CT, ita GT ad AT: & propterea, ex superioris ostensis, recta ET tangens erit ellipsis.

X.  
Quinta

X. Præterea, ut alias tangentium hyperbolæ

*bolæ proprietates prosequamur*, sint adhuc  $AX$ ;  $EX$  duæ tangentes hyperbolæ. Et, ducta diametro  $AB$ , sit  $BZ$  tangens tertia, quæ conveniat cum  $EX$  in puncto  $Z$ . Sitque demum  $KL$  conjugata ipsius  $AB$ . Dico, rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$  æquale esse quadrato, quod fit ex  $CK$ .

*proprietates  
tangentiũ  
sibi mutuo  
occurrentiũ.*

FIG. 12.

Conveniat namque tangens  $EX$  cum diametro  $AB$  in puncto  $T$ , & cum ejus conjugata  $KL$  in puncto  $V$ . Ducaturque ex puncto contactus  $E$ , tum recta  $EG$  ordinata ad diametrum  $AB$ , cum recta  $EH$  ordinata ad diametrum  $KL$ .

Quia igitur  $ET$  est tangens hyperbolæ erit, ut  $BT$  ad  $CT$ , ita  $GT$  ad  $AT$ . Sed, propter triangula æquiangula  $TBZ$ ,  $TCV$ ,  $BT$  est ad  $CT$ , ut  $BZ$  ad  $CV$ . Itemque, propter triangula æquiangula  $TGE$ ,  $TAX$ ,  $GT$  est ad  $AT$ , ut  $EG$ , sive  $CH$  ad  $AX$ . Quare erit ex æquali, ut  $BZ$  ad  $CV$ , ita  $CH$  ad  $AX$ : & propterea rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$  æquale erit rectangulo  $HCV$ .

Et quoniam eadem tangens  $ET$  occurrit quoque conjugatæ diametro  $KL$  in puncto  $V$ ; erit, ex superius ostensis, ut  $CH$  ad  $CK$ , ita  $CK$  ad  $CV$ . Quare rectangulum  $HCV$  æquale erit quadrato ex  $CK$ . Sed rectangulo  $HCV$  ostensum est æquale rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$ . Igitur erit rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$  æquale quadrato, quod fit ex  $CK$ .

XI. Ulterius, quemadmodum  $AB, KL$  sunt duæ hyperbolæ conjugatæ diametri, ita sint  $MR, PS$  binæ aliæ diametri similiter conjugatæ, quæ conveniant cum tangente  $AX$  in

XI.  
*Theorema  
de rectangu-  
lo sub por-  
tionibus  
tangentiũ.*

per duas punctis X, & Y. Et nullo item negotio ostende-  
 conjugatas mms, quod eidem CK quadrato æquale fit  
 abscissis.  
 FIG. 13. etiam rectangulum ex AX in AY.

Ductis liquidem, tum ordinatis MN, PQ ad diametrum AB, cum ordinatis AO, AI, ad diametros MR, PS; erit rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum in ratione composita ex MN ad CK, & ex PQ ad CK. Sed, per ea, quæ superius ostensa sunt, MN est ad CK, ut AO, seu CI ad CP. Itemque PQ est ad CK, ut CN ad CA; sive etiam, ut CO ad CM. Itaque rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum rationem habebit compositam ex CI ad CP, & ex CO ad CM.

Jam, propter tangentem AY, diametro PS occurrentem in Y, CI est ad CP, ut CP ad CY; sive etiam, ut PQ ad AY. Pariterque, ob tangentem AX, diametro MR occurrentem in X, CO est ad CM, ut CM ad CX; sive etiam, ut MN ad AX. Quare rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum habebit quoque rationem compositam ex PQ ad AY, & ex MN ad AX.

Quoniam autem duæ istæ rationes componunt pariter rationem, quam habet rectangulum ex MN in PQ ad rectangulum ex AX in AY; erit ex æquali, ut rectangulum ex MN in PQ ad rectangulum ex AX in AY, ita idem rectangulum ex MN in PQ ad CK quadratum: & propterea rectangulum ex AX in AY æquale erit quadrato, quod fit ex CK.

XII.  
 Quod præcedens

XII. Sed conversum hujus theorematibus facile quoque erit ostendere. Nimirum, quod si AB,

si  $AB$ ,  $KL$  sint duæ hyperbolæ diametri conjugatæ, & rectangulum  $XAY$ , contentum sub portionibus tangentis  $AX$ , æquale sit quadrato, quod fit ex  $CK$ ; aliæ binæ diametri  $MR$ ,  $PS$  sint etiam conjugatæ.

*theorematia  
conversum  
fit pariter  
verum.*

FIG. 13.

Si enim  $PS$  non sit conjugata ipsius  $MR$ , sit ejus conjugata diameter alia  $TV$ , quæ occurrat tangenti  $XY$  in puncto  $W$ . Et quoniam  $MR$ ,  $TV$  sunt duæ hyperbolæ conjugatæ diametri, quæ conveniunt cum tangente  $XY$  in punctis  $X$ , &  $W$ ; erit rectangulum ex  $AX$  in  $AW$  æquale quadrato, quod fit ex  $CK$ .

Quia autem eidem  $CK$  quadrato positum est æquale rectangulum ex  $AX$  in  $AY$ ; erit rectangulum ex  $AX$  in  $AW$  æquale rectangulo ex  $AX$  in  $AY$ : proindeque portiones duæ  $AW$ ,  $AY$  æquales erunt inter se. Quod quum fieri nequeat, consequens est, ut  $PS$  sit conjugata ipsius  $MR$ .

XIII. Atque hinc modo colligi ulterius potest, quod, si ex extremitatibus diametri  $AB$ , ducantur tangentes duæ  $AX$ ,  $BZ$ , convenientes cum tangente tertia  $ET$  in punctis  $X$ , &  $Z$ , junganturque rectæ  $CX$ ,  $CZ$ ; istæ, ad hyperbolas usque productæ, exhibebunt nobis binas earum diametros conjugatas.

XIII.  
*Theorema  
pro determin-  
atione dia-  
metrorum  
conjugata-  
rum hyper-  
bolæ.*

FIG. 12.

Si enim  $CZ$  producat, usque donec conveniat cum tangente  $AX$  in puncto  $Y$ ; ob triangula æquiangula  $CBZ$ ,  $CAY$ , erit, ut  $CB$  ad  $BZ$ , ita  $CA$  ad  $AY$ . Unde, quemadmodum æquales sunt duæ  $CB$ ,  $CA$ ; ita æquales erunt pariter duæ  $BZ$ ,  $AY$ : proindeque rectangulum ex  $AX$  in  $BZ$  æquale erit rectangulo ex  $AX$  in  $AY$ .

C 4

Quum

Quum autem ostensum sit rectangulum ex AX in BZ æquale quadrato ex CK; erit eidem CK quadrato æquale pariter rectangulum ex AX in AY. Unde, quum duæ diametri MR, PS abscindant ex tangente AX portiones duas AX, AY, quæ rectangulum continent, æquale quadrato, quod fit ex CK: per ea, quæ modo ostensa sunt, omnino necesse est, ut MR, PS sint duæ hyperbolarum conjugatæ diametri.

XIV.  
Tangentis  
relate ad  
axem hyper-  
bola pro-  
prietas spe-  
cialis.  
FIG. 14.

XIV. Cæterum nolim hic silentio prætere-  
rire, quod si AB sit axis hyperbolæ, AD para-  
meter ejus, & ET aliqua tangens; ducanturque  
ex puncto contactus E rectæ duæ EG, EH,  
una perpendicularis ad axem, & altera per-  
pendicularis ad tangentem; quod, inquam, AB  
sit ad AD, ut est CG ad GH.

Si enim tangens ET conveniat cum axe  
AB in puncto T; erit, ex superius ostensis, ut  
AB ad AD, ita rectangulum CGT ad EG  
quadratum. Sed, ob triangulum TEH, rectan-  
gulum in E, quadratum ex EG est æquale re-  
ctangulo HGT. Quare erit quoque, ut AB  
ad AD, ita rectangulum CGT ad rectangu-  
lum HGT: & propterea, quia duo ista rectan-  
gula sunt inter se, ut CG ad GH; erit, ex æ-  
quali, ut AB ad AD, ita CG ad GH.

Quin etiam, si KL sit axis conjugatus;  
& KI parameter ejus, cumque eo conveniat  
perpendicularis EH in puncto R, eidemque  
ordinata demittatur EF; erit ut KL ad KI,  
ita CF ad FR.

Jam enim AB est ad AD, ut CG ad GH.  
Sed AB est ad AD, ut KI ad KL; & CG est  
ad

ad GH, ut ER ad EH; five etiam, ut FR ad GF. Quare erit ex æquali, ut KI ad KL, ita FR ad GF; & invertendo, KL erit ad KI, ut GF ad FR.

C A P. IV.

*Demonstrantur proprietates, quæ competunt secantibus hyperbolæ.*

I. **O**stenfis proprietatibus, quæ pertinent ad tangentes hyperbolæ; sequitur modo, ut eas ostendamus, quæ ejusdem secantibus competunt. Res autem eo redit, ut inquiramus, *quam rationem habeant inter se rectangula, contenta sub segmentis duarum rectarum, quæ sibi mutuo occurrentes, utrinque, vel ad eandem hyperbolam, vel etiam ad hyperbolas oppositas terminantur.*

De ratione, quam habent rectangula, sub secantium segmentis contenta. Præmissis casibus, quæ secantes sunt diametri.

Atque hic quoque, non secus ac in ellipti, varii sunt casus distinguendi, pro diversa qualitate rectarum, quæ sibi mutuo occurrunt, & utrinque ad curvam terminantur. Primo igitur supponemus, rectas illas esse *binas diametros*, & ostendemus, *rectangulum sub segmentis unius esse ad rectangulum sub segmentis alterius in duplicata ratione ipsarum diametrorum.*

Sint enim AB, KL duæ quævis hyperbolæ diametri, quæ sibi mutuo occurrunt in ipso centro C. Dico, *rectangulum sub segmentis unius*

FIG. 150

43 SECTIONUM CONICARUM  
 unius AC, BC, esse ad rectangulum sub seg-  
 mentis alterius KC, LC, ut est quadratum  
 diametri AB ad quadratum diametri KL.

Nam, quum utraque diameter secta sit  
 bifariam in centro C; erit in ratione ipsarum  
 AB, KL, tam AC ad KC, quam BC ad LC.  
 Sed rectangulum ACB est ad rectangulum  
 KCL in ratione composita ex AC ad KC, &  
 ex BC ad LC. Quare ratio eorundem rectan-  
 gulorum ACB, KCL duplicata erit diametro-  
 rum AB, KL.

II. Supponemus secundo, ex rectis, sibi  
 mutuo occurrentibus, unam quidem esse diame-  
 trum, alteram ordinatam ipsius. Et in isto ca-  
 su rectangulum sub segmentis prioris rectæ  
 erit ad rectangulum sub segmentis alterius re-  
 ctæ in duplicata ratione ejus, quam habet dia-  
 meter ad suam conjugatam.

FIG. 15. Sit enim AB diameter aliqua hyperbolæ,  
 cujus KL sit conjugata; sitque etiam MO una  
 ex ordinatis ejus diametri, quæ ipsi diametro  
 occurrens in puncto N, utrinque ad hyperbo-  
 lam terminetur. Dico, rectangulum ANB esse  
 ad rectangulum MNO, ut est AB quadratum  
 ad KL quadratum.

Nam recta MO, velut ordinata ipsius  
 AB, bifariam secta est in puncto N. Quare  
 erit MN quadratum æquale rectangulo  
 MNO: & propterea erit, ut rectangulum  
 ANB ad rectangulum MNO, ita idem re-  
 ctangulum ANB ad MN quadratum. Sed re-  
 ctangulum ANB est ad MN quadratum, ut  
 AB quadratum ad KL quadratum. Igitur in  
 hac eadem ratione erit pariter rectangulum  
 ANB



ANB ad rectangulum MNO.

III. Supponemus tertio, *rectas sibi mutuo occurrentes esse ordinatas, quæ ad duas diametros conjugatas referuntur; ostendemusque, rectangulum sub segmentis unius esse ad rectangulum sub segmentis alterius in ratione duplicata reciproca ipsarum diametrorum.*

III.  
Tertius casus, quum dua secantes sunt ordinata, quæ ad duas diametros conjugatas referuntur.

FIG. 15.

Sint namque AB, KL duæ hyperbolæ diametri conjugatæ; sitque etiam MO ordinata diametri AB, & EF ordinata diametri KL, quæ utrinque ad curvam terminatæ, sibi mutuo occurrant in puncto H. Dico, rectangulum MHO esse ad rectangulum EHF, ut est KL quadratum. ad AB quadratum.

Ex puncto E ducatur ad diametrum AB ordinata EG. Et quoniam, propter hyperbolam, KL quadratum est ad AB quadratum, tam ut MN quadratum ad rectangulum ANB, quam ut EG quadratum ad rectangulum AGB; erit quoque, ut KL quadratum ad AB quadratum, ita differentia quadratorum MN, EG ad differentiam rectangulorum ANB, AGB.

Jam, propter æquales EG, NH, differentia quadratorum MN, EG est æqualis rectangulo MHO. Itemque, quum rectangulum ANB æquale sit differentiæ quadratorum CA, CN, & rectangulum AGB æquale differentiæ quadratorum CA, CG; erit differentia rectangulorum ANB, AGB æqualis differentiæ quadratorum CG, CN, quæ tantundem valet, ac rectangulum EHF. Unde erit, ut KL quadratum ad AB quadratum, ita rectangulum MHO ad rectangulum EHF.

IV. Sup-

IV. *Quartus casus, quum duarum sectionum una est diameter, & alia ordinata alterius diametri.*

FIG. 16.

17.

IV. Supponemus quarto, *ex rectis, sibi invicem occurrentibus, unam esse diametrum, aliam vero ordinatam alterius diametri*. Et quum id contingit, erit rectangulum sub segmentis illius ad rectangulum sub segmentis istius, ut est quadratum prioris diametri ad quadratum conjugatæ alterius diametri.

Sit enim AB aliqua hyperbolæ diameter, cujus conjugata sit KL, & MO una ex ejus ordinatis, utrinque ad hyperbolam terminata. Sit porro EF diameter alia, quæ conveniat cum ordinata prioris MO in puncto H. Dico, rectangulum EHF esse ad rectangulum MHO, ut est EF quadratum ad KL quadratum.

Patet autem, duo hic contingere posse. Primo, ut ordinata MO, quæ refertur ad diametrum AB, suos terminos habeat in eadem hyperbola. Et secundo, ut terminetur ad hyperbolas oppositas. In utroque casu ducantur ex punctis E, H, M rectæ EG, HI, MR, ipsæ AB parallelæ, quæ conveniant cum KL in punctis G, I, R. Et, ob triangula æquiangula CEG, CHI, erit, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita EG quadratum ad HI, seu MR quadratum.

V. *Demonstratio hujus casus, quando ordinata ad eandem hyperbolam terminatur.*

FIG. 16.

V. Ponamus itaque primo, *ordinatam suos terminos habere in eadem hyperbola*. Et quoniam, propter hyperbolam, EG quadratum est ad MR quadratum, ut summa quadratorum CK, CG ad summam quadratorum CK, CR; erit ex æquali, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita summa quadratorum CK, CG ad summam quadratorum CK, CR.

Hinc

Hinc, subducendo terminos prioris rationis ex terminis secundæ, erit quoque, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita CK quadratum ad differentiam inter summam quadratorum CK, CR, & CI quadratum. Quumque CG quadratum sit ad CI quadratum, ut est CE quadratum ad CH quadratum; erit rursus ex æquali, ut CE quadratum ad CH quadratum, ita CK quadratum ad differentiam inter summam quadratorum CK, CR, & CI quadratum.

Atque hinc, subducendo antecedentes ex consequentibus, erit ulterius, ut CE quadratum ad differentiam quadratorum CE, CH, ita CK quadratum ad differentiam quadratorum CR, CI. Sed differentia quadratorum CE, CH est æqualis rectangulo EHF; & differentia quadratorum CR, CI, five MN, NH est æqualis rectangulo MHO. Itaque erit, ut CE quadratum ad rectangulum EHF, ita CK quadratum ad rectangulum MHO; & permutando, ut CE quadratum ad CK quadratum, five etiam, ut EF quadratum ad KL quadratum, ita rectangulum EHF ad rectangulum MHO.

VI. Ponamus secundo, *ordinatam terminari ad hyperbolas oppositas*. Et similiter, quia propter hyperbolam EG quadratum est ad MR quadratum, ut rectangulum KGL ad rectangulum KRL; erit ex æquali, ut CG quadratum ad CI quadratum, ita rectangulum KGL ad rectangulum KRL.

VI.  
*Demonstratio ejusdem casus, quando ordinata terminatur ad hyperbolas oppositas.*  
 FIG. 17.

Hinc, ex terminis prioris rationis subducendo terminos secundæ, erit quoque, ut CG qua-

quadratum ad  $Cl$  quadratum, ita  $Ck$  quadratum ad differentiam inter  $Cl$  quadratum, & rectangulum  $KRL$ . Quoniam  $Cg$  quadratum sit ad  $Cl$  quadratum, ut est  $Ce$  quadratum ad  $Ch$  quadratum; erit rursus ex æquali, ut  $Ce$  quadratum ad  $Ch$  quadratum, ita  $Ck$  quadratum ad differentiam inter  $Cl$  quadratum, & rectangulum  $KRL$ .

Atque hinc, capiendo differentias antecedentium, & consequentium, erit ulterius, ut  $Ce$  quadratum ad differentiam quadratorum  $Ce, Ch$ , ita  $Ck$  quadratum ad differentiam quadratorum  $Cr, Cl$ . Sed differentia quadratorum  $Ce, Ch$  est æqualis rectangulo  $EHF$ ; & differentia quadratorum  $Cr, Cl$  est æqualis rectangulo  $MHO$ . Itaque erit, ut  $Ce$  quadratum ad rectangulum  $EHF$ , ita  $Ck$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ ; & permutando, ut  $Ce$  quadratum ad  $Ck$  quadratum, sive etiam, ut  $Ef$  quadratum ad  $KL$  quadratum, ita rectangulum  $EHF$  ad rectangulum  $MHO$ .

VII.  
 Postremus  
 casus, quum  
 secantes sunt  
 ordinata  
 duarum  
 quarumvis  
 diametro-  
 rum.

FIG. 18.

19.

VII. Supponemus denique, *rectas duas, sibi mutuo occurrentes, ordinatas esse duarum diametrorum, quæ inter se nequaquam sunt conjugatæ*. Et in isto casu rectangula, contenta sub segmentis ipsarum, erunt, ut quadrata, quæ fiunt ex conjugatis earum diametrorum.

Sint enim  $AB, RS$  duæ quævis diametri, inter se nequaquam conjugatæ; sitque  $MO$  una ex ordinatis diametri  $AB$ , &  $PQ$  una ex ordinatis diametri  $RS$ . Conveniant autem inter se duæ istæ ordinatæ in puncto  $H$ . Dico, rectangulum  $MHO$  esse ad rectangulum  $PHQ$ , ut est quadratum, quod fit ex conjugata.

jugata diametri AB, ad quadratum, quod fit ex conjugata diametri RS.

Ducatur namque per punctum H diameter tertia EF. Et quoniam diameter ista EF secat MO, ordinatam diametri AB, in puncto H; erit, ex ostensis, ut rectangulum EHF ad rectangulum MHO, ita EF quadratum ad quadratum conjugatæ diametri AB. Quumque eadem EF secat pariter PQ, ordinatam diametri RS, in puncto H; erit quoque, ut rectangulum EHF ad rectangulum PHQ, ita EF quadratum ad quadratum conjugatæ diametri RS. Quare ordinando erit, ut rectangulum MHO ad rectangulum PHQ, ita quadratum ex conjugata diametri AB ad quadratum ex conjugata diametri RS.

VIII. Et quidem universale theorema, quod hac in re locum habet, hujusmodi est, quod si intra hyperbolas oppositas binæ ducantur rectæ lineæ, quæ sese mutuo secant; rectangula, quæ fiunt ex segmentis ipsarum, sint, ut quadrata ex conjugatis earum diametrorum, ad quas rectæ illæ velut ordinatæ referuntur. Et omnia alia theoremata, superius ostensa, sunt tantum casus speciales istius.

Nam primo, si ductæ rectæ lineæ transcant per centrum, & sint hyperbolarum diametri; erunt ipsæmet conjugatæ earum diametrorum, ad quas eadem velut ordinatæ referuntur. Unde, vi ejus theorematis generalis, omnino necesse est, ut rectangula sub segmentis ipsarum sint, ut quadrata earundem.

Secundo, si una ex iis rectis sit diameter, & altera ejus ordinata: quemadmodum prior est

VIII.  
Theorema  
generale,  
quod hac in  
re locum ha-  
bet, in me-  
dium offer-  
tur.

48 SECTIONUM CONICARUM

est conjugata illius diametri, ad quam ipsa velut ordinata refertur; sic conjugata ejus diametri, quæ secundam agnoscit tamquam suam ordinatam, est conjugata diametri prioris. Quare, per theorema generale, rectangulum sub segmentis diametri ad rectangulum sub segmentis ordinatæ erit, ut quadratum diametri ad quadratum suæ conjugatæ.

Tertio, si rectæ, sese invicem secantes, sint ordinatæ duarum hyperbolæ diametrorum conjugatarum; non aliæ erunt conjugatæ diametrorum, ad quas rectæ illæ velut ordinatæ referuntur, quam eadem diametri, in verso ordine sumptæ. Unde, per theorema generale, rectangula, contenta sub segmentis earum ordinatarum, erunt in ratione reciproca duplicata suarum diametrorum.

Denique, si una ex iis rectis sit diameter, & altera sit ordinata alterius diametri; erit ipsa prior recta conjugata illius diametri, ad quam eadem velut ordinata refertur. Unde, ob theorema generale, rectangulum sub segmentis prioris diametri erit ad rectangulum sub segmentis ordinatæ alterius diametri, ut est quadratum diametri prioris ad quadratum conjugatæ alterius diametri.

IX.  
Quod idem  
theorema sit  
verum  
etiam si una  
ex secantibus  
vertitur in  
tangentem.

IX. Fieri autem potest, ut una ex secantibus tangens evadat: nimirum, quum puncta duo sectionis coeunt in unum. In isto casu rectangulum sub ejus segmentis vertetur in quadratum ipsius tangentis. Unde inter quadratum istud, & rectangulum, sub alterius secantis portionibus contentum, eadem adhuc ratio obtinebit.

Quin

Quin etiam *verti potest in tangentem utraque secans*. Et quum id contingit, ambo quidem rectangula, sub secantium portionibus contenta, abibunt in quadrata ipsarum tangentium. Ex quo fit, ut inter quadrata, quæ ex tangentibus fiunt, eadem pariter ratio debeat locum habere.

Et istud quidem jam præcedenti capite speciatim a nobis ostensum fuit. Vidimus enim, quod si fuerint tangentes duæ AX, EX, sibi mutuo occurrentes in X; quadrata ipsarum eandem habeant rationem inter se, quam quadrata, quæ fiunt ex conjugatis diametro- rum AB, EF.

FIG. 11.

Ad illud vero quod attinet, nec etiam difficile erit, veritatem ejus speciatim ostendere. Sed distinguendi sunt tamen duo casus. Primus est, quum secans est parallela diametro, quæ pertinet ad punctum contactus. Alter est, quum eadem secans ei diametro nequaquam est parallela.

X. Ponamus itaque primo, *secantem parallelam esse diametro, quæ pertinet ad punctum contactus*; adeo nempe, ut existente EH tangente, secans sit recta HO, parallela diametro EF. Jamque in hoc casu diameter, ad quam recta MO velut ordinata refertur, erit illa eadem, quæ est conjugata ipsius EF.

X.  
Primus casus, quum secans est parallela diametro, quæ pertinet ad punctum contactus.

FIG. 20.

Sit igitur AB conjugata diametri EF. Quumque vicissim EF sit conjugata ipsius AB; jam illud ostendendum nobis erit, ut EH quadratum sit ad rectangulum MHO, veluti est AB quadratum ad EF quadratum. Istud autem nullo negotio ostendemus sequenti ratione.

Tom. II.

D

Ex

Ex puncto M ducatur ad diametrum EF ordinata MR. Et quoniam duæ CR, MN inter se sunt æquales; erit etiam CR quadratum æquale quadrato, quod fit ex NM. Sed CR quadratum est æquale rectangulo ERF una cum CE quadrato. Et NM quadratum est æquale rectangulo MHO una cum NH, five eodem CE quadrato. Quare, dempto communi quadrato ex CE, remanebit rectangulum ERF æquale rectangulo MHO.

Quia autem æqualia sunt quoque quadrata, quæ fiunt ex ipsis MR, EH; erit, ut MR quadratum ad rectangulum ERF, ita EH quadratum ad rectangulum MHO. Sed MR quadratum est ad rectangulum ERF, ut AB quadratum ad EF quadratum. Et igitur ex æquali in eadem ratione, quam habet AB quadratum ad EF quadratum, erit quoque EH quadratum ad rectangulum MHO.

XI. Ponamus secundo, *secantem haud quidem parallelam esse diametro, quæ pertinet ad punctum contactus*: adeo nempe, ut existente EH tangente, secans sit recta HS, quæ occurrit diametro EF. Jamque, si KL sit diameter, ad quam recta TS velut ordinata refertur; ostendendum erit, EH quadratum esse ad rectangulum THS, ut est quadratum conjugatæ diametri EF ad quadratum conjugatæ diametri KL.

Ducatur ex puncto H secans alia HO, quæ ipsi EF sit parallela; fitque AB diameter, quæ ipsam MO velut suam ordinatam agnoscit. Itaque, quum secans HO parallela sit diametro EF, quæ pertinet ad punctum contactus

XI.  
Alter casus,  
quum secans  
non est pa-  
rallela dia-  
metro, quæ  
transit per  
punctum  
contactus.  
FIG. 21.



ctus E ; erit EH quadratum ad rectangulum MHO , ut est quadratum conjugatæ diametri EF ad quadratum conjugatæ diametri AB.

Quoniam autem HO , HS sunt secantes duæ , quæ velut ordinatæ referuntur ad diametros AB, KL; erit, ex superius ostensis, rectangulum MHO ad rectangulum THS , ut est quadratum conjugatæ diametri AB ad quadratum conjugatæ diametri KL . Quare ordinando erit , ut EH quadratum ad rectangulum THS , ita quadratum ex conjugata diametri EF ad quadratum ex conjugata diametri KL .

XII. *Speciatim , quum secans est diameter hyperbolæ, veritas ejus , de quo agitur , ostendi potest hoc pacto.* Manentibus omnibus, ut supra, transeat secans HO per centrum hyperbolæ . Dico, EH quadratum esse ad rectangulum MHO , ut est quadratum ex conjugata diametri EF ad quadratum diametri MO . Id vero ostendemus in hunc modum.

XII.  
Demonstratio specialis,  
quando secans est diameter.

FIG. 22.

Sit GI conjugata ipsius EF , ducaturque ex puncto M ad eandem EF ordinata MR. Et quoniam CH quadratum est ad CM quadratum , ut CE quadratum ad CR quadratum; subducendo antecedentes ex consequentibus , erit ut CH quadratum ad rectangulum MHO , ita CE quadratum ad rectangulum ERF . Sed , ob hyperbolam , CE quadratum est ad rectangulum ERF , ut est CG quadratum ad MR quadratum . Itaque erit ex æquali , ut CG quadratum ad MR quadratum , ita CH quadratum ad rectangulum MHO .

D 2

Quo-

Quoniam vero  $MR$  quadratum est ad  $EH$  quadratum, ut  $CM$  quadratum ad  $CH$  quadratum; erit ex æquo perturbando, ut  $CG$  quadratum ad  $EH$  quadratum, ita  $CM$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ ; & permutando, ut  $CG$  quadratum ad  $CM$  quadratum, ita  $EH$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ . Sed  $CG$  quadratum est ad  $CM$  quadratum, ut  $GI$  quadratum ad  $MO$  quadratum. Itaque erit ex æquali, ut  $EH$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ , ita  $GI$  quadratum ad  $MO$  quadratum.

XIII.  
Theorema  
de ratione,  
quam habent  
duæ  
hyperbolæ  
tangentes,  
virsus ostenditur.

FIG. 23.

XIII. Atque hinc modo nullo negotio ostendi potest, quod si duæ hyperbolæ tangentes sibi mutuo occurrant, eæ sint inter se, veluti conjugatæ diametrorum, quæ pertinent ad puncta contactus.

Sint enim  $AH$ ,  $EH$  duæ hyperbolæ tangentes, quæ sibi invicem occurrant in puncto  $H$ . Ducantur ex punctis contactus  $A$ , &  $E$  diametri  $AB$ ,  $EF$ . Dico esse, ut  $AH$  ad  $EH$ , ita conjugata diametri  $AB$  ad conjugatam diametri  $EF$ .

Ducatur namque diameter alia  $MO$ , quæ transeat per punctum  $H$ . Et quoniam  $AH$  est tangens, &  $HO$  est secans, transiens per centrum; erit, ut  $AH$  quadratum ad rectangulum  $MHO$ , ita quadratum ex conjugata diametri  $AB$  ad quadratum ipsius  $MO$ .

Similiter, quia  $EH$  est tangens, &  $HO$  est secans, transiens per centrum; erit, ut rectangulum  $MHO$  ad  $EH$  quadratum, ita  $MO$  quadratum ad quadratum, quod fit ex conjugata diametri  $EF$ .

Hinc ex æquo ordinando erit, ut  $AH$   
qua-

quadratum ad EH quadratum, ita quadratum ex conjugata diametri AB ad quadratum ex conjugata diametri EF: & propterea tangentes duæ AH, EH erunt, ut conjugatæ diametrorum AB, EF.

XIV. Cæterum ex iis, quæ hætenus ostensa sunt, prono alveo fluunt sequentia duo theoremata.

Primum theorema est, quod si duabus hyperbolæ tangentibus parallelæ fuerint duæ secantes, & conveniant inter se, tum tangentes, cum secantes; rectangula, sub secantium segmentis contenta, sint proportionalia quadratis, quæ ex tangentibus fiunt.

Nam diametri, ad quas duæ secantes velut ordinatæ referuntur, sunt illæ eædem, quæ pertinent ad puncta contactus. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se quadrata tangentium, erunt quoque rectangula, quæ sub secantium segmentis continentur.

Alterum theorema est, quod si duabus secantibus hyperbolæ parallelæ fuerint binæ aliæ secantes, & conveniant inter se, tam illæ, quam istæ; rectangula sub segmentis illarum sint proportionalia rectangulis, quæ sub segmentis istarum continentur.

Nam diametri, ad quas duæ posteriores secantes velut ordinatæ referuntur, sunt illæ eædem, quæ agnoscunt velut suas ordinatas secantes priores. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se rectangula sub segmentis primarum secantium, erunt quoque rectangula sub segmentis aliarum.

XIV.

*Alia duo  
theoremata  
ex hætenus  
ostensis de-  
ducuntur.*

## C A P. V.

*Proprietates, quæ hyperbolæ asymptotis competunt, in medium afferuntur.*

*I.  
Qua sint  
hyperbolæ  
asymptoti,  
& quod  
numquam  
cum ea con-  
veniant.*

**I.** **P**ertinet ad hunc locum doctrinam asymptotorum hyperbolæ, ut quæ sunt rectæ, quæ hyperbolam contingunt in punctis extremis, sive infinite a centro distantibus. Primo igitur ostendemus, qua ratione definiantur rectæ istæ, quæ hyperbolæ asymptoti dicuntur. Tum proprietates, quæ eis competunt, more nostro prosequemur.

**FIG. 24.** Hunc in finem referat AB axem hyperbolæ, sitque KL ejus conjugatus. Describatur circa duos istos axes AB, KL parallelogrammum EFGH. Et diagonales hujus parallelogrammi EG, FH, transeuntes per centrum C, hyperbolæ asymptotos nobis exhibebunt.

Sortitæ sunt autem diagonales istæ tale nomen, quia productæ in infinitum, etsi continuo ad hyperbolam accedant, numquam tamen cum ea conveniunt. Nec difficile id erit ostendere. Nam, ducta ex puncto quovis hyperbolæ M ad axem AB ordinata MN; erit, ut MN quadratum ad rectangulum ANB, ita CK, sive AE quadratum ad CA quadratum.

Jam vero, si eadem ordinata MN conveniat

niat cum EG in O, AE quadratum erit ad CA quadratum, ut est NO quadratum ad CN quadratum. Quare erit ex æquali, ut MN quadratum ad rectangulum ANB, ita NO quadratum ad CN quadratum: & propterea, quemadmodum rectangulum ANB minus est CN quadrato, ita quoque MN quadratum minus erit quadrato, quod fit ex NO; adeoque punctum O erit ultra punctum M.

II. Quod autem asymptoti continuo ad hyperbolam accedant, demonstratur hoc pacto. Extendatur eadem ordinata MN, usque donec conveniat cum asymptoto altera FH in puncto R. Et quemadmodum EH secta est bifariam in A, ita quoque OR bisecta erit in N: proindeque differentia quadratorum MN, NO erit æqualis rectangulo OMR.

II.  
Quod asym-  
ptoti conti-  
nuo ad hy-  
perbolam  
accedant.

FIG. 24.

Et quoniam in eadem ratione, quam habet AE quadratum ad CA quadratum, est, tam MN quadratum ad rectangulum ANB, quam NO quadratum ad CN quadratum; erit quoque, ut AE quadratum ad CA quadratum, ita rectangulum OMR ad idem CA quadratum. Unde rectangulum OMR æquale erit quadrato, quod fit ex AE.

Hinc, quocumque in loco capiatur ordinata MN, si ea producaturs usque donec secet asymptotos in punctis O, & R, erit rectangulum OMR ejusdem ubique magnitudinis. Unde per recessum ipsius ordinatæ a vertice A, quemadmodum augetur latus unum MR, ita necesse est, ut minuatur latus alterum MO: & propterea asymptoti ad hyperbolam continuo accedent.

D 4

III. Non

III.  
Quod di-  
stantia inter  
asympto-  
tum, & hy-  
perbolam e-  
vadit tan-  
dem inaffi-  
gnabilis.

FIG. 24.

III. Non igitur in dubium verti potest, quod distantia inter asymptotum, & hyperbolam minor semper, ac minor evadat. Sed ostendi quoque potest, quod eadem distantia eoque minuat, ut tandem evadat inassignabilis, sive minor quacumque data recta linea.

Capiatur enim super EH portio EI, quæ sit minor recta linea data. Tum extendatur eadem versus S, ita ut EI sit ad AE, ut est AE ad IS. Ducatur porro per punctum S recta SR, ipsi CE parallela, quæ conveniat cum CH in puncto R. Ac denique compleatur parallelogrammum SO.

Quia igitur EI est ad AE, ut AE ad IS; erit rectangulum EIS æquale quadrato, quod fit ex AE. Sed eidem AE quadrato est etiam æquale rectangulum OMR. Quare duo rectangula EIS, OMR æqualia erunt inter se.

Ulterius, quemadmodum OR secta est bifariam in N, ita ES bisecetur in T. Et, ob æquales ES, OR, erunt etiam æquales duæ TE, NO. Unde erit, ut TE quadratum ad rectangulum EIS, ita NO quadratum ad rectangulum OMR; & convertendo, ut TE quadratum ad TI quadratum, ita NO quadratum ad MN quadratum.

Hinc, quum sit, ut TE ad TI, ita NO ad MN; erit rursus convertendo, ut TE ad EI, ita NO ad MO. Sed duæ TE, NO sunt æquales inter se. Quare etiam EI ipsi MO æqualis erit; & propterea, quemadmodum EI est minor recta linea data, ita quoque eadem data recta linea minor erit ipsa MO.

IV.  
Asymptote

IV. Ostendemus modo proprietates, quæ hy-

hyperbolæ asymptotis competunt. Et primâ quidem proprietas hæc est, quod si per aliquod hyperbolæ punctum recta ducatur, uni ex axibus parallela, quæ cum utraque asymptoto conveniat; rectangulum sub eius segmentis sit æquale quadrato, quod fit ex dimidio axis prædicti.

vna hyper-  
bola pro-  
prietas  
principalis  
ostenditur.

FIG. 24.

Sint enim AB, KL duo axes hyperbolæ, sintque etiam EG, FH binæ ejus asymptoti. Jamque, si per aliquod hyperbolæ punctum M ducatur recta OR, parallela axi KL, quæ cum utraque asymptoto conveniat in punctis O, & R; erit, ex superius ostensis, rectangulum OMR æquale quadrato ex AE; & consequenter æquale etiam quadrato, quod fit ex CK.

Ducatur porro per idem punctum M recta PQ, parallela axi AB, quæ conveniat cum utraque asymptoto in punctis P, & Q. Ostendendum est, rectangulum PMQ esse etiam æquale quadrato, quod fit ex CA. Id vero nullo negotio ostendemus sequenti ratione.

Rectangulum OMR ad rectangulum PMQ est in ratione composita ex MO ad MP, & ex MR ad MQ. Sed MO est ad MP, ut AE, sive CK ad CA. Et MR est ad MQ, ut AH, sive CK ad CA. Quare ratio rectanguli OMR ad rectangulum PMQ duplicata erit ejus, quam habet CK ad CA.

Hinc erit, ut CK quadratum ad CA quadratum, ita rectangulum OMR ad rectangulum PMQ. Sed rectangulum OMR ostensum est æquale quadrato, quod fit ex CK. Quare etiam rectangulum PMQ erit æquale quadrato, quod fit ex CA.

V. At.

v.  
 Conſeſſaria,  
 qua fluunt  
 ex oſtenſa  
 proprietate.  
 FIG. 25.

V. Atque hinc modo *plura nobis derivantur*. Nimirum primo, quod ſi uni ex axibus, veluti KL, ducantur duæ parallelæ OR, PQ, convenientes cum aſymptotis, & hyperbola; reſtângulum ſub ſegmentis unius OMR æquale ſit reſtângulo ſub ſegmentis alterius PSQ; quum utrumque ſit æquale quadrato, quod ſit ex CK.

FIG. 25.

Secundo, quod ſi per eadem hyperbolæ puncta M, & S ducantur duæ quævis aliæ parallelæ TV, XZ, ad utramque aſymptotum pariter terminatæ, reſtângulum TMV ſit etiam æquale reſtângulo XSZ. Nam reſtângulum OMR ad reſtângulum TMV rationem habet compoſitam ex MO ad MT, & ex MR ad MV; ſive etiam ex SP ad SX, & ex SQ ad SZ; quum æquiangula ſint, tam triangula OMT, PSX, quam triangula RMV, QSZ. Sed duæ iſtæ rationes componunt pariter rationem, quam habet reſtângulum PSQ ad reſtângulum XSZ. Quare erit ex æquali, ut reſtângulum OMR ad reſtângulum TMV, ita reſtângulum PSQ ad reſtângulum XSZ: & propterea, ſicuti reſtângulum OMR eſt æquale reſtângulo PSQ, ita quoque reſtângulum TMV æquale erit reſtângulo XSZ.

FIG. 26.

Tertio, quod etſi reſtæ MV, SZ non ſint in directum cum reſtis MT, SX, modo tamen parallelæ ſint inter ſe, tam iſtæ, quam illæ, ſemper reſtângulum TMV ſit æquale reſtângulo XSZ. Quum enim adhuc æquiangula ſint, tam triangula OMT, PSX, quam triangula RMV, QSZ; ſemper quidem erit, ut reſtângulum OMR ad reſtângulum  
 TMV,



TMV, ita rectangulum PSQ ad rectangulum XSZ. Unde, sicuti rectangulum OMR ostensum est æquale rectangulo PSQ, ita quoque rectangulum TMV æquale erit rectangulo XSZ.

Et quarto demum, quod, si rectæ MT, **FIG. 26.** SX, ad unam asymptotum ductæ, sint parallelæ alteri asymptoto, rectangulum CTM sit æquale rectangulo CXS. Nam, completis parallelogrammis CM, CS, erit rectangulum TMV æquale rectangulo XSZ. Sed, ob æquales MV, CT, rectangulum TMV est æquale rectangulo CTM. Pariterque, ob æquales SZ, CX, rectangulum XSZ est æquale rectangulo CXS. Quare erit etiam rectangulum CTM æquale rectangulo CXS.

VI. Asymptotis hyperbolæ competit etiam hæc alia proprietas, quod *portiones cuiusvis rectæ, hyperbola, & asymptotis interceptæ, inter se sint æquales.*

VI.  
Alia proprietas asymptotorum hyperbolæ demonstratur.

Maneant enim omnia, ut supra, & ducatur utcumque recta OR, quæ tum curvam, cum asymptotos secet. Dico portiones duas MO, SR, hyperbola, & asymptotis interceptas, æquales esse inter se.

**FIG. 27.**

Jam enim, ex ostensis, rectangulum OMR est æquale rectangulo OSR. Sed, secta OR bifariam in puncto N, æqualia sunt quoque quadrata, quæ fiunt ex ipsis NO, NR. Quare erit, ut NO quadratum ad rectangulum OMR, ita NR quadratum ad rectangulum OSR; & convertendo erit etiam, ut NO quadratum ad MN quadratum, ita NR quadratum ad SN quadratum.

Hinc,

60 SECTIONUM CONICARUM

Hinc, quum sit, ut NO ad MN, ita NR ad SN; erit rursus convertendo, ut NO ad MO, ita NR ad SR. Sed duæ NO, NR inter se sunt æquales; quum ex constructione tota OR bisecta sit in puncto N. Quare etiam æquales erunt duæ MO, SR.

VII.  
Præcedentis  
proprietas  
consecuta-  
rium, defi-  
niens tan-  
gentis relate  
ad asympto-  
tor positio-  
nem.

FIG. 27.

VII. Ex hac autem proprietate pronum alioveo fluit, quod si recta, ad asymptotum terminata, bisariam secata sit in puncto, in quo hyperbolæ occurrit, ea sit tangens ipsius hyperbolæ.

Recta etenim PQ, terminata ad utramque asymptotum, secetur bisariam in puncto T, in quo occurrit hyperbolæ. Dico, eandem rectam PQ contingere hyperbolam in solo puncto T.

Si enim fieri potest, eadem recta PQ occurrat etiam hyperbolæ in puncto V. Itaque, per ostensam proprietatem, duæ PT, QV æquales erunt inter se. Sed ex hypothese PT est æqualis ipsi QT. Quare duæ QV, QT inter se erunt æquales. Quod fieri non potest.

VIII.  
Quod con-  
versum præ-  
cedentis  
consecutari  
sit pariter  
verum.

FIG. 27.

VIII. Eiusdem proprietatis ope, licebit etiam, conversum huius ostendere. Nimirum, quod si recta PQ, hyperbolam contingens in T, ad utramque asymptotum terminetur; portiones ejus PT, QT inter se sint æquales.

Ducatur enim recta alia OR, ipsi PQ parallela, quæ secans hyperbolam in punctis M, & S, cum utraque asymptoto similiter conveniat. Jamque, si per punctum contactus T diameter ducatur, erit ejus ordinata recta MS; adeoque eadem MS a diametro illa bisariam secabitur in N.

Quum

Quum igitur æquales sint inter se, tam duæ MO, SR, quam duæ MN, SN; erit tota NO toti NR pariter æqualis. Sed NO est ad NR, ut PT ad QT. Quare duæ PT, QT etiam æquales erunt: & propterea tangens PQ bifariam secta erit in puncto contactus T.

IX. Atque hinc modo, *determinatis hyperbolæ asymptotis, nullo negotio ducetur tangens ad aliquod ejus punctum*. Maneant enim omnia, ut supra. Et oporteat, tangentem ducere ad punctum hyperbolæ T.

IX.  
Quomodo,  
determina-  
tis hyperbo-  
læ asympto-  
tis, duci pos-  
sit tangens  
ad punctum  
datum.

Ducatur ex puncto T recta TX, parallela asymptoto CH, quæ conveniat cum asymptoto altera CE in puncto X. Capiatur postea super eadem asymptoto CE portio PX æqualis ipsi CX. Et recta PQ, ducta per punctum T, erit tangens quæsitæ.

FIG. 27.

Quum enim ex constructione parallelæ sint rectæ TX, CQ; erit, ut PX ad CX, ita PT ad QT. Sed PX posita est æqualis ipsi CX. Quare etiam PT ipsi QT æqualis erit: & propterea per ea, quæ mox ostensa sunt, recta PT tangens erit hyperbolæ.

X. Ex ostensa tangentis proprietate illud etiam consequitur, quod *si duæ hyperbolæ tangentes, ad utramque asymptotum terminentur, eæ in eadem ratione sectæ sint in puncto, in quo sibi mutuo occurrunt*.

X.  
Quod duæ  
hyperbolæ  
tangentes,  
ad utram-  
que asym-  
ptotum ter-  
minata, se-  
cantur in  
eadem ra-  
tione.

Manentibus namque omnibus, ut supra, sint PQ, EH duæ hyperbolæ tangentes, ad utramque asymptotum terminatæ. Conveniant autem tangentes istæ inter se in puncto V. Dico, fore, ut PV ad QV, ita HV ad EV.

FIG. 28.

Ducantur enim ex punctis contactus T,  
& A

62 SECTIONUM CONICARUM  
 & A rectæ TX, AZ asymptoto CH paralle-  
 læ, quæ conveniant cum asymptoto altera CE  
 in punctis X, & Z. Et quoniam, ex superius  
 ostensis, rectangulum CXT est æquale rectan-  
 gulo CZA; erit ut CX ad CZ, ita AZ ad TX.

Quia autem, ob tangentes PQ, EH bise-  
 ctas in punctis contactus T, & A, rectæ CP,  
 CE sunt duplæ ipsarum CX, CZ; erit, ut CX  
 ad CZ, ita CP ad CE. Et similiter, quia, ob  
 easdem tangentes, rectæ CH, CQ sunt duplæ  
 ipsarum AZ, TX; erit, ut AZ ad TX, ita  
 CH ad CQ. Unde erit ex æquali, ut CP ad  
 CE, ita CH ad CQ.

Hinc triangula duo PCQ, ECH æqualia  
 erunt inter se: proindeque, ablato communi  
 trapetio CEVQ, erit quoque triangulum  
 PEV æquale triangulo QHV. Quumque duo  
 ista triangula habeant unum angulum uni an-  
 gulo æqualem; habebunt quoque latera cir-  
 cum æquales istos angulos reciproce propor-  
 tionalia: & propterea erit, ut PV ad QV, ita  
 HV ad EV.

XI. Exinde vero consequitur ulterius,  
 tangentem hyperbolæ, ad utramque asymp-  
 tum terminatam, æqualem esse conjugatæ illius  
 diametri, quæ transit per punctum contactus.

Jam enim ostensum est, PV esse ad QV,  
 ut est HV ad EV. Quare, addendo antece-  
 dentes consequentibus, erit, ut PV ad PQ, ita  
 HV ad EH; &, capiendo consequentium dimi-  
 dia, erit quoque, ut PV ad PT, ita HV ad HA.

XI.  
 Tangens hy-  
 perbola, ad  
 utramque  
 asymptotum  
 terminata,  
 est æqualis  
 conjugatæ  
 diametri,  
 ad punctum  
 contactus  
 pertinentis.  
 FIG. 28.

Quoniam autem, dividendo, TV est ad  
 PT, ut AV ad HV; capiendo rursus conse-  
 quentium dupla, erit, ut TV ad PQ, ita AV  
 ad

ad EH ; & permutando erit etiam , ut TV ad AV , ita PQ ad EH.

Jam per ea , quæ superius ostensa sunt, TV est ad AV , ut est conjugata diametri, quæ transit per punctum T , ad conjugatam diametri , quæ transit per punctum A . Quare ex æquali in hac eadem ratione erit pariter tangens PQ ad tangentem EH .

Atque hoc quidem generaliter verum est , ubicumque capiantur puncta contactus T , & A . Quare verum etiam erit, quum punctum A est vertex axis hyperbolæ. Sed in isto casu tangens EH æqualis est axi conjugato . Et igitur etiam tangens altera PQ æqualis erit conjugatæ diametri , quæ transit per punctum contactus T .

XII. Ex quibus modo pronò alveo fluit, *asymptotos esse diagonales, non modo ejus parallelogrammi, quod describitur circa axes conjugatos hyperbolæ, verum etiam cujuslibet alterius parallelogrammi, circa duas quascumque diametros conjugatas descripti.*

Quod quum ita sit , liquet etiam asymptotos hyperbolæ determinari posse adhibitis, non solum axibus , verum etiam duabus quibusvis aliis diametris conjugatis ; quum diagonales parallelogrammi , descripti circa diametros , sint etiam diagonales parallelogrammi, quod describitur circa axes.

Unde sequitur quoque , quod si per aliquod hyperbolæ punctum recta ducatur , alicui diametro parallela , quæ cum utraque asymptoto conveniat ; rectangulum , quod sub ejus segmentis continetur , sit æquale qua-

XII.  
*Quod asymptoti sint diagonales omnium parallelogrammorum, quæ circa conjugatas diametros describuntur.*

64 SECTIONUM CONICARUM  
 quadrato, quod fit ex dimidio diametri præ-  
 dictæ.

XIII.  
 Cujusmodi  
 fit angulus,  
 quem hyper-  
 bolæ asym-  
 ptoti occur-  
 su mutuo in  
 centro con-  
 stituunt.

FIG. 24.

XIII. Illud quoque nolim hic silentio præterire, quod *angulus, sub asymptotis comprehensus, sit rectus, obtusus, vel acutus, prout axis ipsius hyperbolæ est æqualis, minor, vel major suo conjugato.*

Sint enim AB, KL duo axes hyperbolæ, sintque etiam EG, FH binæ ejus asymptoti. Dico, angulum ECH, contentum sub asymptotis, esse rectum, obtusum, vel acutum, prout axis AB est æqualis, minor, vel major conjugato suo KL.

Ponamus primo, axes AB, KL æquales esse inter se. Et quoniam recta EH, quæ hyperbolam contingit in A, est æqualis ipsi KL; erunt AB, EH pariter æquales; & consequenter, tam AE, quam AH ipsi CA æqualis erit. Unde angulus ECH æqualis erit duobus angulis CEH, CHE; atque adeo rectus erit.

Ponamus secundo, axem AB minorem esse conjugato suo KL. Et quoniam tangens EH est æqualis ipsi KL; erit AB minor quoque, quam EH; & consequenter CA minor itidem erit unaquaque ipsarum AE, AH. Unde angulus ECH major erit duobus angulis CEH, CHE; & propterea erit obtusus.

Ponamus denique, axem AB majorem esse suo conjugato KL. Et rursus, quia tangens EH est æqualis ipsi KL; erit AB major quoque, quam EH; & consequenter CA major itidem erit unaquaque ipsarum AE, AH. Unde angulus ECH minor erit duobus angulis CEH, CHE; atque adeo erit acutus.

XIV. Cæ-

XIV. Cæterum, quod asymptoti sint rectæ, quæ hyperbolam contingunt in punctis extremis, sive infinite a centro distantibus, facile quidem erit ostendere.

XIV.  
Quod asymptoti contingant hyperbolam in punctis extremis, seu infinite a centro distantibus.

FIG. 29

Contingat enim hyperbolam in puncto quovis E recta ET, quæ conveniat cum axe AB in puncto T. Sitque etiam AX recta, quæ eandem hyperbolam contingit in A. Ostendendum est, tangentem ET asymptotum fieri, ubi punctum contactus E abit in infinitum.

Ut tangens ET asymptotus fiat, duo quidem requiruntur. Primum est, ut punctum T accedat ad centrum ipsius hyperbolæ C. Alterum, ut AX æqualis fiat dimidio axis conjugati CK. Unde eo res redit, ut ostendamus, duo ista obtineri, quotiescumque abit in infinitum punctum contactus E.

Ducatur itaque ad axem AB ordinata EG. Et, propter tangentem ET, erit, ut CT ad CA, ita CA ad CG. Sed, abeunte in infinitum puncto E, CA fit infinite minor respectu ipsius CG. Quare etiam CT infinite minor erit relate ad CA: & propterea punctum T ad centrum accedet,

Deinde, quum punctum E abit in infinitum, rectangulum AGB non differt sensibilibiter a quadrato, quod fit ex CG, sive TG; quum differentia sit quadratum ex CA, sive TA, quod evanescit relate ad quadratum ex CG, sive TG. Unde erit, ut EG quadratum ad rectangulum AGB, ita idem EG quadratum ad TG quadratum.

Jam, propter hyperbolam, EG quadratum est ad rectangulum AGB, ut CK quadratum

Tom. II.

E . . . . . ad

ad CA quadratum. Et, ob triangula æquiangula TGE, TAX, EG quadratum est ad TG quadratum, ut AX quadratum ad TA, sive CA quadratum. Quare erit ex æquali, ut CK quadratum ad CA quadratum, ita AX quadratum ad idem CA quadratum: & propterea duæ AX, CK æquales erunt inter se.

XV.  
Quod asymptoti  
sunt ultimæ  
hyperbolæ  
diametri,  
atque adeo  
correspondent  
ellipsi  
diametris  
æqualibus.

FIG. 30

XV. Nolim autem hoc loco reticere, quod eadem asymptoti considerari quoque possint veluti ultimæ hyperbolæ diametri: quæ ratione iis ellipsis diametris correspondent, quæ inter se sunt æquales.

Sint enim AB, KL axes ellipsis, circa quos describatur parallelogrammum EFGH. Ducantur in parallelogrammo isto diagonales EG, FH. Et quoniam huiusmodi diagonales dividunt bifariam latera opposita alterius parallelogrammi AKBL; per superius ostensa, eæ erunt diametri ellipsis æquales.

Verum quidem est, quod diametris hisce non competit illa eadem proprietas, quæ in hyperbolæ asymptotis obtinet. Ibi enim ostensum est, quod si uni ex axibus, veluti KL, parallela agatur OR, quæ tum hyperbolam, cum asymptotos secet, rectangulum OMR sit æquale quadrato ex CK. Quod tamen in ellipsi minime locum habet.

Interim, si consideremus, quod rectangulum OMR sit æquale differentiarum quadratorum MN, NO; simile quidpiam etiam in ellipsi comperiemus. Nam ducta hic quoque recta OR, ipsi KL parallela, quæ secet tam ellipsim, quam diametros æquales; erit summa quadratorum MN, NO æqualis quadrato, quod fit ex CK. In



In eadem etenim ratione, quam habet CK, five AE quadratum ad CA quadratum est, tam MN quadratum ad rectangulum ANB, quam NO quadratum ad CN quadratum. Quare in eadem illa ratione erit quoque summa quadratorum MN, NO ad CA quadratum: & propterea duo quadrata MN, NO æqualia erunt quadrato, quod fit ex CK.

C A P. VI.

*Proprietates, quæ parabolæ tangentibus, & secantibus competunt, ostenduntur.*

I. **C** Omplectemur eodem capite proprietates, quæ competunt tangentibus, & secantibus parabolæ; quia numero pauciores sunt, nec adeo longius nos ducent. Ac primo quidem circa tangentes parabolæ jam illud superius ostensum est, quod si ex vertice alicujus diametri recta ducatur ordinatis ejus parallela, ea tangat parabolam in solo illo vertice. Nunc autem subjungemus, quod in locum, tangente, & parabola contentum, nulla alia cadat recta linea.

I.  
Tangentis  
parabola  
proprietates  
duæ princi-  
pales affe-  
runtur.

Sit enim parabola AM, cujus AB fit diameter aliqua, AD parameter ejus, & DAH recta, ordinatis ejusdem diametri parallela. Dico, quod sicuti recta DAH contingit parabolam in solo vertice A, ita in locum, contentum tangente, & eadem parabola, nulla alia recta

FIG. 31.

Si fieri potest, ducatur recta alia AI, in qua sumpto puncto quovis P, agatur per illud recta PN, ipsi AH parallela, conveniens cum parabola in puncto M. Et quoniam PN quadratum majus est MN quadrato; habebit PN quadratum ad AN quadratum majorem rationem, quam MN quadratum ad idem AN quadratum. Sed, propter parabolam, MN quadratum est æquale rectangulo DAN. Et rectangulum DAN est ad AN quadratum, ut AD ad AN. Quare PN quadratum ad AN quadratum habebit quoque majorem rationem, quam AD ad AN.

Fiat ergo, ut PN quadratum ad AN quadratum, ita AD ad AK, quæ minor erit, quam AN. Tum per punctum K ducatur recta KI, eidem AH parallela, conveniens cum parabola in puncto L. Et quoniam PN quadratum est ad AN quadratum, ut IK quadratum ad AK quadratum; erit ex æquali, ut AD ad AK, ita IK quadratum ad AK quadratum. Sed AD est ad AK, ut rectangulum DAK ad AK quadratum; sive etiam, ut LK quadratum ad AK quadratum. Quare erit rursus ex æquali, ut LK quadratum ad AK quadratum, ita IK quadratum ad idem AK quadratum: & propterea erit LK quadratum æquale quadrato ex IK. Quod fieri non potest.

II.  
 Corollaria,  
 quæ ex  
 duabus  
 precedentibus  
 proprietatibus  
 consequuntur.

II. Quælibet ergo recta linea, quæ ex puncto contactus ducitur infra tangentem, necesse est, ut primo secet parabolam, tum cadat in locum, tangente, & parabola contentum. Hinc autem duo consequuntur, quæ  
 adi-

aditum nobis aperient ad ostendendas proprietates omnes, quæ parabolæ tangentibus competunt.

Primum est, quod ad unum, idemque punctum parabolæ non nisi unica tangens duci possit. Nam, si duci possent tangentes duæ; jam una caderet in locum, parabola, & tangente altera comprehensum. Quod quidem ostensum est fieri non posse.

Alterum est, quod si recta linea contingat parabolam in puncto aliquo, ea debeat esse parallela ordinatis illius diametri, quæ pertinet ad illud punctum. Nam aliter, ducta ex eo puncto recta alia, ordinatis iis parallela, foret ista quoque tangens parabolæ; atque adeo ad unum, idemque punctum parabolæ duæ tangentes duci possent. Quod fieri nequit.

III. His jactis principiis, facile modo erit eam primum tangentis proprietatem ostendere, quæ ei competit, ubi alicui diametro occurrit.

III.  
Proprietatis  
tangentis  
parabolæ,  
alicui dia-  
metro oc-  
currentis.

Tangens igitur ET, ducta ad punctum E, verticem diametri EF, conveniat cum diametro altera AB in puncto T. Demittatur ad diametrum AB ordinata EG. Et dico, portiones duas AT, AG æquales esse inter se.

FIG. 32

Ducatur enim ad diametrum alteram EF ordinata AO. Et quoniam recta ET contingit parabolam in puncto E, vertice diametri EF; erit ET ipsi AO parallela. Sed diametri AB, EF sunt itidem æquidistantes. Quare TO parallelogrammum erit.

Quum ergo TO parallelogrammum sit; latera ejus opposita AT, EO æqualia erunt inter se. Sed, ex superius ostensis, EO est æqualis ipsi

E 3

AG

AG. Quare duæ AT, AG inter se æquales erunt; adeoque tota TG dupla erit ipsius AG.

IV. Sed facile quoque erit *conversam huius proprietatis ostendere*. Nimirum, quod recta ET sit tangens parabolæ, si demissa ad diametrum AB ordinata EG, æquales fuerint portiones duæ AT, AG.

Precedentis proprietatis *conversa demonstratur.*

FIG. 32

Ducatur enim ad diametrum EF ordinata AO. Et, ex superius ostensis, erit AG æqualis EO. Sed ipsi AG æqualis ponitur AT. Quare etiam AT eidem EO æqualis erit.

Quum igitur duæ AT, EO sint æquales, & parallelæ; erunt etiam æquales, & parallelæ duæ ET, AO, quæ illas ad easdem partes jungunt. Unde, quum AO sit ordinata diametri EF, erit ET tangens parabolæ.

V. Nunc eas quidem proprietates ostendemus, quæ tangentibus parabolæ, sibi mutuo occurrentibus, competunt. Hunc in finem ad duo quælibet parabolæ puncta A, & E ducantur tangentes duæ AX, EX, quæ sibi mutuo occurrant in X; & extendantur eadem, usque donec conveniant cum diametris AB, EF in punctis L, & T.

Proprietates tangentium parabolæ sibi mutuo occurrentium ostenduntur.

FIG. 32

Primo igitur utraque tangens bifariam secabitur in puncto X. Duæ siquidem ad diametrum AB ordinata EG, erunt duæ AT, AG æquales inter se. Sed, propter parallelogrammum GL, æquales quoque sunt duæ AG, EL. Quare erit AT ipsi EL pariter æqualis; & consequenter æquales erunt, tam duæ AX, LX, quam duæ TX, EX.

Secundo tangentes duæ AX, EX eandem rationem habebunt cum ordinatis EG, AO,

**AO.** Sunt enim **AX**, **EX** semiffes ipsarum **AL**, **ET**. Quare erit, ut **AX** ad **EX**, ita **AL** ad **ET**. Sed **AL** est ad **ET**, ut **EG** ad **AO**. Igitur erit ex æquali, ut **AX** ad **EX**, ita **EG** ad **AO**.

Denique tangentes duæ **AX**, **EX** erunt in subduplicata ratione parametrorum, quæ referuntur ad diametros **AB**, **EF**. Jam enim, per superius ostensa, in hac ratione sunt ordinatæ **EG**, **AO**. Sed **AX** est ad **EX**, ut **EG** ad **AO**. Quare in eadem subduplicata ratione earum parametrorum erunt etiam tangentes duæ **AX**, **EX**.

**VI.** *Speciatim relate ad axem competit tangenti parabolæ sequens proprietas.* Nimirum, quod si **AB** sit axis parabolæ, **AD** parameter ejus, & **ET** aliqua tangens; ducanturque ex puncto contactus **E** rectæ duæ **EG**, **EH**, una perpendicularis ad axem, & altera perpendicularis ad tangentem; quod, inquam, portio axis **GH** sit æqualis dimidio parametri **AD**.

**VI.**  
*Tangentis parabolæ relate ad axem proprietas quædam specialis demonstratur.*

**FIG. 33**

Si enim tangens **ET** conveniat cum axe **AB** in puncto **T**; erit, ex superius ostensis, **AG** æqualis ipsi **AT**, atque adeo semiffis totius **TG**. Jam vero **EG** quadratum est æquale; tam rectangulo **DAG**, propter parabolam; quam rectangulo **TGH**, ob triangulum **TEH**, rectangulum in **E**. Quare, quum duo rectangula **DAG**, **TGH** inter se sint æqualia; erit, ut **AG** ad **TG**, ita **GH** ad **AD**; & consequenter **GH** semiffis erit ipsius **AD**.

**VII.** *Perlustratis proprietatibus, quæ parabolæ tangentibus competunt; reliquum*

**VII.**  
*Theorema fundamentum.*

*tale, pro  
ostendenda  
proprietate  
secantium  
parabola.*

FIG. 34.

modo est, ut quid parabolæ secantibus acci-  
dat, ostendamus. Hunc in finem *præmitten-*  
*dum est sequens theorema*, quod si AB sit ali-  
qua parabolæ diameter, cujus AD sit parame-  
ter, & MO una ex ejus ordinatis, utrinque  
ad parabolam terminata, ducaturque recta  
EF, diametro parallela, quæ conveniat cum  
MO in puncto H; quod, inquam, rectangulum  
MHO sit æquale rectangulo, quod fit ex  
AD in EH.

Neque vero difficile erit theorema istud  
ostendere. Nam, demissa ad diametrum AB  
ordinata EG; erit, tam MN quadratum æqua-  
le rectangulo DAN, quam EG, sive NH qua-  
dratum æquale rectangulo DAG. Unde erit  
quoque differentia quadratorum MN, NH æ-  
qualis differentiæ rectangulorum DAN,  
DAG. Sed differentia quadratorum MN, NH  
est æqualis rectangulo MHO; & differentia  
rectangulorum DAN, DAG est æqualis re-  
ctangulo, quod fit ex AD in GN, sive EH.  
Quare erit rectangulum MHO æquale re-  
ctangulo, quod sub ipsis AD, EH continetur.

VIII.  
*Ostenditur  
proprietas,  
quæ para-  
bola secan-  
tibus com-  
petit.*

FIG. 34

VIII. Hinc autem sequitur, quod *si in-*  
*tra parabolam binæ ducantur rectæ lineæ, quæ*  
*se se mutuo secant; rectangula, quæ fiunt ex*  
*segmentis ipsarum, sint, ut parametri earum*  
*diametrorum, ad quas rectæ illæ velut ordi-*  
*natæ referuntur.*

Sint enim AB, RS duæ quævis parabo-  
læ diametri; sitque MO una ex ordinatis dia-  
metri AB, & PQ una ex ordinatis diametri  
RS. Conveniant autem inter se duæ istæ ordi-  
natæ in puncto H; & sit AD parameter diame-  
tri

tri AB, & RK parameter diametri RS. Dico, re-  
ctangulum MHO esse ad rectxangulum PHQ,  
ut est parameter AD ad parametrum RK.

Ducatur namque per punctum H dia-  
meter tertia EF, quæ utrique ipsarum AB,  
RS parallela erit. Et quoniam diameter ista  
EF secat MO, ordinatam diametri AB, in pun-  
cto H; erit, ex ostensis, rectxangulum MHO  
æquale rectxangulo ex AD in EH. Quumque  
eadem EF secet pariter PQ, ordinatam diame-  
tri RS, in puncto H; erit quoque rectxangu-  
lum PHQ æquale rectxangulo ex RK in EH.

Hinc erit, ut rectxangulum MHO ad re-  
ctxangulum PHQ, ita rectxangulum ex AD in  
EH ad rectxangulum ex RK in EH. Sed, ob  
communem altitudinem EH, rectxangulum ex  
AD in EH est ad rectxangulum ex RK in EH,  
veluti est AD ad RK. Quare erit ex æquali,  
ut AD ad RK, ita rectxangulum MHO ad  
rectxangulum PHQ.

IX. Fieri vero potest, ut *una ex secanti-*  
*bus tangens evadat*: nimirum, quum puncta  
duo sectionis coeunt in unum. In isto casu  
rectxangulum sub ejus segmentis vertetur in  
quadratum ipsius tangentis. Unde inter qua-  
dratum istud, & rectxangulum, sub alterius  
secantis portionibus contentum, eadem adhuc  
ratio obtinebit.

IX.  
Quod ean-  
dem pro-  
prietatem ha-  
beat, etiam  
si, vel una,  
vel utraque  
secans ver-  
tatur in  
tangentem

Quin etiam *verti potest in tangentem*  
*utraque secans*. Et quum id contingit, ambo  
quidem rectxangula, sub secantium portioni-  
bus contenta, abibunt in quadrata ipsarum  
tangentium. Ex quo fit, ut inter quadrata,  
quæ ex tangentibus fiunt, eadem pariter ra-  
tio

74 SECTIONUM CONICARUM  
tio debeat locum habere.

FIG. 32. Et istud quidem jam paulo ante speciali-  
ter a nobis ostensum est. Vidimus enim, quod  
si fuerint tangentes duæ AX, EX, sibi mutuo  
occurrentes in X; quadrata ipsarum eandem  
habeant rationem inter se, quam parametri  
diametrorum AB, EF. Ad illud vero quod  
attinet, nec etiam difficile erit, veritatem  
ejus speciatim ostendere.

X.  
Demonstra-  
tio, quando  
duarum re-  
ctarum una  
est tangens,  
altera se-  
cans.

FIG. 35

X. Sit enim EH tangens, & HO secans;  
sitque etiam EF diameter, quæ pertinet ad  
punctum contactus E, & RS diameter, ad  
quam recta MO velut ordinata refertur.  
Ostendendam est, EH quadratum esse ad re-  
ctangulum MHO, ut est parameter diametri  
EF ad parametrum diametri RS.

Ducatur ex puncto H recta HL, diame-  
tris parallela, quæ parabolæ occurrat in L.  
Tum ex puncto L demittatur ad diametrum  
EF ordinata LK. Et quoniam HL secat MO,  
ordinatam diametri AB, in puncto H; erit, ex  
ostensis, rectangulum MHO æquale rectan-  
gulo ex HL, sive EK in parametrum diame-  
tri RS.

Jam vero, propter parabolam, LK, sive  
EH quadratum est æquale rectangulo, quod  
fit ex eadem EK in parametrum diametri EF.  
Quare erit, ut EH quadratum ad rectangu-  
lum MHO, ita parameter diametri EF ad pa-  
rametrum diametri RS.

XI.  
Demonstra-  
tio, quando  
utraque re-  
ctarum est  
tangens.

XI. Atque hinc modo alia ratione  
ostendi potest, quod si duæ parabolæ tangen-  
tes sibi mutuo occurrant, eæ sint inter se in  
subduplicata ratione parametrorum, pertinen-  
tium



*tium ad diametros, quæ transeunt per puncta contactus.*

Sint enim AH, EH duæ parabolæ tan- FIG. 35.  
gentes, quæ sibi invicem occurrant in puncto  
H. Ducantur ex punctis contactus A, & E  
diametri AB, EF. Dico, esse AH ad EH in  
subduplicata ratione parametrorum, quæ re-  
feruntur ad diametros AB, EF.

Ducatur namque secans quævis MO,  
quæ transeat per punctum H, sitque RS dia-  
meter, ad quam ipsa MO velut ordinata re-  
fertur. Et quoniam AH est tangens, & HO  
est secans; erit AH quadratum ad rectangu-  
lum MHO, ut est parameter diametri AB ad  
parametrum diametri RS.

Similiter, quia EH est tangens, & HO  
est secans; erit rectangulum MHO ad EH  
quadratum, ut est parameter diametri RS ad  
parametrum diametri EF. Quare ex æquo or-  
dinando erit, ut AH quadratum ad EH qua-  
dratum, ita parameter diametri AB ad para-  
metrum diametri EF: & propterea tangentes  
duæ AH, EH erunt in subduplicata ratione  
earum parametrorum.

XII. Ex iis autem, quæ hæcenus  
ostensa sunt, prono alveo fluunt sequentia  
duo theoremata.

Primum theorema est, quod si duabus pa-  
rabolæ tangentibus parallelæ fuerint duæ se-  
cantes, & conveniant inter se, tum tangentes,  
cum secantes; rectangula, sub secantium seg-  
mentis contenta, sint proportionalia quadratis,  
quæ ex tangentibus fiunt.

XII.  
Theorema-  
ta duo, quæ  
ex hæcenus  
ostensa de-  
ducuntur.

Nam

Nam diametri, ad quas duæ secantes velut ordinatæ referuntur, sunt illæ eædem, quæ pertinent ad puncta contactus. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se quadrata tangentium, erunt quoque rectangula, quæ sub secantium segmentis continentur.

Alterum theorema est, quod si duabus secantibus parabola parallela fuerint binæ aliæ secantes, & conveniant inter se, tam illæ, quam istæ; rectangula sub segmentis illarum sint proportionalia rectangulis, quæ sub segmentis istarum continentur.

Nam diametri, ad quas duæ posteriores secantes velut ordinatæ referuntur, sunt illæ eædem, quæ agnoscunt velut suas ordinatas secantes priores. Quare in eadem illa ratione, quam habent inter se rectangula sub segmentis primarum secantium, erunt quoque rectangula sub segmentis aliarum.

XIII.  
Proprietates tangentium, & secantium parabola, ex iis, quæ obtinentur in ellipsi, & hyperbola deducuntur.

FIG. 2.

II.

XIII. Cæterum ostendendum modo esset, qua ratione proprietates, quæ pertinent ad tangentes, & secantes, tum hyperbolæ, cum ellipsi, vertantur in eas, quæ parabola tangentibus, & secantibus competant. Sed satis erit, transmutationem istam in iis tantum ostendere, quæ reliquarum omnium sunt basis, & fundamentum.

Nimirum primo, tam in ellipsi, quam in hyperbola ostensum est, quod si ET sit tangens, conveniens cum diametro AB in puncto T, & EG sit diametri ejus ordinata, CG sit ad CA, ut est CA ad CT. Jam, capiendo differentias antecedentium, & consequentium,

tium, erit quoque, ut  $AG$  ad  $CA$ , ita  $AT$  ad  $CT$ : & propterea, abeunte in infinitum centro  $C$ , quemadmodum æquales fiunt duæ  $CA$ ,  $CT$ , ita quoque æquales erunt duæ  $AG$ ,  $AT$ .

Deinde, si duæ rectæ sese mutuo secent, sive in ellipsi, sive in hyperbola; erunt re-ctangula sub segmentis ipsarum, ut quadrata ex conjugatis earum diametrorum, ad quas rectæ illæ velut ordinatæ referuntur; & consequenter in ratione composita ex iisdem diametris, & parametris earundem.

Jam, abeunte in infinitum centro, sive ellipsis, sive hyperbolæ, ratio earum diametrorum evadit æqualitatis, quum ipsæ diametri fiant infinitæ longitudinis, ac differentes inter se mutuo per differentiam finitam. Quare re-ctangula, contenta sub segmentis earum re-ctarum, erunt in sola ratione parametrorum, pertinentium ad diametros, ad quas eædem illæ rectæ velut ordinatæ referuntur.

*De Focis , seu Umbilicis Sectionum Conicarum.*

**I**Ntra conicas sectiones dantur puncta nonnulla , ad quæ puncta ipsarum sectionum quum referuntur , plures alias , easque non contemnendas proprietates sortiuntur . Puncta ista vocavit Apollonius puncta comparisonum . Sed , ob speciale ipsorum accidens , quod conicas sectiones usibus opticis intervenientes nobis ostendit , eadem puncta foci , sive umbilici a Recentioribus dicuntur . Proprietates ergo , quæ conicis sectionibus competunt , relate ad focos , seu umbilicos , hoc libro ostendendæ nobis erunt .

C A P. I.

*Focorum ellipsis proprietates generales ostenduntur.*

I.  
Definitio  
focorum ellipsis , &  
quod æqualiter distent , tum a centro , cum a verticibus .

FIG. 36

**I.** **E**llipsis foci , sive umbilici dicuntur duo illa puncta axis majoris , quibus ordinatæ correspondentes semissem parametri ejusdem axis adæquant .

Ita , si AB sit axis major ellipsis , & AD parameter ejus , capianturque in axe illo AB duo puncta G , & H adeo quidem , ut ordinatæ

tæ

tæ EG, FH, punctis illis correspondentes, adæquent semissem ipsius AD; dicentur puncta G, & H foci, sive umbilici ipsius ellipsis.

Unde liquet focos G, & H æqualiter distare, tam a centro ellipsis C, quam ab axis verticibus A, & B. Nam, quemadmodum æqualia sunt quadrata EG, FH; ita quoque æqualia erunt rectangula AGB, AHB, quæ iis quadratis proportione correspondent.

Hinc, subducendo æqualia ista rectangula AGB, AHB ex æqualibus quadratis CA, CB, remanebit quadratum ex CG æquale quadrato ex CH: & propterea æquales erunt inter se, tam duæ CG, CH, quam duæ AG, BH.

II. Ex ipsa autem focorum definitione liquet, *rectangulum sub axis portionibus, per focorum alterum abscissis, quadrantem figuræ ejusdem axis adæquare.* Maneant enim omnia, ut supra. Dico, tam rectangulum AGB, quam rectangulum AHB æquale esse quartæ parti figuræ axis AB, quæ constituitur per rectangulum DAB.

II.  
Focorum ell.  
ipsis pro-  
prietas pri-  
ma genera-  
lis.

FIG. 36.

Nam, propter ellipsem, EG quadratum est ad rectangulum AGB, ut AD ad AB; sive etiam, ut AD quadratum ad rectangulum DAB. Sed EG quadratum est quarta pars quadrati, quod fit ex AD; quum ex constructione EG semissem adæquet ipsius AD. Quare etiam rectangulum AGB quarta pars erit rectanguli DAB.

Eadem ratione, propter ellipsem, FH quadratum est ad rectangulum AHB, ut AD ad AB; sive etiam, ut AD quadratum ad rectangulum DAB. Sed FH quadratum est quar-

80 SECTIONUM CONICARUM  
 quarta pars quadrati, quod fit ex AD; quum  
 ex constructione FH semissem adæquet ipsius  
 AD. Quare etiam rectangulum AHB quarta  
 pars erit rectanguli DAB.

III.  
 Focorum el-  
 lipsis pro-  
 prietas se-  
 cunda gene-  
 ralis.  
 FIG. 37.

III. Ducantur nunc ad vertices A, & B,  
 tangentes AX, BZ, quæ conveniant cum tan-  
 gente quavis tertia XMZ in punctis X, & Z.  
 Et facile erit ostendere, quod si ex focorum  
 altero G ducantur rectæ GX, GZ, angulus  
 XGZ, sub ipsis comprehensus, perpetuo re-  
 ctus esse debeat, ubicunque fuerit punctum  
 contactus M.

Nam rectangulum ex AX in BZ, velut  
 æquale quadrato, quod fit ex dimidio axis  
 conjugati, adæquat quartam partem figuræ  
 axis AB. Sed ejusdem figuræ quadranti æ-  
 quale est quoque rectangulum AGB. Quare  
 erit rectangulum ex AX in BZ æquale re-  
 ctangulo AGB: & propterea erit, ut AX ad  
 AG, ita BG ad BZ.

Hinc duo triangula rectangula XAG,  
 GBZ æquiangulara erunt; adeoque erit angulus  
 AXG æqualis angulo BGZ. Et, appposito com-  
 muni AGX, erunt etiam duo anguli AXG,  
 AGX æquales duobus angulis BGZ, AGX,  
 Sed priores duo unum rectum adæquant.  
 Quare uni recto pariter æquales erunt poste-  
 riores duo; & consequenter angulus XGZ  
 etiam rectus erit.

IV.  
 Focorum el-  
 lipsis pro-  
 prietas ter-  
 tia genera-  
 lis.  
 FIG. 37.

IV. Eadem autem ratione ostendemus,  
 rectum esse angulum XHZ, quem continent  
 rectæ HX, HZ, ductæ ex foco altero H ad ea-  
 dem puncta X, & Z. Unde sequitur quoque,  
 quod si ex puncto K, in quo rectæ duæ GZ,  
 HX

$HX$  se mutuo secant, ducatur ad punctum contactus  $M$  recta  $KM$ , hæc perpendicularis sit ad tangentem  $XZ$ .

Si enim fieri potest, sit  $KO$  perpendicularis ad  $XZ$ . Et quoniam rectus est, tam angulus  $XGZ$ , quam angulus  $XHZ$ ; semicirculus, descriptus super  $XZ$ , velut diametro, transibit per focos  $G$ , &  $H$ . Unde erit angulus  $HGZ$  æqualis angulo  $HXZ$ . Sed angulus  $HGZ$  æqualis est angulo  $AXG$ . Quare duo anguli  $AXG$ ,  $HXZ$  æquales erunt inter se; & propterea, ob triangula æquiangula  $AGX$ ,  $OKX$ , erit, ut  $AX$  ad  $OX$ , ita  $GX$  ad  $KX$ .

Simili ratione ostendemus,  $BZ$  esse ad  $OZ$ , ut est  $HZ$  ad  $KZ$ . Unde, quia propter triangula æquiangula  $KGX$ ,  $KHZ$ ,  $GX$  est ad  $KX$ , ut  $HZ$  ad  $KZ$ ; erit ex æquali, ut  $AX$  ad  $OX$ , ita  $BZ$  ad  $OZ$ ; & permutando erit quoque, ut  $AX$  ad  $BZ$ , ita  $OX$  ad  $OZ$ .

Jam per ea, quæ superius ostensa sunt, in eadem ratione, qua est tangens  $AX$  ad tangentem  $MX$ , est etiam tangens  $BZ$  ad tangentem  $MZ$ . Quare erit ex æquali, ut  $AX$  ad  $MX$ , ita  $BZ$  ad  $MZ$ ; & permutando erit etiam, ut  $AX$  ad  $BZ$ , ita  $MX$  ad  $MZ$ .

Quum igitur in eadem ratione rectarum  $AX$ ,  $BZ$  sit, tam  $OX$  ad  $OZ$ , quam  $MX$  ad  $MZ$ ; erit rursus ex æquali, ut  $OX$  ad  $OZ$ , ita  $MX$  ad  $MZ$ . Unde componendo erit, ut  $XZ$  ad  $OZ$ , ita  $XZ$  ad  $MZ$ ; & propterea duæ  $OZ$ ,  $MZ$  æquales erunt inter se. Quod fieri non potest.

V. Atque hinc sequitur etiam, rectas  $MG$ ,  
*Tom. II.* F MH,

V.  
 Focorum

ellipsi pro-  
prietas  
quarta ge-  
neralis.

FIG. 37.

MH, quæ ex puncto contactus M ad focos inclinatur, æquales cum tangente XZ angulos constituere, hoc est angulum GMX æqualem esse angulo HMZ.

Quum enim rectus sit, tam angulus KGX, quam angulus KMX; semicirculus, descriptus super KX, velut diametro, transibit per puncta G, & M: proindeque erit angulus GMX æqualis angulo GKX.

Eadem ratione, quia rectus est uterque angulorum KHZ, KMZ; semicirculus, descriptus super KZ, velut diametro, transibit per puncta H, & M. Quare erit angulus HMZ æqualis angulo HKZ.

Quemadmodum igitur angulo GKX æqualis est angulus GMX, ita angulo HKZ æqualis est angulus HMZ. Sed duo anguli GKX, HKZ inter se sunt æquales. Quare etiam inter se æquales erunt duo anguli GMX, HMZ.

VI.  
Focorum el-  
lipfis pro-  
prietas  
quinta gene-  
ralis.

FIG. 37.

VI. Inde vero *deducitur præterea*, easdem rectas MG, MH continere rectangulum, quod quartam partem adæquat figuræ diametri, transeuntis per punctum contactus M.

Nam, ex superius ostensis, si ex centro ellipsis C ad puncta X, & Z intelligantur ductæ rectæ CX, CZ, eæ exhibebunt nobis duas ellipsis diametros conjugatas. Quare rectangulum XMZ æquale erit quadrato, quod fit ex dimidio conjugatæ illius diametri, quæ pertinet ad punctum M.

Jam quadratum istud adæquat quartam partem figuræ ejusdem diametri. Unde constabit, rectangulum GMH æquale esse quadrato.



dranti figuræ diametri, transeuntis per punctum  $M$ , si utique ostendi possit, rectangulum  $GMH$  æquale esse rectangulo  $XMZ$ . Id vero ostendemus in hunc modum.

Quoniam rectus est uterque angulorum  $KGX$ ,  $KMX$ ; erunt alii duo anguli  $GKM$ ,  $GXM$  duobus rectis æquales: proindeque, quum duobus rectis sint etiam æquales anguli duo  $GKM$ ,  $MKZ$ ; ablato communi  $GKM$ , remanebit angulus  $GXM$  æqualis angulo  $MKZ$ .

Jam, ob circulum, transeuntem per quatuor puncta  $M$ ,  $K$ ,  $H$ ,  $Z$ , angulus  $MKZ$  æqualis est angulo  $MHZ$ . Quare etiam angulus  $GXM$  æqualis erit angulo  $MHZ$ . Unde triangula duo  $GMX$ ,  $HMZ$  æquiangula erunt: & propterea, quum sit, ut  $MX$  ad  $MG$ , ita  $MH$  ad  $MZ$ ; erit rectangulum  $GMH$  æquale rectangulo  $XMZ$ .

VII. Exinde colligitur pariter, easdem rectas  $MG$ ,  $MH$  simul sumptas æquales esse axi  $AB$ . Ducantur enim uni earum, veluti  $MG$ , parallelæ  $CR$ ,  $HS$ . Tum jungantur rectæ  $AR$ ,  $HR$ ,  $BR$ .

VII.  
Focorum ellipsis proprietates sex-  
ta generalis.  
FIG. 38.

Et quoniam eidem angulo  $GMX$  æqualis est, tam angulus  $HMS$ , quam angulus  $HSM$ , erunt duo anguli  $HMS$ ,  $HSM$  æquales inter se: & propterea triangulum  $MHS$  isosceles erit. Sed basis ejus  $MS$  bisecta est per rectam  $HR$ ; quum sit, ut  $RM$  ad  $RS$ , ita  $CG$  ad  $CH$ . Quare erit  $HR$  perpendicularis ad ipsam  $MS$ .

Hinc, ob circulum, transeuntem per quatuor puncta  $A$ ,  $H$ ,  $R$ ,  $X$ , erit angulus

$ARX$  æqualis angulo  $AHX$ . Et similiter, ob circulum, transeuntem per puncta quatuor  $B, H, R, Z$ , erit angulus  $BRZ$  æqualis angulo  $BHZ$ . Unde angulus  $ARB$  æqualis erit angulo  $XHZ$ ; atque adeo rectus erit.

Id quum ita sit, semicirculus, descriptus super  $AB$ , velut diametro, transibit per punctum  $R$ : & propterea recta  $CR$  ipsi  $CA$ , vel  $CB$  æqualis erit. Sed, ob rectam  $GH$  bisectam in  $C$ , est  $MG$  dupla ipsius  $CI$ , &  $MH$  dupla ipsius  $MI$ , five  $IR$ . Itaque summa duarum  $MG, MH$  dupla erit totius  $CR$ ; atque adeo æqualis axi  $AB$ .

VIII. Hinc vero alia nobis suboritur ratio describendi ellipsim in plano, datis focus cum longitudine axis majoris. Sit enim  $AB$  axis major ellipsis, sintque puncta  $G, & H$  ejusdem foci, seu umbilici. Oportet, in subjecto plano ellipsim describere.

VIII.  
Alia ellipsim in plano describendi ratio, datis axe, & umbilicis.

FIG. 37.

Capiatur filum ejusdem longitudinis cum axe  $AB$ , & extrema ejus focus  $G, & H$  aligentur. Deinde ope alicujus stili circumducatur filum circa focos ea lege, ut portiones ejus maneat continuo tensæ. Dico, curvam, quæ per stilum in subjecto plano describitur, esse ellipsim quæsitam.

Jam enim ex ipsa curvæ descriptione liquet, ejus naturam hanc esse, ut summa rectorum, quæ ex aliquo ejus puncto ducuntur ad puncta  $G, & H$ , adæquet longitudinem fili. Sed ex constructione filum est ejusdem longitudinis cum axe majore  $AB$ . Quare eadem summa rectorum æqualis erit axi  $AB$ ; & propterea curva descripta erit ellipsis.

Per

Perpicuum est autem, quod si foci  $G$  &  $H$  accedant ad punctum  $C$ , quod bisecat axem  $AB$ , descripta curva sit circuli circumferentia. Unde sequitur, *circulum considerari posse, veluti ellipsim, cujus foci coeunt cum ipso centro.*

IX. Sit nunc recta  $MT$  aliqua tangens ellipsis, conveniens cum axe  $AB$  in puncto  $T$ . Erigatur super ea perpendicularis  $MO$ , eadem axi occurrens in  $O$ . Et circa perpendiculararem istam plura licebit ostendere.

IX.  
Proprietates, pertinentes ad perpendiculararem, quae ex puncto contactus ducitur ad tangentem.

FIG. 39.

Nimirum primo, quod ea bisecet angulum  $GMH$ . Nam rectae  $MG$ ,  $MH$  constituunt cum tangente angulos aequales. Sed aequales quoque sunt anguli, quos cum eadem tangente constituit perpendicularis  $MO$ . Quare erit angulus  $GMO$  aequalis angulo  $HMO$ .

Secundo, quod recta  $TH$  sit harmonice secta in punctis  $G$ , &  $O$ . Nam rectae  $MG$ ,  $MH$ , ob aequales angulos, quos constituunt cum tangente  $MT$ , sunt, ut perpendicula, quae ex punctis  $G$ , &  $H$  ad tangentem demittuntur, sive etiam, ut rectae  $TG$ ,  $TH$ . Sed, ob angulum  $GMH$  bisectum per rectam  $MO$ , eadem sunt quoque, ut portiones  $GO$ ,  $HO$ . Igitur erit ex aequali, ut  $TG$  ad  $TH$ , ita  $GO$  ad  $HO$ : & propterea rectangulum, quod fit ex tota  $TH$  in portionem intermediam  $GO$ , aequale erit rectangulo sub portionibus extremis  $TG$ ,  $HO$ .

Tertio, quod tres rectae  $CO$ ,  $CG$ ,  $CT$  sint continue proportionales. Quum enim rectangulum ex  $TH$  in  $GO$  sit aequale rectangulo ex  $TG$  in  $HO$ ; erit, ut  $TH$  ad  $TG$ , ita

$E$  3

$HO$

HO ad GO ; & componendo, ut summa duarum TH, TG ad TG, ita GH ad GO ; & capiendo antecedentium dimidia, ut CT ad TG, ita CG ad GO ; ac denique convertendo, ut CT ad CG, ita CG ad CO.

Quarto, quod si demittatur ad axem ordinata MN, data sit ratio, quam habet CO ad CN, hoc est æqualis duplicatæ ejus, quam habet CG ad CA. Quum enim tres rectæ CT, CG, CO sint continue proportionales ; erit CG quadratum æquale rectangulo TCO. Sed, ex superius ostensis, CA quadratum est æquale rectangulo TCN. Quare erit, ut rectangulum TCO ad rectangulum TCN, sive etiam ut CO ad CN, ita CG quadratum ad CA quadratum.

Denique, quod data sit etiam ratio, quam habet CO ad NO, hoc est æqualis ei, quam habet CG quadratum ad rectangulum AGB. Jam enim CO est ad CN, ut est CG quadratum ad CA quadratum. Sed, ex superius ostensis, CN est ad NO, ut axis AB ad parametrum ejus AD ; sive etiam, ut AB quadratum ad rectangulum DAB ; sive demum, ut CA quadratum ad rectangulum AGB. Quare ex æquo ordinando erit, ut CO ad NO, ita CG quadratum ad rectangulum AGB.

X.  
Ejusdem  
perpendicu-  
laris singu-  
laris qua-  
dam pro-  
prietas of-  
tenditur.  
FIG. 39.

X. Meretur autem, ut *speciatim ostendatur sequens proprietas* : nimirum, quod si ex puncto O super aliquam ipsarum MG, MH perpendicularis demittatur OR, abscissa portio MR fit æqualis dimidio parametri axis majoris AD.

Nec sane difficile erit eam ostendere.  
Nam

Nam rectæ  $MG$ ,  $MH$ , ob æquales angulos, quos constituunt cum tangente  $MT$ , sunt, ut perpendiculara, quæ ex punctis  $G$ , &  $H$  ad tangentem demittuntur; sive etiam, ut portiones  $TG$ ,  $TH$ . Quare componendo summa rectarum  $MG$ ,  $MH$ , sive axis  $AB$ , erit ad  $MH$ , ut summa duarum  $TG$ ,  $TH$  ad ipsam  $TH$ ; & capiendo antecedentium dimidia erit quoque, ut  $CA$  ad  $MH$ , ita  $CT$  ad  $TH$ ; ac denique permutando erit, ut  $CA$  ad  $CT$ , ita  $MH$  ad  $TH$ .

Demittatur jam ex puncto  $H$  super tangentem perpendicularis  $HL$ . Et  $MH$  ad  $TH$  erit in ratione composita ex  $MH$  ad  $HL$ , & ex  $HL$  ad  $TH$ . Jam vero  $MH$  est ad  $HL$ , ut  $MO$  ad  $MR$ . Itemque  $HL$  est ad  $TH$ , ut  $MO$  ad  $TO$ ; sive etiam, ut  $NO$  ad  $MO$ . Quare erit  $MH$  ad  $TH$  in ratione composita ex  $NO$  ad  $MO$ , & ex  $MO$  ad  $MR$ ; atque adeo in simplici ratione, quam habet  $NO$  ad  $MR$ .

Quum igitur  $CA$  sit ad  $CT$ , ut  $MH$  ad  $TH$ , &  $MH$  sit ad  $TH$ , ut  $NO$  ad  $MR$ ; erit ex æquali, ut  $CA$  ad  $CT$ , ita  $NO$  ad  $MR$ . Sed  $CA$  est ad  $CT$ , ut  $CN$  ad  $CA$ . Quare rursus ex æquali erit, ut  $CN$  ad  $CA$ , ita  $NO$  ad  $MR$ ; & permutando erit pariter, ut  $CN$  ad  $NO$ , ita  $CA$  ad  $MR$ . Est autem ex ostensis, ut  $CN$  ad  $NO$ , ita  $AB$  ad  $AD$ . Et igitur ex æquali rursus erit, ut  $AB$  ad  $AD$ , ita  $CA$  ad  $MR$ : proindeque, sicuti  $CA$  semissis est ipsius  $AB$ , ita erit  $MR$  semissis ipsius  $AD$ .

XI. Præterea pertinet ad focos ellipsis hæc alia proprietas, quod si duæ tangentes  $MK$ ,  $NK$  conveniant in  $K$ , & ex eodem foco  $G$

F 4

du.

XI.  
Focorum el-  
lipfis alia  
proprietas  
generalis.  
FIG. 40.

88 SECTIONUM CONICARUM  
 ducantur ad puncta contactus rectæ  $GM$ ,  
 $GN$ , angulus  $MGN$  bifariam sit sectus per  
 rectam  $GK$ .

Jungantur enim puncta  $M$ , &  $N$  per re-  
 ctam  $MN$ , cui per focum  $G$ , & centrum  $C$   
 parallelæ agantur  $OR$ ,  $XZ$ , cum tangentibus  
 convenientes. Jungantur quoque rectæ  $HM$ ,  
 $HN$ ; & conveniat cum axe, tangens quidem  
 $MK$  in puncto  $T$ , tangens vero  $NK$  in pun-  
 cto  $S$ .

Et quoniam  $HM$  est ad  $GM$ , ut  $TH$  ad  
 $TG$ ; erit componendo, ut  $AB$  ad  $GM$ , ita  
 summa duarum  $TH$ ,  $TG$  ad ipsam  $TG$ ; & ca-  
 piendo antecedentium dimidia erit quoque,  
 ut  $CA$  ad  $GM$ , ita  $CT$  ad  $TG$ . Sed  $CT$  est  
 ad  $TG$ , ut  $CX$  ad  $GO$ . Quare erit ex æquali,  
 ut  $CA$  ad  $GM$ , ita  $CX$  ad  $GO$ .

Eadem ratione ostendemus,  $CA$  esse ad  
 $GN$ , ut est  $CZ$  ad  $GR$ . Unde, quia  $GM$  est  
 ad  $GN$  in ratione composita ex  $GM$  ad  $CA$ ,  
 & ex  $CA$  ad  $GN$ ; habebit quoque  $GM$  ad  
 $GN$  rationem compositam ex  $GO$  ad  $CX$ , &  
 ex  $CZ$  ad  $GR$ .

Jam diameter, quæ bifecat rectam  $MN$ ,  
 eamque velut suam ordinatam agnoscit, trans-  
 ire debet per punctum  $K$ , in quo tangentes  
 duæ  $MK$ ,  $NK$  sibi mutuo occurrunt. Qua-  
 re eadem diameter bifecabit quoque rectam  
 $XZ$ ; & propterea, quum æquales sint duæ  
 $CX$ ,  $CZ$ ; erit  $GM$  ad  $GN$  in simplici ratione,  
 quam habet  $GO$  ad  $GR$ .

Ponamus modo, rectam  $GK$  ipsi  $MN$   
 occurrere in  $L$ . Et quoniam  $GO$  est ad  $GR$ ,  
 ut  $ML$  ad  $NL$ ; erit ex æquali, ut  $GM$  ad  
 $GN$ ,

GN, ita ML ad NL: proindeque angulus MGN sectus erit bifariam per rectam GK.

XII. Sed *banc aliam proprietatem nec etiam silentio præteribimus*, quod si per focum aliquem G ducatur recta MN, utrinque ad ellipsim terminata; ea sit tertia proportionalis post axem AB, & diametrum KL, ipsi MN parallelam.

XII.  
Theorema  
de longitudine rectæ,  
per focorum  
alterum  
transientis.  
FIG. 41.

Ducantur enim ad puncta M, & N tangentes MT, NS, convenientes cum axe AB in punctis T, & S, cumque diametro KL in punctis X, & Z. Tum ex iisdem punctis M, & N demittantur ad diametrum KL ordinatæ MO, NR.

Et quoniam, ut paulo ante vidimus, CA est ad GM, ut CT ad TG; erit quoque, ut CA ad GM, ita CX ad eandem GM. Quare duæ CA, CX æquales erunt inter se. Quumque eadem ratione etiam CZ ipsi CA æqualis comperiatur, erit tota XZ æqualis axi AB.

Quia autem tangens MX occurrit diametro KL in puncto X, & ex puncto contactus M ducta est ad eandem diametrum ordinata MO; erit, ut CX ad CK, ita CK ad CO; & duplicando terminos omnes, erit quoque, ut XZ ad KL, ita KL ad OR.

Jam, quemadmodum XZ est æqualis axi AB, ita OR æqualis est rectæ MN. Quare erit, ut AB ad KL, ita KL ad MN: & propterea recta MN, ducta per focum G, & utrinque ad ellipsim terminata, erit tertia proportionalis post axem AB, & diametrum KL, ipsi MN parallelam.

XIII. Hinc autem *prono alveo fuit*, quod si per

XIII.  
Corollar.

90 SECTIONUM CONICARUM

*eiusdem, quod  
ex praece-  
denti theo-  
remate de-  
ducitur.*

FIG. 41.

si per eundem focum, vel etiam per utrumque ducantur rectæ duæ  $MN$ ,  $PQ$ , utrinque ad ellipsim terminatæ; eæ sint inter se, ut quadrata diametrorum, quæ ipsis sunt parallelæ.

Quum enim  $MN$  sit tertia proportionalis post axem  $AB$ , & diametrum  $KL$ , ipsi  $MN$  parallelam; erit  $KL$  quadratum æquale rectangulo ex  $AB$  in  $MN$ . Et eadem ratione, quia  $PQ$  est tertia proportionalis post axem  $AB$ , & diametrum  $EF$ , ipsi  $PQ$  æquidistantem; erit  $EF$  quadratum æquale rectangulo ex  $AB$  in  $PQ$ .

Inde autem erit, ut  $KL$  quadratum ad  $EF$  quadratum, ita rectangulum ex  $AB$  in  $MN$  ad rectangulum ex  $AB$  in  $PQ$ . Sed, ob communem altitudinem  $AB$ , rectangulum ex  $AB$  in  $MN$  est ad rectangulum ex  $AB$  in  $PQ$ , ut  $MN$  ad  $PQ$ . Quare erit ex æquali, ut  $MN$  ad  $PQ$ , ita  $KL$  quadratum ad  $EF$  quadratum.

Quum igitur, ex superius ostensis, rectangula, quæ fiunt ex segmentis duarum secantium, sint inter se, ut quadrata ex conjugatis earum diametrorum, ad quas secantes illæ velut ordinatæ referuntur; erunt nunc illa eadem rectangula, ut earundem diametrorum ordinatæ illæ, quæ transeunt per focos.

XIV.  
*Focorum el-  
lipfis ulti-  
ma proprie-  
tas genera-  
lis.*

FIG. 42.

XIV. Denique *banc quoque proprietatem volumus silentio committere*, quod si recta  $XZ$  ellipsim contingat in  $M$ , & ducta ex focorum altero  $G$  ad punctum contactus  $M$  recta  $GM$ , huic per vertices axis parallelæ agantur  $AX$ ,  $BZ$ , cum tangente convenientes; quod, inquam, demissa ad axem ordinata  $MN$ , sint ipsæ



ipsæ  $AX$ ,  $BZ$  æquales portionibus axis  $AN$ ,  $BN$ .

Extendatur enim tangens  $MX$ , usque donec conveniat cum axe  $AB$  in puncto  $T$ . Et, ut paulo superius ostensum est,  $CA$  erit ad  $GM$ , ut est  $CT$  ad  $TG$ . Sed ducta  $CL$  ipsi  $GM$  parallela,  $CT$  est ad  $TG$ , ut  $CL$  ad  $GM$ . Igitur erit ex æquali, ut  $CA$  ad  $GM$ , ita  $CL$  ad eandem  $GM$ : & propterea  $CL$  ipsi  $CA$  æqualis erit.

Jam, ob tangentem  $MT$ ,  $CT$  est ad  $CA$ , ut  $CA$  ad  $CN$ . Quare convertendo erit, ut  $CT$  ad  $AT$ , ita  $CA$ , sive  $CL$  ad  $AN$ ; & permutando, ut  $CT$  ad  $CL$ , ita  $AT$  ad  $AN$ . Sed  $CT$  est ad  $CL$ , ut  $AT$  ad  $AX$ . Et igitur ex æquali erit, ut  $AT$  ad  $AX$ , ita  $AT$  ad  $AN$ : proindeque  $AX$  ipsi  $AN$  æqualis erit.

Erigantur deinde ex punctis  $A$ , &  $B$  perpendiculara  $AI$ ,  $BK$ . Et quoniam in eadem illa ratione, quam habet  $AI$  ad  $MI$ , est etiam  $BK$  ad  $MK$ ; erit ex æquali, ut  $AI$  ad  $MI$ , ita  $BK$  ad  $MK$ ; & permutando, ut  $AI$  ad  $BK$ , ita  $MI$  ad  $MK$ . Sed  $AI$  est ad  $BK$ , ut  $AX$  ad  $BZ$ ; &  $MI$  est ad  $MK$ , ut  $AN$  ad  $BN$ . Quare erit rursus ex æquali, ut  $AX$  ad  $BZ$ , ita  $AN$  ad  $BN$ : & propterea, quemadmodum  $AX$  ostensa est æqualis ipsi  $AN$ , sic etiam  $BZ$  ipsi  $BN$  æqualis erit.

CAP.

## C A P. II.

*Focorum ellipsis proprietates  
Speciales ostenduntur.*

I.  
Focorum el-  
lipsis prima  
proprietates  
specialia.

I. **P** Ræcedenti capite ostensæ sunt focorum ellipsis proprietates generales, hoc est, eæ quæ obtinent in quolibet ellipsis puncto; nunc eas ostendemus, quæ speciales sunt, & ad illud dumtaxat punctum pertinent, quod conjungitur cum altero focorum per rectam, axi perpendicularem.

Fig. 43. Sit igitur AB axis major ellipsis, sintque etiam G, & H foci ipsius. Ex focorum altero G perpendicularis ad axem erigatur GE, ellipsi occurrens in E. Tum ad punctum E ducatur tangentes ET, cum eodem axe conveniens in T.

Ac primo quidem ostendemus, quod erectis ex verticibus axis A, & B ad tangentem usque perpendicularibus AX, BZ, eæ sint æquales portionibus AG, BG, abscissis ex axe AB per focum G.

Jam enim rectæ AX, BZ parallelæ sunt ipsi EG. Quare eadem, ex ostensis, æquales esse debent iis portionibus, in quas dividitur axis per ordinatam, demissam ex puncto E. Sed ordinata ista est ipsa EG. Itaque rectæ AX, BZ æquales esse debent portionibus AG, BG.

Hoc idem ostendi quoque potest in  
hunc

hunc modum. Quoniam  $AX$ ,  $EX$  sunt tangentes duæ; per ea, quæ superius ostensa sunt, secabitur angulus  $AGE$  bifariam per rectam  $GX$ . Unde, quum angulus  $AGE$  sit rectus; erit semirecto æqualis, tam angulus  $AGX$ , quam angulus  $AXG$ ; & consequenter duæ  $AX$ ,  $AG$  æquales erunt inter se.

Simili ratione, quoniam  $BZ$ ,  $EZ$  sunt tangentes duæ; secabitur angulus  $BGE$  bifariam per rectam  $GZ$ . Unde, quum angulus  $BGE$  sit rectus; erit semirecto æqualis, tam angulus  $BGZ$ , quam angulus  $BZG$ ; atque adeo duæ  $BZ$ ,  $BG$  æquales erunt inter se.

II. Hinc autem ostendemus secundo loco, quod si ex alio ellipsis puncto  $M$  ducatur ad axem  $AB$  ordinata  $MN$ , quæ conveniat, tam cum tangente, quam cum ellipsi ad partem alteram in punctis  $R$ , &  $O$ ; rectangulum  $MRO$  sit æquale quadrato, quod fit ex interjecta axis portione  $GN$ .

Nam, per superius ostensa, rectangulum  $MRO$  est ad quadratum tangentis  $ER$ , ut est quadratum ex axe conjugato ad quadratum ex conjugata diametri, quæ transit per punctum  $E$ . Sed in hac eadem ratione est etiam quadratum tangentis  $AX$  ad quadratum tangentis  $EX$ . Quare erit ex æquali, ut rectangulum  $MRO$  ad  $ER$  quadratum, ita  $AX$  quadratum ad  $EX$  quadratum.

Jam, permutando, rectangulum  $MRO$  erit ad  $AX$  quadratum, ut est  $ER$  quadratum ad  $EX$  quadratum. Sed, propter parallelas  $NR$ ,  $EG$ ,  $AX$ ,  $ER$  quadratum est ad  $EX$  qua-

II.  
 Focorum el-  
 lipsis secun-  
 do proprie-  
 tas speciali.  
 FIG. 43.

SECTIONUM CONICARUM  
 quadratum, ut  $GN$  quadratum ad  $AG$  qua-  
 dratum. Quare erit rursus ex æquali, ut re-  
 ctangulum  $MRO$  ad  $AX$  quadratum, ita  $GN$   
 quadratum ad  $AG$  quadratum: & propterea,  
 quemadmodum æqualia sunt quadrata duo  
 $AX, AG$ , ita quoque erit rectangulum  $MRO$   
 æquale quadrato, quod fit ex  $GN$ .

III.  
 Focorum et  
 ipsius tertie  
 proprietatis  
 specialis.

III. Atque hinc sequitur tertio, quod si  
 jungatur punctum  $M$  cum foco  $G$  per rectam  
 $MG$ , hæc sit semper æqualis rectæ  $NR$ , ubi-  
 FIG. 43. cumque sumptum fuerit punctum  $M$ .

Jam enim rectangulum  $MRO$  ostensum  
 est æquale quadrato, quod fit ex  $GN$ . Quare,  
 appposito communi quadrato ex  $MN$ , erit re-  
 ctangulum  $MRO$  una cum  $MN$  quadrato æ-  
 quale duobus quadratis  $GN, MN$ .

Quoniam autem  $MO$  est secta bifariam  
 in puncto  $N$ ; erit rectangulum  $MRO$  una  
 cum  $MN$  quadrato æquale quadrato ex  $NR$ .  
 Et quoniam angulus  $GNM$  est rectus, erunt  
 quadrata duo  $GN, MN$  æqualia quadrato ex  
 ipsa  $MG$ . Hinc erit  $NR$  quadratum æquale  
 quadrato ex  $MG$ : & propterea duæ  $NR,$   
 $MG$  æquales erunt inter se.

Hujus autem proprietatis ope, *dati axe,*  
*& focus, facile erit invenire longitudinem or-*  
*dinatæ, quæ cuilibet axis abscissæ correspon-*  
*det.* Sit enim axis  $AB$ , sintque  $G, & H$  foci.  
 Et oporteat invenire ordinatam, quæ corre-  
 spondet abscissæ  $AN$ .

Erigantur ex punctis  $A, & B$  perpendi-  
 culares  $AX, BZ$  æquales ipsis  $AG, BG$ .  
 Tum, juncta  $XZ$ , erigatur ex puncto  $N$  per-  
 pendicularis altera  $NR$ , ei occurrens in  $R$ .

De.

Denique centro  $G$ , & intervallo ipsius  $NR$  describatur arcus, eandem  $NR$  secans in  $M$ ; & erit  $MN$  ordinata quæsitæ.

IV. Iisdem, ut supra manentibus, erigatur modo ex puncto  $T$ , in quo tangens  $ET$  secat axem  $AB$ , perpendicularis ad ipsum axem  $TV$ . Et quemadmodum perpendiculari istam  $TV$  ellipsis *directricem* deinceps appellabimus, sic *relate ad eam plures ellipsi proprietates competunt.*

IV.  
De ellipso  
directrice,  
& de illius  
relate ad  
istam praci-  
pui pro-  
prietatibus.  
FIG. 44.

Nimirum primo, demissa ad directricem perpendiculari  $EF$ , erit, ut  $EF$  ad  $EG$ , ita  $AT$  ad  $AG$ . Nam, ob parallelogrammum  $FG$ , duæ  $EF$ ,  $GT$  inter se sunt æquales. Quare erit, ut  $EF$  ad  $EG$ , ita  $GT$  ad  $EG$ . Sed, ob triangula æquiangula  $TGE$ ,  $TAX$ ,  $GT$  est ad  $EG$ , ut  $AT$  ad  $AX$ . Et, ob æquales  $AX$ ,  $AG$ , ut est  $AT$  ad  $AX$ , ita est  $AT$  ad  $AG$ . Quare erit ex æquali, ut  $EF$  ad  $EG$ , ita  $AT$  ad  $AG$ .

Secundo, demissa ex alio quovis ellipsis puncto  $M$  ad eandem directricem perpendiculari  $MS$ , erit, ut  $MS$  ad  $MG$ , ita  $AT$  ad  $AG$ . Nam, ducta ad axem ordinata  $MN$ , eaque producta ad tangentem usque in puncto  $R$ ; erit, ut  $TN$  ad  $NR$ , ita  $AT$  ad  $AX$ , sive  $AG$ . Sed  $TN$  est ad  $NR$ , ut  $MS$  ad  $MG$ ; quum sint æquales, tam duæ  $TN$ ,  $MS$ , quam duæ  $NR$ ,  $MG$ . Igitur erit ex æquali, ut  $MS$  ad  $MG$ , ita  $AT$  ad  $AG$ .

Tertio, id verum erit etiam relate ad alium axis verticem  $B$ ; quandoquidem erit, ut  $BT$  ad  $BG$ , ita  $AT$  ad  $AG$ . Nam, ob triangula æquiangula  $TBZ$ ,  $TAX$ , ut est  $BT$  ad  $BZ$ ,

96 SECTIONUM CONICARUM  
**BZ**, ita est **AT** ad **AX**. Sed, ex superius  
 ostensis, æquales sunt inter se, tam duæ **AX**,  
**AG**, quam duæ **BZ**, **BG**. Quare erit quoque  
 ut **BT** ad **BG**, ita **AT** ad **AG**.

Quarto, si duo in ellipsi capiantur pun-  
 cta **M**, & **P**, & ex iis perpendiculares ad  
 directricem demittantur **MS**, **PQ**; erit, ut  
**MS** ad **PQ**, ita **MG** ad **PG**. Nam in eadem  
 ratione, quam habet **AT** ad **AG**, est, tam  
**MS** ad **MG**, quam **PQ** ad **PG**. Igitur erit  
 ex æquali, ut **MS** ad **MG**, ita **PQ** ad **PG**; &  
 permutando erit etiam, ut **MS** ad **PQ**, ita  
**MG** ad **PG**.

Denique, si ex iisdem punctis **M**, & **P**  
 ducantur ad directricem aliæ duæ rectæ **MI**,  
**PL**, quæ inter se sint parallelæ; erit quoque  
 ut **MI** ad **PL**, ita **MG** ad **PG**. Nam, ob trian-  
 gula æquiangula **MSI**, **PQL**, ut est **MI** ad  
**PL**, ita est **MS** ad **PQ**. Sed, ex ostensis, **MS**  
 est ad **PQ**, ut est **MG** ad **PG**. Igitur erit ex  
 æquali, ut **MI** ad **PL**, ita **MG** ad **PG**.

V.  
 Circa pro-  
 prietatem  
 præcipuam  
 ellipsis re-  
 late ad di-  
 rectricem  
 monita duo.  
 FIG. 44.

V. Recta igitur, quæ ex quolibet ellipsis  
 puncto perpendiculariter demittitur ad dire-  
 tricem, est ad rectam, quæ ex eodem puncto  
 ducitur ad focus **G**, in eadem illa ratione,  
 quam habet **AT** ad **AG**. Sed circa proprieta-  
 tem istam duo occurrunt, notatu digna.

Primum est, quod ratio, quam habet  
**AT** ad **AG**, sit majoris ad minus: adeo nem-  
 pe, ut perpendicularis demissa ad directricem  
 sit semper major recta, quæ ducitur ad focus  
**G**. Ob tangentem enim **ET**, ut est **CT** ad **CA**,  
 ita est **CA** ad **CG**. Quare convertendo erit  
 quoque, ut **CT** ad **AT**, ita **CA** ad **AG**. Sed

CT

CT major est, quam CA. Et igitur AT etiam major erit, quam AG.

Alterum est, quod eadem illa ratio sit æqualis ei, quam habet axis AB ad distantiam, quæ inter utrumque focus existit. Nam, ob tangentem ET, ut est CT ad CA, ita est CA ad CG. Quare, dividendo, erit, ut AT ad CA, ita AG ad CG; & permutando erit quoque, ut AT ad AG, ita CA ad CG. Jam vero CA est ad CG, ut AB ad GH. Et igitur ex æquali AT erit ad AG, ut est AB ad GH.

VI. Ad directricem ellipsis alia etiam proprietas pertinet valde singularis. Sed ad eam ostendendam, sternendum est prius, velut lemma, sequens theorema, quod si ad aliquod ellipsis punctum M ducatur tangens MS, conveniens cum axe AB in puncto S, & ex puncto contactus M demittatur ad eundem axem ordinata MO; quod, inquam, CG sit ad CO, ut est CS ad CT.

VI.  
Lemma pro  
ostendenda  
singulari el-  
lipis relate  
ad directri-  
cem proprie-  
tate.

FIG. 45.

Quum enim recta ET contingat ellipsem, & ex puncto contactus E ducta sit ad axem ordinata EG; erit, ex superius ostensis, ut CT ad CA, ita CA ad CG: proindeque rectangulum ex CT in CG æquale erit quadrato, quod fit ex CA.

Similiter, quoniam recta MS est tangens ellipsis, & ex puncto contactus M ducta est ad axem ordinata MO; per ea, quæ superius ostensa sunt, erit, ut CS ad CA, ita CA ad CO. Quare rectangulum ex CS in CO æquale erit quadrato, quod fit ex CA.

Eodem igitur CA quadrato æquale est,

Tom. II.

G

tam

98 SECTIONUM CONICARUM  
 tam rectangulum ex CT in CG, quam re-  
 ctangulum ex CS in CO. Quare erit rectan-  
 gulum ex CT in CG æquale rectangulo ex  
 CS in CO; & propterea erit, ut CG ad CO,  
 ita CS ad CT.

VII.  
 Lemmatis  
 precedentis  
 corollarium  
 primum.  
 FIG. 45.

VII. Hinc autem sequitur primo, quod si  
 eadem tangens MS conveniat cum directrice  
 TV in puncto K, & cum axe conjugato PQ  
 in puncto R; rectangulum ex MO in TK sit  
 ad CP quadratum, ut est GO ad CG.

Quum enim CG sit ad CO, ut est CS  
 ad CT; erit convertendo, ut CG ad GO, ita  
 CS ad TS. Sed, ob triangula æquiangula  
 CRS, TKS, CS est ad TS, ut CR ad TK.  
 Quare erit ex æquali, ut CR ad TK, ita CG  
 ad GO; & invertendo erit etiam, ut TK ad  
 CR, ita GO ad CG.

Præterea, demissa ad axem conjugatum  
 PQ ordinata ML; erit, ob tangentem MR,  
 ut CR ad CP, ita CP ad CL. Unde rectan-  
 gulum ex CR in CL, sive MO æquale erit  
 quadrato, quod fit ex CP; & propterea re-  
 ctangulum ex MO in TK erit ad CP qua-  
 dratum, ut est idem rectangulum ex MO in  
 TK ad rectangulum ex CR in MO.

Jam, ob communem altitudinem MO,  
 rectangulum ex MO in TK est ad rectangu-  
 lum ex CR in MO, ut est TK ad CR. Osten-  
 sum est autem, TK esse ad CR, ut est GO ad  
 CG. Quare erit ex æquali, ut rectangulum  
 ex MO in TK ad rectangulum ex CR in  
 MO, ita GO ad CG; & consequenter in hac  
 eadem ratione erit etiam rectangulum ex  
 MO in TK ad CP quadratum.

VIII. Un-



eadem ratione erit etiam rectangulum ex MO in TK ad CP quadratum.

VIII. Unde *sequitur secundo*, rectangulum ex MO in TK æquale esse rectangulo TGO; atque adeo esse, ut TG ad TK, ita MO ad GO.

VIII.  
Corollarium  
secundum.

FIG. 55.

Quum enim recta ET contingat hyperbolam, & ex puncto contactus E demissa sit ad axem ordinata EG; erit, ex superius ostensis, rectangulum TGC æquale rectangulo AGB. Sed rectangulum AGB adæquat quartam partem figuræ axis AB, sive etiam quadratum, quod fit ex CP, dimidio axis conjugati. Quare rectangulum TGC eidem CP quadrato pariter æquale erit.

Hinc erit, ut rectangulum TGO ad rectangulum TGC, ita idem rectangulum TGO ad CP quadratum. Sed, ob communem altitudinem TG, rectangulum TGO est ad rectangulum TGC, ut est GO ad GC. Quare erit ex æquali, ut GO ad GC, ita rectangulum TGO ad CP quadratum.

Et quoniam ostensum est, GO esse ad GC, ut est rectangulum ex MO in TK ad CP quadratum; erit rursus ex æquali, ut rectangulum ex MO in TK ad CP quadratum, ita rectangulum TGO ad idem CP quadratum. Unde rectangulum ex MO in TK æquale erit rectangulo TGO.

IX. Atque hinc *sequitur demum*, quod junctis rectis GK, GM, rectus sit angulus KGM, quod sub iis continetur.

IX.  
Corollarium  
tertium.

FIG. 55.

Quum enim ostensum sit rectangulum ex MO in TK æquale rectangulo TGO; erit,  
ut

124 SECTIONUM CONICARUM  
 ut TG ad TK, ita MO ad GO. Unde trian-  
 gula duo rectangula GTK, MOm habebunt  
 circa angulos rectos latera proportionalia; &  
 consequenter æquiangula erunt.

Angulus igitur T GK æqualis erit an-  
 gulo GMO. Unde, apposito communi OGM,  
 erunt duo anguli T GK, OGM æquales duo-  
 bus angulis GMO, OGM. Sed isti duo simul  
 sumpti unum rectum adæquant. Quare etiam  
 uni recto æquales erunt priores duo; atque  
 adeo angulus KGM ex iis compositus pariter  
 rectus erit.

X.  
 Hyperbola  
 relate ad di-  
 rectricem  
 singularis  
 proprietas  
 demonstra-  
 tur.

FIG. 55.

X. His præmissis, facile modo erit ostend-  
 ere proprietatem illam singularem, quæ perti-  
 net ad directricem hyperbolæ. Illiusmodi pro-  
 prietas hæc est, quod si per focorum alterum  
 G ducatur recta MN, utrinque ad hyperbo-  
 lam terminata, & rectæ MS, NX contingant  
 hyperbolam in punctis M, & N; tangentes istæ  
 super directrice TV sibi mutuo occurrant.

Si enim fieri potest, secent tangentes  
 illæ directricem TV in punctis diversis: ni-  
 mirum tangens quidem MS in puncto K,  
 tangens vero NX in puncto I. Tum jungan-  
 tur rectæ GK, GI.

Et quoniam recta MK est tangens hyper-  
 bolæ, eaque occurrit directrici in puncto K;  
 erit angulus KGM rectus; adeoque rectus  
 pariter angulus KGN, qui ad partem alteram  
 existit.

Eadem ratione, quia recta NX est tan-  
 gens hyperbolæ, eademque secat directricem  
 in puncto I, erit angulus IGN similiter rectus.  
 Unde duo anguli KGN, IGN æquales erunt  
 in-

inter se. Quod fieri non potest.

XI. Hinc vero *alia etiam proprietas valde elegans fuit* : nimirum , quod si per focorum alterum G ducatur recta MN , utrinque ad hyperbolam terminata ; & actis tangentibus MK,NK,sibi mutuo occurrentibus in K, jungatur recta GK ; hæc perpendicularis esse debeat ad ipsam MN.

Referat namque recta TV directricem hyperbolæ. Et, per ostensam proprietatem , in ea locabitur punctum K , in quo tangentes duæ sibi mutuo occurrunt . Unde per ea, quæ paulo ante ostensa sunt , omnino necesse est, ut rectus sit uterque angulorum KGM , KGN; atque adeo, ut ipsa GK perpendicularis sit ad rectam MN.

Hoc idem erui quoque potest ex proprietate illa generali , superius ostensa , quod recta GK bifariam dividat angulum, contentum sub rectis GM, GN. Inde enim sequitur, eandem rectam GK æquales semper angulos constituere cum rectis GM , GN ; atque adeo rectos esse angulos illos , ubi ipsæ GM , GN jacent in directum ,

XII. Cæterum ex iis , quæ modo ostensa sunt , *datiis focus, & directrice, nullo negotio ducetur tangens ad quodlibet hyperbolæ punctum.* Referat enim recta TV directricem hyperbolæ , sintque foci ejusdem puncta G , & H. Oportet ad punctum N, tangentem ducere.

Ad focorum alterum G ducatur ex puncto N recta NG . Tum ei ex eodem foco G perpendicularis erigatur GK , conveniens cum directrice in puncto K . Jungantur denique

XI.  
Alia hyperbola relate ad directricem elegans proprietas ostenditur.  
FIG. 56.

XII.  
Quomodo datiis directrice, & focus hyperbola duci possit tangens ad punctum datum.  
FIG. 56.

126 SECTIONUM CONICARUM  
 que puncta  $N$ , &  $K$  per rectam  $NK$ . Et erit  
 recta ista  $NK$  tangens quaesita.

Si enim fieri potest, contingat hyperbo-  
 lam in puncto  $N$  recta quævis alia  $NI$ ,  
 quæ conveniat cum directrice in puncto  $I$ .  
 Tum ex foco  $G$  ad punctum  $I$  ducatur recta  
 $GI$ . Et, ex ostensis, rectus erit angulus  $IGN$ .  
 Sed ex constructione rectus etiam est angu-  
 lus  $KGN$ . Quare duo anguli  $IGN$ ,  $KGN$   
 æquales inter se erunt. Quod fieri non potest,

## C A P. V.

*Ostenduntur proprietates gene-  
 rales, ad parabolæ focum  
 pertinentes.*

*I.  
 Qui sit pa-  
 rabolæ fo-  
 cus, & cur  
 in ea unus  
 tantum re-  
 periatur.*

FIG. 57.

**I.** **I**N parabola quoque vocatur focus,  
 seu umbilicus, *illud axis punctum,*  
*cui ordinata correspondens semissem parame-*  
*tri ejusdem axis adæquat.*

Ita, si  $AB$  sit axis parabolæ  $AM$ , &  $AD$   
 parameter ejus; capiaturque in axe illo  $AB$   
 punctum  $G$  adeo quidem, ut ordinata ei cor-  
 respondens  $EG$  adæquet semissem ipsius  $AD$ ;  
 dicetur punctum  $G$  focus, seu umbilicus  
 ipsius parabolæ,

Mirum autem videri non debet, quod  
 quum in ellipsi, & hyperbola duo sint foci,  
 seu umbilici, in parabola tamen nonnisi uni-  
 cus reperitur. Id namque pendet ex eo,  
 quod alter axis vertex in parabola est in in-  
 fini-

fnita a priore distantia .

II. Ex ipsa autem foci definitione liquet, distantiam ejus a vertice axis quadrantem parametri ejusdem axis adæquare . Maneant enim omnia , ut supra . Dico, portionem axis AG æqualem esse quartæ parti ipsius AD. II.  
Foci parabola  
ma proprie-  
tas genera-  
lis.  
FIG. 57.

Nam, propter parabolam, EG quadratum est æquale rectangulo DAG. Quare erit, ut AG ad EG, ita EG ad AD. Sed ex constructione EG semissis est ipsius AD. Itaque etiam AG semissis erit ipsius EG. Ex quo fit, ut eadem AG adæquet quadrantem totius parametri AD.

III. Ducatur nunc ad verticem A tangens AX, quæ conveniat cum alia quavis tangente MX in puncto X. Et facile erit ostendere, quod recta GX, ducta ex foco G ad punctum X, perpendicularis sit ad tangentem MX. III.  
Foci parabola secunda  
proprietat  
generalis.  
FIG. 57.

Extendatur etenim tangens MX, usque donec conveniat cum AB in puncto T, & ex puncto contactus M demittatur ad axem ordinata MN. Jamque erit, ut NT ad AT, ita MN ad AX. Sed, ob æquales AT, AN, est NT dupla ipsius AT. Quare etiam MN dupla erit ipsius AX: & propterea MN quadratum quadruplum erit quadrati, quod fit ex AX.

Quoniam vero AG quadrans est ipsius AD, erit rectangulum DAN quadruplum quoque rectanguli GAT. Unde erit, ut MN quadratum ad AX quadratum, ita rectangulum DAN ad rectangulum GAT. Sed, propter parabolam, MN quadratum est æquale rectangulo DAN. Quare etiam AX quadratum æquale

128 SECTIONUM CONICARUM  
 quale erit rectangulo  $GAT$  : & propterea angulus  $TXG$  rectus erit.

IV.  
 Foci parabola  
 tertia  
 proprietates  
 generalis.  
 FIG. 57.

IV. Hinc autem *sequitur quoque*, rectam  $GM$ , conjungentem punctum contactus  $M$  cum foco  $G$ , æqualem esse axis portioni  $GT$ , quæ inter focum, & tangentem existit.

Quum enim recta  $MT$  contingat parabolam, & ex puncto contactus  $M$  ducta sit ad axem ordinata  $MN$ ; erunt portiones duæ  $AT$ ,  $AN$  æquales inter se. Sed  $AT$  est ad  $AN$ , ut  $TX$  ad  $MX$ . Quare duæ  $TX$ ,  $MX$  etiam æquales erunt.

Hinc duo triangula  $TGX$ ,  $MGX$  habebunt duo latera  $TX$ ,  $GX$  æqualia duobus lateribus  $MX$ ,  $GX$ , alterum alteri. Sed æquales quoque sunt anguli, sub iis lateribus comprehensû; quum uterque sit rectus. Quare eorundem bases  $GT$ ,  $GM$  pariter æquales erunt.

V.  
 Foci parabola  
 quarta  
 proprietates  
 generalis.  
 FIG. 57.

V. Atque hinc *sequitur etiam*, quod si extendatur tangens  $MX$  versus  $Z$ , & per punctum contactus  $M$  ducatur recta  $MH$ , parallela axi  $AB$ , æquales sint anguli, quos rectæ  $GM$ ,  $MH$  constituunt cum tangente  $XZ$ .

Quum enim duæ  $GT$ ,  $GM$  inter se sint æquales, triangulum  $TGM$  isosceles erit; adeoque erit angulus  $GTM$  æqualis angulo  $GMT$ . Sed, propter parallelas  $AB$ ,  $MH$ , idem angulus  $GTM$  æqualis etiam est angulo  $HMZ$ . Quare duo anguli  $GMT$ ,  $HMZ$  æquales erunt inter se.

VI.  
 Foci parabola  
 quinta  
 proprietates  
 generalis.  
 FIG. 57.

VI. Exinde *deducitur præterea*, rectam  $GM$  adæquare quadrantem parametri, quæ refertur ad diametrum, transeuntem per punctum contactus  $M$ .

Quum

Quum enim rectus sit angulus TXG; erit, tam AX quadratum æquale rectangulo TAG, quam TX, seu MX quadratum æquale rectangulo ATG. Unde AX quadratum erit ad MX quadratum, ut est rectangulum TAG ad rectangulum ATG; sive etiam, ut est AG ad TG, seu GM.

Et quoniam, ex superius ostensis, AX quadratum est ad MX quadratum, ut parameter axis AB ad parametrum diametri MH; erit in hac eadem quoque ratione AG ad GM: & propterea, quemadmodum AG quadrantem adæquat parametri, quæ refertur ad axem AB, ita GM æqualis erit quartæ parti parametri, quæ refertur ad diametrum MH.

VII. Demittatur ex puncto contactus M ad axem AB ordinata MN. Et exinde colligatur pariter, eandem rectam GM æqualem esse duabus AN, AG simul sumptis.

VII.  
Foci parabola sextæ  
proprietas  
generalis.  
FIG. 57.

Portiones namque duæ AT, AN, ob tangentem MT, inter se sunt æquales. Quare, apposita communi AG, erit tota GT æqualis duabus AN, AG simul sumptis. Sed GM ostensa est æqualis ipsi GT. Quare iisdem AN, AG simul sumptis etiam GM æqualis erit.

Id quum ita sit, si extendatur axis AB versus verticem A usque ad punctum F: ita, ut duæ AF, AG inter se sint æquales; erit GM æqualis ipsi FN. Nam, ob æquales AF, AG, est FN æqualis summæ duarum AN, AG. Sed eidem summæ æqualis est etiam GM. Quare duæ GM, FN equales erunt inter se.

FIG. 58.

VIII. Hinc vero alia nobis suboritur ratio

VIII.  
Alia para-

Tom. II.

I

tio

*bolam in plano describendi ratio, datis axe, & foco.*  
 tio describendi parabolam in plano, datis axe, & foco. Sit enim AB axis parabolæ, sitque punctum G ejusdem focus, seu umbilicus. Oportet, in subjecto plano parabolam describere.

Extendatur axis AB usque ad punctum F: ita, ut duæ AF, AG inter se sint æquales; & ex puncto F perpendicularis erigatur FH. Sit deinde HL regula quævis, ipsi FH normaliter insistens. Et sumpto filo ejusdem cum regula longitudinis, alligentur extrema ejus punctis G, & L.

Feratur postea regula HL super ipsa FH, ea quidem lege, ut ei maneat semper perpendicularis, atque adeo parallela axi AB. Et, ope stili, una cum regula feratur etiam filum, sed ita tamen, ut portiones ejus maneant continuo tensæ. Dico, curvam, quæ per stili in subjecto plano describitur, esse parabolam quæsitam.

Jam enim ex ipsa curvæ descriptione liquet, ejus naturam hanc esse, ut si ex aliquo ejus puncto M demittatur ad axem AB perpendicularis MN, duæ GM, FN inter se sint æquales. Sed FN est æqualis summæ duarum AN, AG. Quare eidem summæ æqualis quoque erit GM: & propterea curva descripta erit parabola.

Perpicuum est autem, parabolam, quæ præfata ratione describitur, necessario transire per punctum A, verticem axis AB. Patetque etiam, eo majorem parabolæ portionem exposita ratione describi, quo longior assumitur regula HL.

IX. Sed



IX. Sed ex iis, quæ modo ostensa sunt, rursus liquet *veritas ejus, quod alia ratione alibi demonstravimus*; nimirum, quod parameter cujusvis diametri MH superet parametrum axis AB per quadruplum abscissæ AN.

IX.  
Theorema  
circa para-  
metros supe-  
rius osten-  
sum alia ra-  
tione de-  
monstratur.

FIG. 57.

Quum enim GM sit æqualis duabus AG, AN simul sumptis; erit AN differentia duarum GM, AG: & propterea quadruplum rectæ GM superabit quadruplum rectæ AG per quadruplum ipsius AN.

Quoniam autem GM est quadrans parametri, quæ refertur ad diametrum MH; erit quadruplum ejusdem GM parameter integra ejusdem diametri. Et similiter, quia AG est quarta pars parametri, quæ refertur ad axem AB; erit quadruplum ejusdem AG ipsa axis parameter.

Unde, quum quadruplum rectæ GM superet quadruplum rectæ AG per quadruplum abscissæ AN; omnino necesse est, ut parameter diametri MH superet parametrum axis AB per quadruplum ejusdem abscissæ AN.

X. Sit nunc recta MT aliqua tangens parabolæ, conveniens cum axe AB in puncto T. Erigatur super ea perpendicularis MO, eidem axi occurrens in O. Et circa perpendicularem istam duo licebit ostendere.

X.  
Proprieta-  
tes, perti-  
nentes ad  
perpendicu-  
larem, quæ  
ex puncto  
contactus  
ducitur ad  
tangentem.

FIG. 57.

Primum est, quod si per punctum contactus M ducatur recta MH, parallela axi AB, ea bifariam dividat angulum GMH, contentum sub rectis GM, MH. Nam rectæ GM, MH constituunt cum tangente MT angulos æquales. Sed æquales quoque sunt anguli,

1 2

quos

quos cum eadem tangente efficit perpendicularis  $MO$ . Quare erit angulus  $GMO$  æqualis angulo  $HMO$ .

Alterum est, quod duæ axis portiones  $TG$ ,  $OG$  inter se sint æquales. Nam per ea, quæ superius ostensa sunt, portio  $NO$  semissem adæquat ipsius  $AD$ ; adeoque dupla est portio  $AG$ . Sed, propter tangentem  $MT$ , etiam portio  $NT$  dupla est ipsius  $AT$ . Quare erit tota  $TO$  dupla totius  $TG$ : & propterea, quum  $TO$  secta sit bifariam in  $G$ , portiones duæ  $TG$ ,  $OG$  æquales erunt inter se.

XI.  
Ejusdem  
perpendicu-  
laris singu-  
laris qua-  
dam pro-  
prietatis of-  
tenditur.  
FIG. 57.

XI. Meretur autem, ut *speciatim ostendatur sequens proprietas*: nimirum, quod si ex puncto  $O$  demittatur super rectam  $GM$  perpendicularis  $OR$ , abscissa portio  $MR$  sit æqualis dimidio parametri  $AD$ , quæ refertur ad axem  $AB$ .

Nec sane difficile erit, eam ostendere. Quum enim duæ  $TG$ ,  $OG$  inter se sint æquales, sitque  $TG$  æqualis ipsi  $GM$ ; erunt duæ  $GM$ ,  $OG$  pariter æquales inter se: proindeque anguli  $GMO$ ,  $GOM$  etiam æquales erunt.

Hinc triangula duo rectangula  $OMR$ ,  $ONM$  æquiangulara erunt: & propterea, quum sit, ut  $MO$  ad  $MR$ , ita  $MO$  ad  $NO$ ; erunt duæ  $MR$ ,  $NO$  æquales inter se. Sed  $NO$  semissis est ipsius  $AD$ . Quare etiam  $MR$  semissis erit ejusdem  $AD$ .

XII.  
Foci para-  
bolæ alia  
proprietas  
generalis.

FIG. 59.

XII. Præterea *pertinet ad focum parabolæ hæc alia proprietas*, quod si duæ tangentes  $MK$ ,  $NK$  conveniant in  $K$ , & ex foco  $G$  ducantur ad puncta contactus rectæ  $GM$ ,  $GN$ , angulus  $MGN$  bifariam sit sectus per rectam  $GK$ .

Jun-

Jungantur enim puncta  $M$ , &  $N$  per rectam  $MN$ , cui per focus  $G$  parallela agatur  $OR$ , conveniens cum utraque tangente in punctis  $O$ , &  $R$ . Sit porro  $EF$  diameter, quæ bisecat rectam  $MN$ , eamque velut suam ordinatam agnoscit. Et per verticem ejus  $E$  eidem  $MN$  parallela ducatur  $XZ$ , quæ similiter tangentibus occurrat in punctis  $X$ , &  $Z$ .

Quia igitur diameter  $EF$  transire debet per punctum  $K$ , in quo tangentes duæ  $MK$ ,  $NK$  sibi mutuo occurrunt; erit  $XZ$  bifariam secta in puncto  $E$ : proindeque erit, ut  $EK$  ad  $EX$ , ita  $EK$  ad  $EZ$ . Sed, productis tangentibus, usque donec axi occurrant in punctis  $T$ , &  $S$ ,  $EK$  est ad  $EX$ , ut  $TG$  ad  $GO$ ; itemque  $EK$  est ad  $EZ$ , ut  $SG$  ad  $GR$ . Quare erit ex æquali, ut  $TG$  ad  $GO$ , ita  $SG$  ad  $GR$ ; & permutando erit etiam, ut  $TG$  ad  $SG$ , ita  $GO$  ad  $GR$ .

Jam, ob tangentes  $MT$ ,  $NS$ , æquales sunt inter se, tam duæ  $TG$ ,  $GM$ , quam duæ  $SG$ ,  $GN$ . Unde, quum sit, ut  $TG$  ad  $SG$ , ita  $GM$  ad  $GN$ ; erit rursus ex æquali, ut  $GO$  ad  $GR$ , ita  $GM$  ad  $GN$ . Sed, producta  $GK$ , usque donec ipsi  $MN$  occurrat in  $L$ ,  $GO$  est ad  $GR$ , ut  $ML$  ad  $NL$ . Quare erit denuo ex æquali, ut  $GM$  ad  $GN$ , ita  $ML$  ad  $NL$ : proindeque angulus  $MGN$  sectus erit bifariam per rectam  $GK$ .

XIII. Sed hanc aliam proprietatem nec etiam silentio præteribimus, quod si per focus  $G$  ducatur recta  $PQ$ , utrinque ad parabolam terminata, ea sit æqualis parametro illius diametri, quæ eandem  $PQ$  velut suam

XIII.  
Theorema  
de longitudine rectæ,  
per focus  
transcurrentis.

FIG. 60.

134 SECTIONUM CONICARUM  
 ordinatam agnoscit.

Sit enim  $EF$  diameter, ad quam  $PQ$  velut ordinata refertur, sitque etiam  $EH$  parameter istius diametri. Ostendendum est, duas  $PQ$ ,  $EH$  æquales esse inter se.

Super axe  $AB$  demittatur perpendicularis  $EL$ . Jamque per ea, quæ superius ostensa sunt, parameter diametri  $EH$  æqualis erit parametro axis  $AD$  una cum quadruplo ipsius  $AL$ . Sed parameter  $AD$  quadrupla est ipsius  $AG$ . Quare eadem  $EH$  duabus  $AG$ ,  $AL$  quater sumptis æqualis erit.

Ducatur deinde per verticem axis  $A$  alia ad diametrum ordinata  $AO$ . Et quemadmodum æquales sunt duæ  $AG$ ,  $OR$ ; ita etiam, ex ostensis, æquales erunt duæ  $AL$ ,  $EO$ . Unde, quum duabus  $AG$ ,  $AL$  æqualis sit tota  $ER$ , erit  $EH$  æqualis quadruplo ipsius  $ER$ .

Quoniam autem, propter parabolam,  $EH$  est ad  $PR$ , ut  $PR$  ad  $ER$ ; erit quoque, ut  $EH$  quadratum ad  $PR$  quadratum, ita  $EH$  ad  $ER$ . Unde, quemadmodum  $EH$  quadrupla est ipsius  $ER$ , ita etiam erit  $EH$  quadratum quadruplum quadrati, quod fit ex  $PR$ : proindeque  $EH$  ipsi  $PQ$  æqualis erit.

XIV.  
 Foci-parabola  
 extrema  
 proprietates  
 generalis.

FIG. 61.

XIV. Denique *hanc quoque proprietatem nolumus silentio committere*, quod si recta  $MT$  parabolam contingat in  $M$ , & ducta ex foco  $G$  ad punctum contactus  $M$  recta  $GM$ , huic per verticem axis  $A$  parallela agatur  $AX$ , cum tangente conveniens; quod, inquam, demissa ad axem ordinata  $MN$ , duæ  $AX$ ,  $AN$  inter se sint æquales.

Quum enim triangula duo  $TGM$ ,  $TAX$   
 sint

sint æquiangula; erit, ut TG ad GM, ita TA ad AX. Sed per ea, quæ superius ostensa sunt, duæ TG, GM inter se sunt æquales. Quare etiam æquales erunt duæ TA, AX: & propterea, quemadmodum TA æqualis est ipsi AN, ita quoque AX eidem AN æqualis erit.

Id quum ita sit, liquet, differentiam duarum GM, AX esse eandem ubique: nimirum æqualem ipsi AG. Quum enim GM duabus AG, AN simul sumptis sit æqualis; erit AG differentia duarum GM, AN. Quare, ob æquales AN, AX, eadem AG erit quoque differentia duarum GM, AX.

C A P. VI.

*Ostenduntur proprietates Speciales, ad parabolæ focum pertinentes.*

I. **O**stensis proprietatibus generalibus, ad parabolæ focum pertinentibus; reliquum modo est, ut eas ostendamus, quæ speciales sunt, & ad illud dumtaxat punctum pertinent, quod per rectam axi perpendicularem cum foco conjungitur.

Sit igitur AB axis parabolæ, sitque punctum G ejus focus, seu umbilicus. Erigatur ex eo perpendicularis ad axem GE, parabolæ occurrens in E. Tum ad punctum E ducatur tangens ET, cum eodem axe conveniens in T.

I.  
Foci parabolæ primæ proprietates speciales.  
FIG. 62.

Ac primo quidem ostendemus, quod erecta ex vertice  $A$  ad tangentem usque perpendiculari  $AX$ , ea sit æqualis portioni  $AG$ , abscissæ ex axe  $AB$  per focus  $G$ .

Jam enim  $AX$  parallela est ipsi  $EG$ . Quare eadem, ex ostensis, æqualis esse debet ei axis portioni, quam abscindit ordinata, demissa ex puncto  $E$ . Sed, ex constructione ordinata ista est ipsa  $EG$ . Itaque recta  $AX$  æqualis erit portioni  $AG$ .

Hoc idem ostendi quoque potest in hunc modum. Quoniam  $AX$ ,  $EX$  sunt tangentibus duæ; per ea, quæ superius ostensa sunt, secabitur angulus  $AGE$  bifariam per rectam  $GX$ . Unde, quum angulus  $AGE$  sit rectus; erit semirecto æqualis, tam angulus  $AGX$ , quam angulus  $AXG$ ; & consequenter duæ  $AX$ ,  $AG$  æquales erunt inter se.

II.  
Foci parabola secundæ proprietatis specialis.

FIG. 62.

II. Hinc autem ostendemus secundo loco, quod si ex alio parabolæ puncto  $M$  ducatur ad axem  $AB$  ordinata  $MN$ , quæ conveniat, tam cum tangente, quam cum parabola ad partem alteram in punctis  $R$ , &  $O$ ; rectangulum  $MRO$  sit æquale quadrato, quod fit ex interjecta axis portione  $GN$ .

Nam, per superius ostensa, rectangulum  $MRO$  est ad quadratum tangentis  $ER$ , ut est parameter axis  $AB$  ad parametrum diametri, quæ transit per punctum  $E$ . Sed in hac eadem ratione est etiam quadratum tangentis  $AX$  ad quadratum tangentis  $EX$ . Quare erit ex æquali, ut rectangulum  $MRO$  ad  $ER$  quadratum, ita  $AX$  quadratum ad  $EX$  quadratum.

Jam,

Jam, permutando, rectangulum MRO erit ad AX quadratum, ut est ER quadratum ad EX quadratum. Sed, propter parallelas NR, EG, AX, ER quadratum est ad EX quadratum, ut GN quadratum ad AG quadratum. Quare erit rursus ex æquali, ut rectangulum MRO ad AX quadratum, ita GN quadratum ad AG quadratum: & propterea, quemadmodum æqualia sunt quadrata duo AX, AG, ita quoque erit rectangulum MRO æquale quadrato, quod fit ex GN.

III. Atque hinc sequitur tertio, quod si jungatur punctum M cum foco G per rectam GM, hæc sit semper æqualis rectæ NR, ubicumque sumptum fuerit punctum M.

III.  
Foci parabolæ  
tertia  
proprietas  
specialis.

FIG. 62.

Jam enim rectangulum MRO ostensum est æquale quadrato, quod fit ex GN. Quare, appposito communi quadrato ex MN, erit rectangulum MRO una cum MN quadrato æquale duobus quadratis GN, MN.

Quoniam autem MO est secta bifariam in puncto N; erit rectangulum MRO una cum MN quadrato æquale quadrato ex NR. Et quoniam angulus GNM est rectus, erunt quadrata duo GN, MN æqualia quadrato ex ipsa GM. Hinc erit NR quadratum æquale quadrato ex GM: & propterea duæ NR, GM æquales erunt inter se.

Hujus autem proprietatis ope, *dati axe, & foco, facile erit invenire longitudinem ordinatæ, quæ cuilibet axis abscissæ correspondet.* Sit enim axis AB, sitque G focus. Et oporteat, invenire ordinatam, quæ correspondet abscissæ AN.

Eri-

Erigantur ex punctis A, & G perpendiculares AX, GE, quarum prior AX sit æqualis ipsi AG, altera GE sit dupla ejusdem AG. Tum, juncta EX, erigatur ex puncto N perpendicularis altera NR, ei occurrens in R. Denique centro G, & intervallo ipsius NR describatur arcus, eandem NR secans in M; & erit MN ordinata quæsitæ.

IV.  
De parabo-  
la directrice,  
& de illius  
relate ad  
istam præci-  
pua pro-  
prietatibus.  
FIG. 62.

IV. Iisdem, ut supra, manentibus, erigatur modo ex puncto T, in quo tangens ET secat axem AB, perpendicularis ad ipsum axem TV. Et, quemadmodum perpendicularem istam TV parabolæ *directricem* deinceps appellabimus, sic *relate ad eam plures parabolæ proprietates competant.*

Nimirum primo demissa ad directricem perpendiculari EF, erit, ut EF ad EG, ita AT ad AG. Nam, ob parallelogrammum FG, duæ EF, GT inter se sunt æquales. Quare erit, ut EF ad EG, ita GT ad EG. Sed, ob triangula æquiangula TGE, TAX, GT est ad EG, ut AT ad AX. Et, ob æquales AX, AG, ut est AT ad AX, ita est AT ad AG. Quare erit ex æquali, ut EF ad EG, ita AT ad AG.

Secundo, demissa ex alio quovis parabolæ puncto M ad eandem directricem perpendiculari MS, erit, ut MS ad MG, ita AT ad AG. Nam, ducta ad axem ordinata MN, eaque producta ad tangentem usque in puncto R; erit, ut TN ad NR, ita AT ad AX, sive AG. Sed TN est ad NR, ut MS ad MG; quum sint æquales, tam duæ TN, MS, quam duæ NR, MG. Igitur erit ex æquali, ut MS, ad



ad MG, ita AT ad AG.

Tertio, si duo in parabola capiantur puncta M, & P, & ex iis perpendiculares ad directricem demittantur MS, PQ; erit, ut MS ad PQ, ita MG ad PG. Nam in eadem ratione, quam habet AT ad AG, est, tam MS ad MG, quam PQ ad PG. Igitur erit ex æquali, ut MS ad MG, ita PQ ad PG; & permutando erit etiam, ut MS ad PQ, ita MG ad PG.

Denique, si ex iisdem punctis M, & P ducantur ad directricem aliæ duæ rectæ MI, PL, quæ inter se sint parallelæ; erit quoque, ut MI ad PL, ita MG ad PG. Nam, ob triangula æquiangula MSI, PQL, ut est MI ad PL, ita est MS ad PQ. Sed, ex ostensis, MS est ad PQ, ut est MG ad PG. Igitur erit ex æquali, ut MI ad PL, ita MG ad PG.

V. Recta igitur, quæ ex quolibet parabolæ puncto perpendiculariter demittitur ad directricem, est ad rectam, quæ ex eodem puncto ducitur ad focum G, in eadem illa ratione, quam habet AT ad AG. Sed *circa proprietatem istam illud occurrit notatu dignum.*

V.  
Monitum  
circa princi-  
paliorum  
proprietatem  
parabola re-  
late ad di-  
rectricem.

FIG. 62.

Nimirum, quod ratio, quam habet AT ad AG, quemadmodum in ellipsi est majoris ad minus, & in hyperbola minoris ad majus, sic in parabola sit æqualitatis; adeoque perpendicularis, demissa ad directricem, erit semper æqualis rectæ, quæ ducitur ad focum G.

Neque vero difficile id erit ostendere. Nam, ex constructione, recta ET contingit parabolam in E. Quare, quum EG incidat ex puncto contactus E perpendiculariter super axem

140 SECTIONUM CONICARUM  
 axem AB; per ea, quæ superius ostensa sunt,  
 omnino necesse est, ut duæ AT, AG inter se  
 sint æquales.

VI.  
 Lemma pro  
 ostendenda  
 singulari pa-  
 rabola re-  
 late ad di-  
 rectricem  
 proprietate.  
 FIG. 63.

VI. Ad directricem parabolæ alia etiam  
 proprietas pertinet valde singularis. Sed ad  
 eam ostendendam, *sternendum est prius, velut*  
*lemma, sequens theorema*, quod si ad aliquod  
 parabolæ punctum M ducatur tangens MS,  
 conveniens cum axe AB in puncto S, & ex  
 puncto contactus M demittatur ad eundem  
 axem ordinata MO; quod, inquam, duæ TS,  
 GO inter se sint æquales.

Quum enim recta ET contingat parabo-  
 lam, & ex puncto contactus E ducta sit ad  
 axem ordinata EG; erunt duæ AT, AG æ-  
 quales inter se. Et similiter, quoniam recta  
 MS est tangens parabolæ, & ex puncto con-  
 tactus M ducta est ad axem ordinata MO;  
 erunt duæ AS, AO pariter æquales inter se.  
 Unde erit etiam differentia duarum AT, AS  
 æqualis differentiæ duarum AG, AO; hoc est  
 TS æqualis ipsi GO.

VII.  
 Lemmatis  
 precedentis  
 corollarium  
 primum.  
 FIG. 63.

VII. Hinc autem *sequitur primo*; quod si  
 eadem tangens MS conveniat cum directrice  
 TV in puncto K, & super tangente MS per-  
 pendicularis erigatur MP, rectangulum ex  
 MO in TK sit æquale rectangulo POG.

Quum enim triangulum PMS sit re-  
 ctangulum in M, & ex angulo recto demissa  
 sit ad hypotenusam perpendicularis MO;  
 erit, ut PO ad MO, ita MO ad OS. Sed MO  
 est ad OS, ut TK ad TS; & TK est ad TS, ut  
 TK ad GO. Quare erit ex æquali, ut PO ad  
 MO, ita TK ad GO; & propterea rectangu-  
 lum

lum ex MO in TK æquale erit rectangulo PGO.

VIII. Unde *sequitur secundo*, quod idem rectangulum ex MO in TK sit æquale quoque rectangulo TGO.

VIII.  
Corollarium  
secundum.  
FIG.63.

Quum enim recta MP sit perpendicularis ad tangentem MS, erit portio axis PO æqualis dimidio parametri ejusdem axis, & consequenter dupla portionis AG. Sed, propter tangentem ET, ejusdem AG dupla est quoque ipsa TG. Quare duæ PO, TG æquales erunt inter se.

Hinc æqualia erunt pariter rectangula POG, TGO. Sed rectangulum ex MN in TK ostensum est æquale rectangulo POG. Quare idem rectangulum ex MN in TK erit etiam æquale rectangulo TGO.

IX. Atque hinc *sequitur demum*, quod junctis rectis GK, GM, rectus sit angulus KGM, qui sub iis continetur.

IX.  
Corollarium  
tertium.  
FIG.63.

Quum enim ostensum sit, rectangulum ex MO in TK æquale rectangulo TGO; erit, ut TG ad TK, ita MO ad GO. Unde triangula duo rectangula GTK, MOG habebunt circa angulos rectos latera proportionalia; & consequenter æquiangula erunt.

Angulus igitur T GK æqualis erit angulo GMO. Unde, appposito communi OGM, erunt duo anguli T GK, OGM æquales duobus angulis GMO, OGM. Sed isti duo simul sumpti unum rectum adæquant. Quare etiam uni recto æquales erunt priores duo; atque adeo angulus KGM pariter rectus erit.

X. His præmissis, *facile modo erit ostendere*

X.  
Parabola

relate ad di-  
rectricem  
singularis  
proprietas  
demonstra-  
tur.

FIG. 63.

deve proprietatem illam singularem, quæ pertinet ad directricem parabolæ. Illiusmodi proprietas hæc est, quod si per focum  $G$  ducatur recta  $MN$ , utrinque ad parabolam terminata, & rectæ  $MS$ ,  $NX$  contingant parabolam in punctis  $M$ , &  $N$ ; tangentes istæ super directricem  $TV$  sibi mutuo occurrant.

Si enim fieri potest, secent tangentes illæ directricem  $TV$  in punctis diversis: nimirum tangens quidem  $MS$  in puncto  $K$ , tangens vero  $NX$  in puncto  $I$ . Tum jungantur rectæ  $GK$ ,  $GI$ .

Et quoniam recta  $MK$  est tangens parabolæ, eaque occurrit directrici in puncto  $K$ ; erit angulus  $KCM$  rectus; adeoque rectus pariter angulus  $KGN$ , qui ad partem alteram existit.

Eadem ratione, quia recta  $NX$  est tangens parabolæ, eademque secat directricem in puncto  $I$ ; erit angulus  $IGN$  similiter rectus. Unde duo anguli  $KGN$ ,  $IGN$  æquales erunt inter se. Quod fieri non potest.

XI.

Alia parabola relate ad directricem elegans proprietas ostenditur.

FIG. 63.

XI. Hinc vero alia etiam proprietas valde elegans fuit: nimirum, quod si per focum  $G$  ducatur recta  $MN$ , utrinque ad parabolam terminata; & actis tangentibus  $MK$ ,  $NK$ , sibi mutuo occurrentibus in  $K$ , jungatur recta  $GK$ ; hæc perpendicularis esse debeat ad ipsam  $MN$ .

Referat namque recta  $TV$  directricem parabolæ. Et, per ostensam proprietatem, in ea locabitur punctum  $K$ , in quo tangentes duæ sibi mutuo occurrunt. Unde per ea, quæ paulo ante ostensa sunt, omnino necesse est,

ut

ut rectus sit uterque angulorum  $KGM$ ,  $KGN$ , atque adeo, ut ipsa  $GK$  perpendicularis sit ad rectam  $MN$ .

Hoc idem erui quoque potest ex proprietate illa generali, superius ostensa, quod recta  $GK$  bifariam dividat angulum, contentum sub rectis  $GM$ ,  $GN$ . Inde enim sequitur, eandem rectam  $GK$  æquales semper angulos constituere cum rectis  $GM$ ,  $GN$ ; atque adeo rectos esse angulos illos, ubi ipsæ  $GM$ ,  $GN$  jacent in directum.

XII. Cæterum ex iis, quæ modo ostensa sunt, *dati foco, & directrice nullo negotio ducetur tangens ad quodlibet parabolæ punctum.* Referat enim recta  $TV$  directricem parabolæ, sitque punctum  $G$  focus ejusdem. Oportet, ad punctum  $N$  tangentem ducere.

Ex foco  $G$  ad punctum  $N$  ducatur recta  $GN$ . Tum ei ex eodem foco  $G$  perpendicularis erigatur  $GK$ , conveniens cum directrice in puncto  $K$ . Jungantur denique puncta  $N$ , &  $K$  per rectam  $NK$ . Et erit recta ista  $NK$  tangens quæsitæ.

Si enim fieri potest, contingat parabolam in puncto  $N$  recta quævis alia  $NI$ , quæ conveniat cum directrice in puncto  $I$ . Tum ex foco  $G$  ad punctum  $I$  ducatur recta  $GI$ . Et, ex ostensis, rectus erit angulus  $IGN$ . Sed, ex constructione, rectus etiam est angulus  $KGN$ . Quare duo anguli  $IGN$ ,  $KGN$  æquales inter se erunt. Quod fieri non potest.

XII.

*Quomodo  
dati dire-  
ctrice, & fo-  
co parabolæ  
duci possit  
tangens ad  
punctum  
datum.*

FIG. 63.

*De Locis Geometricis , Coni  
Sectionibus terminatis.*

**P**Ræcipuis sectionum conicarum proprietatibus ostensis; sequitur modo, ut compositionem aggrediamur locorum geometricorum, quæ conicis sectionibus terminantur: quo nempe deinceps easdem coni sectiones ad constructionem problematum solidorum traducere possimus. Sed priusquam huic operi manum admoveamus, ratio postulat, ut paucis explicemus, quid veniat nomine loci geometrici; tum item, ut varias locorum species aperiamus, quas veteres Geometræ distinguebant.

C A P. I.

*Quid loci geometrici nomine  
veniat, & quot ejus spe-  
cies distinguantur.*

I.  
De differentiis proble-  
matum geo-  
metricorum.

**I.** **L**Ocus geometricus vocatur *series illa punctorum, quibus alicui problemati geometrico, indeterminate proposito, satisfieri potest.* Unde non aliter intelligere licebit, quid veniat nomine loci geometrici, quam cognitis prius differentiis problematum geometricorum.

Hunc

Hunc in finem sciendum est primo, *problemata geometrica, non secus ac omnia quævis, duplicis speciei esse: alia nimirum determinata, quæ solutionum diversarum determinatum numerum admittunt; & alia indeterminata, quæ infinitis plane modis diversis solvi possunt.*

Ita, si punctum in recta quærat, quod subinde eam dividat, ut rectangulum, sub segmentis ejus contentum, alterius rectæ datæ quadratum adæquet: problema erit determinatum; quia duo tantum puncta licebit invenire, quibus quæsitæ divisioni satisfiat: quæ etiam coibunt in unum, si altera recta data prioris semissem adæquet.

Sed, si oporteat, in data recta punctum invenire, quod adeo illam dispescat, ut quadrata, quæ fiunt ex tota, & parte una, sint æqualia rectangulo, bis contento sub tota, & dicta parte, una cum quadrato partis alterius: problema erit indeterminatum; quia, ut ostensum est ab Euclide in Elementis, singula datæ rectæ puncta quæsitæ divisioni satisfaciunt.

II. Ut hæc problematum geometricorum distinctio clarius intelligatur, sciendum est *insuper, in omni problemate duo necessario contineri: scilicet notum, seu datum; & incognitum, seu quæsitum.* Nam ea est finitæ nostræ mentis indoles, ut quod incognitum est, dumtaxat ex cognitis quibusdam conditionibus, eruere valeamus.

II.  
*Quid in omni problemate debeat contineri, & unde eorum genera oriuntur.*

Jam, quemadmodum plerumque, præter conditiones, ad problematis solutionem necessarias, aliæ etiam adjunguntur, omnino

146 SECTIONUM CONICARUM  
 superfluae, & ut plurimum rejiciendae, quo  
 problematis solutio possit obtineri; ita quan-  
 doque nec omnes apponuntur conditiones, ad  
 problematis solutionem necessariae: qua ratio-  
 ne problema indeterminatum redditur, & in-  
 finitas solutiones diversas admittet.

Ex quo liquet, problematum tria pro-  
 prie genera dari: alia scilicet determinata,  
 quae omnes continent conditiones, ad ipso-  
 rum solutionem necessarias; alia determina-  
 ta, in quibus non omnes adsunt conditiones,  
 quae ad eorum solutionem requiruntur; &  
 alia demum plusquam determinata, in quibus  
 multo plures conditiones sunt appositae,  
 quam quae illorum solutioni inserviunt.

III.  
 Quomodo  
 problema-  
 sum genera  
 ex datorum,  
 quæstorumq;  
 numero di-  
 gnoscuntur.

III. Sed notetur hic velim, quod *tria ista*  
*problematum genera ex datorum, quæstorum-*  
*que numero nullo negotio dignoscantur.* Ubi  
 enim numerus datorum adæquat numerum  
 quæstorum; problema erit determinatum.  
 Ubi vero data sunt pauciora quæstis; pro-  
 blema erit indeterminatum. Ac demum, ubi  
 quæstis sunt pauciora datis; problema erit  
 plusquam determinatum.

Ita, si rectangulum quærat, quod sit  
 æquale dato quadrato, & cujus latera simul  
 sumpta datam rectam adæquent: problema  
 erit determinatum; quia, sicuti duo sunt pro-  
 blematis data, sic duo etiam sunt ejusdem  
 quæstis: scilicet latera duo, quæ optatum re-  
 ctangulum debent continere.

Sed, si ex eodem problemate auferatur  
 una conditio, puta, quod latera rectanguli in-  
 veniendi debeant simul sumpta datam rectam  
 adæ-



adæquare, & dumtaxat quærat<sup>r</sup> rectangu-  
lum, quod sit æquale dato quadrato: proble-  
ma erit indeterminatum; quia unum quidem  
est datum, quæsitæ vero sunt duo.

Et denique, si eidem problemati, præter  
duas illas conditiones, adjungatur quoque  
tertia, veluti, quod latera rectanguli inve-  
niendi debeant ad invicem datam rationem  
habere: problema erit plusquam determina-  
tum; quum in eo tria quidem sint data, duo  
vero quæsitæ.

IV. Quum calculo litterali, seu specioso  
problematis resolutio peragitur, *innotescit*  
*natura ejus, per numerum æquationum, quæ*  
*nobis sese offerunt.* Si enim, perlustratis singu-  
lis conditionibus, in problemate appositis,  
tot inveniuntur æquationes, quot occurrunt  
quantitates incognitæ; problema erit deter-  
minatum. Sed, si numerus æquationum minor  
sit numero incognitarum; problema erit in-  
determinatum. Et denique idem problema  
erit plusquam determinatum, si numerus æ-  
quationum incognitarum numerum excedat.

IV.  
*Quomodo*  
*natura pro-*  
*blematis in-*  
*notescit per*  
*numerum æ-*  
*quationum,*  
*quæ nobis se-*  
*se offerunt.*

Ut enim notum est, æquationes inve-  
niuntur per ipsas conditiones, quæ in pro-  
blemate apponuntur: adeo quidem, ut quæli-  
bet conditio suam nobis æquationem largia-  
tur. Unde omnino necesse est, ut in proble-  
mate determinato tot æquationes invenian-  
tur, quot fuerint incognitæ quantitates as-  
sumptæ; quandoquidem, pro determinandis  
singulis incognitis, tot in eo conditiones ap-  
poni debent, quotus est ipse numerus inco-  
gnitarum.

K 2

Ob

Ob eandem autem rationem in problemate indeterminato numerus æquationum minor esse debet numero incognitarum; quia in eo non omnes apponuntur conditiones, quæ ad determinationem singularum incognitarum requiruntur. Et vice versa in problemate plusquam determinato, ob conditiones superfluas, quas habet appositas, necesse est, ut numerus æquationum incognitarum numerum excedat.

V.  
Qua ratione Veteres problematum genera distinguebant, & quibus ea nominibus appellabant.

V. Quemadmodum autem problema *proprie* vocatur illud, quod determinatum est, certisque tantum modis solvi potest; ita inter problema indeterminatum, & problema plusquam determinatum *illud discriminis inest*, quod primum, ob deficientes conditiones, sit capax infinitarum solutionum; alterum, ob conditiones superfluas, sæpe sæpius pugnantes cum necessariis, nullam ut plurimum solutionem admittat.

Has omnes problematum differentias satis explicat Proclus libro tertio suorum commentariorum in primum librum Elementorum Euclidis. Et, eodem referente, vocabant Veteres problema *deficiens*, quod indeterminatum est, nec omnes continet conditiones, ad solutionem ejus necessarias. Vocabant vero problema *excedens*, seu *redundans*, quod est plusquam determinatum, & multo plures continet conditiones, quam quæ ad solutionem ejus requiruntur.

Sed *excedentium* problematum, ut idem Proclus est auctor, duas adhuc species Veteres distinguebant. Quæ enim problemata in-

con.

congruentibus, pugnantibusque conditionibus redundant; *impossibilia* appellabant, quia omnino solvi non possunt. Quæ vero abundant conditionibus, sibi mutuo conspirantibus; dicebant *problemata majora*, ut ab indeterminatis distinguerentur, quæ *minora* vicissim appellabant.

VI. Etsi autem istæ omnes sint *problematum* differentiæ, attamen Geometriæ *problematis nomine illud proprie vocant, quod determinatum est, certumque solutionum numerum admittit.* Nec alia ratione ea, quæ sunt indeterminata, sub ipsorum contemplationem veniunt, quam ut eorum ope determinatis satisfiat, quæ præcipuum Geometriæ objectum constituunt.

VI.  
Quod *problemata* indeterminata solutioni *problematum* determinatorum inseriunt.

Quum enim *problemata* indeterminata infinitas solutiones admittant; utique inter eas necesse est, ut reperiantur solutiones peculiare *problematum* determinatorum, quæ ejusdem speciei sunt. Unde, nactis semel infinitis illorum solutionibus, non aliud fieri debet, quum de istis est quæstio, quam eas excerpere, quæ ipsis correspondent, suasque conditiones adimplent.

Ita, quotiescunque, exempli gratia, super recta data constituta sunt omnia triangula isoscelia; omnino necesse est, ut inter ea reperiatur triangulum illud isosceles, quod habet quoque datam altitudinem. Unde, quum quæstio est de constituendo triangulo isoscele, cujus data sit, tam basis, quam altitudo; satis erit, ad infinita illa triangula isoscelia confugere, & inter ea illud eligere, cui data competit altitudo.

K 3 VII.

VII.  
*Quorsum  
 tendit com-  
 positio loco-  
 rum geome-  
 tricorum, o-  
 stenditur.*

VII. Quum mens nostra finita sit, ac limitata; utique infinitas solutiones, quarum capax est problema aliquod indeterminatum, sigillatim percurrere nequit. Hinc *speciali quodam artificio* opus est, ut eæ omnes in unum colligi possint, atque ita collectæ continuo præsentibus haberi. Præstant id igitur *Geometrix compositione locorum geometricorum*; nam ea mediante infinitas illas solutiones certis limitibus claudunt.

Id ut clarius intelligatur, juvat prius advertere, nullum esse problema geometricum, quod ad puncti alicujus positionem determinandam revocari non possit. Unde, quotiescumque problema est natura sua indeterminatum, tunc infinita hujusmodi puncta debent definiri: & propterea habebuntur infinitæ ejus solutiones, determinando locum, in quo infinita illa puncta reperiuntur.

Hac ratione, si super data recta linea constituendum sit triangulum isosceles; res eo redit, ut vertex ejus trianguli reperiatur. Quemadmodum autem infinita esse queunt illiusmodi triangula, ita infinitus quoque erit numerus punctorum, quæ quæsitum verticem nobis exhibebunt. Sed perspicuum est, omnia illa puncta reperiri in linea recta, quæ secat bifariam, & ad angulos rectos rectam lineam datam.

VIII.  
*Quid sit locus  
 geometricus, &  
 quot locorum  
 genera dis-  
 tingui possint*

VIII. Id quum ita sit, liquet, *locum geometricum non aliud esse, quam sedem omnium illorum punctorum, quæ alicui problemati indeterminato satisfaciunt*. Et quoniam hujusmodi sedes potest esse, vel linea, vel superficies

cies, vel solidum; tria hinc locorum genera Veteres distinguebant, & eorum alia *ad lineam*, alia *ad superficiem*, & alia demum *ad solidum* appellabant.

Ut tres istæ locorum species rectius intelligantur, meminisse oportet, problema esse indeterminatum, quum non omnes apponuntur conditiones, ad problematis solutionem necessariæ. Hinc itaque fit, ut non omnia loca geometrica ejusdem speciei sint. Nam, deficiente una tantum conditione, locus erit ad lineam; deficientibus duabus conditionibus, locus erit ad superficiem; & denique, ubi tres in problemate desunt conditiones, locus erit ad solidum.

Possunt etiam tres istæ locorum species a se mutuo distingui per æquationem, quæ omnes ipsius problematis indeterminati conditiones includit. Ubi enim hujusmodi æquatio duas continet incognitas, locus erit ad lineam; quia ad determinationem problematis una tantum conditio deest. Quotiescumque vero in eadem æquatione tres occurrunt incognitæ, locus erit ad superficiem; quia pro determinando problemate duæ requiruntur conditiones. Et denique, quum æquatio quatuor incognitas complectitur, locus erit ad solidum; quia tribus conditionibus opus est, ut problema determinatum evadat.

IX. Et sane, quod æquatio, duabus incognitis constans, loco ad lineam debeat explicari, ostendi potest generaliter in hunc modum, Sint  $x$ , &  $y$  binæ æquationis incognitæ. Jam utraque harum incognitarum infinitos valo-

IX.  
De loca ad  
lineam, &  
quomodo hu-  
jusmodi lo-  
cus oriatur.

152 SECTIONUM CONICARUM  
res admittit. Sed una ex iis determinata, ne-  
cesse est, ut altera quoque suam determinatio-  
nem acquirat.

FIG. 64.

Referant itaque portiones AN rectæ alicujus AB valores omnes incognitæ  $x$ . Et cuique earum correspondebit incognita alte-  
ra  $y$  determinato valore. Ducantur ergo per singula puncta N parallelæ totidem NM, quæ referant valores correspondentes incognitæ  $y$ . Et linea, transiens per extremitates ipsarum NM, locus erit quæsitus.

Notetur autem hoc loco velim, quod quum simpliciter de explicanda æquatione agitur; angulus ANM potest ad libitum assumi. Sed, si una cum æquatione satisfaciendum sit quoque problemati, unde ea fluxit æquatio; tunc angulus ille talis oportet magnitudinis capiatur, qualem ipsum exigit problema.

Nec silentio hic præteribimus, quod in priore casu licebit quandoque angulum illum ANM talem assumere, ut rectæ NM, vel sint in directum cum ipsis AN, vel cadant ad partem oppositam: nimirum, quum dando eis positionem istam, ad unum idemque punctum omnes terminantur. Sed non ideo locus dicendus erit *ad punctum*, ut qui per extremitates alias N proprie constituetur.

X.  
De loco ad  
superficiem,  
& qua ra-  
tione locus  
iste produca-  
tur.

FIG. 65.

X. Similiter, quod æquatio, tribus incognitis constans, loco ad superficiem debeat explicari, ostendetur generaliter hac ratione. Sint  $x, y, z$  tres æquationis incognitæ. Referant adhuc portiones AN rectæ alicujus AB valores omnes incognitæ  $x$ . Et cuique earum, tam

tam  $y$ , quam  $z$  infinitis adhuc valoribus correspondebit.

Ductis igitur per singula puncta  $N$  parallelis  $NX$ , capiantur super iis portiones  $NM$ , quæ referant infinitos valores, quibus incognita  $y$  ipsis  $AN$  correspondet. Et quoniam cuique istarum  $NM$  correspondet  $z$  determinato valore, erigantur ex punctis  $M$  parallelæ  $MO$ , quæ referant valores illos, & datum cum subjecto plano angulum constituent. Et superficies, ad quam terminantur omnia puncta  $O$ , locus erit quæsitus.

Sed hic quoque notare oportet, quod quum simpliciter quæstio est de explicanda æquatione; tunc ad libitum potest assumi, tam angulus  $ANM$ , quam angulus, quem rectæ  $MO$  cum subjecto plano constituunt. Verum, si una cum æquatione satisfaciendum sit quoque problemati, unde ea fluxit æquatio; tunc uterque angulus talis oportet magnitudinis capiatur, qualem ipsum problema requirit.

Nec item hoc loco reticebimus, quod in priore casu licebit quandoque angulum, quem rectæ  $MO$  cum subjecto plano constituunt, indefinite parvum assumere, & in eodem illo plano ducere rectas  $MO$ : nimirum, quum dando eis positionem istam, ad unam, eandemque lineam omnes, quotquot fuerint, terminantur. Sed non ideo locus dicendus erit *ad lineam*, ut qui per extremitates alias  $M$  proprie constituetur.

XI. Non dissimili ratione ostendemus quoque, quod æquatio, quatuor constans incogni-

XI.  
De loco ad  
solidum, &

qualis sit or-  
tus ipsius.

FIG. 66.

*gnitis, debeat loco ad solidum explicari.* Sint enim  $x, y, z, u$  quatuor æquationis incognitæ. Referant portiones AN rectæ alicujus AB valores omnes incognitæ  $x$ . Tum, ductis parallelis NX, designent portiones NM harum parallelarum infinitos valores, quibus incognita  $y$  ipsis AN correspondet. Et cuique istarum NM tam  $z$ , quam  $u$  infinitis adhuc valoribus correspondebit.

Erigantur ergo ex punctis M parallelæ MZ, quæ datum cum subjecto plano angulum constituent. Et capiantur super iis portiones MO, quæ referant infinitos valores, quibus incognita  $z$  ipsis AN correspondet. Quumque demum cuique istarum MO respondeat  $u$  determinato valore; ducantur ex punctis O parallelæ aliæ OR, quæ referant valores illos, datumque angulum constituent cum ipsis MO. Et solidum, inde ortum, illud erit, quod quæritur.

Sed notetur hic velim, hujusmodi solidum tunc tantum usui nobis esse, quum rectæ OR ad unam eandemque superficiem omnes terminantur. Et ratio est, quia in solo isto casu, ope ejus solidi, propositæ æquationi satisfieri potest. Nec tamen idcirco locus dicendus erit *ad superficiem*, ut qui non jam per puncta R, sed per extremitates alias O proprie constituetur.

XII.  
Constitutio  
cujusvis loci  
geometrici  
paulo cla-  
rius ostendi-  
tur.

XII. Hinc, ut plenius natura loci geometrici intelligatur, sciendum est ulterius, quod, sicuti fit locus loco geometrico, quum æquatio, ex problemate orta, duas, aut plures continet incognitas; sic *ipsius loci constitutio*



tio talis esse debeat, ut per quodlibet ejus punctum omnes simul æquationis incognitæ determinentur.

Nec obscura est hujus rei ratio. Debet siquidem unoquoque loci puncto fieri satis æquationi, ex problemate ortæ. Plane vero, quum æquatio pluribus constat incognitis, non aliter ei fiet satis, quam determinando simul singulas incognitas, quæ in illa continentur. Quare omnino necesse est, ut per quodlibet loci punctum omnes æquationis incognitæ simul definiantur.

Id quum ita sit, facile modo erit intelligere, cur in loco ad solidum rectæ OR debeant ad unam, eandemque superficiem omnes terminari, quo possit nobis usui esse: nimirum, quia dumtaxat in hoc casu quodlibet loci punctum potis est, definire simul omnes æquationis incognitas. Et quoniam hunc effectum præstant puncta O; hinc etiam est, ut per hujusmodi puncta proprie locus constituatur.

FIG. 66.

Ob eandem autem rationem, quum in loco ad superficiem rectæ MO ad unam, eandemque lineam omnes terminantur, constituetur locus per puncta M; quia ista puncta sumi debent, ut omnes æquationis incognitæ simul determinentur. Atque ita quoque, quum in loco ad lineam rectæ NM ad unum, idemque punctum omnes terminantur, constituent locum puncta N; quia his mediantibus utraque æquationis incognita simul definitur.

FIG. 65.

FIG. 64.

XIII. Jam, ut demonstrationes illæ generales casibus specialibus possint applicari, non aliud requiritur, quam, ut in solutione cujusque

XIII.  
Quomodo  
tradita generalis  
nesis locorum  
casibus

que

*speculibus  
debeat ap-  
plicari.*

que problematis indeterminati pro incognitis capiantur rectæ illæ, quæ extremitatibus suis sibi mutuo occurrunt, & occurſu illo datum angulum conſtituunt. Nam in tradita locorum geneſi non aliæ, quam iſtæ conditiones, exiguntur.

FIG. 67.  
68.

In plano aliquo detur, tum poſitione, cum magnitudine recta AB. Et extra eam oporteat invenire punctum aliquod, ita ut rectæ, quæ exinde inclinantur ad terminos ipſius AB, rectum angulum comprehendant. In hoc problemate duo caſus ſunt diſtinguendi. Vel enim inveniendum eſt punctum in eodem illo plano, in quo data eſt recta AB; vel extra planum illud tale punctum oportet invenire.

FIG. 67.

In priore caſu ſit M punctum quæſitum, ex quo demittatur ſuper AB perpendicularis MN. Tum capiantur pro incognitis ipſæ AN, MN, quæ extremitatibus ſuis ſibi mutuo occurrunt, & occurſu illo rectum angulum conſtituunt. Quem in finem, poſita  $AB = a$ , fiat  $AN = x$ , &  $MN = y$ . Quumque, ob angulum rectum AMB, quadratum ex MN ſit æquale rectangulo ANB, erit  $yy = ax \rightarrow xx$  propoſiti problematis æquatio.

FIG. 68.

In ſecundo caſu ſit O punctum, quod quæritur, ex quo demiffa ad planum ſubjectum perpendicularis OM, ducatur ex puncto M ſuper AB perpendicularis alia MN. Et poſita adhuc  $AB = a$ , fiat  $AN = x$ ,  $MN = y$ , &  $MO = z$ . Jungatur poſtea ON. Et quoniam eidem ON quadrato æquale eſt, tam rectangulum ANB, quam ſumma quadratorum MN, MO; erunt quadrata duo MN, MO æqua.

æqualia rectangulo ANB: & propterea problematis æquatio erit  $yy \mp zz = ax - xx$ .

In utroque autem casu, perspicuum est, problema esse indeterminatum, & locum fieri loco geometrico. Sed ex tradita locorum genesi liquet etiam, locum esse ad lineam, quum æquatio problematis est  $yy = ax - xx$ ; esse vero ad superficiem, quum eadem æquatio est  $yy \mp zz = ax - xx$ . Nam illa quidem duas continet incognitas, in ista vero tres incognitæ comprehenduntur.

XIV. Cæterum, haud quidem putandum est, loca geometrica expositis rationibus componi debere; sed fiet eorum compositio, definiendo limites, quibus loca ipsa terminantur. Ita in allato problemate, quum æquatio est  $yy = ax - xx$ , verum quidem est, quod capiendo super AB valores omnes incognitæ  $x$ , & applicando eis ad angulos rectos valores correspondentes alterius incognitæ  $y$ , oriatur locus ad lineam; nihilo tamen minus ejus compositio fiet, describendo lineam, ad quam ipse locus nos manuducit.

XIV.  
Quo pacto  
locorum geo-  
metricorum  
compositio  
proprie pe-  
ragi debeat  
FIG.67.

Simili ratione, quum ejusdem problematis æquatio est  $yy \mp zz = ax - xx$ , etsi oriatur locus ad superficiem, capiendo super AB valores omnes incognitæ  $x$ , applicando eis ad rectos angulos valores correspondentes incognitæ  $y$ , tumque demum erigendo normaliter ad subjectum planum valores tertiæ incognitæ  $z$ ; attamen loci compositio fiet proprie, describendo superficiem, per quam locus ipse terminatur.

FIG.68.

Hinc locorum compositio duo quidem præ-

158 SECTIONUM CONICARUM  
 præsupponit. Primum est cognitio proprietatum, quæ lineis, superficiebus, & solidis competunt. Alterum est ratio describendi lineas, superficies, & solida. Horum utrumque ad illam pertinet Geometriæ partem, quæ *Elementaris* appellatur. Et ea, quæ *de compositione locorum* edisserit, non nisi post partem illam elementarem est addiscenda: quæ tamen eo tendit, ut ope ejus partem Geometriæ nobiliorum, quæ *de solutione problematum* agit, tandem assequi liceat.

Tres istas Geometriæ partes, tum item alterius ad alteram subordinationem satis indicat Pappus initio libri septimi suarum collectionum. Ibi enim scribens ad Filium Hermodorum: *locus, inquit, qui vocatur resolutus, ut summam dicam, propria quædam est materia, post communium Elementorum constitutionem, iis parata, qui in geometricis sibi comparare volunt vim, ac facultatem inveniendi problemata, quæ ipsis proponuntur; atque hujus tantummodo utilitatis gratia inventa est.*

XV.  
 Qua ratione  
 per calculum proprie-  
 tates linearum, superficierum, aut solidorum innotescunt.

XV. Nolo autem hoc loco reticere, quod *calculi litteralis* ope facile sit quidem inquirere, num alicui lineæ, superficiei, aut solido data quædam proprietas competat. Si enim, adhibita ea proprietate, talis inveniatur æquatio, ut ab utraque parte eadem quantitas occurrat; indicio erit, illiusmodi proprietatem revera ei competere. Quod si autem secus contigerit; nec item illa proprietas ad eam lineam, superficiem, aut solidum poterit pertinere.

FIG. 67. Sit AB circuli alicujus diameter, cujus cen.

centrum sit punctum C. Et quærat, num demissa super AB ex aliquo circumferentiæ puncto M perpendiculari MN, sit MN quadratum æquale rectangulo ANB. Ponatur  $CA = a$ ,  $CN = x$ , &  $MN = y$ . Quumque hac ratione fiat  $AN = a - x$ , &  $BN = a + x$ ; erit rectangulum ANB  $= aa - xx$ . Quare posito, quod MN quadratum sit æquale rectangulo ANB, erit  $yy = aa - xx$ .

Jam, propter circulum, duæ CA, CM inter se sunt æquales. Quare, sicuti CM quadratum est æquale duobus quadratis CN, NM; ita iisdem quadratis æquale quoque erit quadratum ex CA. Hinc erit  $aa = xx + yy$ . Et, posito loco yy valore ejus  $aa - xx$ , erit quoque  $aa = xx + aa - xx$ , hoc est  $aa = aa$ . Unde, quum ab utraque æquationis parte eadem quantitas reperiat; consequens est, ut MN quadratum sit revera æquale rectangulo ANB.

Hinc notetur hoc loco velim, quod si circa aliquam lineam, superficiem, aut solidum proponatur problema aliquod, & in ejus resolutione talis inveniatur æquatio, ut ab utraque parte eadem quantitas occurrat; tunc illud non erit problema, sed theorema. Nam, ob illiusmodi æquationem, id quod quæritur in problemate, verum erit relate ad quodlibet punctum ejus lineæ, superficiem, aut solidi; adeoque velut proprietas ipsius universalis debet haberi.

CAP.

## C A P. II.

*De divisione locorum ad lineam, & quomodo ea construi possint.*

I.  
*Quod loca ad lineam, pro qualitate linearum, in varias classes distinguere possint.*

I. **Q**UAMQUAM locorum geometricorum tria genera distinguantur, & eorum alia vocentur ad lineam, alia ad superficiem, & alia demum ad solidum; in constructione tamen problematum determinatorum non alia loca a Geometris adhibentur, quam quæ prioris sunt generis, & loca ad lineam dicuntur. Unde etiam, quum *simpliciter, & absolute* loca vocant geometrica, non alia veniunt apud ipsos, quam quæ linearum longitudinibus terminantur.

Hujusmodi autem loca *non omnia ejusdem speciei sunt, sed pro qualitate linearum, quas pro suis terminis habent, in varias classes distinguere possunt.* Dantur enim loca nonnulla, quæ lineis rectis terminantur. Sed dantur etiam loca alia, quæ lineas curvas, velut suos terminos, agnoscunt. Quumque lineæ curvæ possint esse infinitarum specierum; infinita etiam erit diversitas locorum, quæ lineis curvis circumscribuntur.

Hinc, ut rectius intelligatur, qua ratione loca geometrica, lineis terminata, in certas classes distinguere possint; operæ pretium est  
 prius

prius ostendere, quo pacto recentiores Geometræ naturam cujuscumque lineæ definiunt, & quomodo omnem illarum molem in varia genera dispescunt. Nam profecto ex variis generibus linearum, quibus loca terminantur, fit, ut ipsa quoque loca in varios ordines distinguantur.

II. Itaque recentiores Geometræ non alia ratione naturam cujuscumque lineæ definiunt, quam referendo ejus puncta omnia ad puncta alia rectæ alicujus positione datæ, & inveniendo æquationem, quæ relationem illam nobis ostendat. Ut, si AM sit lineæ, de qua agitur, ex singulis ejus punctis ducunt ad rectam aliam quam positione datam AB parallelas totidem MN, & definiunt naturam illius per relationem, quam habet quælibet earum parallelarum MN ad portionem correspondentem AN.

II.  
Quomodo  
natura cujuscumque  
lineæ a recentioribus  
Geometris definitur.

FIG. 69.

Supponatur namque, si placet, lineæ illa descripta per intersectionem duarum regularum AX, BZ, quæ ita quidem revolvantur circa puncta A, & B, ut erecta super AB perpendiculari AC, sit angulus ABZ perpetuo æqualis angulo CAX. Et fingamus quoque, rectas MN, quæ ordinatæ dicuntur, parallelas esse ipsi AC; adeoque perpendiculares super portionibus AN, quæ vocantur abscissæ.

Quia igitur angulus ABZ æqualis est angulo CAX: appposito communi BAX, erunt duo anguli ABZ, BAX æquales toti angulo BAC. Sed angulus BAC est rectus, ex hypothesis. Quare etiam uni recto æquales erunt duo anguli ABZ, BAX: & propterea tertius angulus AMB etiam rectus erit. Unde, quum

ex angulo recto M demissa sit ad hypothenusam AB perpendicularis MN; erit MN quadratum æquale rectangulo ANB.

Hinc, quemadmodum abunde liquet, lineam AM esse circuli circumferentiam, diametrum habentem rectam AB; ita facile quoque erit, æquationem invenire, quæ exprimat nobis relationem inter unamquamque ordinatam MN, & abscissam correspondentem AN. Ponatur enim  $AB = a$ ,  $AN = x$ , &  $MN = y$ . Erit igitur reliqua portio  $BN = a - x$ . Et quoniam MN quadratum est æquale rectangulo ANB; erit  $yy = ax - xx$  æquatio quæsitæ.

III. Sed nolo hic silentio reticere, quod *hujusmodi æquatio, exprimens relationem inter ordinatas, & abscissas correspondentes, non semper possit inveniri.* Sit enim quadratum ABCD. Et interea a clatus ejus AD fertur æquabiliter, & sibi ipsi æquidistanter versus BC, revolvatur motu etiam æquabili circa punctum B latus AB; adeo, ut in fine motus utrumque latus AD, AB reperiat eodem tempore super BC.

III. *Quod æquatio, exprimens lineam naturam, non semper possit inveniri.*

FIG. 70.

Quum sic duo illa latera feruntur, perspicuum est, continua eorum intersectione, describi lineam curvam AME. Sed, demissis ex singulis ejus punctis rectis MN, perpendicularibus super AB, frustra quæretur æquatio, exprimens relationem inter unamquamque ipsarum MN, & portionem correspondentem AN; quum nulla adsit in descripta curva proprietas, quæ ad inveniendam æquationem illam nos manuducere possit.

De



Descriptæ siquidem curvæ natura, ut ex ipsa ejus genesi liquet, hæc est, quod producta BM usque donec quadrantem AC secet in O, sit semper, ut AN ad BN, ita AO ad CO. Quare, positis  $AB = a$ ,  $AN = x$ , &  $MN = y$ , determinanda esset ope istarum quantitatum ratio arcuum AO, CO, ut optata æquatio posset haberi. Unde, quum ratio ista nequeat ullo pacto definiri, nec item optatam æquationem invenire licebit.

IV. Id quum ita sit, duo passim linearum genera distinguuntur, & ex iis aliæ dicuntur geometricæ, aliæ vero mechanicæ. Prioris generis lineæ sunt illæ, in quibus relatio ordinarum ad abscissas correspondentes æquatione aliqua potest definiri. Per contrarium vero lineæ alterius generis sunt eæ, in quibus eadem illa relatio nulla potest æquatione designari.

IV.  
Distinctio linearum in geometricas, & mechanicas explicatur.

Hanc linearum distinctionem in geometricas, & mechanicas primus omnium protulit Cartesius. Nec alias in Geometriam admitendas esse censuit, quam quæ geometricarum nomen apud ipsum sortitæ sunt; quia eæ tantum sub certam, determinatamque cadunt mensuram. Unde reliquas vocavit mechanicas; quia ad mechanicam potius eas pertinere judicavit.

Et sane, quin lineæ, mechanicæ dictæ, valde differant ab iis, quæ passim geometricæ nuncupantur, non est dubitandum. Sed non ideo illiusmodi curvæ a Geometria sunt excludendæ, quemadmodum voluit Cartesius; quandoquidem, si mente concipiantur descriptæ, ha-

habent perinde, ac lineæ ipsæ geometricæ, constantes quasdam proprietates, quæ ad omnia linearum puncta se extendent.

Huc adde, quod beneficio ejus analysis, quæ dicitur *indefinite parvorum*, etiam in lineis mechanicis reperire licet æquationem, quæ exprimat relationem ordinatarum ad abscissas correspondentes. Nec aliud sane discriminis occurrit, quam quod in iis hujusmodi æquatio ad infinitas semper dimensiones ascendat; quo factum, ut a nonnullis lineæ *transcendentes* dicerentur.

V.  
Linearum  
in certa ge-  
nera distri-  
buitio Carte-  
siana affer-  
tur, & rejici-  
tury.

V. Quemadmodum autem naturam cuiusque lineæ definiunt recentiores Geometræ per æquationem, exprimentem relationem ordinatarum ad abscissas correspondentes; sic omnem linearum molem in certa genera distinguunt, secundum numerum dimensionum, ad quas earum æquationes ascendunt.

Et Cartesius quidem genera linearum, non unica, sed duabus dimensionibus a se mutuo distinxit. Vocavit enim lineas primi generis, quarum æquationes quadratum, aut rectangulum duarum incognitarum non excedunt; vocavit lineas secundi generis, quarum natura æquationibus, ad tres, vel quatuor dimensiones ascendentibus, definitur; vocavit lineas tertii generis, quarum æquationes ad quinque, vel sex dimensiones assurgunt; atque ita deinceps.

Ut genera linearum hunc in modum a se mutuo distingueret, non aliud eum movit, quam quia, sicuti æquationes quatuor dimensionum, per regulam a Bombellio traditam, fa-  
cili

cili negotio deprimuntur ad alias, quæ tres tantum continent dimensiones; sic etiam regula possit inveniri, per quam æquationes sex dimensionum ad alias quinque, æquationes octo dimensionum ad alias septem, atque ita porro, deprimi queant.

Interim regula ista non adhuc Algebrae cultoribus innotuit. Et deinde, si eam reperire liceret, ut jam olim acutissime Fermatius adnotavit, nec etiam usui nobis esse posset ad deprimendas æquationes, quæ duas incognitas comprehendunt; cujusmodi sunt illæ, per quas linearum natura definitur. Quare consequens est, ut nullo quidem solido fundamento Cartesius genera linearum duabus dimensionibus a se mutuo distinxerit.

VI. Rectius igitur alii distinguunt linearum ordines a se invicem unica tantum dimensione. Quem in finem vocant lineas primi ordinis, quæ æquationibus simplicibus, ac unius dimensionis definiuntur; vocant lineas secundi ordinis, quarum æquationes ad duas dimensiones ascendunt; vocant lineas tertii ordinis, quarum æquationes ad tres dimensiones assurgunt; atque ita deinceps.

VI.  
Qua ratione linearum ordines distinguere debent, aperitur.

Patet autem hac ratione, dicendas esse lineas ordinis infinitesimi, quæ æquationibus, ad infinitas dimensiones ascendentibus, definiuntur. Et quoniam hujusmodi sunt lineæ illæ, quas Cartesius mechanicas appellavit; liquet, ordinem harum linearum omnes alios sub se comprehendere; nec ideo a Geometria exulem esse debere, quemadmodum Cartesius judicavit.

L 3

Jam

Jam in lineis ordinis primi nulla curva, sed sola recta continetur. Unde, si curvarum genera sint distinguenda, erunt curvæ primi generis, quarum æquationes quadratum, vel rectangulum duarum incognitarum non excedunt; erunt curvæ secundi generis, quæ æquationibus definiuntur trium dimensionum; erunt curvæ tertii generis, quarum æquationes ad quatuor dimensiones ascendunt; atque ita deinceps.

Eadem linearum distinctio repeti quoque potest a numero punctorum, in quibus a recta secari possunt. Nam generaliter æquatio cujusque lineæ ad tot dimensiones ascendit, quot sunt puncta, in quibus recta eam secare potest. Et ideo erit linea ordinis primi, quam recta secat in unico puncto; linea ordinis secundi, cui recta occurrit in duobus punctis; linea ordinis tertii, quæ in tribus punctis a recta secari potest; atque ita de aliis.

VII.  
*Quomodo  
 loca geometrica,  
 lineis terminata,  
 in certa genera  
 sunt distinguenda.*

VII. Linearum ordinibus constitutis, facile modo erit, & ipsa loca geometrica, quæ lineis terminantur, in certa genera dispersevere. Erunt enim loca primi generis, quæ lineas primi ordinis pro suis terminis habent; erunt loca secundi generis, quæ terminantur lineis ordinis secundi; erunt loca tertii generis, quæ agnoscunt ut suos terminos lineas ordinis tertii; atque ita deinceps.

Quoniam autem ad primum ordinem linearum nulla curva, sed sola recta revocatur; perspicuum est, loca primi generis, non aliis lineis, quam rectis terminari. Quumque secundum ordinem linearum constituent con-

se.

sectiones, & præter eas nulla alia curva ad eum ordinem referatur; perspicuum est quoque, loca secundi generis, non aliis lineis, quam conii sectionibus, circumscribi.

Inter sectiones vero conii ponendus est etiam circulus; ut qui, ex superius ostensis, velut species quædam ellipsis debet haberi. Unde locorum secundi generis alia erunt ad parabolam, alia ad ellipsim, alia ad circulum, & alia demum ad hyperbolam. Quumque hyperbola considerari possit, vel relate ad aliquam ejus diametrum, vel in ordine ad suas asymptotos; duæ hinc locorum ad hyperbolam species communiter a Geometris distinguuntur.

VIII. Et quidem, quod recta sola constituat primum ordinem linearum, solisque adeo rectis loca primi generis terminentur, facile erit ostendere. Æquatio enim, quæ duas incognitas continens, ad unam tantum dimensionem ascendit, potest esse quadruplicis formæ, vel scilicet  $x = ay : c$ , vel  $x + b = ay : c$ , vel  $x - b = ay : c$ , vel  $b - x = ay : c$ . Unde eo res redit, ut ostendamus, unamquamque harum æquationum posse per rectam solam explicari.

VIII.  
Ostenditur,  
quod loca  
primi gene-  
ris solis re-  
ctis termi-  
nentur. Pri-  
mus casus.

Sit itaque primo  $x = ay : c$ . Ducatur re-  
cta quævis AB, per cujus portiones AN desi-  
gnentur valores incognitæ  $x$ . Capiatur in AB  
portio  $AD = a$ . Et constituto ad punctum  
D angulo quovis ADE, fiat  $DE = c$ . Jun-  
gantur deinde puncta A, & E per rectam  
AEX. Et actis rectis NM, ipsi DE parallelis,  
terminatisque ad rectam AEX; dabunt istæ

FIG. 71.

168 SECTIONUM CONICARUM  
valores correspondentes alterius incognitæ  $y$ .

Ponatur enim unaquæque portio  $AN = x$ , & quælibet rectarum  $NM = y$ . Jamque, ob triangula æquiangula  $ADE$ ,  $ANM$ , erit, ut  $AD$  ad  $DE$ , ita  $AN$  ad  $NM$ . Quare, substituendo symbola harum rectarum, erit, ut  $a$  ad  $c$ , ita  $x$  ad  $y$ : & propterea, quum sit  $x = ay : c$ ; erit recta  $AEX$  linea, ad quam refertur æquatio  $x = ay : c$ .

Sed notetur hic velim, quod si recta  $AEX$  extendatur ad partem oppositam versus  $Z$ , etiam per ipsam  $AZ$  explicari possit æquatio  $x = ay : c$ . Nam, etsi in isto casu sit  $AN = -x$ , &  $NM = -y$ ; adeoque reperiatur æquatio  $-x = -ay : c$ : translatis tamen terminis ad partes contrarias, rursus habebitur ut antea  $x = ay : c$ .

IX.  
Secundus  
casus.  
FIG. 72.

IX. Sit secundo  $x \mp b = ay : c$ . Designentur quoque per portiones  $AN$  rectæ alicujus  $AB$  valores incognitæ  $x$ . Et, sumpta ad plagam oppositam portione  $AC = b$ , abscindatur ex tota  $CB$  portio alia  $CD = a$ . Constituaturs deinde ad punctum  $D$  angulus quivis  $CDE$ , & fiat  $DE = c$ . Jungantur postea puncta  $C$ , &  $E$  per rectam  $CEX$ . Et actis rectis  $NM$ , ipsi  $DE$  parallelis, terminatisque ad rectam  $CEX$ , dabunt istæ valores correspondentes alterius incognitæ  $y$ .

Ponatur enim unaquæque portio  $AN = x$ , & quælibet rectarum  $NM = y$ . Erit igitur quævis ipsarum  $CN = x \mp b$ . Quumque triangula  $CDE$ ,  $CNM$  sint æquiangula; erit, ut  $CD$  ad  $DE$ , ita  $CN$  ad  $NM$ . Quare, subrogatis symbolis harum rectarum, erit, ut  
 $a$  ad

$a$  ad  $c$ , ita  $x + b$  ad  $y$ ; adeoque, quum sit  $x + b = ay : c$ ; erit recta  $CEX$  linea, ad quam refertur æquatio  $x + b = ay : c$ .

Sed hic quoque notatu dignum existimo, quod ducta per punctum  $A$  recta  $AF$ , ipsi  $DE$  parallela, explicari possit æquatio  $x + b = ay : c$  non solum per rectæ  $CEX$  portionem  $FX$ , verum etiam per portionem alteram  $CF$ . Etsi enim in isto casu sit  $AN = x$ ; manet tamen, tam  $NM = y$ , quam  $CN = x + b$ . Quare, ob triangula æquiangula  $CDE$ ,  $CNM$ , semper erit  $x + b = ay : c$ .

Quin imo, si recta  $CEX$  extendatur ad partem oppositam versus  $Z$ , etiam per ipsam  $CZ$  explicari poterit æquatio  $x + b = ay : c$ . Nam relate ad puncta ipsius  $CZ$  fiet  $AN = x$ ,  $NM = y$ , &  $CN = x - b$ . Unde æquatio erit  $x - b = ay : c$ : quæ tamen, translatis terminis ad partes oppositas, evadet rursus ut antea  $x + b = ay : c$ .

X. Sit tertio  $x - b = ay : c$ . Referant adhuc portiones  $AN$  rectæ  $AB$  valores omnes incognitæ  $x$ . Capiatur super ea, tam portio  $AC = b$ , quam portio  $CD = a$ . Tum, constituto ad punctum  $D$  angulo quovis  $CDE$ , fiat  $DE = c$ . Jungantur postea puncta  $C$ , &  $E$  per rectam  $CEX$ . Et ductis rectis  $NM$ , ipsi  $DE$  parallelis, terminatisque ad rectam  $CEX$ , dabunt istæ valores correspondentes alterius incognitæ  $y$ .

Ponatur enim quævis portio  $AN = x$ , & quælibet rectarum  $NM = y$ . Erit igitur unaquæque ipsarum  $CN = x - b$ . Et quoniam triangula  $CDE$ ,  $CNM$  sunt æquiangu-

X.  
Tertius casus.  
FIG. 73.

la

la; erit, ut  $CD$  ad  $DE$ , ita  $CN$  ad  $NM$ . Quare, substitutis symbolis harum rectarum, erit, ut  $a$  ad  $c$ , ita  $x - b$  ad  $y$ : proindeque, quum sit  $x - b = ay : c$ , erit recta  $CEX$  linea, ad quam refertur æquatio  $x - b = ay : c$ .

Nec silentio hoc loco præteribimus, quod, si per punctum  $A$  ducatur recta  $AF$ , ipsi  $DE$  parallela, quæ conveniat cum recta  $CEX$ , producta ad partem oppositam, in puncto  $F$ ; æquatio  $x - b = ay : c$  explicari possit etiam per portionem  $CF$ . Etsi enim in isto casu sit  $NM = -y$ , quia tamen manet  $AN = x$ , fiet  $CN = b - x$ . Unde æquatio erit  $b - x = -ay : c$ : quæ, translatis terminis ad partes contrarias, evadet  $x - b = ay : c$ .

Quin imo, si ipsa  $CF$  extendatur ulterius versus  $Z$ , eadem æquatio  $x - b = ay : c$  explicari quoque poterit per portionem aliam indefinitam  $FZ$ . Nam relate ad puncta ipsius  $FZ$ , fiet  $AN = -x$ ,  $NM = -y$ , &  $CN = -x + b$ . Unde æquatio erit  $-x + b = -ay : c$ : quæ, per translationem terminorum ad partes oppositas, evadet rursus ut antea  $x - b = ay : c$ .

XI.  
Quartus  
casus.  
FIG. 74.

XI. Sit demum  $b - x = ay : c$ . Designentur pariter valores incognitæ  $x$  per portiones  $AN$  rectæ alicujus  $AB$ . Et, sumpta super  $AB$  portione  $AC = b$ , capiatur ad partem oppositam portio alia  $CD = a$ . Constituaturs deinde ad punctum  $D$  angulus quivis  $CDE$ , & fiat  $DE = c$ . Jungantur postea puncta  $C$ , &  $E$  per rectam  $CEX$ . Et ductis rectis  $NM$ , ipsi  $DE$  parallelis, terminatisque ad rectam  $CEX$ ; dabunt istæ valores correspondentes.



ſpondentes alterius incognitæ  $y$ .

Ponatur enim quælibet portio  $AN = x$ , & quælibet rectorum  $NM = y$ . Erit igitur unaquæque ipſarum  $CN = b - x$ . Et quoniam triangula  $CDE$ ,  $CNM$  ſunt æquiangu-  
la; erit, ut  $CD$  ad  $DE$ , ita  $CN$  ad  $NM$ . Qua-  
re, ſubſtituendo ſymbola harum rectorum,  
erit, ut  $a$  ad  $c$ , ita  $b - x$  ad  $y$ : & propterea,  
quum ſit  $b - x = ay : c$ , erit rectora  $CEX$  li-  
nea, ad quam refertur æquatio  $b - x = ay : c$ .

Hic etiam notare oportet, quod, ducta  
per punctum  $A$  rectora  $AF$ , ipſi  $DE$  parallela,  
explicari poſſit æquatio  $b - x = ay : c$ , non  
ſolum per rectoræ  $CEX$  portionem finitam  $CF$ ,  
verum etiam per portionem aliam indefinitam  
 $FX$ . Eſſi enim in iſto caſu ſit  $AN = -x$ ,  
manet tamen, tam  $NM = y$ , quam  $CN = b$   
 $- x$ ; adeoque, ob triangula æquiangu-  
la  $CDE$ ,  
 $CNM$ , ſemper erit  $b - x = ay : c$ .

Quin imo, ſi rectora  $CEX$  extendatur ad  
partem oppoſitam verſus  $Z$ , etiam per ipſam  
 $CZ$  explicari poterit æquatio  $b - x = ay : c$ .  
Nam relate ad puncta ipſius  $CZ$ , eſſi fiat  
 $NM = -y$ , quia tamen manet  $AN = x$ , erit  
 $CN = x - b$ . Unde æquatio erit  $x - b =$   
 $- ay : c$ : quæ, per tranſpoſitionem termino-  
rum ad partes oppoſitas, evadet ruruſus ut an-  
tea  $b - x = ay : c$ .

XII. Atque hinc, aliud agentes, jam me-  
thodum aperuimus, conſtruendi loca omnia, quæ  
ſunt ad lineam rectoram. Æquatio enim localis,  
quæ conſtrui debet, omnino neceſſe eſt, ut  
formam habeat alicujus ex quatuor præce-  
dentibus æquationibus. Quare, ea comperta,  
ſatis

XI.  
Quomodo  
loca primi  
generis per  
reductionem  
ad ſingulos  
caſus con-  
ſtruantur.

fatis erit, illas inter se mutuo conferre, & mutua ista comparatione determinare valores quantitatum, quibus locus definitur.

Ut, si in resolutione alicujus problematis indeterminati inventa fuerit æquatio  $gx + ff = fy$ ; divisis terminis omnibus per  $g$ , fiet ea  $x + ff : g = fy : g$ ; adeoque erit ejusdem formæ cum secunda æquatione  $x + b = ay : c$ . Hinc, comparatis inter se mutuo terminis ipsarum, habebitur  $b = ff : g$ , &  $a : c = f : g$ ; adeo nempe, ut assumpta  $a = f$ , fiet  $c = g$ . Unde constructur locus quæsitus, capiendo  $AC = ff : g$ ,  $CD = f$ , &  $DE = g$ .

Similiter, si æquatio, orta ex resolutione alicujus problematis indeterminati, fuerit  $ffx - ggm = ggy$ ; dividendo terminos omnes per  $ff$ , evadet ea  $x - ggm : ff = ggy : ff$ ; adeoque erit ejusdem formæ cum tertia æquatione  $x - b = ay : c$ . Unde, comparando terminos unitis cum terminis alterius, habebitur  $b = ggm : ff$ , &  $a : c = gg : ff$ ; adeo nempe, ut assumpta  $a = gg : f$ , fiet  $c = f$ . Quocirca constructur locus quæsitus, capiendo  $AC = ggm : ff$ ,  $CD = gg : f$ , &  $DE = f$ .

Atque ita quoque, si æquatio, nata ex resolutione alicujus problematis indeterminati, fuerit  $fg - mx = my$ ; divisis terminis omnibus per  $m$ , fiet illa  $fg : m - x = y$ ; proindeque erit ejusdem formæ cum quarta æquatione  $b - x = ay : c$ . Quare, comparatis inter se mutuo terminis ipsarum, habebitur  $b = fg : m$ , &  $a : c = 1$ , sive etiam  $a = c$ . Unde constructur locus quæsitus, si posita  $AC = fg : m$ , capiatur  $CD$  cujusvis longitudinis, & fiat

fiat DE ipsi CD æqualis .

XIII. Quoniam vero molestum est , omnium quatuor formularum constructiones memoria retinere ; poterit unica tantummodo formula totum negotium peragi . Licebit autem hunc in finem eligere, vel formulam priorē , quæ est omnium simplicissima , vel aliquam trium posteriorum , ad quas casus compositi reducuntur .

XIII.  
Quo pacto fieri possit eorum constructio, per reductionem ad casum simplicem.

Quum eligitur formula prior  $x = ay : c$ , in id maxime incumbendum, ut substitutionis ope ad eam reducatur localis æquatio proposita . Nam, reductione ista peracta , facile erit , quæsitum locum construere . Ita, si localis æqualis sit  $fg + fx = gy$ ; divisis terminis omnibus per  $f$ , erit  $g + x = gy : f$ . Et ponendo  $g + x = z$ , erit  $z = gy : f$  æquatio reducta.

Referant modo portiones AN rectæ AB valores incognitæ  $x$ . Et quoniam habetur  $g + x = z$ , capiendo ad partem oppositam  $AC = g$ , designabunt portiones CN valores incognitæ  $z$ . Quare, si ex CB abscindatur portio  $CD = g$ , & constituto angulo quovis CDE, fiat  $DE = f$ ; erit recta CEX locus quæsitus.

FIG. 72.

Eadem ratione , si localis æquatio sit  $ffg - ff x = ggy$ ; dividendo terminos omnes per  $ff$ , erit  $g - x = ggy : ff$ ; & ponendo  $g - x = z$ , erit  $z = ggy : ff$  æquatio reducta. Hinc, siquidem super AB capiatur  $AC = g$ , & designentur per portiones AN istius AC valores incognitæ  $x$ ; fiet unaquæque reliquarum portionum  $CN = g - x$ ; adeoque ipsæ CN designabunt valores incognitæ  $z$ . Unde, si ex CA,

FIG. 74.

CA, producta si opus, abscindatur portio CD  
 $= gg : f$ , & constituto angulo quovis CDE,  
 fiat DE  $= f$ ; erit recta CEX locus optatus

XIV.  
 Quomodo  
 eadem con-  
 structio pe-  
 ragenda, per  
 reductionem  
 ad casum  
 compositum.

XIV. Quod si autem eligi velit aliqua  
 trium posteriorum formularum, veluti secun-  
 da  $x \mp b = ay : c$ , sive etiam  $x \mp b = ay : c$   
 $= 0$ ; tunc oportebit, comparationis ope, defi-  
 nire quantitates, quæ locum determinant. Et  
 siquidem omnes inveniuntur positivæ; danda  
 est rectis, quas referunt, illa eadem positio,  
 quam in constructione formulæ reperiuntur  
 habere. Sed, si earum aliqua prodit negativa;  
 tunc recta, quam exhibet, capienda est ad  
 plagam oppositam.

Jam quantitates, quæ locum determi-  
 nant, sunt  $a, b, c$ . Verum, instituta compara-  
 tione, dumtaxat ipse  $b$  valor innotescit. Et  
 quantum ad alias duas  $a$ , &  $c$ , nonnisi ratio,  
 quam habent inter se, cognita fiet. Hinc va-  
 lor unius ex iis sumi poterit ad libitum. Et  
 tunc per cognitam rationem, quam habent in-  
 ter se, etiam valor alterius notus evadet. Præ-  
 stat autem, utcumque assumere valorem ipsius  
 $c$ , quem tamen positivum semper esse oportebit.

FIG. 74,

Sit igitur  $x = g \mp ffy : gg = 0$  æquatio  
 localis construenda. Instituta comparatione, ha-  
 bebatur  $b = -g$ , &  $a : c = -ff : gg$ . Quare, as-  
 sumpta  $c = g$ , erit  $a = -ff : g$ . Quum ergo va-  
 lores rectarum AC, CD comperti sint negati-  
 vi, ducendæ sunt eæ ad plagas oppositas:  
 proindeque quæsti loci constructio peragen-  
 da erit, ut in quarta formula, ad quam pro-  
 posita æquatio proprie reducitur.

Sit

Sit etiam  $x - my : n = 0$  æquatio localis proposita . Comparatione instituta , habebitur  $b = 0$  , &  $a : c = m : n$  : proindeque, assumpta  $c = n$  , fiet  $a = m$  . Quum ergo valor rectæ AC compertus sit nullus ; evanescet ipsa AC, cadetque punctum C super punctum A , Quare constructur quæsitus locus , ut in prima formula; nimirum, capiendo super AB portio- nem AD = m , constituendo utcunque angu- lum ADE , faciendo DE = n , & conjungen- do demum puncta A , & E per rectum AEX.

XV. Sed nolo hic silentio reticere , quod locus ad lineam rectam exprimi quoque possit per æquationem , quæ unicam tantum incogni- tam contineat . Jam enim generalis formula, nulla habita signorum , quibus termini affi- ciuntur , ratione, est  $x + b - ay : c = 0$  . Pro- fecto autem in hujusmodi æquatione ratio, quam habet a ad c , quemadmodum potest esse æqualitatis , ita nihil etiam vetat, ut sit vel in- finite magna , vel infinite parva.

XV.  
Locorum ad  
lineam re-  
ctam casus  
duo speciales  
ostenduntur.

Sit itaque primo ratio illa infinite ma- gna : adeo nempe , ut existente c quantitate finita, sit vicissim infinita quantitas a. Quia igitur in hoc casu punctum C abire debet in infi- nitum; fiet recta CEX parallela ipsi AB. Unde quælibet parallelarum NM æqualis erit rectæ DE : & propterea , iisdem ut supra manenti- bus , loci æquatio erit  $y = c$ .

FIG. 72.  
75.

Sit secundo eadem illa ratio infinite par- va, adeo nempe, ut existente a quantitate fini- ta, sit per contrarium c quantitas infinita . Et quoniam in hoc alio casu abire debet in infi- nitum punctum E, fiet recta CEX parallela ip- si DE.

FIG. 72.  
76.

176 SECTIONUM CONICARUM  
 si DE. Quare, sicuti in recta CEX sunt omnia  
 puncta M, ita super eadem CEX cadent paral-  
 lelæ omnes MN. Hinc quælibet portionum  
 AN æqualis fiet ipsi AC: proindeque loci æ-  
 quatio erit  $x = b$ .

FIG. 72. Nec silentio hic præteribimus, quod ubi  
 ratio, quam habet  $a$  ad  $c$ , reperitur esse æqua-  
 litatis, tunc etiam portiones CN ipsis NM  
 æquales fiant. Unde, si simpliciter quæstio sit  
 de explicanda æquatione, valores incognitæ  
 $y$  exprimi poterunt, non modo per rectas NM,  
 verum etiam per portiones ipsas CN, quæ ad  
 punctum C omnes terminantur.

XIV.  
 Quomodo  
 construenda  
 sint loca se-  
 cundi gene-  
 ris, conicis  
 sectionibus  
 terminata.

XVI. Quemadmodum autem, constru-  
 ctione locorum ad lineam rectam, abunde nunc  
 liquet, rectam solam constituere primum or-  
 dinem linearum, solisque adeo rectis loca pri-  
 mi generis terminari; ita etiam, construendo  
 loca, quæ conicis sectionibus terminantur,  
 patebit, *solas conicis sectionibus secundum linea-  
 rum ordinem constituere, nec aliis, quam conicis  
 sectionibus, secundi generis loca definiri.*

Constructionem horum locorum sequen-  
 tibus capitibus ostendemus; & pro ea quoque  
 eandem illam methodum usurpabimus, qua  
 mediante loca primi generis construuntur. Ni-  
 mirum formulam unicam eligemus, quæ sit,  
 vel omnium simplicissima, vel omnium ma-  
 xime composita; & ope ejus formulæ cujus-  
 cumque propositæ æquationis constructionem  
 exhibebimus.

Sed hic quoque notare oportet, quod  
 ubi eligitur formula omnium simplicissima;  
 tunc præcipuum constructionis artificium in

eo

eo situm sit, ut substitutionis ope ad eam reducat<sup>ur</sup> localis æquatio proposita. Quotiescumque vero adhibetur formula omnium maxime composita; tunc labor omnis eo se vertet, ut comparationis ope definiantur quantitates, quæ locum determinant.

C A P. III.

*Qua ratione loca ad parabolam construi possint, ostenditur.*

I. **D**iximus præcedenti capite, loca omnia construi posse, adhibita formula, quæ casum contineat, vel omnium simplicissimum, vel omnium maxime compositum. Jam in parabola casus simplicissimus habetur, quum *ejus puncta omnia ad aliquam ipsius diametrum referuntur per rectas, quæ sint diametri illius ordinatæ.*

I.  
Locorum ad  
parabolam  
formula  
simplicissi-  
ma defini-  
tur.

Sit igitur AB aliqua parabolæ diameter, sitque etiam AD, tum parameter ejus diametri, cum recta, cui omnes ejusdem diametri ordinatæ sunt parallelæ. Capiatur in parabola punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum AB recta MN, ipsi AD parallela. Tum ponatur  $AN = x$ ,  $MN = y$ , &  $AD = p$ .

FIG. 77.

Et quoniam, ob parabolæ naturam, MN quadratum est æquale rectangulo DAN; erit ejusdem parabolæ localis æquatio  $yy = px$ . Unde, semper ac æquatio aliqua subinde redu-

*Tab. II.*

M

ci

ci possit, ut ex una parte habeatur quadratum unius incognitæ, ex altera vero rectangulum ex incognita alia in datam quamvis quantitatem; tunc æquatio illa ad parabolam nos manuducet.

Sed notetur hoc loco velim, æquationem  $yy = px$  haberi, non solum adhibitis ordinatis, quæ cadunt ad diametri partem unam, verum etiam, quum adhibentur ordinatæ illæ, quæ cadunt ad diametri partem oppositam. Nam, etsi in hoc casu sit  $MN = -y$ , quia tamen ejus quadratum est  $yy$ , erit semper  $yy = px$  æquatio parabolæ localis.

II. Neque vero difficile erit definire, qualis esse debeat æquatio, quæ subinde reduci possit, ut formam induat istius  $yy = px$ . Primo enim, si in æquatione incognitæ duæ non reperiantur simul multiplicatæ, reducetur ad eam formam talis æquatio, quotiescumque unius dumtaxat incognitæ quadratum in ea continetur.

II.  
Qua æquationes ad formulam illam simplicissimam sunt reducibiles.

Proponatur, exempli gratia, æquatio  $yy + 2ay = cx - bb$ . Fiat  $y + a = z$ . Et quoniam habetur  $yy + 2ay = zz - aa$ ; substitutione perfecta, erit  $zz - aa = cx - bb$ , sive etiam  $zz = cx + aa - bb$ . Fiat quoque  $x + (aa - bb) : c = u$ , ita ut sit  $cx + aa - bb = cu$ . Et habebitur demum  $zz = cu$ , quæ est ejusdem formæ cum æquatione parabolæ  $yy = px$ .

Quod si autem in æquatione incognitæ duæ simul multiplicatæ reperiantur; tunc, ut illiusmodi æquatio formam induat istius  $yy = px$ , oportebit, ut in ea utriusque incognitæ quadratum contineatur, sed ita tamen, ut  
trans.



translatis ad eandem æquationis partem, tum terminis, quadrata illa continentibus, cum termino, incognitarum productum includente, iidem simul quadratum perfectum constituent.

Ita, si æquatio fuerit  $yy - 2ay - 2xy + xx = cx + aa$ ; ponendo  $y - a - x = z$ , erit  $yy - 2ay - 2xy + xx = zz - 2ax - aa$ . Quare, ope substitutionis, fiet  $zz - 2ax - aa = cx + aa$ , sive etiam  $zz = cx + 2ax + 2aa$ . Hinc, ponendo quoque  $x + 2aa : (c + 2a) = u$ , &  $c + 2a = d$ ; erit  $cx + 2ax + 2aa = du$ ; atque adeo, rursus ope substitutionis, erit  $zz = cu$ .

III. Sed exemplis modo ostendamus, qua ratione, per reductionem æquationis ad formam simplicissimam, loca ad parabolam construuntur.

III. Ostenditur exemplis constructio locorum, ad parabolam per formulam simplicissimam. Exemplum primum.

Primo itaque proponatur construenda æquatio  $yy + 2ay = cx$ . Fiat  $y + a = z$ . Quumque habeatur  $yy + 2ay = zz - aa$ ; erit  $zz - aa = cx$ , sive etiam  $zz = cx + aa$ . Fiat quoque  $x + aa : c = u$ . Et quoniam habetur  $cx + aa = cu$ ; erit  $zz = cu$  æquatio reducta.

FIG. 78.

Ducatur ergo in subiecto plano recta quævis AB, & per portiones ejus AN designentur valores incognitæ  $x$ . Quumque habeatur  $x + aa : c = u$ ; capiendo ad partem oppositam AC,  $= aa : c$ , fiet unaquæque CN  $= x + aa : c$ ; adeoque designabunt portiones CN valores incognitæ  $u$ .

Sit porro CD recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ NM, quæ referunt valores alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur  $y + a = z$ ; capiatur super ea ad plagam oppositam CE  $= a$ ; & ducta per pun-

M a etum

180 SECTIONUM CONICARUM  
 Etum E recta EF, ipsi CB parallela, fiet quæli-  
 bet  $EO = y + a$ ; adeoque designabunt portio-  
 nes EO valores incognitæ z.

Denique, quum æquatio reducta sit  $zz = cx$ , liquet, quæsitæ parabolæ diametrum debe-  
 re esse rectam ipsam EF. Et quemadmodum  
 ED est illa recta, cui parallelæ esse debent  
 omnes ejus diametri ordinatæ; sic perspicuum  
 est quoque, quod si super eadem ED capia-  
 tur portio EG = c, debeat esse portio ista EG  
 parameter illius diametri.

IV.  
 Demonstratio constru-  
 tionis præcedentis ex-  
 empli

FIG. 78.

IV. Ut autem ostendere possimus, para-  
 bolam istam esse lineam, ad quam refertur æqua-  
 tio  $yy + 2ay = cx$ , juvat prius advertere, quod  
 ea per punctum A necessario debeat transire.  
 Compleatur siquidem parallelogrammum AE.  
 Et quoniam, ex constructione, est AC, sive EH  
 = aa : c, & EG = c; erit rectangulum GEH  
 = aa, & consequenter æquale quadrato, quod  
 fit ex CE, sive AH. Quare omnino necesse  
 est, ut parabola transeat per punctum A.

Id quum ita sit, capiatur primo in portio-  
 ne parabolæ AX punctum aliquod M, ex quo  
 demittatur ad diametrum EF ordinata MO,  
 quæ ipsi AB occurrat in N. Jamque, positis  
 AN = x, & MN = y; erit ex constructione  
 CN, sive EO =  $x + aa : c$ , & MO =  $y + a$ .  
 Sed, propter parabolam, MO quadratum est  
 æquale rectangulo GEO. Quare erit  $yy + 2ay$   
 $+ aa = cx + aa$ , sive etiam  $yy + 2ay = cx$ .

Capiatur secundo in portione parabolæ  
 AE punctum quodvis M, ex quo etiam demit-  
 tatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ  
 producat ad partem oppositam, usque do-  
 nec

nec ipsi AC occurrat in N. Et quoniam in isto casu fit  $AN = \rightarrow x$ , &  $MN = \rightarrow y$ ; inveniatur quoque CN, sive  $EO = x \dagger aa : c$ , &  $MO = y \dagger a$ . Unde, ob parabolæ naturam, rursus erit ut antea  $yy \dagger 2ay \dagger aa = cx \dagger aa$ , sive etiam  $yy \dagger 2ay = cx$ .

Extendatur porro AH usque in K, & capiatur in portione parabolæ AK punctum aliquod M, ex quo similiter demittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ ipsi AC occurrat in N. Et, quamquam in hoc casu habeatur quoque  $AN = \rightarrow x$ , &  $MN = \rightarrow y$ ; at tamen erit CN, sive  $EO = x \dagger aa : c$ , &  $MO = \rightarrow y \rightarrow a$ . Interim, quia quadratum ex  $\rightarrow y \rightarrow a$  est  $yy \dagger 2ay \dagger aa$ ; adhuc, per parabolæ naturam, habebitur ut prius  $yy \dagger 2ay = cx$ .

Capiatur denique in portione parabolæ KZ punctum quodvis M, ex quo pariter demittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ ipsi AB occurrat in N. Quumque in isto casu fiat  $AN = x$ , &  $MN = \rightarrow y$ ; erit CN, sive  $EO = x \dagger aa : c$ , &  $MO = \rightarrow y \rightarrow a$ . Unde, propter parabolæ naturam, semper erit ut antea  $yy \dagger 2ay \dagger aa = cx \dagger aa$ , sive etiam  $yy \dagger 2ay = cx$ .

V. Proponatur secundo *construenda æquatio*  $yy \rightarrow 2ay = bb \rightarrow cx$ , *quæ similiter ad parabolam nos manuducit.* Fiat  $y \rightarrow a = z$ . Et quoniam habetur  $yy \rightarrow 2ay = zz \rightarrow aa$ ; substitutione peracta, erit  $zz \rightarrow aa = bb \rightarrow cx$ , sive etiam  $zz = aa \dagger bb \rightarrow cx$ . Ponatur quoque  $(aa \dagger bb) : c \rightarrow x = u$ . Quumque habeatur  $aa \dagger bb \rightarrow cx = cu$ ; erit rursus ope substitutionis  $zz = cu$  æquatio reducta.

V.  
Exemplum  
secundum,  
non longe  
diversum a  
primo.

FIG. 79.

Ducatur itaque in subiecto plano recta quævis  $AB$ , ex qua abscindatur portio  $AC = (aa + bb) : c$ . Jamque, si designentur per portiones  $AN$  istius  $AC$  valores incognitæ  $x$ , fiet unaquæque reliquarum portionum  $CN = (aa + bb) : c - x$ ; adeoque ipsæ  $CN$  designabunt valores incognitæ  $u$ .

Sit deinde  $CD$  recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ  $NM$ , quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur  $y - a = z$ , abscindatur ex  $CD$  portio  $CE = a$ ; & ducta per punctum  $E$  recta  $EF$ , ipsi  $CA$  parallela, fiet quælibet  $OM = y - a$ ; atque adeo ipsæ  $OM$  valores referent incognitæ  $z$ .

Denique, quum æquatio reducta sit  $zx = cu$ , liquet, quæsitæ parabolæ diametrum debere esse rectam  $EF$ . Et quemadmodum diametri ejus ordinatæ debent esse parallelæ ipsi  $ED$ , sic perspicuum est quoque, quod si super eadem  $ED$  capiatur portio  $EG = c$ , debeat esse portio ista  $EG$  parameter illius diametri.

Jam, quod per parabolam, subinde descriptam, fiat latis propositæ æquationi  $yy - 2ay = bb - cx$ , ostendetur prorsus ut supra. Tantum notabimus, parabolam istam non posse transire per punctum  $A$ . Nam, completo parallelogrammo  $AE$ , invenietur rectangulum  $GEH$  majus quadrato, quod fit ex  $AH$ . Plane vero, si abesset ab æquatione terminus  $bb$ , tunc parabola per punctum  $A$  proculdubio transire deberet.

VI.  
Exemplum  
tertium, ca-

VI. Proponatur tertio *construenda æquatio*  
tio

$yy + 2mxy:n + mmxx:nn = ax \rightarrow bb$ , quæ <sup>sum paulo</sup> <sup>difficiliorem</sup> <sup>contineat.</sup>  
 ob tres priores terminos, quadratum perfectum  
 constituentes, adhuc ad parabolam nos ducit.  
 Fiat  $y + mx:n = z$ . Quumq; habeatur  $yy + 2mxy:n$   
 $+ mmxx:nn = zz$ , erit  $zz = ax \rightarrow bb$ . Capiatur  
 quoque  $x \rightarrow bb:a = u$ . Et quoniam habeatur  
 $ax \rightarrow bb = au$ , erit  $zz = au$  æquatio re-  
 ducta.

Ducatur jam in subjecto plano recta **FIG. 80.**  
 quævis AB, & per portiones ejus AN desi-  
 gnentur valores incognitæ  $x$ . Quumque ha-  
 beatur  $x \rightarrow bb:a = u$ , abscindatur ex ea por-  
 tio AC =  $bb:a$ . Et quoniam fit unaquæque  
 CN =  $x \rightarrow bb:a$ , designabunt portiones CN  
 valores incognitæ  $u$ .

Sit deinde CD recta, cui esse debent æ-  
 quidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt  
 alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductio-  
 ne habetur  $y + mx:n = z$ , capiatur super ea  
 ad partem oppositam portio CE, quæ sit ad  
 AC, ut est  $m$  ad  $n$ . Jamque, ducta recta AEF,  
 occurrente in O ipsis NM, fiet unaquæque  
 OM =  $y + mx:n$ ; adeoque ipsæ OM designa-  
 bunt valores incognitæ  $z$ .

Quoniam autem rectæ OM correspon-  
 dent portionibus ipsius EF; utique debet esse  
 EF diameter describendæ parabolæ. Verum  
 portiones illæ EO tunc demum reperiuntur  
 æquales ipsis CN, ubi æquales sunt duæ AE,  
 AC. Unde procul est, ut eadem EO designa-  
 re queant valores incognitæ  $u$ ; adeoque, etsi  
 æquatio reducta sit  $zz = au$ , multum tamen  
 abest, ut sit  $a$  parameter quæsitæ parabolæ.

Itaque, ut parametrum describendæ pa-

parabolæ definiamus , sit AC ad AE , ut est  $n$  ad  $s$  . Quumque hac ratione fiat quælibet  $EO = su:n$  ; debeat quæsitæ parameter ejusmodi esse , ut ducta in  $su:n$  producat  $au$  . Quare , si ea vocetur  $p$  , erit  $psu:n = au$  , hoc est  $ps:n = a$  , ex quo infertur  $p = an:s$  .

Abscindatur ergo ex ED portio EG =  $an:s$  . Et quemadmodum describendæ parabolæ debet esse EF diameter , & ED recta , definiens positionem suarum ordinarum ; ita oportebit , ut abscissa illa portio EG sit parameter ejus diametri . Nec difficile erit ostendere , quod per hujusmodi parabolam fiat satis propositæ æquationi .

VII.  
Veritas constructionis  
precedentis  
exempli demonstratur .

FIG. 80.

VII. Sit enim XEZ descripta parabola, quæ ipsi AB occurrat in H, & K. Capiatur primo in portione HK punctum quodvis M , ex quo demittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ ipsi AB occurrat in N . Jamq; positis  $AN = x$  , &  $MN = y$  ; erit ex constructione  $CN = x \rightarrow bb:a$  , &  $MO = y \dagger mx:n$  . Quumque CN sit ad EO , ut est AC ad AE , sive etiam, ut est  $n$  ad  $s$  ; erit  $EO = sx:n \rightarrow sbb:na$  . Sed, propter parabolam , MO quadratum est æquale rectangulo GEO . Quare erit  $yy \dagger 2mxy:n \dagger mmxx:nn = ax \rightarrow bb$  .

Capiatur secundo in portione EH , vel KX punctum quodvis M , ex quo etiam demittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ producat ad partem oppositam , usque donec ipsi AB occurrat in N . Et quoniam in isto casu fit  $AN = x$  , &  $MN = y$  ; invenietur quoque  $CN = x \rightarrow bb:a$  , &  $MO = y \dagger mx:n$  . Quumque adhuc fiat  $EO = sx:n \rightarrow sbb:na$  ;

ob

ob parabolæ naturam, rursus erit ut antea  
 $yy \dagger 2mxy:n \dagger mmxx:nn = ax \rightarrow bb.$

Capiatur denique in portione parabolæ  
 EZ punctum aliquod M, ex quo similiter de-  
 mittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ  
 ipsi AB occurrat in N. Et quamquam in hoc  
 casu habeatur quoque  $AN = x, \& MN = -y;$   
 attamen erit  $EO = sx:n \rightarrow sbb:na, \& MO =$   
 $\rightarrow y \rightarrow mx:n.$  Interim, quia quadratum ex  
 $\rightarrow y \rightarrow mx:n$  est  $yy \dagger 2mxy:n \dagger mmxx:nn;$   
 adhuc, per parabolæ naturam, erit ut prius  $yy$   
 $\dagger 2mxy:n \dagger mmxx:nn = ax \rightarrow bb.$

Neque vero difficile erit, definire pun-  
 cta duo H, & K, in quibus ipsi AB occurrit  
 descripta parabola. Quum enim sub iis pun-  
 ctis evanescere debeat valor incognitæ y; satis  
 erit, ex ipsa æquatione delere terminos illos, in  
 quibus incognita y reperitur. Et quoniam,  
 deletis hujusmodi terminis, æquatio evadit  
 $mmxx:nn = ax \rightarrow bb;$  dabunt radices duæ  
 hujus æquationis valores ipsarum AH, AK.

Fieri autem potest, ut puncta duo H, &  
 K coeant in unum, & ipsa AB parabolæ tan-  
 gens evadat: nimirum, quum habetur  $a =$   
 $2bm:n;$  quandoquidem in hoc casu radices  
 duæ æquationis  $mmxx:nn = ax \rightarrow bb$  fiunt  
 æquales inter se. Sed contingere quoque po-  
 test, ut recta AB, nec secet, nec tangat para-  
 bolam: scilicet si a minor sit, quam  $2bm:n;$   
 quum in isto casu ejusdem æquationis radices  
 duæ evadant imaginariæ.

VIII. Proponatur demum *construenda æ-*  
*quatio*  $yy \rightarrow 2ay \rightarrow 2xy \dagger xx \dagger ax = 0,$  *quæ simi-*  
*liter locum exhibet ad parabolam, ob tres ter-*  
*mi-*

VIII.  
 Exemplum  
 quartum, cas-  
 sum maxi-  
 me compos.

tum  
bens.

minus  $yy \rightarrow 2xy \dagger xx$ , quadratum perfectum  
constituentes. Fiat  $y \rightarrow a \rightarrow x = z$ . Quum-  
que habeatur  $yy \rightarrow 2ay \rightarrow 2xy \dagger xx = zz \rightarrow$   
 $2ax \rightarrow aa$ ; erit  $zz \rightarrow 2ax \rightarrow aa \dagger ax = 0$ , si-  
ve etiam  $zz = ax \dagger aa$ . Capiatur quoque  $x \dagger$   
 $a = u$ , ita ut sit  $ax \dagger aa = au$ . Et erit  $zz =$   
 $au$  æquatio reducta.

**FIG. 81.** In subiecto itaque plano ducatur recta  
quævis  $AB$ , per cujus portiones  $AN$  desi-  
gnentur valores incognitæ  $x$ . Et quoniam in  
reductione habetur  $x \dagger a = u$ , capiatur su-  
per ea ad plagam oppositam portio  $AC = a$ ,  
Quumque fiat unaquæque  $CN = x \dagger a$ , de-  
signabunt portiones istæ  $CN$  valores incogni-  
tæ  $u$ .

Sit deinde  $CD$  recta, cui esse debent æ-  
quidistantes ipsæ  $NM$ , quæ valores referunt  
alterius incognitæ  $y$ . Et quia in reductione  
habetur quoque  $y \rightarrow a \rightarrow x = z$ , abscinda-  
tur ex  $CD$  portio  $CE = a$ , nec non, comple-  
to parallelogrammo  $AE$ , ducatur in eo dia-  
gonalis  $CF$ , quæ ipsis  $NM$  occurrat in  $O$ .  
Quumque habeatur quælibet  $OM = y \rightarrow a$   
 $\rightarrow x$ ; designabunt ipsæ  $OM$  valores incogni-  
tæ  $z$ .

Jam rectæ  $OM$  correspondent portioni-  
bus ipsius  $CF$ . Quare  $CF$  debebit esse diame-  
ter describendæ parabolæ. Et quoniam, posi-  
to, quod  $CA$  sit ad  $CF$ , ut  $n$  ad  $s$  invenitur  
quælibet  $CO = su : n$ ; parametrum illius  
diametri talem esse oportebit, ut productum  
ejus per  $su : n$  sit  $au$ ; proindeque erit  $an : s$   
ejusmodi parameter.

Abscindatur ergo ex  $CD$  portio  $CG =$   
 $an : s$ .



*an: s'*. Et quemadmodum describendæ parabolæ debet esse CF diameter, & CD recta, definiens positionem suarum ordinatarum; ita necesse erit, ut abscissa illa portio CG sit parameter ejus diametri. Quod autem per hujusmodi parabolam fiat satis propositæ æquationi  $yy \rightarrow 2ay \rightarrow 2xy \dagger xx \dagger ax = 0$ , ostendetur profus ut supra.

Notatu interim hic dignum existimo, quod sicuti punctum C est vertex parabolæ, sic eadem parabola transire quoque debeat per punctum A. Est enim CA ad CF, ut *n* ad *s*. Itaque erit  $CF = as : n$  : & propterea, quum sit  $CG = an : s$ , erit rectangulum GCF =  $aa$ , & consequenter æquale quadrato, quod fit ex AF. Quare omnino necesse est, ut parabola transeat per punctum A.

IX. Atque ita quidem construuntur loca ad parabolam, per reductionem suarum æquationum ad formulam simplicissimam. Videamus itaque modo, qua ratione eadem loca ad parabolam construi debeant, reducendo eorum æquationes ad formulam, quæ sit omnium maxime composita. Quem in finem, qualis sit istiusmodi formula, operæ pretium est, ut primo loco definiamus.

IX.  
Locorum ad  
parabolam  
formula ge-  
neralis exhibetur.

Nimirum, referendo parabolæ puncta omnia ad rectam positione datam, per rectas alias, quæ sint diametri alicujus ordinatæ; perspicuum est, tria contingere posse. Primo, ut recta positione data sit ipsa illa diameter. Secundo, ut sit aliqua ejus parallela. Et tertio demum, ut angulum cum eadem diametro constituat. Unde, sicuti ex tribus hisce

casibus priores duo sub tertio continentur ;  
ita & formula parabolæ, omnium maxime  
composita, ea erit, quæ ex tertio illo casu  
deducitur.

**FIG. 82.** Sit igitur EF aliqua parabolæ diameter,  
sitque etiam EG recta, quæ exhibet, tum pa-  
rametrum ejus diametri, cum positionem sua-  
rum ordinarum. Agatur deinde AD, ei-  
dem diametro parallela ; & per aliquod ejus  
punctum A ducatur quoque obliqua AB. Su-  
matur postea in AB punctum quodvis C ; &  
ductis rectis AF, CD, ipsi EG parallelis, po-  
natur AC = n, CD = m, AD = s, EG = p,  
AF = q, & EF = r.

Capiatur nunc in parabola punctum  
aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum  
EF ordinata MO, conveniens cum AB in N,  
& cum AD in R ; ponaturque adhuc AN = x,  
& NM = y. Quia ergo AN est ad NR, ut  
AC ad CD ; erit NR = mx:n, adeoque, quum  
duæ AF, RO inter se sint æquales, erit MO  
= y + mx:n + q. Et quoniam AN est ad AR,  
ut AC ad AD ; erit AR, sive FO = sx:n:  
proindeque erit EO = r + sx:n.

Jam, propter parabolam, MO quadratum  
est æquale rectangulo GEO. Quare erit yy +  
2mxy:n + mmxx:nn + 2qy + 2qmx:n + qq =  
pr + psx:n ; sive etiam yy + 2mxy:n + mmxx:  
nn + 2qy + 2qmx:n - psx:n + qq - pr = 0:  
& propterea formulam parabolæ, omnium ma-  
xime compositam, comperta æquatio nobis  
exhibebit.

Perspicuum est autem, in hujusmodi for-  
mula tres terminos yy + 2mxy:n + mmxx:nn  
qua-

quadratum perfectum constituere; nec posse in ea deficere terminum  $2mxy : n$ , quin simul deficiat terminus alter  $mmxx : nn$ . Unde veritas regulæ, superius traditæ, pro cognoscendis locis ad parabolam, ex ipsa eorum formula generali pronò alveo fluit.

X. Sed ostendamus nunc, quo pacto, ope inventæ formulæ generalis, loca ad parabolam construantur. Nimirum, comparationis ope, definiendæ sunt primum quantitates, quæ locum determinant. Et siquidem omnesveniuntur positivæ; danda est rectis, quas referunt, illa eadem positio, quam in figura formulæ reperiuntur habere. Sed, si earum aliqua prodit negativa; tunc recta, quam exhibet, capienda est ad plagam oppositam.

X.  
Quomodo  
per inven-  
tam formu-  
lam genera-  
lem loca ad  
parabolam  
construan-  
tur.

Quantitates porro, quæ locum determinant, sunt  $m, n, p, q, r, s$ . Verum, instituta comparatione, dumtaxat ipsarum  $p, q, r$  valores innotescunt. Et, quantum ad priores duas  $m, & n$ , nonnisi ratio, quam habent inter se, cognita fiet. Hinc valor unius ex iis sumi poterit ad libitum. Et tunc, per cognitam rationem, quam inter se habent, etiam valor alterius notus evadet. Præstat autem, utcumque assumere valorem ipsius  $n$ , quem tamen positivum semper esse oportebit.

Determinatis valoribus ipsarum  $m, & n$ , FIG. 82. etiam quantitatis  $s$  valor innotescet. In triangulo enim CAD notus est angulus ACD, velut æqualis angulo ANM, qui vel datus est, vel sumitur ad libitum. Quare, ubi duo ejus latera AC, CD, designata per quantitates  $n, & m$ , similiter nota sunt; cognoscemus quoque

ter-

190 SECTIONUM CONICARUM  
 tertium latus  $AD$ , quod exhibet quantitas  $s$ .  
 Speciaticim autem erit  $s = n$ , ubi valor ipsius  
 $m$  nullus reperitur; quandoquidem, evanescente  
 $CD$ , cadit  $AB$  super  $AD$ , & puncta  
 duo  $C$ , &  $D$  coeunt in unum.

Illud quoque sedulo hic notandum existi-  
 stimo, quod ubi valor parametri  $p$  prodit ne-  
 gativus, tunc ipsa parabola volvenda sit con-  
 cavitate sua ad plagam oppositam. Nec ob-  
 scura est hujus rei ratio. Nam negatio illa,  
 non tam afficit parametrum, quam abscissam,  
 in quam parameter multiplicata reperitur.  
 Unde, quum abscissa capienda sit ad partem  
 contrariam; omnino necesse est, ut parabola  
 sua concavitate respiciat plagam oppositam.

XI.  
 Exemplum  
 primum, ca-  
 sum exhi-  
 bens simpli-  
 ciorum.

XI. Oporteat itaque primo, *construere*  
*æquationem*  $yy \rightarrow 2ay \mp cx = 0$ , *quæ locum*  
*exhibet ad parabolam*. Quia in ea deest termi-  
 nus  $xy$ ; utique fractio  $2m:n$ , per quam ille in  
 formula multiplicatus reperitur, debet esse  
 nihilo æqualis. Unde, quum sit  $m = 0$ ; per  
 ea, quæ paulo ante notata sunt, erit quoque  
 $n = s$ ; adeoque ipsa formula fiet  $yy \mp 2ay \rightarrow$   
 $px \mp qq \rightarrow pr = 0$ .

Jam, instituta comparatione, habebitur  
 $2q = \rightarrow 2a$ ,  $p = \rightarrow c$ , &  $qq \rightarrow pr = 0$ .  
 Quare, per reductionem, ut est  $p = \rightarrow c$ , sic  
 erit  $q = \rightarrow a$ , &  $r = qq:p = \rightarrow aa:c$ : proin-  
 deque, designatis valoribus incognitæ  $x$  per  
 portiones  $AN$  rectæ  $AB$ , & existente  $AH$   
 recta, cui esse debent æquidistantes valores  
 alterius incognitæ  $y$ , construetur proposita  
 æquatio in eum, qui sequitur, modum.

FIG. 83.

Abscindatur ex  $AH$  portio  $AF = a$ ,  
 Tum,

Tum, ducta FO, ipsi AB parallela, capiatur super ea portio FE = aa:c. Agatur postea EG parallela rectæ AH, & fiat eadem EG=c. Denique circa diametrum EF describatur parabola, ita ut EG exhibeat, tam parametrum ejus diametri, quam positionem suarum ordinatarum. Et parabola, subinde descripta, locus erit quæsitus.

Ducatur enim ex puncto aliquo M ordinata ad diametrum MO, quæ extendatur usque donec ipsi AB occurrat in N. Et, positis AN, sive FO = x, & MN = y; erit ex constructione EO = aa:c → x, & MO = y → a. Sed, propter parabolam, MO quadratum est æquale rectangulo GEO. Quare erit yy → 2ay + aa = aa → cx, sive etiam yy → 2ay + cx = 0, quæ est æquatio construenda.

XII. Oporteat etiam, *construere æquationem*  $yy \rightarrow 2axy:c + aaxx:cc + 2ay \rightarrow cx = 0$ , *quæ similiter locum exhibet ad parabolam.* Quia hic adest terminus xy; instituta comparatione, habebitur primo  $2m:n = \rightarrow 2a:c$ . Quare, assumpta  $n = c$ , fiet  $2m = \rightarrow 2a$ , sive etiam  $m = \rightarrow a$ . Comparatis autem terminis reliquis, habebitur quoque  $2q = 2a$ ,  $2qm:n \rightarrow ps:n = \rightarrow c$ , &  $qq \rightarrow pr = 0$ .

XII.  
Exemplum  
secundum,  
casum ma-  
xime com-  
positum con-  
tinens.

Hinc, per reductionem, erit primo  $q = a$ . Et, subrogatis in æquatione  $2qm:n \rightarrow ps:n = \rightarrow c$  valoribus ipsarum m, n, q, erit secundo  $p = (cc \rightarrow 2aa):s$ . Unde fiet tertio  $r = qq:p = aas:(cc \rightarrow 2aa)$ . Et quoniam relate ad quantitatem  $cc \rightarrow 2aa$  tria contingere possunt; ponamus, cc majorem esse quam 2aa: qua ratione, ut positiva est quantitas  $cc \rightarrow 2aa$ , sic

va-

FIG. 84.

Sit jam  $AB$  recta, per cujus portiones  $AN$  designantur valores incognitæ  $x$ ; & ea, cui æquidistantes esse debent valores alterius incognitæ  $y$ , sit  $AH$ . Capiatur in  $AB$  portio  $AC = c$ ; & ducta  $CD$ , ipsi  $AH$  parallela, fiat eadem  $CD = a$ , jungaturque  $AD$ . Extendatur deinde  $AH$  versus  $A$ . Et, constituta  $AF = a$ , ducatur per punctum  $F$  recta  $EO$ , parallela ipsi  $AD$ . Fiat postea  $FE = aas : (cc - 2aa)$ , & ponatur parameter describendæ parabolæ  $EG = (cc - 2aa) : s$ .

His peractis, describatur parabola circa diametrum  $EF$ , ita ut recta  $EG$  designet, tam parametrum ejus diametri, quam positionem suarum ordinatarum. Et facile erit ostendere, quod per eam fiat satis propositæ æquationi. Nam, ducta ex aliquo ejus puncto  $M$  ordinata ad diametrum  $MO$ , quæ occurrat ipsis  $AB, AD$  in  $N$ , &  $R$ , positisque  $AN = x$ , &  $NM = y$ ; erit, ob triangula æquiangula  $ACD, ANR, NR = ax : c$ , &  $AR$ , sive  $FO = sx : c$ .

Hinc, quum sit  $MR = y - ax : c$ , &  $AF$ , sive  $RO = a$ , erit tota  $MO = y - ax : c + a$ . Est autem ex constructione  $FE = aas : (cc - 2aa)$ . Quare erit tota  $EO = sx : c + aas : (cc - 2aa)$ : & propterea, quum propter parabolam  $MO$  quadratum sit æquale rectangulo  $GEO$ , fiet æquatio  $yy - 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - 2aax : c + aa = cx - 2aax : c + aa$ , quæ reducta exhibebit æquationem propositam  $yy - 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - cx = 0$ .

XIII.  
Præcedentis  
exempli

XIII. Nolo autem hoc loco reticere, quod quem:

quemadmodum valores quantitatum  $p$ , &  $r$  <sup>sus quidem specialis ex-</sup> <sup>penditur.</sup>  $cc$  maior est, quam  $2aa$ ; ita iidem valores prodant **FIG. 84.**   
 negativi, ubi per contrarium  $cc$  minor est, quam  $2aa$ . Id vero quum contingit, non aliud fieri debet, quam sumere FE ad partem contrariam, ipsamque parabolam subinde describere, ut concavitate sua respiciat quoque plagam oppositam.

Sed fieri quoque potest, ut sit  $cc = 2aa$ . Quumque in hoc casu quantitas  $cc - 2aa$  fiat nihilo æqualis, evanescet quoque valor parametri  $p$ ; ipsa autem  $r$  infinita reperietur. Id vero mirum censerri non debet. Nam, ubi habetur  $cc = 2aa$ , duo parabolæ crura vertuntur in binas rectas, diametro EF parallelas; quarum una est ipsa AD, transiens per punctum A; altera in eadem a diametro distantia jacet ad partem oppositam.

Nec sane difficile erit, veritatem hujus ostendere. Quotiescumque enim habetur  $cc = 2aa$ , erit  $c = 2aa : a$ ; adeoque æquatio construenda  $yy - 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - cx = 0$  vertetur in hanc aliam  $yy - 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - 2aax : c = 0$ . Hinc, addendo utrique æquationis parti eandem quantitatem  $ax$ , erit  $yy - 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - 2aax : c + ax = ax$ . Et, extrahendo hinc inde radicem quadratam, erit  $y - ax : c + a = a$ , sive  $y = ax : c$ .

Huic autem æquationi fieri satis per rectam AD, perspicuum quidem est. Nam, quum sit, ut AC ad CD, ita AN ad NR; erit NR =  $ax : c$ ; proindeque, posita eadem NR =  $y$ ,

Tom. II.

N

fiet

fiet æquatio  $y = ax:c$ . Quoniam vero, per extractionem quadratæ radicis ex utraque parte æquationis  $yy = 2axy : c + aaxx : cc + 2ay - 2aax : c + aa = aa$ , habetur quoque  $y + ax:c = a = a$ , sive  $y = 2a - ax:c$ ; hinc est, ut locus componendus, præter rectam AD, aliam exigat ei parallelam ad partem alteram ipsius EF.

XIV.  
*Quid patissimum in compositione locorum ad parabolam debeat vetari.*

XIV. Cæterum, in compositione locorum ad parabolam illud sedulo notari debet, quod existentibus  $x$ , &  $y$  duabus construendæ æquationis incognitis, fieri quandoque possit, ut designari debeant per portiones AN rectæ AB valores incognitæ  $y$ , perque rectas NM valores alterius incognitæ  $x$ . Nec sane in utraque loca construendi ratione difficile erit definire, quando demum id fieri debeat.

Nimirum, quum construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, fieri id debet, quotiescumque in æquatione reducta per parametrum multiplicata reperitur, vel incognita  $y$ , vel quæ ex ipsa dependet. Sic æquatio  $xx = 2ax = cy$  mutationem illam exposcit. Nam, faciendo  $x = a = z$ , &  $y + aa : c = u$ , habetur loco ejus hæc alia  $zz = cu$ ; ubi incognita  $u$ , quæ reperitur per parametrum multiplicata, dependet ex  $y$ ; quum sit  $y + aa : c = u$ .

Quotiescumque vero construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam compositam, illud idem fieri debet, quando in æquatione construenda quadratum incognitæ  $x$  ab omni fractione immune reperitur. Sic sequens æquatio  $xx = 2axy : c + aayy : cc - 2ax$



$- 2ax - 2by + cc = 0$  exigit quoque eam variationem; quia quadratum incognitæ  $x$  illud est, quod in ea omni fractione denudatum occurrit.

Patet autem, dari posse loca quædam, quæ utroque modo construi queant. Hujusmodi est sequens æquatio  $xx - 2xy + yy - 2ax = 0$ . Nam primo in ea utriusque incognitæ quadratum omni vacat fractione. Et deinde, si fiat  $y - x = z$ , habebitur loco ejus hæc alia  $zz = 2ax$ ; si vero ponatur  $x - y - a = z$ , &  $y + a : z = u$ , fiet  $zz = 2au$  æquatio reducta.

Illud quoque perspicuum est, quod ubi æquatio construitur, per reductionem ad formulam compositam, eademque natura sua mutationem illam exposcit, debeant etiam in formula incognitæ variari. Sic formula, cum qua comparanda est æquatio  $xx - 2axy : c + aayy : cc - 2ax - 2by + cc = 0$ , haud quidem esse debet  $yy + 2mxy : n + mmxx : nn + 2qy + 2qmx : n - psx : n + qq - pr = 0$ , sed  $xx + 2myx : n + mmyy : nn + 2qx + 2qmy : n - psy : n + qq - pr = 0$ .

C A P. IV.

*Ratio construendi loca ad ellipsim, & circulum aperitur.*

- I. **O** Stenfo, qua ratione loca ad parabolam construuntur; sequitur I.  
N 2 Locorum ad nunc,

*ellipſim for-  
mula ſim-  
pliciffima  
definitur.*

nunc, ut eorum, quæ sunt ad ellipſim, con-  
ſtructionem aggrediamur. Cum iis autem con-  
jungemus quoque loca, quæ circuli circum-  
ferentia terminantur; quia, ut sæpius dictum  
est, circulus velut species quædam ellipſis  
debet haberi.

Primo igitur ostendemus, quo pacto lo-  
ca ad ellipſim conſtruantur, adhibita formula,  
quæ casum continet, omnium simpliciffimum.  
Et in ellipſi quoque, non secus ac in parabo-  
la, casus simpliciffimus habetur, quum *ejus  
puncta omnia ad aliquam ipsius diametrum re-  
feruntur per rectas, quæ sint diametri illius  
ordinatæ.*

**FIG. 85.** Sit ergo A centrum ellipſis, & BC ali-  
qua ipsius diameter. Sit etiam BD, tum para-  
meter ejus diametri, cum recta, cui omnes  
eiusdem diametri ordinatæ sunt parallelæ. Ca-  
piatur in ellipſi punctum aliquod M, ex quo  
demittatur ad diametrum BC recta MN, ipsi  
BD parallela. Tum ponatur  $AN = x$ ,  $MN$   
 $= y$ , &  $AB$ , vel  $AC = d$ .

Jam, ob naturam ellipſis,  $MN$  quadratum  
est ad differentiam quadratorum  $AB$ ,  $AN$ , ut  
est  $BD$  ad  $BC$ . Quare, si ponamus  $BD$  esse ad  
 $BC$ , ut est  $n$  ad  $m$ ; erit, ut  $n$  ad  $m$ , ita  $yy$  ad  
 $dd - xx$ ; proindeque ellipſis localis æquatio  
erit  $myy: n = dd - xx$ . Unde semper ac æ-  
quatio aliqua ad istiusmodi formam reduci po-  
terit, tunc illa ad ellipſim proculdubio nos  
manuducet.

Sed notetur hoc loco velim, quod etsi  
ordinata  $MN$  cadat infra centrum A, adhuc  
tamen æquatio localis ellipſis sit  $myy: n = dd$   
 $- xx$ .

$\equiv xx$ . Nam, licet in hoc casu habeatur  $AN$   
 $\equiv \rightarrow x$ ; nihilominus ejus quadratum est sem-  
 per  $xx$ . Et ob eandem rationem eadem adhuc  
 erit ellipsis æquatio localis, ubi ordinata du-  
 citur ad diametri partem oppositam; quia, etsi  
 fiat  $MN \equiv \rightarrow y$ , quadratum tamen ex  $MN$   
 semper erit  $yy$ .

II. Neque vero difficile erit definire, qua-  
 lis esse debeat æquatio, quæ subinde reduci  
 possit, ut formam induat istius  $myy: n \equiv dd$   
 $\equiv xx$ . Primo enim, si in æquatione incogni-  
 tæ duæ non reperiuntur simul multiplicatæ,  
 reducetur ad eam formam talis æquatio, si ab  
 utraque ejus parte existant quadrata incogni-  
 tarum, contrariis signis affecta.

II.  
 Quæ æqua-  
 tiones ad  
 formulam  
 illam sim-  
 plicissimam  
 sunt reduc-  
 biles.

Proponatur, exempli gratia, æquatio  
 $ayy: c \equiv 2ay \equiv 2bx \equiv xx$ . Fiat  $b \equiv x \equiv u$ ,  
 Et quoniam habetur  $2bx \equiv xx \equiv bb \equiv uu$ ;  
 substitutione peracta, erit  $ayy: c \equiv 2ay \equiv bb$   
 $\equiv uu$ , sive etiam  $yy \equiv 2cy \equiv bbc: a \equiv cuu: a$ .  
 Fiat quoque  $y \equiv c \equiv z$ . Quumque habeatur  
 $yy \equiv 2cy \equiv zz \equiv cc$ ; erit rursus per substi-  
 tutionem  $zz \equiv cc \equiv bbc: a \equiv cuu: a$ , sive  
 etiam  $azz: c \equiv ac \dagger bb \equiv uu$ . Ponatur porro  
 $ac \dagger bb \equiv ff$ . Et habebitur demum  $azz: c \equiv$   
 $ff \equiv uu$ , quæ est ejusdem formæ cum æqua-  
 tione ellipsis  $myy: n \equiv dd \equiv xx$ .

Quod si autem in æquatione incognitæ  
 duæ simul multiplicatæ reperiuntur; tunc, ut  
 illiusmodi æquatio formam induat istius  $myy: n$   
 $\equiv dd \equiv xx$ , oportebit, utriusque incognitæ  
 quadratum ita quidem in ea contineri, ut  
 translatis ad eandem æquationis partem, tum  
 terminis, quadrata illa continentibus, cum

termino, incognitarum productum includente, debeat coefficientis unius quadrati minui nonnihil, quo termini ii possint simul quadratum perfectum constituere.

Ita si æquatio fuerit  $yy - 2ay + 2axy : c + 2aaxx : cc + 2bx = 0$ ; ponendo  $y - a + ax : c = z$ , erit  $yy - 2ay + 2axy : c + aaxx : cc = zz + 2aax : c - aa$ . Quare, ope substitutionis, fiet  $zz + 2aax : c - aa + aaxx : cc + 2bx = 0$ , sive etiam  $cczz : aa + 2cx - cc + xx + 2bccx : aa = 0$ . Hinc, ponendo quoque  $x + c + bcc : aa = u$ , ita ut sit  $xx + 2cx + 2bccx : aa = uu - cc - 2bc^3 : aa - bbc^4 : a^4$ ; erit rursus per substitutionem  $cczz : aa + uu - 2cc - 2bc^3 : aa - bbc^4 : a^4 = 0$ . Et faciendo adhuc  $2cc + 2bc^3 : aa + bbc^4 : a^4 = ff$ ; erit demum  $cczz : aa + uu - ff = 0$ , sive etiam  $cczz : aa = ff - uu$ .

III.  
Ostenditur  
exemplis  
constructio  
locorum ad  
ellipsim per  
formulam  
simplicissi-  
mam. Ex-  
emplum pri-  
mum.

III. Sed exemplis modo ostendamus, *quæ ratione, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, loca ad ellipsim construuntur*. Primo itaque proponatur construenda æquatio  $ayy : c - 2ay = 2bx - xx$ , quæ, ut paulo ante ostensum est, reducitur ad  $azz : c = ff - uu$ , ponendo  $b - x = u$ ,  $y - c = z$ , &  $ac + bb = ff$ .

FIG. 86. Ducatur in subiecto plano recta quævis AB, ex qua abscindatur portio AC = b. Jamque, si designentur per portiones AN istius AC valores incognitæ x, fiet unaquæque reliquarum portionum CN = b - x; adeoque, quum habeatur b - x = u, ipsæ CN designabunt valores incognitæ u.

Sit deinde CD recta, cui esse debent æ-  
qui-

quidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt alterius incognitæ y. Et quoniam in reductione habetur  $y - c = z$ , abscindatur ex CD portio CE = c; & ducta per punctum E recta EF, ipsi CA parallela, fiet quælibet OM = y - a; atque adeo ipsæ OM valores referent incognitæ z.

Denique, quum æquatio reducta sit  $az^2: c = ff - uu$ , liquet, quod, si hinc inde a puncto E capiatur, tum EF, cum EG = f, debeat esse FG quæsitæ ellipsis diameter. Et quemadmodum, ducta FH, ipsi CD parallela, diametri ejus ordinatæ debent esse æquidistantes rectæ FH; ita, si fiat, ut FH sit ad FG, veluti est c ad a, erit eadem FH parameter illius diametri.

IV. Ut autem ostendere possimus, *ellipsim istam esse lineam, ad quam refertur æquatio*  $ayy: c = 2ay = 2bx - xx$ , juvat prius advertere, quod si fiat AB dupla ipsius AC, ea necessario transire debeat per puncta duo A, & B. Nam in æquatione, de qua agitur, si ponatur  $y = 0$ , habebitur  $2bx - xx = 0$ , unde infertur, tum  $x = 0$ , cum  $x = 2b$ .

IV.  
Demonstratio constructionis præcedentis exempli in medium offertur.

FIG. 86.

Id quum ita sit, agantur rectæ AK, EL ipsi FH parallele, & capiatur primo in portione ellipsis KL punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum EF ordinata MO, quæ ipsi AB occurrat in N. Jamque, positis AN = x, & MN = y; erit ex constructione CN, sive EO, vel  $b - x$ , vel  $x - b$ , & MO = y - c. Sed, propter ellipsim, MO quadratum est ad differentiam quadratorum EF, EO, ut est FH ad FG. Quare erit, ut  $yy - 2cy$  ad

N. 4

cc ad

$cc$  ad  $ff - bb + 2bx - xx$ , ita  $c$  ad  $a$ : proindeque erit  $ayy : c - 2ay + ac = ff - bb + 2bx - xx$ ; sive etiam  $ayy : c - 2ay = 2bx - xx$ , si loco  $ff$  valor ipsius  $ac + bb$  reponatur.

Capiatur secundo in portione ellipsis  $BGL$  punctum aliquod  $M$ , ex quo etiam demittatur ad diametrum  $FG$  ordinata  $MO$ , ipsi  $AB$  occurrens in  $N$ . Et quamquam in isto casu maneat adhuc  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; tamen erit semper  $CN$ , sive  $EO = x - b$ , &  $MO$  esse poterit, vel  $y - c$ , vel  $c - y$ . Interim, quia quadratum, sive fiat ex  $y - c$ , sive ex  $c - y$ , est semper  $yy - 2ay + cc$ ; rursus, ob ellipsis naturam, erit ut antea  $ayy : c - 2ay = 2bx - xx$ .

Capiatur tertio in portione ellipsis  $AFK$  punctum quodvis  $M$ , ex quo ducatur ad diametrum  $FG$  ordinata  $MO$ , ipsi  $AB$  occurrens in  $N$ . Patetque in hoc casu, manere quidem  $MN = y$ , sed fieri  $AN = -x$ . Hinc erit semper  $CN$ , sive  $EO = b - x$ , &  $MO$  esse poterit, ut in casu præcedenti, vel  $y - c$ , vel  $c - y$ . Quare, ob ellipsis naturam, habebitur semper æquatio  $ayy : c - 2ay + ac = ff - bb + 2bx - xx$ , quæ reducta fiet  $ayy : c - 2ay = 2bx - xx$ .

Capiatur demum in portione ellipsis  $AB$  punctum quodvis  $M$ , ex quo pariter demittatur ad diametrum  $FG$  ordinata  $MO$ , ipsi  $AB$  occurrens in  $N$ . Quamque in isto casu fiat  $AN = x$ , &  $MN = -y$ , erit  $CN$ , sive  $EO$ , vel  $b - x$ , vel  $x - b$ , &  $MO$  erit semper  $-y + c$ . Unde, propter naturam ellipsis, adhuc habebitur æquatio  $ayy : c - 2ay = 2bx - xx$ .

V. Pro

V. Proponatur secundo *construenda æquatio altera, superius allata,  $yy - 2ay + 2axy : c + 2aax : cc + 2bx = 0$* , quæ, ut ibidem ostensum est, reducitur ad  $cczz : aa = ff - uu$ , ponendo  $y = a + ax : c = z$ ,  $x + c + bcc : aa = u$ , &  $2cc + 2bc^3 : aa + bbc^4 : a^4 = ff$ .

V.  
Exemplum  
secundum  
casum exhi-  
bens paulo  
difficiliorem.

Ducatur in subjecto plano recta quævis AB, & per portiones ejus AN designentur valores incognitæ  $x$ . Quumque habeatur  $x + c + bcc : aa = u$ , capiatur ad partem oppositam portio AC =  $c + bcc : aa$ . Et quoniam fit quælibet CN =  $x + c + bcc : aa$ , designabunt portiones CN valores incognitæ  $u$ .

FIG. 87.

Sit deinde CD recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur  $y = a + ax : c = z$ , abscindatur ex CD tum portio CE =  $a$ , cum portio EF, quæ sit ad AC, ut est  $a$  ad  $c$ . Jamque completo parallelogrammo AE, ductaque FG, ipsis NM occurrente in O, fiet unaquæque OM =  $y = a + ax : c$ ; adeoque ipsæ OM valores referent incognitæ  $z$ .

Quoniam autem rectæ OM correspondent portionibus ipsius FG; utique debet esse F centrum describendæ ellipsis, & FG positio suæ diametri. Verum portiones illæ FO tunc demum reperiuntur æquales ipsis CN, ubi æquales sunt duæ AC, FG. Unde procul est, ut eadem FO designare queant valores incognitæ  $u$ ; adeoque, etsi æquatio reducta sit  $cczz : a = ff - uu$ , multum tamen abest, ut sit  $f$  semidiameter quæsitæ ellipsis, & ut ratio parametri ad diametrum sit æqualis ei, quam habet  $aa$  ad  $cc$ . Quia

Itaque, ut definiamus, tum semidiametrum describendæ ellipsis, cum rationem parametri ad diametrum; sit AC ad FG, ut est  $c$  ad  $s$ . Quumque hac ratione fiat quælibet FO  $\equiv su : c$ ; si ponamus ulterius, quod quæsitæ semidiameter sit  $g$ , & quod ratio parametri ad diametrum sit æqualis ei, quam habet  $n$  ad  $m$ ; erit ejusdem ellipsis localis æquatio  $mzz : n \equiv gg - ssuu : cc$ , sive etiam  $ccmzz : ssn \equiv ccgg : ss - uu$ . Erat autem  $cczz : aa \equiv ff - uu$ . Quare, instituta comparatione, fiet  $ccm : ssn \equiv cc : aa$ , &  $ccgg : ss \equiv ff$ . Unde inferitur  $n : m \equiv aa : ss$ , &  $g \equiv fs : c$ .

Capiatur ergo super FG hinc inde à puncto F, tum FH, cum  $FK \equiv fs : c$ ; & erit HK diameter quæsitæ ellipsis. Ducatur porro per punctum H recta HL, ipsi CD parallela; & fient diametri ejus ordinatæ æquidistantes rectæ HL. Constituatur demum HL talis longitudinis, ut sit HL ad HK, veluti est  $aa$  ad  $ss$ ; & erit eadem HL parameter illius diametri.

VI. Hic etiam; ut ostendere possimus, *Veritas constructionis præcedentis exempli demonstratur.* *hujusmodi ellipsim satisfacere propositæ æquationi*  $yy - 2ay + 2axy : c + 2aaxx : cc + 2bx \equiv 0$ , juvat prius advertere, quod si super **FIG. 87.** AC capiatur portio AP  $\equiv bcc : aa$ , ea necessario transire debent per puncta duo A, & P. Nam in æquatione, da qua agitur, si ponatur  $y \equiv 0$ , fiet  $2aaxx : cc + 2bx \equiv 0$ , sive etiam  $aaxx : cc + bx \equiv 0$ , unde inferitur, tum  $x \equiv 0$ , cum  $x \equiv -bcc : aa$ .

Id, quum ita sit, agantur rectæ AQ, PS ipsi CD, vel HL parallele. Et capiatur primo



mo in portione ellipsis AKQ punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Jamque, positis AN = x, & MN = y; erit ex constructione CN = x + c + bcc : aa, & MO vel y = a + ax : c, vel = y + a = ax : c. Sed CN est ad FO, ut AC ad FG, sive etiam, ut c ad s. Quare erit FO = sx : c + s + bsc : aa.

Quia autem, propter ellipsim, MO quadratum est ad differentiam quadratorum FH, FO, veluti est HL ad HK; erit, ut yy = 2ay + aa + 2axy : c = 2aax : c + aaxx : cc ad ffs : cc = sxx : cc = 2ssx : c = ss = 2bssx : aa = 2bssc : aa = bbssc : a<sup>4</sup>, ita aa ad ss. Unde fiet yy = 2ay + aa + 2axy : c = 2aax : c + aaxx : cc = aaff : cc = aaxx : cc = 2aax : c = aa = 2bx = 2bc = bbcc : aa, quæ, translatis terminis omnibus ad eandem partem, & posito loco ff valore ejus 2cc + 2bc<sup>3</sup> : aa + bbcc<sup>4</sup> : a<sup>4</sup>, reducitur ad yy = 2ay + 2axy : c + 2aaxx : cc + 2bx = 0.

Capiatur secundo in portione ellipsis QS punctum aliquod M, ex quo etiam demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quamquam in isto casu maneat MN = y, fiet tamen AN = x. Unde adhuc erit CN = x + c + bcc : aa, & FO = sx : c + s + bsc : aa; sed MO erit semper y = a + ax : c : proindeque, ob naturam ellipsis, rursus erit ut antea yy = 2ay + 2axy : c + 2aaxx : cc + 2bx = 0.

Capiatur tertio in portione ellipsis PHS punctum quodvis M, ex quo similiter ducatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB

oc-

occurrentes in N. Patetque, etiam in isto casu manere quidem  $MN = y$ , sed fieri  $AN = x$ . Hinc erit MO, vel  $y = a + ax/c$ , vel  $y = a + ax/c$ ; CN, vel  $x + c + bcc/aa$ , vel  $x + c + bcc/aa$ ; & FO, vel  $sx/c + s + bsc/aa$ , vel  $sx/c + s + bsc/aa$ . Quare, ob ellipsis naturam, habebitur semper æquatio  $yy = 2ay + 2axy/c + 2aax/cc + 2bx = 0$ .

Capiatur demum in portione ellipsis AP punctum quodvis M, ex quo pariter demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quoniam in isto casu fit, tam  $AN = x$ , quam  $MN = y$ ; erit semper  $CN = x + c + bcc/aa$ ,  $FO = sx/c + s + bsc/aa$ , &  $MO = y + a + ax/c$ . Unde, propter ellipsim, adhuc habebitur æquatio  $yy = 2ay + 2axy/c + 2aax/cc + 2bx = 0$ , quam construere oportebat.

VII.  
Locorum ad  
ellipsim for-  
mula gene-  
ralis exhibe-  
tur.

VII. Atque ita quidem construuntur loca ad ellipsim, per reductionem suarum æquationum ad formulam simplicissimam. Videamus itaque modo, qua ratione eadem loca ad ellipsim construi debeant, reducendo earum æquationes ad formulam, quæ sit omnium maxime composita. Quem in finem, qualis sit istiusmodi formula, operæ pretium est, ut primo loco definiamus.

Nimirum, referendo ellipsis puncta omnia ad rectam positione datam, per rectas alias, quæ sint diametri alicujus ordinatæ; perspicuum est, tria contingere posse. Primo, ut recta positione data sit ipsa illa diameter. Secundo, ut sit aliqua ejus parallela. Et tertio de-

demum, ut angulum cum eadem diametro constituat. Unde, sicuti, ex tribus hisce casibus priores duo sub tertio continentur; ita & formula ellipsis, omnium maxime composita, ea erit, quæ ex tertio illo casu deducitur.

Sit igitur E centrum ellipsis, & HK aliqua ejus diameter; sitque etiam HG recta, quæ exhibet, tum parametrum illius diametri, cum positionem suarum ordinatarum. Agatur deinde AD, eidem diametro parallela; & per aliquod ejus punctum A ducatur quoque obliqua AB. Sumatur postea in AB punctum quodvis C; & ductis rectis AF, CD, ipsi HG, parallelis, ponatur AC = n, CD = m, AD = s, EH, vel EK = t, HG = p, AF = q, & EF = r. FIG. 88.

Capiatur nunc in ellipsi punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum HK ordinata MO, conveniens cum AB in N, & cum AD in R; ponaturque adhuc AN = x, & NM = y. Quia ergo AN est ad NR, ut AC ad CD; erit NR = mx:n; adeoque, quum ducæ AF, RO inter se sint æquales, erit MO = y + mx:n + q. Et quoniam AN est ad AR, ut AC ad AD; erit AR, sive FO = sx:n; proindeque erit EO = r + sx:n.

Jam, propter ellipsim, MO quadratum est ad differentiam quadratorum EH, EO, ut est HG ad HK. Quare erit, ut yy + 2mxy:n + mmxx:nn + 2qy + 2qmx:n + qq ad tt - rr - 2rsx:n - ssxx:nn, ita p ad 2t. Unde fiet yy + 2mxy:n + mmxx:nn + 2qy + 2qmx:n + qq = pt:2 - prr:2t - prsx:tn - pssxx:2tnn, sive etiam yy + 2mxy:n + mmxx:nn + pssxx:2tnn + 2qy

$\dagger 2qy \dagger 2qmx : n \dagger prsx : tn \dagger qq \rightarrow pt : 2 \dagger prr : 2t = 0 :$  & propterea formulam ellipsis, omnium maxime compositam, comperta æquatio nobis exhibebit.

Perpicuum est autem, in hujusmodi formula coefficientem quadrati  $xx$  debere minui nonnihil, quo priores tres termini  $yy \dagger 2mxy : n \dagger mmxx : nn \dagger pssxx : 2tnn$  constituere queant quadratum perfectum; nec, deficiente termino  $2mxy : n$ , deficere quoque debere terminum alterum, in quo quadratum  $xx$  continetur. Unde veritas regulæ, superius traditæ, pro cognoscendis locis ad ellipsem, ex ipsa eorum formula generali prono alveo fluit.

VIII.  
Quomodo  
per inven-  
tam formu-  
lam genera-  
lem loca ad  
ellipsem con-  
struantur.

VIII. Sed ostendamus nunc, *quo pacto, ope inventæ formulæ generalis, loca ad ellipsem construantur.* Nimirum, comparationis ope, definiendæ sunt primum quantitates, quæ locum determinant. Et siquidem omnes inveniuntur positivæ; danda est rectis, quas referunt, illa eadem positio, quam in figura formulæ reperiuntur habere. Sed, si earum aliqua prodit negativa; tunc recta, quam exhibet, capienda est ad plagam oppositam.

Quantitates porro, quæ locum determinant, sunt  $m, n, p, q, r, s, t$ . Verum, instituta comparatione, dumtaxat ipsarum  $p, q, r, t$  valores innotescunt. Et, quantum ad priores duas  $m$ , &  $n$ , nonnisi ratio, quam habent inter se, cognita fiet. Hinc valor unius ex iis sumi poterit ad libitum. Et tunc, per cognitam rationem, quam inter se habent, etiam valor alterius notus evadet. Præstat autem,

ut.

utcumque assumere valorem ipsius  $n$ , quem tamen positivum semper esse oportebit.

Determinatis valoribus ipsarum  $m$ , &  $n$ , **FIG. 88.** etiam quantitatis  $s$  valor innotescet. In triangulo enim  $CAD$  notus est angulus  $ACD$ , velut æqualis angulo  $ANM$ , qui vel datus est, vel sumitur ad libitum. Quare, ubi duo ejus latera  $AC$ ,  $CD$ , designata per quantitates  $n$ , &  $m$ , similiter nota sunt; cognoscemus quoque tertium latus  $AD$ , quod exhibet quantitas  $s$ . Speciatim autem erit  $s = n$ , ubi valor ipsius  $m$  nullus reperitur; quandoquidem, evanescente  $CD$ , cadit  $AB$  super  $AD$ , & puncta duo  $C$ , &  $D$  coeunt in unum.

Quantum ad valorem parametri  $p$ , ille nunquam negativus potest oriri. Unde, quod in constructione locorum ad parabolam observavimus, nequit hic locum habere. Potius valor semidiametri  $t$  oriri potest quandoque imaginarius. Et quum id contingit, indicio est, quæsitum locum contradictionem aliquam involvere. Nec reticebimus ejusdem semidiametri valorem posse etiam interdum nihilo æqualem inveniri; & in eo casu optata ellipsis ad simplex punctum reducetur.

**IX.** Oporteat itaque primo, *construere æquationem*  $yy - 2ay + axx: c \rightarrow ac = 0$ , *quæ locum exhibet ad ellipsim*. Quia in ea deest terminus  $xy$ ; utique fractio  $2m:n$ , per quam ille in formula multiplicatus reperitur, debet esse nihilo æqualis. Unde, quum sit  $m = 0$ ; per ea, quæ paulo ante notata sunt, erit quoque  $n = s$ ; adeoque ipsa formula fiet  $yy + pxx: 2t + 2qy + prx: t + qq \rightarrow pt: 2 + prr: 2t = 0$ .  
Jam,

**IX.**  
*Exemplum primum, casu exhibens simpliciorum.*

Jam, instituta comparatione, habebitur  $p: 2t = a: c$ ,  $2q = \sqrt{2a}$ ,  $pr: t = 0$ , &  $qq = \sqrt{pt}: 2 \mp prr: 2t = \sqrt{ac}$ . Unde, sicuti ex prima harum æquationum infertur, quod ratio parametri ad diametrum debeat esse æqualis ei, quam habet  $a$  ad  $c$ ; sic ex secunda eruitur  $q = \sqrt{a}$ , ex tertia  $r = 0$ , & ex quarta  $pt = 2aa \mp 2ac$ .

Quum autem sit  $p: 2t = a: c$ , erit etiam  $p = 2at: c$ , &  $pt = 2att: c$ . Est vero  $pt = 2aa \mp 2ac$ . Itaque erit  $2att: c = 2aa \mp 2ac$ , &  $tt = ac \mp cc$ . Hinc, per extractionem quadratæ radicis, fiet  $t = \sqrt{(ac \mp cc)}$ : proindeque, designatis valoribus incognitæ  $x$  per portiones AN rectæ AB, & existente AL recta, cui esse debent æquidistantes valores alterius incognitæ  $y$ , construetur proposita æquatio in eum, qui sequitur, modum.

Abscindatur ex AL portio AF:  $= a$ . Tum, ducta FO, ipsi AB parallela, capiatur super ea hinc inde a puncto F, tam portio FH, quam portio FK  $= \sqrt{(ac \mp cc)}$ . Agatur postea HG, parallela rectæ AL, & constituatur eadem HG talis longitudinis, ut sit HG ad HK in eadem ratione, quam habet  $a$  ad  $c$ . Denique diametro HK describatur ellipsis, ita ut recta HG exhibeat, tam parametrum ejus diametri, quam positionem suarum ordinarum. Et ellipsis, subinde descripta, locus erit quæsitus.

Ducatur enim ex puncto aliquo M ordinata ad diametrum MO, quæ extendatur usque donec ipsi AB occurrat in N. Et, positus AN, sive FO  $= x$ , & MN  $= y$ , erit ex  
con-

constructione  $MO = y \rightarrow a$ . Sed, propter ellipsum,  $MO$  quadratum est ad differentiam quadratorum  $FH, FO$ , ut est  $HG$  ad  $HK$ . Quare erit, ut  $yy \rightarrow 2ay \dagger aa$  ad  $ac \dagger cc \rightarrow xx$ , ita  $a$  ad  $c$ . Unde fiet  $yy \rightarrow 2ay \dagger aa = aa \dagger ac \rightarrow axx : c$ , sive etiam  $yy \rightarrow 2ay \dagger axx : c \rightarrow ac = 0$ , quæ est æquatio construenda.

X. Oporteat etiam, *construere æquationem*  $yy \rightarrow 2axy : c \dagger 2aaxx : cc \rightarrow 2by \dagger aa = 0$ , quæ similiter locum exhibet ad ellipsum. Quia hic adest terminus  $xy$ ; instituta comparatione, habebitur primo  $2m:n = 2a:c$ . Quare, assumpta  $n = c$ , fiet  $2m = 2a$ , sive etiam  $m = a$ . Comparatis autem terminis reliquis, habebitur quoque  $mm:nn \dagger pss: 2tmm = 2aa:cc$ ,  $2q = 2b$ ,  $2qm: n \dagger prs: tn = 0$ , &  $qq \rightarrow pt: 2 \dagger prr: 2t = aa$ .

X  
Exemplum  
secundum,  
casum ma-  
xime compo-  
situm conti-  
nens.

Hinc in prima harum æquationum, subrogatis valoribus ipsarum  $m$ , &  $n$ , fiet  $aa:cc \dagger pss: 2tcc = 2aa:cc$ , sive etiam  $p:2t = aa:ss$ . Unde inferitur, rationem parametri ad diametrum æqualem esse debere ei, quam habet  $aa$  ad  $ss$ . Et quoniam ex secunda æquatione eruitur  $q = b$ , habebitur ope tertiæ  $pr : t = 2ab:s$ , sive etiam  $pr : 2t = ab : s$ . Quumque sit  $p: 2t = aa: ss$ , erit per substitutionem  $aar : ss = ab : s$ , atque adeo  $r = bs : a$ .

Denique, ob quartam æquationem, erit  $bb \rightarrow pt : 2 \dagger bb = aa$ , sive etiam  $4bb \rightarrow 2aa = pt$ . Quum autem habeatur  $p: 2t = aa : ss$ , fiet quoque  $pt = 2aatt: ss$ . Unde erit  $2aatt: ss = 4bb \rightarrow 2aa$ , &  $tt = 2bbss: aa \rightarrow ss$ : proindeque, per extractionem quadratæ radicis, habebitur  $t = \sqrt{(2bbss: aa \rightarrow ss)}$ : adeo nempe, ut

Tom. II.

O

nisi

210 SECTIONUM CONICARUM  
 nisi sit  $2bb$  major, quam  $aa$ , valor ipsius  $t$ , vel  
 nullus, vel imaginarius prodibit.

FIG. 90. Ponamus ergo,  $2bb$  majorem esse, quam  $aa$ .  
 Et, designatis valoribus incognitæ  $x$  per por-  
 tiones  $AN$  rectæ  $AB$ , sit  $AL$  ea, cui æqui-  
 distantes esse debent valores alterius incogni-  
 tæ  $y$ . Capiatur in  $AB$  portio  $AC = c$ . Et, du-  
 cta  $CD$ , ipsi  $AL$  parallela, fiat eadem  $CD = a$ ,  
 jungaturque  $AD$ . Abscindatur deinde ex  
 $AL$  portio  $AF = b$ , perque punctum  $F$  aga-  
 tur recta  $FEO$ , parallela ipsi  $AD$ . Fiat postea  
 $FE = bs : a$ . Et hinc inde a puncto  $E$  capia-  
 tur, tam portio  $EH$ , quam portio  $EK =$   
 $\sqrt{(2bbs : aa \pm ss)}$ .

Ducatur porro  $HG$ , æquidistans ei-  
 dem  $AL$ , & constituatur eadem  $HG$  talis lon-  
 gitudinis, ut sit  $HG$  ad  $HK$  in eadem prorsus  
 ratione, quam habet  $aa$  ad  $ss$ . Denique dia-  
 metro  $HK$  describatur ellipsis, ita ut  $HG$   
 exhibeat, tam parametrum ejus diametri,  
 quam positionem suarum ordinatarum. Et  
 ellipsis, subinde descripta, locus erit quæsi-  
 tus. Quod ut palam fiat, ducatur ex puncto  
 aliquo  $M$  ordinata ad diametrum  $MO$ , quæ  
 occurrat ipsis  $AB$ ,  $AD$  in  $N$ , &  $R$ ; positif-  
 que  $AN = x$ , &  $NM = y$ , erit, ob triangu-  
 la æquiangula  $ACD$ ,  $ANR$ ,  $NR = ax : c$ , &  
 $AR$ , sive  $FO = sx : c$ .

Hinc, quum sit  $MR = y \rightarrow ax : c$ , &  $AF$ ,  
 sive  $RO = b$ ; erit reliqua  $MO = y \rightarrow ax : c$   
 $\rightarrow b$ . Est autem ex constructione  $FE = bs : a$   
 Quare erit reliqua  $EO = sx : c \rightarrow bs : a$ . Jam  
 vero, propter ellipsim,  $MO$  quadratum est  
 ad differentiam quadratorum  $EH$ ,  $EO$ , ut est  
 $HG$



HG ad HK. Itaque, quum habeatur, ut  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger aaxx:cc \rightarrow 2by \dagger 2abx:c \dagger bb$  ad  $2bbss:aa \rightarrow ss \rightarrow ssxx:cc \dagger 2bssx:ac \rightarrow bbss:aa$ , ita  $aa$  ad  $ss$ ; erit  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger aaxx:cc \rightarrow 2by \dagger 2abx:c \dagger bb \equiv 2bb \rightarrow aa \rightarrow aaxx:cc \dagger 2abx:c \rightarrow bb$ , quæ reducta exhibebit æquationem propositam  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger 2aaxx:cc \rightarrow 2by \dagger aa \equiv 0$ .

XI. In allato igitur exemplo, ut valor semidiametri  $t$  realis evadat, necesse est, ut  $2bb$  major sit, quam  $aa$ . Sed, si fuerit  $2bb$  minor quam  $aa$ ; tunc ejusdem semidiametri valor prodibit imaginarius; adeoque ipse locus construendus contradictionem aliquam involvet. Et denique, si habeatur  $2bb \equiv aa$ ; tunc evanescet valor semidiametri  $t$ ; atque adeo ipsa ellipsis describenda in centro  $F$  tota colligetur.

XI.  
Præcedentis  
exempli casus  
omnes  
expenduntur.

Et sane, quum æquatio construenda sit  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger 2aaxx:cc \rightarrow 2by \dagger aa \equiv 0$ , si-ve etiam  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger aaxx:cc \rightarrow 2by \equiv aaxx:cc \rightarrow aa$ ; addendo utrique ejus parti communem quantitatem  $2abx:c \dagger bb$ , fiet  $yy \rightarrow 2axy:c \dagger aaxx:cc \rightarrow 2by \dagger 2abx:c \dagger bb \equiv bb \dagger 2abx:c \rightarrow aaxx:cc \rightarrow aa$ ; adeoque, per extractionem quadratæ radicis, erit, vel  $y = ax:c \dagger b \dagger \sqrt{(bb \dagger 2abx:c \rightarrow aaxx:cc \rightarrow aa)}$  vel  $y = ax:c \dagger b \rightarrow \sqrt{(bb \dagger 2abx:c \rightarrow aaxx:cc \rightarrow aa)}$ .

Hinc, ut valor incognitæ  $y$  realis reperiat, necesse est, quantitatem  $bb \dagger 2abx:c \rightarrow aaxx:cc \rightarrow aa$ , vel nullam esse, vel positivam. Talis autem esse non potest, quotiescumque  $2bb$  minor est, quam  $aa$ . Nam posito, quod

O 2 sit

fit  $2bb \mp ff = aa$ , quantitas illa  $bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \rightarrow aa$ , ope substitutionis, mutabitur in hanc aliam  $bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \rightarrow 2bb \rightarrow ff$ , sive  $\rightarrow bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \rightarrow ff$ , quam, velut compositam ex duobus quadratis negativis, liquet esse realem, & negativam.

Sed non perinde res est, quum  $2bb$  major est, quam  $aa$ . Tunc enim poni debet  $2bb \rightarrow ff = aa$ ; adeoque, per substitutionem, quantitas  $bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \rightarrow aa$  evadet  $bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \rightarrow 2bb \mp ff$ , hoc est  $\rightarrow bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc \mp ff$ , quam, perspicuum est, tunc tantum esse realem & negativam, quotiescumque  $ff$ , sive  $2bb \rightarrow aa$  minor est, quam  $bb \rightarrow 2abx : c \mp aaxx : cc$ .

Nec item id accidit, quum habetur  $2bb = aa$ . Nam in isto casu illa eadem quantitas fiet  $\rightarrow bb \mp 2abx : c \rightarrow aaxx : cc$ , quæ nulla evadit, si ponatur  $x = bc : a$ . Atque hinc est, ut in hypothese, quod sit  $2bb = aa$ , ellipsis tota in centro colligatur. Nimirum, quia in ea hypothese tunc tantum valor incognitæ  $y$  realis reperitur, quotiescumque habetur  $x = bc : a$ .

XII. Cæterum, in compositione locorum ad ellipsim illud quoque sedulo notari debet, quod existentibus  $x$ , &  $y$  duabus construendæ æquationis incognitis, fieri quandoque possit, ut designari debeant per portiones AN rectæ AB valores incognitæ  $y$ , perque rectas NM valores alterius incognitæ  $x$ . Nec sane in utraque loca construendi ratione difficile erit definire, quando demum id fieri debeat.

Ni-

Quid in compositione locorum ad ellipsim potissimum notari debeat.

Nimirum, quum construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, fieri id debet, quotiescumque in æquatione reducta per fractionem aliquam multiplicatum reperitur quadratum, vel incognitæ  $x$ , vel ejus, quæ ex ipsa dependet. Sic æquatio  $mxx:n \rightarrow 2mx = 2ay \rightarrow yy$  mutationem illam exposcit. Nam, faciendo  $x \rightarrow n = z$ ,  $a \rightarrow y = u$ , &  $aa \dagger mn = cc$ , habetur loco ejus hæc alia  $mzz:n = cc \rightarrow uu$ : ubi per fractionem  $m:n$  reperitur multiplicatum quadratum incognitæ  $z$ , quæ dependet ex  $x$ ; quum habeatur  $x \rightarrow n = z$ .

Quotiescumque vero construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam compositam, illud idem fieri debet, quando in æquatione construenda quadratum incognitæ  $x$  ab omni fractione immune reperitur. Sic sequens æquatio  $xx \rightarrow 2axy : c \dagger 2aayy : cc \rightarrow 2ax \rightarrow 2by \dagger cc = 0$  exigit quoque eam variationem, quia quadratum incognitæ  $x$  illud est, quod in ea omni fractione denudatum occurrit.

Interim, quum construitur æquatio, per reductionem ad formulam compositam, eademque natura sua mutationem illam exposcit, necesse est, ut etiam in formula incognitæ varientur. Sic formula, cum qua comparanda est æquatio  $xx \rightarrow 2axy : c \dagger 2aayy : cc \rightarrow 2ax \rightarrow 2by \dagger cc = 0$ , haud quidem esse debet  $yy \dagger 2mxy:n \dagger mxxx:nn \dagger pssxx:2tnt \dagger 2qy \dagger 2qmx:n \dagger prsx:tn \dagger qq - pt:2 \dagger prr:2t = 0$ , sed  $xx \dagger 2myx:n \dagger mmyy:nn \dagger pssyy:2tnt \dagger 2qx \dagger 2qmy:n \dagger prsy:tn \dagger qq - pt:2 \dagger prr:2t = 0$ .

Fatendum est tamen, variationem istam non esse absolute necessariam. Nam in priore exemplo, etsi per reductionem habeatur  $mzz:n = cc - uu$ ; multiplicando tamen omnes æquationis terminos per  $n$ , eisdemque dividendo per  $m$ , fiet  $zz = ncc:m - nuu:m$ , sive etiam  $nuu:m = ncc:m - zz$ : ubi per fractionem  $n:m$  multiplicatum reperitur quadratum incognitæ  $u$ , quæ dependet ex  $y$ ; quum habeatur  $a \rightarrow y = u$ .

Atque ita quoque in secundo exemplo, etsi æquatio sit  $xx \rightarrow 2axy:c + 2aayy:cc - 2ax \rightarrow 2by + cc = 0$ ; multiplicatis tamen terminis omnibus per  $cc$ , iisdemque divisus per  $2aa$ , habebitur  $ccxx:2aa \rightarrow cxy:a + yy - ccx:a \rightarrow bccy:aa + c^4:2aa = 0$ : ubi quadratum incognitæ  $y$  omni vacat fractione. Nec difficile erit intelligere, quod hoc idem præstari possit in omnibus æquationibus, quæ ad ellipsim nos manuducunt.

XIII.  
Quomodo  
construenda  
sunt loca, quæ  
circuli cir-  
cumferentia  
terminantur.

XIII. Quantum ad compositionem locorum, quæ circuli circumferentia terminantur, ea fieri debet, perinde ac si loca ipsa essent ad ellipsim; quum revera circulus velut species quædam ellipsis debeat haberi. Innotescet autem, locum esse ad circulum, quotiescumque, constructo loco, parameter sit æqualis diametro, ad quam refertur, itemque ordinatæ rectos cum eadem diametro angulos constituunt; quum non aliter ellipsis in circulum abire queat, quam quum duo ista contingunt.

Proponatur, exempli gratia, construenda æquatio  $yy \rightarrow 2ay = 2bx - xx$ , quæ ad  
el.

ellipsim nos ducit. Fiat, tum  $y - a = z$ , cum  $b - x = u$ . Et quoniam habetur  $yy - 2ay = zz - aa$ , &  $2bx - xx = bb - uu$ ; erit per substitutionem  $zz - aa = bb - uu$ , si-  
ve etiam  $zz = aa + bb - uu$ . Ponatur quo-  
que  $aa + bb = cc$ ; & erit  $zz = cc - uu$  æ-  
quatio reducta.

FIG. 91.

Ducatur jam in subiecto plano recta quævis  $AB$ , ex qua abscindatur portio  $AC = b$ . Et siquidem designentur per portiones  $AN$  istius  $AC$  valores incognitæ  $x$ , fiet una-  
quæque reliquarum portionum  $CN = b - x$ ; adeoque, quum habeatur  $b - x = u$ , ipsæ  $CN$  designabunt valores incognitæ  $u$ .

Sit deinde  $CD$  recta, cui esse debent æ-  
quidistantes ipsæ  $NM$ , quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductio-  
ne habetur  $y - a = z$ , abscindatur ex  $CD$  portio  $CE = a$ ; & ducta per punctum  $E$  re-  
cta  $EF$ , ipsi  $CA$  parallela, fiet quælibet  $OM = y - a$ ; adeoque ipsæ  $OM$  valores referent incognitæ  $z$ .

Denique, quum æquatio reducta sit  $zz = cc - uu$ , liquet, quod si hinc inde a pun-  
cto  $E$  capiatur, tum  $EF$ , cum  $EG = c$ , de-  
beat esse  $FG$  quæsitæ ellipsis diameter. Et quemadmodum, ducta  $FH$ , ipsi  $CD$  paral-  
lela, diametri ejus ordinatæ debent esse æ-  
quidistantes rectæ  $FH$ ; ita si fiat, ut  $FH$  sit ad  $FG$  in ratione æqualitatis, erit eadem  $FH$  parameter illius diametri.

In constructo igitur loco inventa est parameter  $FH$  æqualis diametro  $FG$ , ad quam refertur. Unde, si ordinatæ ejusdem diame-

216 SECTIONUM CONICARUM  
 tri OM rectos cum ipsa angulos constituent, jam ellipsis vertetur in circulum; adeoque componetur quæsitus locus, describendo circuli circumferentiam ex puncto E tanquam centro, & intervallo ipsius EF, five EG.

## C A P. V.

### *De constructione locorum ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam.*

I.  
 Locorum ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam formula simplicissima definitur.

I. **R** Eliquum jam est, ut constructionem locorum ostendamus, quæ ad hyperbolam nos ducunt. Hujusmodi loca duplicis speciei esse possunt. Nam hyperbola, per quam terminantur, considerari potest, vel relate ad ejus diametros, vel in ordine ad suas asymptotos. Unde eorundem locorum constructionem duobus etiam capitibus complectemur; & in isto quidem agemus de locis illis, in quibus hyperbola relate ad diametros consideratur; tum capite sequenti ea prosequemur, in quibus hyperbola sub contemplationem venit relate ad asymptotos.

Tradituri autem constructionem locorum ad hyperbolam, relate ad ejus diametros consideratam, ostendemus primo loco, quæ ratione ea construi debeant, adhibita formula, quæ casum continet, omnium simplicissimum. Et in hyperbola quoque, non secus ac in parabola, & ellipsi, casus simplicissimus ha-

habetur, quum ejus puncta omnia ad aliquam ipsius diametrum referuntur per rectas, quæ sint diametri illius ordinatæ.

Sit ergo A centrum hyperbolæ, & BC aliqua ipsius diameter. Sit etiam BD, tum parameter ejus diametri, cum recta, cui omnes ejusdem diametri ordinatæ sunt parallelæ. Capiatur in hyperbola punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum BC recta MN, ipsi BD parallela. Tum ponatur AN =  $x$ , MN =  $y$ , & AB, vel AC =  $d$ . FIG. 92.

Jam, ob naturam hyperbolæ, MN quadratum est ad differentiam quadratorum AN, AB, ut est BD ad BC. Quare, si ponamus, BD esse ad BC, ut est  $n$  ad  $m$ ; erit, ut  $n$  ad  $m$ , ita  $yy$  ad  $xx \rightarrow dd$ : proindeque hyperbolæ localis æquatio erit  $myy : n = xx \rightarrow dd$ . Unde semper ac æquatio aliqua ad istiusmodi formam reduci poterit, tunc ea ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, proculdubio nos manuducet.

Sed notetur hoc loco velim, quod etsi ordinata MN ducatur in hyperbola opposita, adhuc tamen æquatio localis hyperbolæ sit  $myy : n = xx \rightarrow dd$ . Nam, licet in hoc casu habeatur AN =  $-x$ , nihilominus ejus quadratum est semper  $xx$ . Et ob eandem rationem eadem adhuc erit hyperbolæ æquatio localis, ubi ordinata ducitur ad diametri partem oppositam; quia, etsi fiat MN =  $-y$ , quadratum tamen ex MN semper erit  $yy$ .

II. Neque vero difficile erit definire, qualis esse debeat æquatio, quæ subinde reduci possit, ut formam induat istius  $myy : n = xx \rightarrow dd$ . II. Quæ æquationes ad formulam istam simpli-

*effimam  
sunt reduci-  
biles.*

*dd*. Primo enim, si in æquatione incognitæ duæ non reperiuntur simul multiplicatæ, reducetur ad eam formam talis æquatio, si ab utraque ejus parte existant quadrata incognitarum iisdem signis affecta.

Proponatur, exempli gratia, æquatio  $ayy : c \rightarrow 2ay \mp ac = 2bx \mp xx$ . Fiat  $x \mp b = u$ . Et quoniam habetur  $2bx \mp xx = uu \rightarrow bb$ ; substitutione peracta, erit  $ayy : c \rightarrow 2ay \mp ac = uu \rightarrow bb$ , sive etiam  $yy \rightarrow 2cy \mp cc = cuu : a \rightarrow cbb : a$ . Fiat quoque  $y \rightarrow c = z$ . Quumque habeatur  $yy \rightarrow 2cy \mp cc = zz$ ; erit rursus per substitutionem  $zz = cuu : a \rightarrow cbb : a$ , sive etiam  $azz : c = uu \rightarrow bb$ , quæ est ejusdem formæ cum æquatione hyperbolæ locali  $myy : n = xx \rightarrow dd$ .

Quod si autem in æquatione incognitæ duæ simul multiplicatæ reperiuntur; tunc, ut illiusmodi æquatio formam induat istius  $myy : n = xx \rightarrow dd$ , oportebit, utriusque incognitæ quadratum ita quidem in ea contineri, ut translatis ad eandem æquationis partem, tum terminis, quadrata illa continentibus, cum termino, incognitarum productum includente, debeat coefficientis unius quadrati augeri nonnihil, quo termini ii possint simul quadratum perfectum constituere.

Ita si æquatio fuerit  $yy \rightarrow 2ay \mp 4axy : c \mp 3aaxx : cc \mp 2bx = 0$ , ponendo  $y \rightarrow a \mp 2ax : c = z$ , erit  $yy \rightarrow 2ay \mp 4axy : c \mp 3aaxx : cc = zz \mp 4aax : c \rightarrow aa \rightarrow aaxx : cc$ . Quare, ope substitutionis, fiet  $zz \mp 4aax : c \rightarrow aa \rightarrow aaxx : cc \mp 2bx = 0$ , sive etiam  $cczz : aa \mp 4cx \rightarrow cc \rightarrow xx \mp 2ccb : aa = 0$ . Hinc, ponendo quoque  $x \rightarrow$



$ec \rightarrow ccb: aa = u$ , ita ut sit  $4cx \rightarrow 2ccb x: aa \rightarrow xx = 4cc + 4bc^3: aa + bbc^4: a^4 \rightarrow uu$ ; erit rursus per substitutionem  $cczz: aa + 3cc + 4bc^3: aa + bbc^4: a^4 \rightarrow uu = 0$ . Et, faciendo adhuc  $3cc + 4bc^3: aa + bbc^4: a^4 = ff$ , erit demum  $cczz: aa + ff \rightarrow uu = 0$ , sive etiam  $cczz: aa = uu \rightarrow ff$ .

III. Sed exemplis modo ostendamus, *quaratione, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, construuntur loca ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam.* Primo itaque proponatur construenda æquatio  $ayy: c \rightarrow 2ay + ac = 2bx + xx$ , quæ, ut paulo ante ostensum est, reducitur ad  $azz: c = uu \rightarrow bb$ , ponendo  $x + b = u$ , &  $y \rightarrow c = z$ .

III.  
Ostenditur  
exemplis  
construendis  
locorum ad  
hyperbolam.  
Exemplum  
primum.

Ducatur in subjecto plano recta quævis **AB**, per cujus portiones **AN** designentur valores incognitæ  $x$ . Et quoniam in reductione habetur  $x + b = u$ , capiatur ad partem oppositam portio  $AC = b$ . Quumque fiat quælibet  $CN = x + b$ , designabunt ipsæ **CN** valores incognitæ  $u$ .

FIG. 93.

Sit deinde **CD** recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ **NM**, quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur quoque  $y \rightarrow c = z$ , abscindatur ex **CD** portio  $CE = c$ ; & ducta per punctum **E** recta **EF** ipsi **CA** parallela, fiet quælibet  $OM = y \rightarrow c$ ; atque adeo ipsæ **OM** valores referent incognitæ  $z$ .

Denique, quum æquatio reducta sit  $azz: c = uu \rightarrow bb$ , liquet, quod si hinc inde a puncto **E** capiatur, tum **EF**, cum  $EG = b$ , debeat esse **FG** quæsitæ hyperbolæ diameter.  
Et

Et quemadmodum, ducta FH, ipsi CD parallela, diametri ejus ordinatæ debent esse æquidistantes rectæ FH; ita, si fiat, ut FH sit ad FG, veluti est  $c$  ad  $a$ , erit eadem FH parameter illius diametri.

IV.  
Demonstratio constructionis præcedentis exempli in medium afferatur.

FIG. 93.

IV. Ut autem ostendere possimus, hyperbolam istam esse lineam, ad quam refertur æquatio  $ayy : c \rightsquigarrow 2ay \mp ac = 2bx \mp xx$ , juvat prius advertere, quod si super CB capiatur hinc inde a puncto C, tum CK, cum  $CL = \sqrt{(ac \mp bb)}$ ; hyperbola quidem principalis transire debeat per punctum K, ejus vero opposita per punctum L. Nam in æquatione, de qua agitur, si ponatur  $y = 0$ , habebitur  $ac = 2bx \mp xx$ , unde infertur, tum  $x = \rightsquigarrow b \mp \sqrt{(ac \mp bb)}$ , cum  $x = \rightsquigarrow b \rightsquigarrow \sqrt{(ac \mp bb)}$ .

Id quum ita sit, capiatur primo in portione hyperbolæ principalis KFX punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum FG ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Jamque, positis  $AN = x$ , &  $MN = y$ , erit ex constructione CN, sive  $EO = x \mp b$ , & MO esse poterit, vel  $y \rightsquigarrow c$ , vel  $\rightsquigarrow y \mp c$ . Sed, propter hyperbolam, MO quadratum est ad differentiam quadratorum EO, EF, ut est FH ad FG. Quare erit, ut  $yy \rightsquigarrow 2cy \mp cc$  ad  $xx \mp 2bx \mp bb \rightsquigarrow bb$ , ita  $c$  ad  $a$ : Unde fiet  $ayy : c \rightsquigarrow 2ay \mp ac = xx \mp 2bx$ .

Capiatur secundo in portione altera ejusdem hyperbolæ principalis KZ punctum aliquod M, ex quo etiam demittatur ad diametrum FG ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quamquam in isto casu maneat  $AN = x$ ; fiet tamen  $MN = \rightsquigarrow y$ . Unde erit semper

per CN, sive EO =  $x + b$ , & MO =  $y + c$ ; atque adeo, ob hyperbolæ naturam, erit rursus ut antea  $ayy: c \rightarrow 2ay + ac = xx + 2bx$ .

Capiatur tertio in portione hyperbolæ oppositæ LGX punctum quodvis M, ex quo adhuc ducatur ad diametrum FG ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quoniam in isto casu fit AN =  $x$ , & MN =  $y$ ; erit CN, sive EO =  $x - b$ , & MO esse poterit, vel  $y - c$ , vel  $-y + c$ . Quare, ob hyperbolæ naturam, habebitur semper æquatio  $ayy: c - 2ay + ac = xx + 2bx$ .

Capiatur demum in portione altera ejusdem hyperbolæ oppositæ LZ punctum quodvis M, ex quo pariter demittatur ad diametrum FG ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Quumque in isto casu fiat AN =  $x$ , & MN =  $y$ ; erit semper CN, sive EO =  $x + b$ , & MO =  $y + c$ . Unde, propter naturam hyperbolæ, adhuc habebitur æquatio  $ayy: c - 2ay + ac = xx + 2bx$ .

V. Proponatur secundo *construenda æquatio altera, superius allata*,  $yy \rightarrow 2ay + 4axy: c + 3aax: cc + 2bx = 0$ , quæ, ut ibidem ostensum est, reducitur ad  $ccz: aa = uu \rightarrow ff$ , ponendo  $y \rightarrow a + 2ax: c = z$ ,  $x \rightarrow 2c \rightarrow ccb: aa = u$ , &  $3cc + 4bc^3: aa + bbc^4: a^4 = ff$ .

V.  
Exemplum  
secundum  
casum exhibens paulo  
difficiliorem

Ducatur in subjecto plano recta quævis AB, & per portiones ejus AN designentur valores incognitæ  $x$ . Quumque habeatur  $x \rightarrow 2c \rightarrow ccb: aa = u$ , abscindatur ex AB portio AC =  $2c + ccb: aa$ . Et quoniam fit quælibet CN =  $x \rightarrow 2c \rightarrow ccb: aa$ , designabunt

FIG. 94,

222 SECTIONUM CONICARUM  
 bunt portiones CN valores incognitæ  $u$ .

Sit deinde CD recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur  $y \rightarrow a \mp 2ax:c = z$ , abscindatur, tum ex CD portio CE  $\equiv a$ , cum ex EC, producta si opus, portio EF, quæ sit ad AC, ut est  $2a$  ad  $c$ . Jamque, completo parallelogrammo AE, ductaque FG, ipsis NM occurrente in O, fiet unaquæque OM  $\equiv y \rightarrow a \mp 2ax:c$ ; adeoque ipsæ OM valores referent incognitæ  $z$ .

Quoniam autem rectæ OM correspondent portionibus ipsius FG; utique debet esse F centrum describendæ hyperbolæ, & FG positio suæ diametri. Verum portiones illæ FO tunc demum reperiuntur æquales ipsis CN, ubi æquales sunt duæ AC, FG. Unde procul est, ut eadem FO designare queant valores incognitæ  $u$ ; adeoque, etsi æquatio reducta sit  $cczz:aa = uu \rightarrow ff$ , multum tamen abest, ut sit  $f$  semidiameter quæsitæ hyperbolæ, & ut ratio parametri ad diametrum sit æqualis ei, quam habet  $aa$  ad  $cc$ .

Itaque, ut definiamus, tum semidiameterum describendæ hyperbolæ, cum rationem parametri ad diametrum, sit AC ad FG, ut est  $c$  ad  $s$ . Quumque hac ratione fiat quælibet FO  $= su:c$ ; si ponamus ulterius, quod quæsitæ semidiameter sit  $g$ , & quod ratio parametri ad diametrum sit æqualis ei, quam habet  $n$  ad  $m$ , erit ejusdem hyperbolæ localis æquatio  $mzz:n = ssuu:cc \rightarrow gg$ , sive etiam  $ccmzz:ssn = uu \rightarrow ccgg:ss$ . Erat autem  $cczz:aa$   
 $\equiv uu$

$\frac{ccm}{ssn} = \frac{ff}{cc}$ . Quare, instituta comparatione, fiet  $ccm: ssn = cc: aa$ , &  $ccgg: ss = ff$ . Unde infertur  $n:m = aa: ss$ , &  $g = fs: c$ .

Capiatur ergo super FG hinc inde a puncto F, tum FH, cum  $FK = fs: c$ ; & erit HK diameter quæsitæ hyperbolæ. Ducatur porro per punctum H, recta HL, ipsi CD parallela; & fient diametri ejus ordinatæ æquidistantes rectæ HL. Constituatur demum HL talis longitudinis, ut sit HL ad HK, veluti est aa ad ss; & erit eadem HL parameter illius diametri.

VI. Hic etiam, ut ostendere possimus, hujusmodi hyperbolam satisfacere propositæ æquationi  $yy \rightarrow 2ay + 4axy : c + 3aaxx : cc + 2bx = 0$ , juvat prius advertere, quod si super AB capiatur ad partem oppositam portio AP  $= 2bcc: 3aa$ , hyperbola quidem principalis nullimode secet rectam AB, ejus autem opposita transire debeat per puncta duo A, & P. Nam in æquatione, de qua agitur, si ponatur  $y = 0$ , fiet  $3aaxx: cc + 2bx = 0$ , unde infertur, tum  $x = 0$ , cum  $x = \rightarrow 2bcc: 3aa$ .

Id quum ita sit, capiatur primo in hyperbola principali punctum aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quoniam hic poni debet AN  $= x$ , & MN  $= \rightarrow y$ ; erit ex constructione CN  $= x \rightarrow 2c \rightarrow ccb: aa$ , & MO vel  $y \rightarrow a + 2ax: c$  vel  $\rightarrow y + a - 2ax: c$ . Sed CN est ad FO, ut AC ad FG, sive etiam, ut  $c$  ad  $s$ . Quare erit FO  $= sx: c - 2s \rightarrow bsc: aa$ .

Quia autem, propter hyperbolam, MO  
qua.

IV.  
Veritas constructionis præcedentis exempli demonstratur.  
FIG. 94.

quadratum est ad differentiam quadratorum FO, FH, veluti est HL ad HK; erit, ut  $yy \rightarrow 2ay \dagger aa \dagger 4axy:c \rightarrow 4aax:c \dagger 4aaxx:cc$  ad  $ssxx:cc \rightarrow 4ssx:c \dagger 4ss \rightarrow 2bssx:aa \dagger 4bssc:aa \dagger bbsscc:a^4 \rightarrow ffs:cc$ , ita  $aa$  ad  $ss$ . Unde fiet  $yy \rightarrow 2ay \dagger aa \dagger 4axy:c \rightarrow 4aax:c \dagger 4aaxx:cc \dagger aaxx:cc \rightarrow 4aax:c \dagger 4aa \rightarrow 2bx \dagger 4bc \dagger bbcc:aa \rightarrow ffaa:cc$ , quæ, translatis terminis omnibus ad eandem partem, & posito loco  $ff$  valore ejus  $3cc \dagger 4bc^3:aa \dagger bbc^4:a^4$ , reducitur ad  $yy \rightarrow 2ay \dagger 4axy:c \dagger 3aaxx:cc \dagger 2bx \dagger 0$ .

Extendatur deinde in hyperbola opposita ordinata AG versus I, & capiatur in portione ejus AKI punctum aliquod M, ex quo etiam demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quamquam in isto casu maneat  $AN \doteq x$ , fiet tamen  $CN \doteq x \dagger 2c \dagger ccb:aa$ ; adeoque erit  $FO \doteq sx:c \dagger 2s \dagger bsc:aa$ . Quumque hic poni debeat  $MN = y$ ; erit adhuc MO, vel  $y \rightarrow a \dagger 2ax:c$ , vel  $y \dagger a \rightarrow 2ax:c$ : proindeque, ob naturam hyperbolæ, rursus erit ut antea  $yy \rightarrow 2ay \dagger 4axy:c \dagger 3aaxx:cc \dagger 2bx \doteq 0$ .

Capiatur tertio in portione hyperbolæ oppositæ AP punctum quodvis M, ex quo similiter ducatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Patetque, in isto casu fieri, tum  $AN \doteq x$ , cum  $MN \doteq y$ . Et erit semper, tam  $CN \doteq x \dagger 2c \dagger ccb:aa$ , quam  $MO \doteq y \dagger a \rightarrow 2ax:c$ . Unde, quum habeatur  $FO \doteq sx:c \dagger 2s \dagger bsc:aa$ ; ob hyperbolæ naturam, invenietur semper æquatio  $yy \rightarrow 2ay \dagger 4axy:c \dagger 3aaxx:cc \dagger 2bx \doteq 0$ . Ca.

Capiatur demum punctum M in aliqua duarum reliquarum portionum hyperbolæ oppositæ, ex quo pariter demittatur ad diametrum HK ordinata MO, ipsi AB occurrens in N. Et quoniam in isto casu fit  $AN = -x$ , &  $MN = y$ ; erit semper  $CN = -x + 2c + \frac{ccb:aa}{c}$ , &  $FO = -\frac{sx:c + 2s + bsc:aa}{c}$ . Et licet MO esse possit, vel  $y = a + \frac{2ax:c}{c}$ , vel  $-y + a = \frac{2ax:c}{c}$ ; attamen, ob naturam hyperbolæ, semper habebitur æquatio  $yy = 2ay + \frac{4axy:c + 3aax:cc + 2bx}{c} = 0$ .

VII. Atque ita quidem construuntur loca ad hyperbolam, relate ad ejus diametros consideratam, per reductionem suarum æquationum ad formulam simplicissimam. Videamus itaque modo, qua ratione eadem loca ad hyperbolam construi debeant, reducendo earum æquationes ad formulam, quæ sit omnium maxime composita. Quem in finem, qualis sit ejusmodi formula, operæ pretium est, ut primo loco definiamus.

VII.  
Locorum ad hyperbolam relate ad diametros consideratam, formula generalis exhibetur.

Nimirum, referendo hyperbolæ puncta omnia ad rectam positione datam, per rectas alias, quæ sint diametri alicujus ordinatæ, perspicuum est, tria contingere posse. Primo, ut recta positione data sit ipsa illa diameter. Secundo, ut sit aliqua ejus parallela. Et tertio demum, ut angulum cum eadem diametro constituat. Unde, sicuti ex tribus hisce casibus priores duo sub tertio continentur, ita & formula hyperbolæ, relate ad diametros consideratæ, omnium maxime composita, ea erit, quæ ex tertio illo casu deducitur.

Sit igitur F centrum hyperbolæ, & HK **FIG. 95.**  
*Tom. II.* P ali.

226 SECTIONUM CONICARUM  
 aliqua ejus diameter; sitque etiam HG recta,  
 quæ exhibet, tum parametrum illius diame-  
 tri, cum positionem suarum ordinatarum.  
 Agatur deinde AD, eidem diametro paralle-  
 la; & per aliquod ejus punctum A ducatur  
 quoque obliqua AB. Sumatur postea in AB  
 punctum quodvis C; & ductis rectis AF,  
 CD, ipsi HG parallelis, ponatur AC = n,  
 CD = m, AD = s, EH, vel EK = t, HG  
 = p, AF = q, & EF = r.

Capiatur nunc in hyperbola punctum  
 aliquod M, ex quo demittatur ad diametrum  
 HK ordinata MO, conveniens cum AB in N,  
 & cum AD in R; ponaturque adhuc AN =  
 x, & MN = y. Quia ergo AN est ad NR,  
 ut AC ad CD; erit NR = mx:n; adeoque,  
 quum duæ AF, RO inter se sint æquales,  
 erit MO = y + mx:n + q. Et quoniam AN  
 est ad AR, ut AC ad AD; erit AR, sive FO  
 = sx:n: proindeque erit EO = r + sx:n.

Jam, propter hyperbolam, MO quadra-  
 tum est ad differentiam quadratorum EO,  
 EH, ut est HG ad HK. Quare erit, ut yy +  
 2mxy:n + mmxx:nn + 2qy + 2qmx:n + qq ad  
 rr + 2rsx:n + ssxx:nn = tt, ita p ad 2t. Un-  
 de fiet yy + 2mxy:n + mmxx:nn + 2qy + 2qmx:n  
 + qq = prr : 2t + prsx : tn + pssxx : 2tnn =  
 pt:2, sive etiam yy + 2mxy:n + mmxx:nn =  
 pssxx : 2tnn + 2qy + 2qmx:n = prsx : tn +  
 qq + pt:2 = prr : 2t = 0; & propterea for-  
 mulam hyperbolæ, relate ad diametros consi-  
 deratæ, omnium maxime compositam, com-  
 perta æquatio nobis exhibebit.

Perspicuum est autem, in hujusmodi  
 for-



formula coefficientem quadrati  $xx$  augendum esse nonnihil, quo priores tres termini  $yy + 2mxy:n + mmxx:nn \rightarrow pssxx:2tnn$  constituere queant quadratum perfectum; nec, deficiente termino  $2mxy:n$ , deficere quoque debere terminum alterum, in quo quadratum  $xx$  continetur. Unde veritas regulæ, superius traditæ, pro cognoscendis locis ad hyperbolam, relate ad suas diametros consideratam, ex ipsa eorum formula generali, prono alveo fluit.

VIII. Sed ostendamus modo, quo pacto, ope inventæ formulæ generalis, loca ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, construantur. Nimirum, comparationis ope, definiendæ sunt primum quantitates, quæ locum determinant. Et siquidem omnes inveniuntur positivæ; danda est rectis, quas referunt, illa eadem positio, quam in figura formulæ reperiuntur habere. Sed si earum aliqua prodit negativa; tunc recta, quam exhibet, capienda est ad plagam oppositam.

VIII.  
Quomodo  
per inven-  
tam formu-  
lam genera-  
lem loca ad  
hyperbolam,  
relate ad  
diametros  
considera-  
tam, con-  
struantur.

Quantitates porro, quæ locum determinant, sunt  $m, n, p, q, r, s, t$ . Verum, instituta comparatione, dumtaxat ipsarum  $p, q, r, t$  valores innotescunt. Et, quantum ad priores duas  $m$ , &  $n$ , nonnisi ratio, quam habent inter se, cognita fiet. Hinc valor unius ex iis sumi poterit ad libitum. Et tunc, per cognitam rationem, quam inter se habent, etiam valor alterius notus evadet. Præstat autem, utcumque assumere valorem ipsius  $n$ , quem tamen positivum semper esse oportebit.

Determinatis valoribus ipsarum  $m$ , &  $n$ ,  
P 2 etiam

FIG. 95. etiam quantitatis  $s$  valor innotescet. In triangulo enim CAD notus est angulus ACD, velut æqualis angulo ANM, qui vel datus est, vel sumitur ad libitum. Quare, ubi duo ejus latera, designata per quantitates  $n$ , &  $m$ , similiter nota sunt; cognoscemus quoque tertium latus AD, quod exhibet quantitas  $s$ . Speciatim autem erit  $s = n$ , ubi valor ipsius  $m$  nullus reperitur; quandoquidem, evanescente CD, cadit AB super AD, & puncta duo C, & D coeunt in unum.

Hic etiam notare oportet, quod, perinde ac in locis ad ellipsim, valor parametri  $p$  numquam negativus possit oriri. Unde, quod in constructione locorum ad parabolam observavimus, hic quoque nequit locum habere. Potius valor semidiametri  $t$  oriri potest quandoque imaginarius. Et quum id contingit, haud quidem putandum est, quæsitum locum contradictionem aliquam involvere; sed tantum per hyperbolas conjugatas ille debet explicari. Nec reticebimus, ejusdem semidiametri valorem posse etiam interdum nihilo æqualem inveniri; & in eo casu optata hyperbola ad duplicem rectam reducetur.

IX.  
 Exemplum  
 primum, casum  
 eabi  
 bens paulo  
 simplicio-  
 rem.

IX. Oporteat itaque primo, *construere* equationem  $yy \rightarrow 2ay - axx:c \dagger aa \dagger abt = 0$ . Quia in ea deest terminus  $xy$ ; utique fractio  $2m:n$ , per quam ille in formula multiplicatus reperitur, debet esse nihilo æqualis. Unde, quum sit  $m = 0$ ; per ea, quæ paulo ante notata sunt, erit quoque  $n = s$ ; adeoque ipsa formula fiet  $yy \rightarrow pxx:2t \dagger 2qy \rightarrow prx:t \dagger qq \dagger pt:2 - prr:2t = 0$ .

Jam,

Jam, instituta comparatione, habebitur  
 $p:2t = a:c$ ,  $2q = -2a$ ,  $pr:t = 0$ , &  $qq +$   
 $pt:2 = prr:2t = aa + ab$ . Unde, sicuti ex  
 prima harum æquationum infertur, quod ra-  
 tio parametri ad diametrum debeat esse æqua-  
 lis ei, quam habet  $a$  ad  $c$ ; sic ex secunda erui-  
 tur  $q = -a$ , ex tertia  $r = 0$ , & ex quarta  
 $pt = 2ab$ .

Quum autem sit  $p:2t = a:c$ ; erit etiam  
 $p = 2at : c$ , &  $pt = 2att : c$ . Est vero  $pt =$   
 $2ab$ . Itaque erit  $2att : c = 2ab$ , &  $tt = bc$ .  
 Hinc, per quadratæ radicis extractio-  
 nem, fiet  $t = \sqrt{bc}$ : proindeque, designatis  
 valoribus incognitæ  $x$  per portiones AN re- FIG. 96.  
 ctæ AB, & existente AL recta, cui esse de-  
 bent æquidistantes valores alterius incogni-  
 tæ  $y$ , constructur proposita æquatio in eum,  
 qui sequitur, modum.

Abscindatur ex AL portio AF =  $a$ .  
 Tum, ducta FO, ipsi AB parallela, capiatur  
 super ea hinc inde a puncto F, tam portio  
 FH, quam portio FK =  $\sqrt{bc}$ . Agatur po-  
 stea HG, parallela rectæ AL, & constituatur  
 eadem HG talis longitudinis, ut sit HG ad  
 HK in eadem ratione, quam habet  $a$  ad  $c$ .  
 Denique diametro HK describatur hyperbo-  
 la, ita ut HG exhibeat, tam parametrum  
 ejus diametri, quam positionem suarum ordi-  
 natarum. Et hyperbola, subinde descripta,  
 locus erit quæsitus.

Ducatur enim ex puncto aliquo M ordi-  
 nata ad diametrum MO, quæ extendatur  
 usque donec, ipsi AB occurrat in N. Et, po-  
 sitis AN, sive FO =  $x$ , & MN =  $y$ , erit ex

230 SECTIONUM CONICARUM  
 constructione  $MO = y - a$ . Sed, propter  
 hyperbolam,  $MO$  quadratum est ad differen-  
 tiam quadratorum  $FO$ ,  $FH$ , ut est  $HG$   
 ad  $HK$ . Quare erit, ut  $yy - 2ay + aa$  ad  
 $xx - bc$ , ita  $a$  ad  $c$ . Unde fiet  $yy - 2ay +$   
 $aa = axx : c - ab$ , five etiam  $yy - 2ay -$   
 $axx : c + aa + ab = 0$ , quæ est æquatio con-  
 struenda.

X.  
 Exemplum  
 secundum,  
 casum ma-  
 xime compo-  
 situm conti-  
 nens.

X. Oporteat etiam, *construere æquatio-*  
*nem*  $yy - 2axy : c - aaxx : cc - 2by + aa$   
 $= 0$ , quæ similiter locum exhibet ad hyperbo-  
 lam. Quia hic adest terminus  $xy$ ; instituta  
 comparatione, habebitur primo  $2m : n =$   
 $2a : c$ . Quare, assumpta  $n = c$ , fiet  $2m =$   
 $2a$ , five etiam  $m = a$ . Comparatis au-  
 tem terminis reliquis, habebitur quoque  
 $mn : nn - pss : 2tnn = aa : cc$ ,  $2q =$   
 $2b$ ,  $2qm : n - prs : tn = 0$ , &  $qq + pt : 2 =$   
 $pr : 2t = aa$ .

Hinc in prima harum æquationum, sub-  
 rogatis valoribus ipsarum  $m$ , &  $n$ , fiet  $aa : cc$   
 $= pss : 2tcc = aa : cc$ , hoc est  $2aa : cc =$   
 $pss : 2tcc$ , five etiam  $p : 2t = 2aa : ss$ . Unde  
 infertur, rationem parametri ad diametrum  
 æqualem esse debere ei, quam habet  $2aa$  ad  
 $ss$ . Et quoniam ex secunda æquatione eruitur  
 $q = b$ , habebitur ope tertiæ  $pr : t = 2ab : s$ ,  
 five etiam  $pr : 2t = ab : s$ . Quumque sit  $p : 2t$   
 $= 2aa : ss$ ; erit per substitutionem  $2aar : ss =$   
 $ab : s$ , atque adeo  $r = bs : 2a$ .

Denique, ob quartam æquationem,  
 erit  $bb + pt : 2 = bb : 2 = aa$ , five etiam  $aa =$   
 $bb : 2 = pt : 2$ , aut  $2aa = bb = pt$ . Quum  
 autem habeatur  $p : 2t = 2aa : ss$ , fiet quoque  
 $pt$

$pt = 4aat: ss$ . Unde erit  $4aat: ss = 2aa \rightarrow bb$ , &  $tt = ss:2 \rightarrow bbss:4aa$ : proindeque, per extractionem quadratæ radicis, habebitur  $t = \sqrt{(ss:2 \rightarrow bbss:4aa)}$ : adeo nempe, ut nisi sit  $2aa$  major, quam  $bb$ , valor ipsius  $t$ , vel nullus, vel imaginarius prodibit.

Ponamus ergo,  $2aa$  majorem esse, quam  $bb$ . Et, designatis valoribus incognitæ  $x$  per portiones  $AN$  rectæ  $AB$ , sit  $AL$  ea, cui æquidistantes esse debent valores alterius incognitæ  $y$ . Capiatur in  $AB$  portio  $AC = c$ . Et, ducta  $CD$ , ipsi  $AL$  parallela, fiat eadem  $CD = a$ , jungaturque  $AD$ . Abscindatur deinde ex  $AL$  portio  $AF = b$ , perque punctum  $F$  agatur recta  $EO$  parallela ipsi  $AD$ . Fiat postea  $FE = bs:2a$ . Et hinc inde a puncto  $E$  capiatur, tam portio  $EH$ , quam portio  $EK = \sqrt{(ss:2 \rightarrow bbss:4aa)}$ . FIG. 97.

Ducatur porro  $HG$ , æquidistans eidem  $AL$ , & constituatur eadem  $HG$  talis longitudinis, ut sit  $HG$  ad  $HK$  in eadem ratione, quam habet  $2aa$  ad  $ss$ . Denique diametro  $HK$  describatur hyperbola, ita ut  $HG$  exhibeat, tam parametrum ejus diametri, quam positionem suarum ordinatarum. Et hyperbola, subinde descripta, locus erit quæsitus. Quod ut palam fiat, ducatur ex puncto aliquo  $M$  ordinata ad diametrum  $MO$ , quæ occurrat ipsis  $AB$ ,  $AD$  in  $N$ , &  $R$ ; positisque  $AN = x$ , &  $MN = y$ , erit, ob triangula æquiangula  $ACD$ ,  $ANR$ ,  $NR = ax:c$ , &  $AR$ , sive  $FO = sx:c$ .

Hinc, quum sit  $MR = y \rightarrow ax:c$ , &  $AF$ , sive  $RO = b$ : erit reliqua  $MO = y \rightarrow ax:c$   
 $P$  4  $\rightarrow b$ .

$\rightarrow b$ . Est autem ex constructione  $FE = bs:2a$ .  
 Quare erit tota  $EO = sx:c + bs:2a$ . Jam vero,  
 propter hyperbolam,  $MO$  quadratum est ad  
 differentiam quadratorum  $EO$ ,  $EH$ , ut est  
 $HG$  ad  $HK$ . Itaque, quum habeatur, ut  $yy$   
 $\rightarrow 2axy:c + aaxx:cc \rightarrow 2by + 2abx:c + bb$  ad  
 $ssxx:cc + 2bssx:2ac + bbss:4aa \rightarrow ss:2 + bbss:4aa$ ,  
 ita  $2aa$  ad  $ss$ ; erit  $yy \rightarrow 2axy:c + aaxx:cc \rightarrow$   
 $2by + 2abx:c + bb = 2aaxx:cc + 2abx:c +$   
 $bb:2 \rightarrow aa + bb:2$ , quæ reducta exhibebit æ-  
 quationem propositam  $yy \rightarrow 2axy:c \rightarrow aaxx:cc$   
 $\rightarrow 2by + aa = 0$ .

XI.  
 Præcedentis  
 exempli ca-  
 sus omnes  
 expendun-  
 tur.

XI. In allato igitur exemplo, ut valor  
 semidiametri  $t$  realis evadat, necesse est, ut  
 $2aa$  major sit, quam  $bb$ . Sed, si fuerit  $2aa$  mi-  
 nor, quam  $bb$ , tunc ejusdem semidiametri  
 valor prodibit imaginarius. In isto autem  
 casu, ut superius innuimus, explicandus est  
 locus per hyperbolas conjugatas, & fieri de-  
 bet  $EH$ , vel  $EK = \sqrt{(bbss:4aa \rightarrow ss:2)}$ . Nec  
 difficile id erit ostendere.

FIG. 97.

Sumatur enim in altera hyperbolarum  
 conjugatarum punctum aliquod  $M$ , ex quo  
 ducatur ad diametrum  $HK$  ordinata  $MO$ ,  
 ipsi  $AB$  occurrens in  $N$ . Jamque, positus adhuc  
 $AN = x$ , &  $MN = y$ ; erit  $MO = y \rightarrow ax:c$   
 $\rightarrow b$ , &  $EO = sx:c + bs:2a$ . Sed in isto  
 casu  $MO$  quadratum est ad summam quadra-  
 torum  $EO$ ,  $EH$ , ut  $HG$  ad  $HK$ . Quare, quum  
 sit, ut  $yy \rightarrow 2ay:c + aaxx:cc \rightarrow 2by + 2abx:c$   
 $+ bb$  ad  $ssxx:cc + 2bssx:2ac + bbss:4aa +$   
 $bbss:4aa \rightarrow ss:2$ , ita  $2aa$  ad  $ss$ ; erit  $yy \rightarrow$   
 $2axy:c + aaxx:cc \rightarrow 2by + 2abx:c + bb =$   
 $2aaxx:cc + 2abx:c + bb = aa$ , sive etiam  $yy \rightarrow$   
 $2axy:c$

$$2axy : c \longmapsto aaxx : cc \longmapsto 2by \mp aa = 0.$$

Fieri etiam potest, ut sit  $2aa = bb$ . Et tunc, evanescente valore semidiametri  $t$ , vertetur hyperbola in rectas duas, in centro  $E$  sese mutuo secantes. Id vero ut ostendamus, addatur utrique æquationis construendæ parti communis quantitas  $2aaxx : cc \mp 2abx : c \mp bb \longmapsto aa$ ; & erit  $yy \longmapsto 2axy : c \mp aaxx : cc \longmapsto 2by \mp 2abx : c \mp bb = 2aaxx : cc \mp 2abx : c \mp bb \longmapsto aa$ , sive etiam  $yy \longmapsto 2axy : c \mp aaxx : cc \longmapsto 2by \mp 2abx : c \mp bb = bbxx : cc \mp 2abx : c \mp aa$ . Quare, per extractionem quadratæ radicis, fiet, cum  $y \longmapsto ax : c \longmapsto b = bx : c \mp a$ , cum  $\longmapsto y \mp ax : c \mp b = bx : c \mp a$ : quæ duæ æquationes ad lineam rectam nos ducunt.

Et quidem, quod evanescente valore semidiametri  $t$ , hyperbola verti debeat in rectas duas, in centro sese invicem secantes; id generaliter vidimus supra, ubi sectionum conicarum ortum exposuimus. Quod autem locus explicari debeat per hyperbolas conjugatas, quum ejusdem semidiametri valor prodit imaginarius; id universaliter pendet ex eo, quod in hyperbolis conjugatis quadratum cujusque ordinatæ proportionem correspondet, non quidem differentiæ, sed summæ quadratorum, quæ fiunt ex semidiametro, & portione ejus, ordinata, & centro comprehensa.

Hinc notetur hoc loco velim, quod si construendus sit locus aliquis ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, per reductionem ejus ad formulam simplicissimam, & æquatio reducta formam induat,  
 non

non quidem istius  $myy : n = xx - dd$ , sed alterius hujus  $myy : n = xx + dd$ ; tunc ipse locus per hyperbolas conjugatas poterit explicari; quum sit, ut  $n$  ad  $m$ , ita quadratum ordinatæ  $y$  ad summam quadratorum, quæ fiunt ex semidiametro  $d$ , & portione  $x$ , centro & ordinata comprehensa.

Neque vero mirum censeretur, quod id superius a nobis non fuerit adnotatum. Si enim reductæ æquationis  $myy : n = xx + dd$  termini omnes multiplicentur per  $n$ , iidemque dividantur per  $m$ ; fiet  $yy = nxx : m + ndd : m$ , sive etiam  $nxx : m = yy - ndd : m$ , quæ proculdubio per hyperbolas principales debet explicari. Unde, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, semper casus vitari potest, qui ad hyperbolas conjugatas nos manuducit.

## XII.

*Quid in compositione locorum ad hyperbolam, relate ad diametros considerata, potissimum notari debeat.*

XII. Cæterum, in compositione locorum ad hyperbolam, relate ad diametros considerata, illud etiam sedulo notari debet, quod existentibus  $x$ , &  $y$  duabus construendæ æquationis incognitis, fieri quandoque possit, ut designari debeant per portiones  $AN$  rectæ  $AB$  valores incognitæ  $y$ , perque rectas  $NM$  valores alterius incognitæ  $x$ . Nec sane in utraque loca construendi ratione difficile erit definire, quando demum id fieri debeat.

Nimirum, quum construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, fieri id debet, quotiescumque in æquatione reducta per fractionem aliquam multiplicatum reperitur quadratum, vel incognitæ  $x$ , vel ejus, quæ ex ipsa dependet.

Sic



Sic æquatio  $mxx:n \rightarrow 2mx \dagger mn = yy \dagger 2ay$  mutationem illam exposcit. Nam, faciendo  $x - n = z$ , &  $y \dagger a = u$ , habebitur loco ejus hæc alia  $mzz:n = uu - aa$ : ubi per fractionem  $m:n$  reperitur multiplicatum quadratum incognitæ  $z$ , quæ dependet ex  $x$ ; quum habeatur  $x - n = z$ .

Quotiescumque vero construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam compositam, illud idem fieri debet, quando in æquatione construenda quadratum incognitæ  $x$  ab omni fractione immune reperitur. Sic sequens æquatio  $xx \rightarrow 2axy:c \dagger aayy:2cc - 2ax - 2by \dagger cc = 0$  exigit quoque eam variationem, quia quadratum incognitæ  $x$  illud est, quod in ea omni fractione denudatum occurrit.

Interim, quum construitur æquatio, per reductionem ad formulam compositam, eademque natura sua mutationem illam exposcit, necesse est, ut etiam in formula incognitæ varientur. Sic formula, cum qua comparanda est æquatio  $xx - 2axy:c \dagger aayy:2cc - 2ax - 2by \dagger cc = 0$ , haud quidem esse debet  $yy \dagger 2mxy:n \dagger mmxx:nn - pssxx:2tnn \dagger 2qy \dagger 2qmx:n - prsx:tn \dagger qq \dagger pt:2 - prr:2t = 0$ , sed  $xx \dagger 2myx:n \dagger mnyy:nn - pssyy:2tnn \dagger 2qx \dagger 2qmy:n - prsy:tn \dagger qq \dagger pt:2 - prr:2t = 0$ .

Sed hic quoque, perinde ac in ellipsi, fatendum est, variationem istam non esse absolute necessariam. Nam in priore exemplo, etsi per reductionem habeatur  $mzz:n = uu - aa$ ; multiplicando tamen omnes æquationis

nis

his terminos per  $n$ , eisdemque dividendo per  $m$ , fiet  $zz = nuu : m - naa : m$ , sive etiam  $nuu : m = zz + naa : m$ : ubi per fractionem  $n : m$  multiplicatum reperitur quadratum incognitæ  $z$ , quæ dependet ex  $y$ ; quum habeatur  $y + a = u$ : licet ipsa æquatio explicari debeat per hyperbolas conjugatas.

Atque ita quoque in secundo exemplo, etsi æquatio sit  $xx - 2axy : c + ayy : 2cc - 2ax - 2by + cc = 0$ ; multiplicatis tamen terminis omnibus per  $2cc$ , iisdemque divisus per  $aa$ , habebitur  $2ccxx : aa - 4cxy : a + yy - 4ccx : a - 4bccy : aa + 2c^2 : aa = 0$ : ubi quadratum incognitæ  $y$  omni vacat fractione. Nec difficile erit intelligere, quod hoc idem præstari possit in omnibus æquationibus, quæ ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, nos manuducunt.

XIII.  
*Quomodo  
distinguenda  
sunt loca,  
quæ hyper-  
bola æquila-  
tera termi-  
nantur.*

XIII. Illud quoque nolim hic silentio præterire, quod sicuti loca ad circulum referri debent ad illa, quæ sunt ad ellipsim; sic inter loca ad hyperbolam speciatim consideranda sint ea, quæ hyperbola æquilatera terminantur. Innotescunt autem hujusmodi loca, quotiescumque in eorum constructione oritur parameter æqualis diametro, ad quam refertur.

Proponatur, exempli gratia, construenda æquatio  $yy - 2ay + aa = xx - 2bx$ , quæ ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, nos ducit. Fiat, tum  $y + a = z$ , cum  $x + b = u$ . Et quoniam habetur  $yy + 2ay + aa = zz$ , &  $xx - 2bx = uu - bb$ ; erit per substitutionem  $zz = uu - bb$  æquatio reducta.

Du-

Ducatur jam in subiecto plano recta **FIG. 98.** quævis **AB**, & designentur per portiones ejus **AN** valores incognitæ  $x$ . Quumque in reductione habeatur  $x - b = u$ , abscindatur ex **AB** portio **AC**  $= b$ . Et quoniam fit quælibet **CN**  $= x - b$ , designabunt portiones istæ **CN** valores incognitæ  $u$ .

Sit deinde **CD** recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ **NM**, quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in reductione habetur quoque  $y - a = z$ , abscindatur ex **CD** portio **CE**  $= a$ ; & ducta per punctum **E** recta **EF**, ipsi **CA** parallela, fiet quælibet **OM**  $= y - a$ ; adeoque ipsæ **OM** valores referent incognitæ  $z$ .

Denique, quum æquatio reducta sit  $zz = uu - bb$ , liquet, quod, si hinc inde a puncto **E** capiatur, tum **EF**, cum **EG**  $= b$ , debeat esse **FG** quæsitæ hyperbolæ diameter. Et quemadmodum, ducta **FH**, ipsi **CD** parallela, diametri ejus ordinatæ debent esse æquidistantes rectæ **FH**; ita si fiat, ut **FH** sit ad **FG** in ratione æqualitatis, erit eadem **FH** parameter illius diametri.

In constructo igitur loco inventa est parameter **FH** æqualis diametro **FG**, ad quam refertur. Unde consequens est, ut hyperbola, per quam locus terminatur, sit æquilatera: adeo nempe, ut non modo diameter **FG** adæquet parametrum suam **FH**, sed & omnes aliæ diametri parametris suis æquales esse debebunt.

Cæterum, quum hyperbola æquilatera circulo correspondeat, quæri hic potest, cur  
hy-

238 SECTIONUM CONICARUM  
 hyperbola fiat æquilatera, per solam æqualita-  
 tem parametri cum diametro, ad quam refer-  
 tur; sed non item ellipsis, quippe quæ ut in  
 circulum abeat, requiritur quoque, ut ordi-  
 natæ rectos cum eadem diametro angulos  
 constituent.

Pendet id igitur ex eo, quod in quali-  
 bet ellipsi binæ adsint conjugatæ diametri æ-  
 quales, tam inter se, quam cum parametris  
 suis. Unde sola æqualitas parametri cum dia-  
 metro efficere nequaquam potest, ut ellipsis  
 vertatur in circulum; quum æqualitas illa  
 etiam in ellipsi possit haberi.

## C A P. VI.

### *De constructione locorum ad hyperbolam, relate ad asym- ptotos consideratam.*

I.  
 Locorum ad  
 hyperbolam,  
 relate ad as-  
 ymptotos  
 considera-  
 tam, formu-  
 la simplicif-  
 sima exhibe-  
 tur.

I. **T** Radita constructione locorum ad  
 hyperbolam, relate ad diametros  
 consideratam; ostendemus modo, qua ratio-  
 ne construenda sint loca illa, in quibus hy-  
 perbola sub contemplationem venit relate ad  
 asymptotos. Et ut ab ea methodo ordiamur,  
 quæ formulam adhibet, casum omnium sim-  
 plicissimum continentem, sciendum est, quod  
 in hyperbola, relate ad asymptotos confide-  
 rata, casus simplicissimus habeatur, quum *ejus*  
*puncta omnia ad aliquam ipsius asymptotum*  
*referuntur per rectas, quæ sint asymptoto al-*  
*teri parallela.* Sic

Sit ergo  $A$  centrum hyperbolæ, sintque **FIG. 99.**  
 etiam  $AB, AC$  duæ ejus asymptoti. Capiatur in hyperbola punctum aliquod  $M$ , ex quo demittatur ad asymptotum  $AB$  recta  $MN$ , asymptoto alteri  $AC$  parallela. Tum ponatur  $AN = x$ , &  $MN = y$ . Jamque, ob naturam hyperbolæ, rectangulum  $ANM$  est ejusdem ubique magnitudinis. Quare, si quantitas ejus vocetur  $aa$ , erit hyperbolæ localis æquatio  $xy = aa$ . Unde semper ac æquatio aliqua ad istiusmodi formam reduci poterit; tunc ea ad hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam, proculdubio nos manuducet.

Sed notetur hoc loco velim, quod etsi punctum  $M$  capiatur in hyperbola opposita, adhuc tamen æquatio localis hyperbolæ sit  $xy = aa$ . Nam, licet in hoc casu habeatur, tam  $AN = -x$ , quam  $MN = -y$ ; nihilominus rectangulum  $ANM$  semper per  $xy$  exprimi debet; quum notum sit ex Algebrae Elementis, positivum esse productum, quod oritur ex multiplicatione duarum quantitarum negativarum.

Notatu etiam hic dignum existimo, quantitatem cujusque rectanguli  $ANM$ , per  $aa$  a nobis designatam, vocari communiter *potentiam* hyperbolæ; nec aliter, datis asymptotis, hyperbolam definiri, quam data etiam ejus potentia. Qua autem ratione hyperbola in plano describi possit, ubi una cum ejus asymptotis data est quoque ejusdem potentia; id quidem inferius ostendemus.

II. Neque vero difficile erit definire, <sup>II.</sup> *Qua aqua-*  
*qua-*

tionem ad  
formulam  
illam sim-  
plicissimam  
sunt reduci-  
biles.

qualis esse debeat æquatio, quæ subinde re-  
duci possit, ut formam induat istius  $xy = aa$ .  
Primo enim, quemadmodum in formula in-  
cognitæ duæ simul multiplicatæ reperiuntur;  
sic etiam non poterit æquatio aliqua ad eam  
formulam revocari, nisi contineat productum  
duarum incognitarum.

Sed productum istud necesse est quo-  
que, ut vel cum nullo earundem incognita-  
rum quadrato, vel cum uno tantum conjun-  
gatur: adeo nempe, ut si ambo fuerint in æ-  
quatione quadrata incognitarum, locus nun-  
quam erit ad hyperbolam, relate ad suas asym-  
ptotos consideratam; sed, per regulas su-  
perius traditas, erit, vel ad hyperbolam, con-  
sideratam relate ad diametros, vel ad ellipsem,  
vel etiam ad parabolam.

Proponatur, exempli gratia, æquatio  
 $xy - ax - by - ac = 0$ , ubi productum  
incognitarum cum nullo earum quadrato  
conjugitur. Fiat  $y - a = z$ , sive etiam  $y$   
 $= z + a$ ; & erit per substitutionem  $xz + ax$   
 $- ax - bz - ab - ac = 0$ , sive etiam  $xz$   
 $- bz - ab - ac = 0$ . Fiat quoque  $x - b$   
 $= u$ , ita ut sit  $xz - bz = uz$ ; & erit rursus  
ope substitutionis  $uz - ab - ac = 0$ . Fiat  
demum  $ab + ac = ff$ ; & erit  $uz - ff = 0$ , si-  
ve etiam  $uz = ff$  æquatio reducta.

Proponatur etiam æquatio  $ax - xx +$   
 $xy + by - ac = 0$ , ubi productum incogni-  
tarum cum uno tantum earum quadrato con-  
jungitur. Capiatur  $x + b = u$ ; sive etiam  $x$   
 $= u - b$ . Et ponendo ubique  $u - b$  loco  $x$ ,  
&  $uu - 2bu + bb$  loco  $xx$ ; erit  $au - uu +$   
 $2bu$

$2bu + uy - ab - bb - ac = 0$ . Capiatur quoque  $u - u + 2b + y = z$ , ita ut sit  $az - uu + 2bu + uy = uz$ ; & erit per substitutionem  $uz - ab - bb - ac = 0$ . Unde, ponendo demum  $ab + bb + ac = ff$ , fiet  $uz - ff = 0$ , five etiam  $uz = ff$  æquatio reducta.

III. Sed exemplis modo ostendamus, *quaratione, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam, loca ad hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam, construuntur*. Primo itaque proponatur construenda æquatio  $xy - ax - by - ac = 0$ , quæ, ut paulo ante ostensum est, reducitur ad  $uz = ff$ , ponendo  $y - a = z$ ,  $x - b = u$ , &  $ab + ac = ff$ .

III. Ostenditur exemplis construendis locorum per formulam simplicissimam. Exemplum primum.

Ducatur in subjecto plano recta quævis AB, ex qua abscindatur portio AC = b. Jamque, si designentur per portiones AN ipsius AB valores incognitæ x, fiet unaquæque reliquarum portionum CN = x - b; adeoque, quum habeatur x - b = u, ipsæ CN designabunt valores incognitæ u.

FIG. 100.

Sit deinde CD recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt alterius incognitæ y. Et quoniam in reductione habetur y - a = z, abscindatur ex CD portio CE = a; & ducta per punctum E recta EF, ipsi CA parallela, fiet quælibet OM = y - a; atque adeo ipsæ OM valores referent incognitæ z.

Denique, quum æquatio reducta sit  $uz = ff$ , liquet, debere esse punctum E centrum describendæ hyperbolæ, & rectas ED, EF asymptotos ejus. Describatur ergo hyperbola ista, sed ita tamen, ut sit ff potentia ejus,

Tom. II.

Q

& ea-

IV.  
Demonstratio  
constru-  
tionis præ-  
cedentis ex-  
empli in me-  
dium affer-  
tar.

FIG.  
100.

IV. Ut autem ostendere possimus, hyperbolam istam esse lineam, ad quam refertur æquatio  $xy - ax - by - ac = 0$ , juvat prius advertere, quod si super AB capiatur ad partem oppositam portio  $AG = c$ , hyperbola quidem principalis nullimode fecet rectam AB, ejus autem opposita transire debeat per punctum G. Nam in æquatione, de qua agitur, si ponatur  $y = 0$ , habebitur  $-ax - ac = 0$ , unde infertur  $x = -c$ .

Id quum ita sit, capiatur primo in hyperbola principali punctum aliquod M, ex quo demittatur ad asymptotum EF recta MO, ipsi ED parallela, conveniens cum AB in N. Jamque, positis  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; erit ex constructione CN, sive  $EO = x - b$ ,  $OM = y - a$ , & rectangulum  $EOM = xy - ax - by + ab$ . Unde, quum sit ff, sive etiam  $ab + ac$  potentia hyperbolæ; erit  $xy - ax - by + ab = ab + ac$ , sive etiam  $xy - ax - by - ac = 0$ , quæ est æquatio construenda.

Ducantur nunc ex punctis A, & G in hyperbola opposita rectæ AH, GK, ipsi ED parallele. Tum capiatur secundo punctum aliquod M in portione HX ipsius hyperbolæ oppositæ, ex quo demittatur pariter ad asymptotum EF recta MO, eidem ED parallela, conveniens cum AB in N. Et quamquam in isto casu maneat  $AN = x$ , fiet tamen CN, sive  $EO = b - x$ . Quumque hic poni debeat  $MN = -y$ ; erit  $MO = -y + a$ : proindeque, ob naturam hyperbolæ, rursus erit ut antea  $xy - ax - by - ac = 0$ .

Ca-



Capiatur tertio in portione hyperbolæ oppositæ HK punctum quodvis M, ex quo etiam ducatur ad asymptotum EF recta MO, alteri ED parallela, conveniens cum AB in N. Patetque, in isto casu fieri, tum  $AN = x$ , cum  $MN = y$ ; adeoque esse, ut in casu præcedenti,  $CN$ , sive  $EO = b - x$ , &  $MO = y + a$ . Quare, ob hyperbolæ naturam, invenietur semper æquatio  $xy - ax - by - ac = 0$ .

Capiatur denique punctum M in portione reliqua KZ hyperbolæ oppositæ, ex quo similiter demittatur ad asymptotum EF recta MO, alteri ED parallela, conveniens cum AB in N. Et quoniam in isto casu fit  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; adhuc erit CN, sive  $EO = b - x$ , &  $MO = y + a$ . Unde, ob naturam hyperbolæ, semper habebitur æquatio  $xy - ax - by - ac = 0$ .

V. Proponatur secundo *construenda æquatio altera, superius allata*,  $ax - xx + xy + by - ac = 0$ , quæ, ut ibidem ostensum est, reducitur ad  $uz = ff$ , ponendo  $x + b = u$ ,  $a - u + 2b + y = z$ , &  $ab + bb + ac = ff$ .

V.  
Exemplum  
secundum,  
casum exhi-  
bens paulo  
difficiliorem.

FIG.

Ducatur in subjecto plano recta quævis AB, & per portiones ejus AN designentur valores incognitæ  $x$ . Quumque habeatur  $x + b = u$ , capiatur super AB ad plagam oppositam portio  $AC = b$ . Et quoniam fit quælibet  $CN = x + b$ , designabunt portiones CN valores incognitæ  $u$ .

101.

Sit deinde CD recta, cui esse debent æquidistantes ipsæ NM, quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Et quoniam in redu-

Q 2

ctio.

Etione habetur  $a \rightarrow u \dagger 2b \dagger y = z$ , sive etiam  $y \dagger a \dagger b \rightarrow x = z$ ; capiatur super CD ad partem contrariam, tum portio CE  $\Leftarrow a \dagger b$ , cum portio EF æqualis ipsi AC. Jamque, completo parallelogrammo AE, ductaque FG, ipsis NM occurrente in O, fiet unaquæque OM  $\Leftarrow y \dagger a \dagger b \rightarrow x$ ; adeoque ipsæ OM valores referent incognitæ z.

Quoniam autem rectæ istæ OM correspondent portionibus ipsius FG; utique erit F centrum describendæ hyperbolæ, tum item FG, FD erunt asymptoti ejus. Verum portiones illæ FO tunc demum reperiuntur æquales ipsis CN, ubi æquales sunt duæ AC, FG. Unde procul est, ut eædem FO designare queant valores incognitæ u; adeoque, etsi æquatio reducta sit  $uz = ff$ , multum tamen abest, ut sit ff quæsitæ hyperbolæ potentia.

Itaque, ut definiamus potentiam describendæ hyperbolæ, sit AC ad FG, ut est u ad m. Quumque hac ratione fiat quælibet FO  $\Leftarrow mu : n$ , si ponamus ulterius, quod quæsitæ potentia sit gg, erit ejusdem hyperbolæ localis æquatio  $muz : n = gg$ , sive etiam  $uz = ngg : m$ . Erat autem  $uz = ff$ . Quare, instituta comparatione, fiet  $ngg : m = ff$ . Unde inferitur  $gg = mff : n$ ; adeoque potentia hyperbolæ describendæ debet esse  $mff : n$ .

VI.

Veritas constructionis præcedentis exempli demonstratur.

FIG.

101.

VI, Hic etiam, ut ostendere possimus, hujusmodi hyperbolam satisfacere propositæ æquationi  $ax - xx \dagger xy \dagger by \rightarrow ac = a$ , juvat prius advertere, quod si ex AB abscindatur portio AH  $= a : 2$ , & hinc inde a puncto H capiatur, tum HK, cum HL  $= \sqrt{(aa : 4 \rightarrow ac)}$ ,

ac), hyperbola quidem principalis transire debeat per puncta K, & L; ejus autem opposita nullimode secet rectam AB. Nam in æquatione, de qua agitur, si ponatur  $y=0$ , fiet  $ax - xx - ac = 0$ , unde infertur, tum  $x = a : 2 \pm \sqrt{(aa : 4 - ac)}$ , cum  $x = a : 2 - \sqrt{(aa : 4 - ac)}$ .

Id quum ita sit, extendatur AG usque donec hyperbolam principalem secet in I, & capiatur in portione ejus IL, aut KX punctum aliquod M, ex quo demittatur ad asymptotum FG recta MO, alteri FD parallela, conveniens cum AB in N. Jamque, positis  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; erit ex constructione  $CN = x + b$ , &  $MO = y + a + b - x$ . Sed CN est ad FO, ut AC ad FG, sive etiam, ut  $n$  ad  $m$ . Quare erit  $FO = mx : n + mb : n$ .

Hinc erit rectangulum  $FOM = mxy : n + max : n + mbx : n \rightarrow mxx : n + mby : n + mab : n + mbb : n \rightarrow mby : n$ . Sed, ob naturam hyperbolæ, quantitas ejusdem rectanguli est  $mff : n$ . Quare erit  $mxy : n + max : n + mbx : n \rightarrow mxx : n + mby : n + mab : n + mbb : n \rightarrow mby : n = mff : n$ , sive etiam  $xy + ax + bx \rightarrow xx + by + ab + bb \rightarrow bx = ff$ , quæ, translatis terminis omnibus ad eandem partem, & posito loco  $ff$  valore ejus  $ab + bb + ac$ , reducitur ad  $xy + ax - xx + by - ac = 0$ .

Capiatur secundo in portione hyperbolæ principalis KL punctum aliquod M, ex quo etiam demittatur ad asymptotum FG recta MO, alteri FD parallela, conveniens cum AB in N. Et quoniam in isto casu fit  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; erit adhuc  $CN = x + b$ ,  $FO = mx : n + mb : n$ , &  $MO = y$

$\dagger a \dagger b \rightarrow x$ . Unde, ob hyperbolæ naturam, rursus erit ut antea  $xy \dagger ax \rightarrow xx \dagger by \rightarrow ac = 0$ .

Capiatur tertio in portione reliqua hyperbolæ principalis IZ punctum quodvis M, ex quo ducatur pariter ad asymptotum FG recta MO, alteri FD parallela, conveniens cum AB in N. Patetque, in hoc casu fieri  $AN = \rightarrow x$ , &  $MN = y$ . Hinc erit semper  $CN = x \dagger b$ ,  $FO = mx : n \dagger mb : n$ , &  $MO = y \dagger a \dagger b \rightarrow x$ , Quare, ob naturam hyperbolæ, habebitur semper æquatio  $xy \dagger ax \rightarrow xx \dagger by \rightarrow ac = 0$ .

Capiatur demum in hyperbola opposita punctum quodvis M, ex quo similiter ducatur ad asymptotum FG recta MO, alteri FD parallela, quæ conveniat cum AB in N. Quumque in isto casu fiat, tum  $AN = \rightarrow x$ , cum  $MN = \rightarrow y$ ; erit adhuc  $CN = x \dagger b$ ,  $FO = mx : n \dagger mb : n$ , &  $MO = y \dagger a \dagger b \rightarrow x$ : proindeque, ob hyperbolæ naturam, adhuc habebitur eadem æquatio  $xy \dagger ax \rightarrow xx \dagger by \rightarrow ac = 0$ .

Fieri autem potest, ut puncta duo H, & K coeant in unum, & ipsa AB hyperbolæ tangens evadat: nimirum, quum habetur  $a = 4c$ ; quandoquidem in hoc casu radices duæ æquationis  $ax \rightarrow xx \rightarrow ac = 0$  fiunt æquales inter se. Sed contingere quoque potest, ut recta AB nec fecet, nec tangat hyperbolam: scilicet, si  $a$  minor sit, quam  $4c$ ; quum in isto casu ejusdem æquationis radices duæ evadant imaginariæ.

VII.  
Locorum ad

VII. Atque ita quidem construuntur  
lo-

loca ad hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam, per reductionem suarum æquationum ad formulam simplicissimam. Videamus itaque modo, qua ratione eadem loca ad hyperbolam construi debeant, reducendo eorum æquationes ad formulam, quæ sit omnium maxime composita. Quem in finem, qualis sit istiusmodi formula, operæ pretium est, ut primo loco definiamus.

*hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam, formulam generalis exhibetur.*

Nimirum, referendo hyperbolæ puncta omnia ad rectam positione datam, per rectas alias, quæ sint uni ex asymptotis parallelæ; perspicuum est, tria contingere posse. Primo, ut recta positione data sit asymptotus altera. Secundo, ut sit aliqua ejus parallela. Et tertio demum, ut angulum cum eadem asymptoto constituat. Unde, sicuti ex tribus hisce casibus priores duo sub tertio continentur; ita & formula hyperbolæ, relate ad asymptotos consideratæ, omnium maxime composita, ea erit, quæ ex tertio illo casu deducitur.

Sit igitur  $E$  centrum hyperbolæ; sintque etiam  $EH$ ,  $EK$  binæ ejus asymptoti. Agatur recta  $AD'$ , asymptoto  $EH$  parallela; & per aliquod ejus punctum  $A$  ducatur quoque obliqua  $AB$ . Sumatur postea in  $AB$  punctum quodvis  $C$ ; & ductis rectis  $AF$ ,  $CD$ , asymptoto alteri  $EK$  æquidistantibus, ponatur  $AC = n$ ,  $CD = m$ ,  $AD = s$ ,  $AF = q$ , &  $EF = r$ .

FIG.  
102.

Capiatur nunc in hyperbola punctum aliquod  $M$ , ex quo demittatur ad asymptotum  $EH$  recta  $MO$ , alteri  $EK$  parallela, con-

Q 4

ve-

veniens cum AB in N, & cum AD in R; ponaturque adhuc AN = x, & NM = y. Quia ergo AN est ad NR, ut AC ad CD; erit NR = mx : n; adeoque, quum duæ AF, RO inter se sint æquales, erit MO = y + mx : n + q. Et quoniam AN est ad AR, ut AC ad AD; erit AR, sive FO = sx : n; proindeque erit EO = r + sx : n.

Hinc erit rectangulum EOM = ry + mx : n + rq + sxy : n + msxx : nn + sqx : n; adeoque, si potentia hyperbolæ vocetur pp, habebitur, ob naturam ejusdem hyperbolæ, ry + mx : n + rq + sxy : n + msxx : nn + sqx : n = pp, sive etiam xy + mxx : n + nry : s + mrx : s + qx + nrq : s - npp : s = 0 : & propterea formulam hyperbolæ, relate ad asymptotos considerata, omnium maxime compositam, comperta æquatio nobis exhibebit.

Perspicuum est autem, in hujusmodi formula productum duarum incognitarum xy cum uno tantum earum quadrato conjungi; nec quidquam obstare, quin quadratum illud ab ipsa formula deficiat: nimirum, si fuerit m = 0. Unde veritas regulæ, superius traditæ, pro cognoscendis locis ad hyperbolam, relate ad suas asymptotos considerata, ex ipsa eorum formula generali prono alveo fluit.

VIII.  
Quomodo  
per inven-  
tam formu-  
lam genera-  
lem præfata  
loca constru-  
antur.

VIII. Sed ostendamus modo, quo pacto, ope inventæ formulæ generalis, construantur loca ad hyperbolam, relate ad ejus asymptotos considerata. Nimirum, comparationis, ope definiendæ sunt primum quantitates, quæ locum determinant. Et siquidem omnes inveniu-

veniuntur positivæ, danda est rectis, quas referunt, illa eadem positio, quam in figura formulæ reperiuntur habere. Sed si earum aliqua prodit negativa; tunc recta, quam exhibet, capienda est ad plagam oppositam.

Quantitates porro, quæ locum determinant, sunt  $m, n, pp, q, r, s$ . Verum, instituta comparatione, dumtaxat ipsarum  $pp, q, r$  valores innotescunt. Et, quantum ad priores duas  $m$ , &  $n$ , nonnisi ratio, quam habent inter se, cognita fiet. Hinc valor unius ex iis sumi poterit ad libitum. Et tunc, per cognitam rationem, quam inter se habent, etiam valor alterius notus evadet. Præstat autem, utcumque assumere valorem ipsius  $n$ , quem tamen positivum semper esse oportebit.

Determinatis valoribus ipsarum  $m$ , &  $n$ , etiam quantitatis  $s$  valor innotescet. In triangulo enim  $CAD$  notus est angulus  $ACD$ , vel æqualis angulo  $ANM$ , qui vel datus est, vel sumitur ad libitum. Quare, ubi duo ejus latera  $AC, CD$ , designata per quantitates  $n$ , &  $m$ , similiter nota sunt; cognoscemus quoque tertium latus  $AD$ , quod exhibet quantitas  $s$ . Speciatim autem erit  $s = n$ , ubi valor ipsius  $m$  nullus reperitur; quandoquidem, evanescente  $CD$ , cadit  $AB$  super  $AD$ , & puncta duo  $C$ , &  $D$  coeunt in unum.

Illud quoque sedulo hic notandum existimo, quod ubi valor ipsius  $pp$ , quæ hyperbolæ potentiam refert, prodit negativus; tunc ipsa hyperbola describenda fit ad partem alteram asymptoti  $EH$ . Nec obscura est hujus rei ratio. Nam negatio illa, non tam affi-

FIG.  
102.

cit

cit hyperbolæ potentiam, quam reetangulum EOM, cui potentia illa est æqualis. Unde, quum ordinata OM capienda sit ad partem contrariam; omnino necesse est, ut hyperbola describatur ad partem alteram ipsius EH

IX.  
Exemplum  
primum, casum exhibens  
simpliciorum.

IX. Oporteat itaque primo, *construere æquationem*  $xy - ax - by - ac = 0$ , *quæ locum exhibet ad hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam.* Quia in ea deest quadratum  $xx$ ; utique fractio  $m:n$ , per quam illud in formula multiplicatum reperitur, debet esse nihilo æqualis. Unde, quum sit  $m = 0$ ; per ea, quæ paulo ante notata sunt, erit quoque  $n = s$ ; adeoque ipsa formula fiet  $xy + ry + qx + rq - pp = 0$ .

Jam, instituta comparatione habebitur,  $q = -a$ ,  $r = -b$ , &  $rq - pp = -ac$ . Unde, quemadmodum  $-a$ ,  $-b$  sunt valores ipsarum  $q$ , &  $r$ ; ita, substitutis valoribus hisce in tertia æquatione, fiet  $ab - pp = -ac$ , hoc est  $pp = ab + ac$ : proindeque, designatis valoribus incognitæ  $x$  per portiones AN rectæ AB, & existente AL recta, cui æquidistantes esse debent valores alterius incognitæ  $y$ , construatur proposita æquatio in eum, qui sequitur, modum.

FIG.  
103.

Abscindatur ex AL portio AF = a. Tum, ducta FK, ipsi AB parallela, capiatur super ea portio FE = b. Ducatur porro per punctum E recta EK, æquidistans ipsi AL. Denique centro E, & asymptotis EH, EK describatur hyperbola talis, ut ejus potentia sit  $ab + ac$ . Et hyperbola, subinde descripta, locus erit quæsitus.

Du.



Ducatur enim ex puncto aliquo M ad asymptotum EH recta MO, alteri EK parallela, conveniens cum AB in N. Et, positis AN, sive FO = x, & MN = y; erit ex constructione MO = y → a, EO = x → b, & rectangulum EOM = xy → ax → by † ab. Est autem hyperbolæ potentia ab † ac. Quare erit xy → ax → by † ab = ab † ac, sive etiam xy → ax → by → ac = 0, quæ est æquatio construenda.

X. Oporteat etiam, *construere æquationem*  $xy † ay † bx → axx : c † ac = 0$ , *quæ similiter locum exhibet ad hyperbolam, relate ad ejus asymptotos consideratam.* Quia hic adest quadratum xx; instituta comparatione, habebitur primo  $m : n = → a : c$ . Quare, assumpta  $n = c$ , fiet  $m = → a$ . Comparatis autem terminis reliquis, habebitur quoque  $nr : s = a$ ,  $mr : s † q = b$ , &  $nrq : s → npp : s = ac$ .

X.  
Exemplum  
secundum,  
casum ma-  
xime compo-  
situm conti-  
nens.

Hinc in prima harum æquationum, subrogato valore ipsius n, fiet  $cr : s = a$ , sive etiam  $r = as : c$ . Et quoniam ex secunda æquatione eruitur  $q = b → mr : s$ ; per substitutionem fiet quoque  $q = b † as : c$ . Quumque demum per tertiam habeatur  $pp = rq → acs : n$ ; substitutionis ope fiet etiam  $pp = abs : c † a3s : cc → as : adeo nempe, ut nisi sit bc † aa major, quam cc, valor ipsius pp prodibit, vel nullus, vel negativus.$

Ponamus ergo,  $bc † aa$  majorem esse, quam  $cc$ . Et, designatis valoribus incognitæ x per portiones AN rectæ AB, fit AL ea, cui æquidistantes esse debent valores al-

FIG.  
104.

te.

terius incognitæ  $y$ . Capiatur in  $AB$  portio  $AC = c$ . Tum, ducta  $CD$ , ipsi  $AL$  parallela, fiat eadem  $CD = a$ , jungaturque  $AD$ . Capiatur deinde super  $AL$  ad partem oppositam portio  $AF = b + aa:c$ , perque punctum  $F$  agatur recta  $EH$ , parallela ipsi  $AD$ . Fiat postea  $FE = as:c$ , & ducatur per punctum  $E$  recta  $EK$  æquidistans rectæ  $AL$ .

Denique centro  $E$ , & asymptotis  $EH$ ,  $EK$  describatur hyperbola, quæ habeat pro sua potentia quantitatem  $abs:c + a^3s:cc = as$ . Et hyperbola, subinde descripta, locus erit quæsitus. Quod ut palam fiat, ducatur ex puncto aliquo  $M$  ad asymptotum  $EH$  recta  $MO$ , alteri  $EK$  parallela, quæ occurrat ipsis  $AB$ ,  $AD$  in punctis  $N$ , &  $R$ ; positisque  $AN = x$ , &  $MN = y$ , erit ob triangula æquiangula  $ACD$ ,  $ANR$ ,  $NR = ax:c$ , &  $AR$ , sive  $FO = sx:c$ .

Hinc, quum sit  $MR = y - ax:c$ , &  $AF$ , sive  $RO = b + aa:c$ ; erit tota  $MO = y - ax:c + b + aa:c$ . Est autem ex constructione  $FE = as:c$ . Quare erit tota  $EO = sx:c + as:c$ ; atque adeo erit rectangulum  $EOM = sxy:c - asxx:cc + bsx:c + aasx:cc + asy:c - aasx:cc + abs:c + a^3s:cc$ . Est autem  $abs:c + a^3s:cc = as$  hyperbolæ potentia. Itaque erit  $sxy:c - asxx:cc + bsx:c + aasx:cc + asy:c - aasx:cc + abs:c + a^3s:cc = abs:c + a^3s:cc = as$ , quæ reducta exhibebit æquationem propositam  $xy - axx:c + bx + ay + ac = 0$ .

XI.  
Præcedentis  
exempli casu

XI. In allato igitur exemplo, ut valor potentiaæ  $pp$  positivus evadat, necesse est, ut

ut  $bc + aa$  major sit, quam  $cc$ . Sed, si fuerit  $bc + aa$  minor, quam  $cc$ ; tunc ejusdem potentiae valor prodibit negativus. In isto autem casu, ut superius innuimus, describenda est hyperbola ad partem alteram asymptoti EH, & esse debet  $as \rightarrow abs : c \rightarrow a^3s : cc$  potentia ejus. Nec difficile id erit ostendere.

*fas omnes  
expenduntur.*

FIG. 105.

Nam, ducta adhuc ex aliquo hyperbolae puncto M ad asymptotum EH recta MO, alteri EK parallela, quae conveniat cum AB in N, & cum AD in R; poni debet AN =  $x$ , & MN =  $y$ . Unde, quum fiat EO =  $sx : c + as : c$ , & MO =  $y + ax : c \rightarrow b \rightarrow aa : c$ ; erit rectangulum EOM =  $sxy : c + asxx : cc \rightarrow bsx : c \rightarrow aasx : cc \rightarrow asy : c + aasx : cc \rightarrow abs : c \rightarrow a^3s : cc$ ; adeoque, ob naturam hyperbolae, erit  $sxy : c + asxx : cc \rightarrow bsx : c \rightarrow aasx : cc \rightarrow asy : c + aasx : cc \rightarrow abs : c \rightarrow a^3s : cc = as \rightarrow abs : c \rightarrow a^3s : cc$ , unde eruitur aequatio construenda  $xy \rightarrow axx : c + bx + ay + ac = 0$ .

Fieri etiam potest, ut sit  $bc + aa = cc$ . Et tunc, evanescente hyperbolae potentia, cum suis asymptotis hyperbola ipsa confundetur. Id vero ut ostendamus, ponatur in aequatione construenda loco  $b$  valor ejus  $c \rightarrow aa : c$ ; & erit  $xy \rightarrow axx : c + cx \rightarrow aax : c + ay + ac = 0$ . Quumque aequatio ista dividi possit per binomium  $x + a$ , & ex divisione oriatur quotiens  $y \rightarrow ax : c + c$ ; liquet, eandem componi ex duabus hisce aequationibus primi gradus  $y \rightarrow ax : c + c = 0$ , &  $x + a = 0$ .

Jam primae harum aequationum fit satis per asymptotum EH. Manentibus enim omni-

FIG. 104.

ni.

nibus, ut supra, invenitur semper  $NR = ax:c$ . Unde, quum sit  $AF$ , five  $RO = b \mp aa:c = c$ ; erit  $NO = c \rightarrow ax:c$ ; proindeque, posita eadem  $NO = \rightarrow y$ , erit  $c \rightarrow ax:c = \rightarrow y$ , five etiam  $y \rightarrow ax:c \mp c = 0$ . Quod vero secundæ satisfaciatur asymptotus altera  $EK$ ; id liquet ex eo, quod, producta  $BA$ , usque donec secet  $EK$  in  $G$ , fiat  $AG = a$ .

XII.  
Quid in  
compositione  
locorum ad  
hyperbolam,  
relate ad a-  
symptotos  
considera-  
tam, potissi-  
mum notari  
debeat.

XII. Cæterum, in compositione locorum ad hyperbolam, relate ad asymptotos considerata, illud pariter sedulo notari debet, quod existentibus  $x$ , &  $y$  duabus construendæ æquationis incognitis, fieri quandoque possit, ut designari debeant per portiones  $AN$  rectæ  $AB$  valores incognitæ  $y$ , perque rectas  $NM$  valores alterius incognitæ  $x$ . Nec sane difficile erit definire, quando demum id fieri debeat.

Nimirum id fiat oportet, quotiescumque in æquatione proposita una cum producto duarum incognitarum reperitur quadratum incognitæ  $y$ . Sic æquatio  $xy \mp yy \rightarrow ay \rightarrow ac = 0$  mutationem illam expolcit, quia quadratum incognitæ  $y$  illud est, quod in ea conjungitur cum producto ambarum incognitarum  $xy$ .

Interim, quum construitur æquatio aliqua, per reductionem ejus ad formulam compositam, eademque natura sua exigit eam variationem, necesse est, ut etiam in formula incognitæ varientur. Sic formula, cum qua comparanda est æquatio  $xy \mp yy \rightarrow ay \rightarrow ac = 0$ , haud quidem esse debet  $xy \mp mxx : n \mp nry : s \mp mrx : s \mp qx \mp nrq : s \rightarrow npp : s$

$npp: s = 0$ , sed  $xy \dagger myy: n \dagger nrx: s \dagger mry: s \dagger qy \dagger nrq: s \rightsquigarrow npp: s = 0$ ,

Esse autem omnino necessariam variationem istam, quum construitur locus, per reductionem æquationis ad formulam compositam; id liquet abunde. Sed eadem necessitas non ita liquido apparet, quum constructio fit, per reductionem æquationis ad formulam simplicissimam. Quare, ut ea innotescat, fiat in allato exemplo  $x \dagger y \rightsquigarrow a = u$ , ita ut sit  $xy \dagger yy \rightsquigarrow ay = uy$ . Et erit  $uy \rightsquigarrow ac = 0$ , sive etiam  $uy = ac$  æquatio reducta.

Designentur jam valores incognitæ  $x$  per portiones AN rectæ AB. Et quoniam in reductione habetur  $x \dagger y \rightsquigarrow a = u$ ; liquet, non aliter haberi posse valores incognitæ  $u$ , quam delendo ex eis constantem  $a$ , & addendo iisdem variabilem  $y$ . Id ergo quum fieri nullo pacto possit; hinc est, ut per portiones AN rectæ AB designandi sint valores incognitæ  $y$ .

XIII. Illud quoque *nolim hic silentio præterire*, quod quotiescumque in æquatione, una cum producto incognitarum, reperitur quadratum unius ex iis, tunc locus explicari possit, non modo per hyperbolam, relate ad eius asymptotos consideratam, verum etiam per hyperbolam, consideratam in ordine ad suas diametros; quum ad utriusque formulam possit æquatio ipsa revocari.

XIII. Quod ad sint quadam loca, qua utraque ratione possunt per hyperbolam explicari.

Proponatur, exempli gratia, construenda æquatio  $yy \dagger 2xy \rightsquigarrow 2ay \dagger 2cx \dagger aa = 0$ . Fiat  $y \dagger x \rightsquigarrow a = z$ . Et quoniam habetur  $yy \dagger 2xy \rightsquigarrow 2ay \dagger aa = zz \rightsquigarrow xx \dagger 2ax$   
sub.

substitutione peracta, erit  $zz \rightarrow xx + 2ax + 2cx = 0$ . Fiat quoque  $x \rightarrow a + c = u$ . Quumque habeatur  $2ax + 2cx \rightarrow xx = aa + 2ac + cc \rightarrow uu$ ; erit rursus per substitutionem  $zz + aa + 2ac + cc \rightarrow uu = 0$ . Ponatur porro  $a + c = f$ , ita ut sit  $aa + 2ac + cc = ff$ ; & habebitur demum  $zz + ff \rightarrow uu = 0$ , sive etiam  $zz = uu - ff$ , quæ ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam, nos ducit.

Id vero mirum censerî non debet. Jam enim vidimus supra, quod ubi in æquatione incognitæ duæ simul multiplicatæ reperiuntur, locus non aliter esse possit ad hyperbolam, consideratam in ordine ad suas diametros, quam quum quadrata earundem incognitarum ita quidem in æquatione continentur, ut translatis ad eandem partem, tum terminis quadrata illa continentibus, cum termino incognitarum productum includente, debeat coefficientis unius quadrati augeri nonnihil, quo termini ii possint simul quadratum perfectum constituere.

Profecto autem, quotiescumque in æquatione cum producto incognitarum conjungitur quadratum unius ex iis; tunc nihil vetat, alterius quoque quadratum in ea considerare; quum satis sit, ei præfigere zero, seu nihilum, velut coefficientem. Unde, quia coefficientis istius quadrati debet augeri nonnihil, quo idem possit una cum quadrato alio, & producto incognitarum quadratum perfectum constituere; poterit consideratione illa per hyperbolam, relate ad diametros consideratam, æquatio ipsa explicari.

XIV.

XIV. Superest jam, ut ostendamus, *quaratione hyperbola in plano describi possit, datis ejus asymptotis, & potentia*. Sint igitur  $AB$ ,  $AC$  asymptoti hyperbolæ describendæ; & exponatur potentia ejus per rectangulum, quod fit ex duabus earum portionibus  $AD$ ,  $AE$ . Compleatur parallelogrammum  $AF$ . Et quoniam rectangulum  $ADF$  adæquat potentiam datam; erit punctum  $F$  in hyperbola quæsitâ.

XIV.  
Quomodo  
describi pos-  
sit hyperbola  
in plano, da-  
tis ejus a-  
slymptotis, &  
potentia.

FIG.  
106.

Quum autem punctum  $A$  sit centrum hyperbolæ, si extendatur  $AF$  ad partem oppositam, usque donec æquales sint duæ  $AF$ ,  $AG$ ; fiet tota  $FG$  una ex diametris hyperbolæ. Et quoniam, constituta  $AB$  dupla ipsius  $AD$ , ductaque per punctum  $F$  recta  $BC$ , contingit ista hyperbolam describendam in  $F$ ; designabit eadem  $BC$  positionem ordinatarum diametri  $FG$ . Unde quæsitâ hyperbola nullo negotio describetur, si ejusdem diametri possit etiam parameter definiri.

Ad hanc vero definiendam, meminisse oportet, quod eadem recta  $BC$  sit æqualis conjugatæ ipsius  $FG$ . Hinc enim sequitur, parametrum diametri  $FG$  debere esse tertio loco proportionalem post duas  $FG$ ,  $BC$ ; adeoque eandem haberi, si fiat, ut  $FG$  ad  $BC$ , ita  $BC$  ad  $FH$ . Describatur ergo diametro  $FG$  hyperbola, ita ut recta  $FH$  exhibeat, tam parametrum ejus diametri, quam positionem suarum ordinatarum. Et hyperbola, subinde descripta, eam, quam quærimus, nobis exhibebit.

Obiter autem notetur hoc loco velim,  
Tom. II. R quod

quod sicuti, datis asymptotis, & potentia, positione datur hyperbola ipsa; sic dabitur quoque, si una cum asymptotis datum sit punctum aliquod, per quod hyperbola debeat transire. Neque enim in exposito problemate alium usum nobis præstitit potentia, expressa per rectangulum  $DAE$ , quam ut, completo parallelogrammo  $AF$ , haberi posset punctum  $F$ , per quod transire deberet hyperbola. Unde, si loco potentia daretur ab initio punctum  $F$ , adhuc solutio problematis eadem foret futura.

Idem problema, de describenda hyperbola in plano, datis ejus asymptotis, & potentia, resolvi quoque potest, inveniendo axem, & focos ipsius hyperbolæ. Si enim angulus  $BAC$ , sub asymptotis comprehensus, secetur bifariam per rectam  $AF$ ; dabit recta ista  $AF$  positionem axis hyperbolæ. Et si porro, constituto  $AB$  quadrato quadruplo datæ potentia, demittatur super  $AF$  perpendicularis  $BC$ ; fiet punctum  $F$  vertex ipsius axis. Unde demum, sicuti vertex alter habetur, capiendo ad partem oppositam  $AG$ , ipsi  $AF$  æqualem; ita circulus, qui describitur centro  $A$ , & intervallo  $AB$ , vel  $AC$ , quæsitos in axe focos designabit.



## L I B E R VIII.

*De Constructione Problematum  
Solidorum.*

**T** Radita compositione locorum geometricorum, quæ conicis sectionibus terminantur; reliquam jam est, ut easdem conic sectiones ad constructionem problematum solidorum traducamus. Sed, ut methodus istud obtinendi rectius intelligatur, præstat, rem paulo altius repetere, & breviter primum explicare, quo quidem artificio problematum geometricorum constructiones generaliter fieri debeant.

## C A P. I.

*Ratio construendi problemata  
geometrica generatim explicatur.*

I. **D**iximus præcedenti libro, problemata geometrica proprie vocari ea, quæ determinata sunt, omnesque continent conditiones, ad solutiones ipsorum necessarias; nec alia ratione illa, quæ sunt indeterminata, a Geometris considerari, quam ut eorum ope determinatis satisfiat, quæ præ-

I.  
*Qua ratione  
problemata  
determinata  
per loca geo-  
metrica con-  
struuntur.*

R 2 ci-

260 SECTIONUM CONICARUM  
cipuum Geometriæ objectum constituunt .  
Videamus itaque modo , *quo demum artificio  
problemata determinata construuntur , adhibi-  
tis iis , quæ indeterminata sunt , & per loca  
geometrica explicantur .*

Nimirum primo invenienda sunt duo  
loca geometrica, quæ omnes construendi pro-  
blematis conditiones seorsim includant. Tum  
ita oportet loca illa construuntur , ut valo-  
res unius incognitæ super eadem recta in  
utroque loco capiantur . Nam , quum valo-  
res incognitarum , ubi linearum , composita  
loca terminantium , fit interseccio , conditio-  
nes habeant utriusque loci geometrici ; ne-  
cesse est , ut valores illi problematis solutio-  
ni satisfaciant.

Oporteat , exempli gratia , invenire re-  
ctangulum , cuius latera datam habeant ra-  
tionem inter se , & simul sumpta datam quo-  
que rectam adæquent . Jam in hoc problema-  
te determinato duæ conditiones continentur.  
Quare, iis a se mutuo sejunctis, duo fient in-  
determinata problemata; unum, in quo quæ-  
ritur rectangulum , cuius latera datam ratio-  
nem habeant inter se ; alterum , in quo quæ-  
ritur rectangulum, cuius latera simul sumpta  
datam rectam adæquent.

Duo ista problemata indeterminata duo  
etiam nobis suppetunt loca geometrica . Un-  
de , quum in iis utraque propositi problema-  
tis conditio seorsim contineatur , poterunt  
pro ejusdem problematis constructione loca  
illa in subsidium advocari . Construuntur  
ergo illiusmodi loca ea quidem lege , ut va-  
lo-

lores unius, ejusdemque incognitæ super eadem recta in utroque loco capiantur. Et valores, quos habent incognitæ in loco intersectionis, quæsitum rectangulum continebunt.

II. Ut autem id liquido constet, *revocemus ad calculum* dua illa loca, tum *exposita ratione utrumque construamus*. Assumptis ergo incognitis  $x$ , &  $y$  pro lateribus rectanguli inveniendi, si eorum ratio ponatur æqualis ei, quam habet  $a$  ad  $b$ ; erit, ut  $x$  ad  $y$ , ita  $a$  ad  $b$ ; adeoque erit  $y = bx : a$  æquatio primi loci. Quod si porro summa earundem laterum dicatur  $c$ ; fiet  $x + y = c$ , vel  $y = c - x$  æquatio secundi loci.

II.  
Artificium  
constru-  
tionis proble-  
matis de-  
terminato-  
rum exem-  
plo illustra-  
tur.

Sit jam  $AB$  recta linea, per cujus portiones  $AN$  designantur valores incognitæ  $x$ ; &  $AC$  recta alia, cui æquidistantes esse debent rectæ  $NM$ , quæ valores referunt alterius incognitæ  $y$ . Quumque æquatio primi loci sit  $y = bx : a$ ; perspicuum est, quod si ex  $AB$  abscindatur portio  $AD = a$ , & ducta  $DE$  ipsi  $AC$  parallela, fiat eadem  $DE = b$ , terminari debeat locus ille per rectam  $AE$ , quæ conjungit puncta duo  $A$ , &  $E$ .

FIG.  
107.

Quia autem æquatio secundi loci est  $y = c - x$ , constructur alter iste locus, faciendo, tum  $AB$ , cum  $AC = c$ , & conjungendo puncta duo  $B$ , &  $C$  per rectam  $BC$ . Nam, ob triangula æquiangularia  $BAC$ ,  $BNM$ , erit, ut  $AB$  ad  $AC$ , ita  $BN$  ad  $NM$ . Quare, propter æquales  $AB$ ,  $AC$ , erunt etiam æquales duæ  $BN$ ,  $NM$ ; adeoque, quum sit  $BN = c - x$ , &  $NM = y$ , erit  $y = c - x$ .

R 3

Ter-

Termini igitur eorum locorum sunt rectæ AE, BC. Quum autem rectæ istæ se se secent in puncto F; habebit punctum istud F utriusq; loci conditiones. Quare, ducta FG, ipsis MN parallela; erunt rectæ AG, FG in data ratione, ob locum AE; & eadem simul datam summam constituent, ob locum BC: proindeque latera quæsitæ rectanguli erunt rectæ ipsæ AG, FG.

III. Neque vero difficile erit, inquirere, *num duo loca geometrica omnes alicujus problematis determinati conditiones includant.* Si enim ex eorum æquationibus colligi possit ipsa problematis æquatio; indicio erit, in locis illis singulas problematis conditiones includi. Quod si autem secus contigerit; nec item in iis locis omnes problematis conditiones continebuntur.

III.  
Quomodo  
cognoscenda  
sint loca,  
quibus de-  
terminatum  
problema  
construi pos-  
sit.

Ita, si æquatio problematis sit  $x = ac : (a - b)$ , nulli dubium esse potest, quin omnes ejusdem problematis conditiones includantur in duobus locis geometricis  $y = ax : c$ , &  $y = bx : c + a$ . Nam, quum ex duabus hisce æquationibus eruatur  $ax : c = bx : c + a$ ; reductione instituta, fiet  $ax - bx = ac$ , si-ve etiam  $x = ac : (a - b)$ , quæ est ipsa problematis æquatio.

Similiter, si æquatio problematis sit  $xx + bx - ax + bb = 0$ , dubitari non potest, quin omnes ejusdem problematis conditiones contineantur in duobus locis geometricis  $yy = 2ax - xx - bb$ , &  $y = x + b$ . Nam, quum duæ istæ æquationes dent nobis  $2ax - xx - bb = xx + 2bx + bb$ ; reductione in-  
sti-

stituta, fiet  $2xx \mp 2bx - 2ax \mp 2bb = 0$ , si-  
 ve etiam  $xx \mp bx - ax \mp bb = 0$ , quæ est  
 problematis æquatio proposita.

Atque ita quoque, si in resolutione ali-  
 cuius problematis perventum sit ad æquatio-  
 nem  $x^3 \mp aax - aab = 0$ , in dubium verti  
 non potest, quin contineant omnes ejusdem  
 problematis conditiones duo loca geometri-  
 ca  $xx = ay$ , &  $bx - xx = yy$ . Nam, quum  
 ex duabus hisce æquationibus eruatur  $bx$   
 $\mp xx = x^4 : aa$ ; reductione instituta, fiet  
 $aabx \mp aaxx = x^4$ , sive etiam  $x^3 \mp aax -$   
 $aab = 0$ , quæ est ipsa problematis æquatio.

IV. Sed nec etiam difficile erit, duo loca  
 geometrica reperire, quæ omnes alicujus pro-  
 blematis determinati conditiones includant.  
 Inveniatur etenim æquatio, ad quam pro-  
 positum problema reducitur. Tum, sumpta  
 ad libitum æquatione alia indeterminata, com-  
 plicentur ambæ simul, quoties fieri potest, si-  
 ve substitutionis, sive additionis, sive de-  
 mum subtractionis ope. Atque hac ratione,  
 non duo tantum, sed plura loca geometrica  
 reperientur, quorum bina quævis singulas  
 problematis conditiones continebunt.

IV.  
 Ratio inve-  
 niendi ea-  
 dem loca in  
 medium af-  
 fertur.

Sit, exempli gratia,  $x^4 \mp aaxx \mp aabx$   
 $\mp a^3c = 0$  æquatio, ex resolutione alicujus  
 determinati problematis orta. Capiatur æ-  
 quatio indeterminata  $xx \mp ay = 0$ , sive  $xx =$   
 $ay$ . Jamque, si in ea ponatur  $aayy$  loco  $x^4$ , ha-  
 bebatur  $aayy \mp aaxx \mp aabx \mp a^3c = 0$ , sive  
 $yy \mp xx \mp bx \mp ac = 0$ , quæ est æquatio al-  
 tera indeterminata. Et si porro in ista loco  $xx$   
 ponatur  $ay$ , fiet  $yy \mp ay \mp bx \mp ac = 0$ , quæ

R 4 est

264 SECTIONUM CONICARUM  
est tertia æquatio indeterminata.

Tres istæ æquationes indeterminatæ jam tria nobis loca geometrica suppetunt, quorum singula paria cunctas problematis conditiones complectuntur. Sed possunt, additionis, subtractionisque ope, tres aliæ reperiri, quæ eundem præstent effectum. Addendo enim priores duas, fiet  $yy + 2xx - ay - bx - ac = 0$ ; addendo autem duas posteriores, habebitur  $2yy + xx + ay - 2bx - 2ac = 0$ ; ac denique addendo simul primam, & tertiam orietur  $yy + xx - bx - ac = 0$ , quæ tamen a secunda non differt.

Eadem ratione, subducendo primam ex secunda, orietur  $yy + ay - bx - ac = 0$ , quæ non differt a tertia; & subducendo secundam ex tertia, habebitur  $ay - xx = 0$ , sive  $xx - ay = 0$ , quæ est ipsissima prima. Sed, si prima ex tertia subducatur, fiet  $yy - xx + 2ay - bx - ac = 0$ , quæ a singulis præcedentibus diversa deprehenditur.

V.  
*Quod unum  
idemq; pro-  
blema variis  
rationibus  
construi pos-  
sit.*

V. Id, quum ita sit, liquet, *unum, idem-  
que problema geometricum non una ratione  
construi posse.* Primo enim pro eodem proble-  
mate potest, modo una, modo alia æquatio  
reperiri: prout hanc, aut illam lineam assu-  
mere placet, velut incognitam. Et deinde,  
etiamsi semper eadem futura esset problematis  
æquatio; adhuc tamen variis, multisque mo-  
dis problema construere liceret: ob varia lo-  
corum geometricorum paria, in quibus sin-  
gulæ problematis conditiones possunt seor-  
sim contineri.

Interim, ut non omnes problematis  
con-

constructions Geometriæ legibus correspondent; sic inter eas, quas legitimas Geometria fatetur, dantur persæpe quædam, quæ facilitate, ac elegantia merentur reliquis præferri. Unde, quum problema aliquod geometricum construi debet, non modo vitandæ sunt eæ constructions, quæ vitio argui possunt; sed in id etiam sedulo incumbendum, ut eligantur constructions illæ, quæ Geometriæ solertiam, ac nitorem ostendunt.

Hinc duo nobis hoc loco præstanda sunt. Primo enim oportet ostendamus, quæ quidem problematum constructions legitimæ censendæ sint, quæve per contrarium vitio argui queant. Deinde vero inter ipsas constructions, quæ Geometriæ legibus correspondent, nec ullo vitio laborant, qua utique ratione faciliores, simplicioresque dignosci possint, oportet aperiamus.

Et quantum ad primum, eæ quidem constructions velut legitimæ haberi debent, quæ naturæ problematum consonæ sunt. Neque enim omnia problemata per cujuscumque generis loca geometrica construi possunt; sed unumquodque pro suo gradu determinati generis loca requirit. Unde, ut de rectitudine constructionum tuto iudicium ferri possit, constituendi primum sunt gradus problematum geometricorum.

VI. Plane *Veteres*, referente Pappo, *problematum geometricorum tria genera distinguiebant, & eorum alia quidem plana, alia solida, & alia demum linearia appellabant. Quæ enim per rectas, & circuli circumferentiam*

VI.  
Quomodo  
Veteres pro-  
blemata dis-  
tinguebant,  
& quo vitio  
distinlio il-  
la laboret.

266 SECTIONUM CONICARUM  
tiam solvi possunt, vocabant plana: ob ortum earum linearum, quem habent in plano. Quæ vero solvuntur, assumpta in constructione aliqua conisectione, dicebant solida; quia conisectiones ex solido trahunt originem suam. Et denique, quæ construi nequeunt, nisi adhibitis lineis aliis, præter jam dictas, linearia nuncupabant: velut problemata, quæ ut construantur, lineas alias magis compositas exigunt.

Sed hujusmodi problematum geometricorum distinctio, a Veteribus facta, non uno vitio laborat. Primo enim per eam natura problematis non semper nobis innotescit. Et si enim tuto concludere liceat, problema esse planum, quotiescumque circulo, & recta construitur; quod tamen sit solidum, aut lineare, numquam certo, ac infallibiliter statui potest; quum impossibile sit, ejus criterii certiolem fieri, quod, juxta Veteres, tum solidum a plano, cum lineare a plano, & solido secernere valet.

Ut enim, ex mente Veterum, solidum dici possit aliquod problema, haud quidem satis est, aliqua conisectione construi posse; sed necesse est quoque, ut recta, & circulo nullimode construi queat. Quare, non aliter concludere licebit, solidum esse problema aliquod, quam ubi illiusmodi impossibilitas extra omnem dubitationis aleam ponitur: & propterea, quum id sine alterius criterii ope obtineri non possit, consequens est, ut nec item solidum problema distinguere liceat.

Similiter, ut juxta Veteres lineare dici



ci possit aliquod problema, haud quidem satis est, linea alia magis composita construi posse; sed oportet etiam, ut respuat, tum circuli circumferentiam, cum conic sectiones. Quare, tunc demum concludere licebit, lineare esse problema aliquod, quum ostenditur, nec circulo, nec aliqua conic sectione posse constructionem ejus obtineri. Unde, quum id evinci nullimode queat, nisi criterium aliud habeatur; nec item lineare problema a plano, & solido poterit secerni.

Hinc, posita problematum geometricorum distinctione, a Veteribus facta, tantum abest, ut reprehensione digni sint ii, qui duplicationem cubi, & anguli trisectionem recta, & circulo tentare conantur; quin potius, meo judicio, laudem omnem merentur, & excitandi eo magis, ut nullum non moveant lapidem, quo videant, num Geometriæ planæ præsidio constructio eorum problematum posset haberi. Nam etsi eorum conatus semper irriti forent futuri; exinde tamen eo magis probabile redditur, problemata illa natura sua esse solida, & non jam plana.

VII. Sed alio quoque vitio laborat distinctio problematum geometricorum, quam Veteres condiderunt: nimirum, quod juxta eam nullum non fiat discrimen inter problemata, quæ nec plana sunt, nec solida; sed omnia in uno eodemque gradu reponantur. Inde enim colligi posset, quod sicuti ejusdem naturæ sunt, tam cuncta problemata plana, quam omnia problemata solida; sic quoque singula problemata linearia eandem naturam deberent habere.

VII.  
*Allud vitium in distinctione problematum, a Veteribus facta, indicatur.*

In.

Interim nolim ex hac parte adeo Veteres increpare. Neque enim problemata linearia ita ii excoluere, quemadmodum plana, & solida. Unde, tametsi eis innotuerit, dari problemata quædam, quæ nec plana, nec solida essent; multiplices tamen, ac pene infinitas eorum problematum differentias minime norunt: quippe quæ non aliter fiunt cognitæ, ac exploratæ, quam ubi aliquot ex iis problematibus ad examen revocantur.

Notetur autem hoc loco velim, quod sicuti problematum geometricorum tria genera Veteres distinguebant; sic lineas omnes, quibus problematum fiunt constructiones, ad tres classes pariter revocabant. Prima etenim erat illarum, per quas plana problemata solvuntur; eaque nonnisi rectam, ac circuli circumferentiam continebat. Secunda complectebatur conicæ sectiones, quas ad constructionem problematum solidorum oportet assumere. Et tertia demum omnes alias lineas magis compositas comprehendebat, quæ constructioni problematum linearium inserviunt.

Revocabant porro ad tertiam hanc classem, non modo omnes alias lineas geometricas, ut cissoidem Dioclis, conchoidem Nicomedis; verum etiam lineas mechanicas, ut quadratricem Dinostrati, spiralem Archimedis. Qua in re nec etiam adeo ii velim arguantur. Nam, sicuti, ob differentias problematum linearium, non adhuc eis exploratas, unum eorum genus constituebant; sic omnino necesse erat, ut in una eademque classe reponerent, tam lineas geometricas, quæ

quæ circuli circumferentiam, & coní sectiones excedunt, quam lineas mechanicas, quæ cunctis natura sua superiores deprehenduntur.

Hinc, quod Cartesius antiquis Geometris vitio vertit, potius refellendo ejus errori apposite nobis inserviet. Ex eo enim, quod sub eodem genere reposuerint Veteres, tam cissoidem, & conchoidem, quam spiralem, & quadratricem; censuit, eos e Geometria rejecisse omnes alias curvas, quæ circuli circumferentia, & conicis sectionibus magis compositæ essent. Sed crediderim, hanc eis sententiam adscripsisse, quia ipse in ea erat opinione, ut spiralis, quadratrix, & similes e Geometria exules esse deberent: quam tamen vel ex eo exuere poterat, quod illiusmodi lineas ad eandem classem cum curvis aliis geometricis ipsi Veteres revocabant.

VIII. Quum igitur distinctio problematum geometricorum, a Veteribus facta, in plana, solida, & linearia, non uno vitio laboret; rectius Recentiores *distinguunt genera problematum ex numero dimensionum, ad quas eorum æquationes ascendunt*. Et quamquam Cartesius duabus dimensionibus ea a se mutuo distinguenda esse putaverit; communiter tamen uníca tantum dimensione a se invicem secernuntur, & unumquodque problema ejus generis esse censetur, quod ipse æquationis gradus ostendit.

VIII.  
*Distinctio  
 problematum ex numero dimensionum, ad quas eorum æquationes ascendunt.*

Itaque, si æquatio problematis sit primi gradus, sive unius tantum dimensionis; ipsum quoque problema primi generis esse di-

270 SECTIONUM CONICARUM  
dicetur. Sed, si æquatio fuerit secundi gradus, seu duarum dimensionum; tunc etiam problema dicetur esse generis secundi. Atque ita pariter dicetur esse generis tertii, si ejus æquatio fuerit tertii gradus, sive trium dimensionum; generis quarti, si æquatio sit quarti gradus, sive quatuor dimensionum; generis quinti, si æquatio sit quinti gradus, sive quinque dimensionum; atque ita deinceps.

Notandum tamen hoc loco est, quod æquatio aliqua tunc proprie dicitur esse alicujus gradus, quum ad gradum alium inferiorem deprimi non potest. Unde, si in resolutione alicujus problematis perventum sit ad æquationem aliquam, quæ deprimi queat; tunc, ut de genere problematis judicium ferri possit, necesse est, prius deprimere æquationem illam per regulas, quæ in Algebra traduntur; quia sic problema ejus generis esse dicetur, quod depressus gradus ostendit.

Illud quoque nolo hic reticere, quod etsi, definiendis constructionibus, quæ naturæ problematum consonæ sunt, consultius sit, unica tantum dimensione eorum genera a se invicem distinguere; attamen, si in cujusque constructione circulus vellet adhiberi, tunc potius probanda esset distinctio problematum Cartesiana, quæ per duas dimensiones procedit; quum in eo casu lex constructionis intra binas dimensiones eadem semper, ac immutata perseveret.

Interim, vitandæ confusionis gratia, etiam quum quæstio erit, de adhibendo circulo in constructione cujusque problematis,  
uni-

unica tantum dimensione distinguemus a se mutuo genera problematum. Nam, juxta hanc distinctionem, nullo negotio pro singulis casibus regulæ tradi possunt; quum tamen, recepta distinctione Cartesiana, non nisi per ambages id, quod quisque casus exigat, poterit definiri.

IX. Problematum generibus constitutis, facile modo erit, constructiones definire, quæ eorum naturæ consonæ sunt, & velut legitimæ debent haberi. Jam enim vidimus supra, pro cujusque problematis constructione, adhibenda esse duo loca geometrica, quæ singulas problematis conditiones seorsim includant. Itaque, ut constructio legitima sit, & naturæ problematis consona, loca illa talia insuper sint oportet, ut multiplicatis per se mutuo numeris suarum dimensionum, oriatur numerus alter, qui vel ipsum problematis genus, vel etiam genus proxime superius nobis exhibeat.

Hac ratione, si problema sit quarti generis, legitima erit constructio, quæ per loca duo geometrica secundi generis absolvi- tur; enim vero, multiplicatis simul duobus binariis, producitur numerus quaternarius, per quem gradus problematis ostenditur. Et eadem ratione, si problema sit generis sexti, erit consona ejus naturæ constructio, quæ perficitur loco secundi generis, & alio tertio; quandoquidem ex multiplicatione numeri binarii per numerum ternarium producitur numerus senarius, per quem problematis genus exhibetur,

Quum

IX.

*Quæ con-  
structiones  
sunt legiti-  
mæ, & na-  
tura proble-  
matum con-  
sonæ.*

Quum vero non semper fieri possit, ut numerus, problematis genus ostendens, ex aliis duobus, per se mutuo multiplicatis, oriatur; hinc est, ut plerisque in casibus loca geometrica talia esse debeant, ut eorum exponentes, in se invicem ducti, genus proxime superius exhibeant. Sic per loca duo secundi generis construenda sunt, non modo problemata generis quarti, verum etiam ea, quæ genus tertium constituunt. Atque ita quoque per locum secundi generis, & alium tertii construi debent, tam problemata generis sexti, quam quæ ad quintum genus revocantur.

Quemadmodum autem abunde liquet, id dumtaxat contingere posse in iis problematum generibus, quæ per numeros impares definiuntur; sic liquido etiam patet, non in omnibus hisce generibus tale quidpiam evenire. Si enim, exempli gratia, problema sit noni generis; poterit constructio ejus per loca duo generis tertii obtineri. Et eadem ratione, si problema sit generis decimi quinti; nihil obstat, quin per locum tertii generis, & alium quinti constructio illius peragatur. Contingit id ergo in iis tantummodo generibus, quorum exponentes sunt numeri primi; quum notum sit, hujusmodi numeros nullos divisores admittere.

X.  
Allata regula  
la consellaria  
quadam  
in medium  
afferuntur.

X. Ex regula jam tradita, pro definiendis constructionibus, quæ legitimæ sunt, & naturæ problematum consonæ, *plura modo licebit inferre, non exiguam rei, de qua agimus, lucem allatura.* Primo enim perspicuum est,

est, posse unum, idemque problema per multiplicis generis loca legitime construi. Sic problema duodecimi generis construere licet, non modo per locum generis tertii, & alium quarti; verum etiam per loca duo, quorum alter sit secundi generis, alter generis sexti.

Deinde liquet etiam, unumquodque problema legitime construi posse per locum geometricum, qui sit ejusdem generis cum ipso problemate. Nam semper ac locus alter assumitur generis primi; jam duo illa loca talia erunt, ut eorum exponentes, per se mutuo multiplicati, construendi problematis genus ostendent. Et quoniam loca primi generis sunt semper ad rectam; non aliter, quam rectæ, & curvæ alicujus intersectione, hujusmodi constructiones erunt peragenda.

Liquet demum, quod si cujusque problematis constructio circulo fieri velit, omnino necesse sit, ut locus alter geometricus sit ejus generis, cujus exponens duplicatus exhibet, vel ipsum problematis genus, vel genus proxime superius. Est enim circulus, locus secundi generis. Quare, ubi una cum ipso alter ille locus adhibetur; jam problema construitur per loca duo, quorum exponentes, in se mutuo ducti, exhibent nobis, vel proprium problematis genus, vel quod proxime illud subsequitur.

Itaque, si problema decimi generis circulo foret construendum, oporteret, locum alium quinti generis esse; nec aliter esse deberet, si problema, circulo construendum, non decimi, sed noni generis esset. Et eadem

274 SECTIONUM CONICARUM  
 ratione , tam problema generis undecimi ,  
 quam quod ad duodecimum genus revoca-  
 tur , non aliter recte circulo construitur ,  
 quam assumpto in constructione loco alio ,  
 qui sit generis sexti .

Hinc , quotiescumque problemata cir-  
 culo construi debent , lex ipsius constructio-  
 nis intra duas dimensiones eadem semper per-  
 severat . Atque hac de causa distinctio pro-  
 blematum Cartesiana , quæ per duplicem di-  
 mensionem procedit , probari potius , quam  
 rejici deberet . Nam , juxta eam , locus alter ,  
 quem in constructione oporteret assumere ,  
 foret semper ejusdem generis cum ipso pro-  
 blemate construendo .

XI.  
 Ostenditur  
 veritas re-  
 gula pro de-  
 finiendis  
 constructio-  
 nibus legiti-  
 mis, & na-  
 tura proble-  
 matum con-  
 sonis.

XI. Cæterum haud difficile erit, ostendere  
 veritatem regulæ , superius traditæ , pro defi-  
 niendis constructionibus , quæ legitimæ sunt,  
 & naturæ problematum consonæ . Jam enim lo-  
 ca , in constructione problematis adhibenda,  
 debent singulas ejus condiciones seorsim  
 continere . Quare , tunc quidem legitima erit  
 constructio , & naturæ problematis consona,  
 quum simpliciora loca adhibentur , quæ om-  
 nes illius condiciones seorsim complectuntur .

Hinc, ut præfatæ regulæ veritas constet,  
 duo quidem sunt nobis ostendenda . Primum  
 est , ut omnes alicujus problematis conditio-  
 nes contineri possint in duobus locis geome-  
 tricis , quorum exponentes , in se mutuo du-  
 cti , exhibent , vel ipsum problematis genus,  
 vel genus proxime superius . Alterum est, ut  
 loca , quorum exponentes , per se invicem  
 multiplicati , exhibent genus inferius , ne-  
 queant



queant ejusdem illius problematis conditiones omnes seorsim comprehendere.

Nescio autem, nunc horum utrumque sua egeat demonstratione. Ut enim vidimus supra, tunc quidem duo loca geometrica singulas alicujus problematis conditiones seorsim includunt, quum ex eorum æquationibus eruere licet æquationem, ex resolutione problematis ortam. Unde eo res redit, ut ostendamus, æquationem istam haberi quidem posse per loca priora, sed non item per loca secunda.

Id vero in ipsis Algebrae Elementis ostenditur. Nam, quum quæstio est, de exterminanda incognita una, per æquationes duas, quæ totidem incognitas complectuntur; regula traditur in iis, ope cujus liquet abunde, æquationem, incognitam alteram continentem, posse quidem ascendere ad eum gradum, qui producitur, multiplicatis per se mutuo gradibus earum æquationum; altius autem attolli nullimode posse.

Atque hinc, alio rursus artificio, inveniri poterunt loca duo, quibus determinati alicujus problematis constructio peragi possit. Nimirum, capiendo indefinite loca illa, tum per eorum æquationes exterminando incognitam unam, & inveniendo æquationem, quæ alteram tantum incognitam contineat. Nam, instituta deinde comparatione inter æquationem istam, & eam, ad quam problema reducitur, facili negotio quæsitæ loca definientur.

XII. Quum ergo jam nobis innotuerit, XII.  
*Quomodo*  
S 2 quæ

*inter con-  
structiones  
legitimas fa-  
ciliores, sim-  
plicioresque  
diagnosci pos-  
sunt, aperi-  
tur.*

quæ constructiones sint legitimæ, & natu-  
ræ problematum consonæ; inquirendum est  
modo, *qua ratione inter eas faciliores, sim-  
plicioresque diagnosci possint.* Et quidem ne-  
gotium istud dijudicandum est ex locis, qui-  
bus ipsæ problematum constructiones pera-  
guntur. Nam, etsi loca omnia, quæ æqua-  
tionibus ejusdem gradus definiuntur, ad idem  
omnino genus pertineant; quin tamen inter  
ea fieri debeat discrimen aliquod, non est du-  
bitandum.

Hujusmodi vero discrimen repeti primo  
debet ex ipsis lineis, quibus loca terminan-  
tur: in quantum non omnes eadem facilitate  
in plano describuntur. Sic lineæ, loca secun-  
di generis terminantes, ut superius vidimus,  
sunt circuli circumferentia, & conicæ sectio-  
nes. Sed nulli dubium esse potest, quin cir-  
cumferentia circuli longe facilius describatur  
in plano, quam quælibet sectio coni.

Idem discrimen repetendum est quoque  
ex æquationibus eorundem locorum. Nam,  
etsi ad eundem locum per varias æquationes  
possit perveniri; nequit tamen in dubium re-  
vocari, quin ipsa loci compositio eo facilior  
futura sit, quo minus composita est ejus æ-  
quatio. Sic loca, conicis sectionibus termi-  
nata, eo quidem facilius construuntur, quo  
magis æquationes, quibus designantur, ad  
formulas ipsorum simplicissimas accedunt.

Hæc autem quum ita sint, liquet, faci-  
litatem, simplicitatemque constructionis geo-  
metricæ æstimandam esse duplici ex capite;  
primo nempe ex faciliore ratione, qua lineæ,  
lo-

loca terminantes, describuntur; & secundo ex simpliciore apparatu, quo opus est, pro determinatione earundem linearum. Unde in hæc duo sedulo oportet incumbere, quo elegans, ac valde simplex dati alicujus problematis constructio possit haberi.

Qui igitur in construendo problemate aliquo, loco conicæ sectionis, circulum substituit, non est dubitandum, quin faciliorem, simpliciolemque constructionem exhibeat; quandoquidem circulus in plano facilius longe describitur, quam quælibet sectio conica. Et eadem ratione nulli etiam dubium esse potest, quin elegantior futura sit dati alicujus problematis constructio, quum conica sectio, quæ assumitur in ea, refertur per suam æquationem, vel ad ipsam diametrum, vel ad aliquam ejus parallelam.

## C A P. II.

### *Ratio construendi problemata plana in medium affertur.*

I. **E** T si in hoc libro propositum nobis sit, dumtaxat de constructione eorum problematum agere, quæ solida a Veteribus dicebantur; nihilo tamen minus, quemadmodum, ad plenioram ejus rei intelligentiam, necessarium duximus, generatim prius explicare, quo pacto problemata geometrica construantur; sic, ob eandem rationem,

I.  
*Quæ sint  
problemata  
plana, juxta  
Recentio-  
rum distin-  
ctionem, a-  
fferuntur.*

278 SECTIONUM CONICARUM  
nem, præmittenda est quoque constructio  
problematum, quæ iidem Veteres plana vo-  
cabant; quum ipsa solida problemata nulli-  
mode absque ea construi possint.

Plana igitur problemata, ut præcedenti  
capite dictum est, vocabant Veteres ea, quæ  
recta, & circulo construi possunt. Unde, ju-  
xta Recentiorum distinctionem, non alia  
problemata tale nomen merentur, quam *quæ,  
tum ad primum, cum ad secundum genus re-  
vocantur*. Istorum enim problematum æqua-  
tiones secundum gradum non excedunt.  
Quare eadem problemata per ea semper loca  
geometrica construere licebit, quæ recta, &  
circuli circumferentia terminantur.

Et illa quidem problemata, quæ primi sunt  
generis, nec etiam circulo opus habent, sed  
rectis tantum construi possunt. Assumenda  
est autem circuli circumferentia, in con-  
structione eorum problematum, quæ secun-  
di sunt generis. Nam numerus binarius,  
per quem istorum genus ostenditur, non ali-  
ter potest oriri, quam multiplicando unita-  
tem per eundem numerum binarium; adeo-  
que omnino necesse est, ut talia problemata  
construantur per loca duo, quorum alter sit  
generis primi, alter generis secundi.

Quamquam vero loca primi generis re-  
ctis semper terminentur; ea tamen, quæ se-  
cundi sunt generis, non modo circuli circum-  
ferentia, sed omnibus conicis sectionibus pos-  
sunt circumscribi. Hinc problemata, quæ se-  
cundum genus constituunt, tam recta, &  
circulo, quam recta, & qualibet conicis sectione-  
ne,

ne construere liceret. Sed præferendæ sunt eæ constructiones, quæ recta, & circulo fiunt; quia circuli circumferentia facilius longe in plano describitur.

II. Jam, ut ea primum problemata construere doceamus, quæ primi sunt generis, sciendum est, quod si æquatio, ex aliquo horum problematum orta, sit adeo simplex, ut habeatur  $x = a$ ; tunc nulla arte opus sit, pro ejus constructione; quum nihil facilius dari possit, quam ut recta, alteri datæ æqualis, capiatur. Constructionem ergo istiusmodi problematis velut postulatum in hoc negotio assumemus: eoque magis, quod eadem sit veluti fundamentum omnium constructionum geometricarum.

Verum, si concedenda est nobis constructio hujus æquationis  $x = a$ , ratio exigit, ut concedantur pariter constructiones istarum  $x = a + b$ ,  $x = a + b + c$ ,  $x = a + b + c + d$ , atque ita deinceps. Nam, sicuti super recta AB capi potest portio AC = a, ita successive super eadem assumere licebit CD = b, DE = c, & EF = d. Unde, quemadmodum valor incognitæ x in æquatione  $x = a$  est AC, sic erit AD in æquatione  $x = a + b$ , AE in æquatione  $x = a + b + c$ , & AF in æquatione  $x = a + b + c + d$ .

Eadem autem ratione neque etiam deneganda est nobis constructio illius problematis, ex quo suborta est æquatio  $x = a - b$ . Jam enim, progrediendo ex A versus B, capi potest super AB portio AC = a. Quare, redeundo ex C versus A, poterit etiam super CA,

II.  
Quod ad similes  
quadam  
problemata  
primi generis,  
quorum  
constructiones  
ut postulata  
debent  
assumi.

FIG.  
108.

FIG.  
109.

280 SECTIONUM CONICARUM  
 producta si opus, capi portio  $CD = b$ . Quum-  
 que hoc pacto fiat  $AD = a - b$ ; erit eadem  
 AD valor, quem habet incognita  $x$  in æqua-  
 tione  $x = a - b$ .

Atque hinc ulterius nec item alicui dif-  
 ficultati obnoxia esse debet constructio ejus  
 problematis, ex quo nata est æquatio  $x = a$   
 $- b + c - d$ . Si enim quærantur rectæ duæ,  
 quæ duabus summis  $a + c$ , &  $b + d$  sint æquales;  
 eæ, ut vidimus, ultro nobis concedi debent.  
 Unde, si eadem dicantur  $f$ , &  $g$ , æquatio fiet  
 $x = f - g$ , cujus quidem constructio nequit  
 nobis denegari.

III.  
 Constructio  
 problematis  
 primi gene-  
 ris, ad quod  
 omnia alia,  
 quæ ejusdem  
 sunt generis,  
 revocantur.

III. Constructionibus hisce præjactis, si-  
 ve potius præsuppositis, facile modo erit,  
*construere unumquodque aliud problema, quod*  
*primi sit generis*. Ut vero ordine progredia-  
 mur, sit primum  $x = ab : c$  æquatio, ex re-  
 solutione problematis orta. Jamque, si locus  
 ad rectam simplicissimus  $y = b$  capiatur; fiet  
 per substitutionem  $x = ay : c$ , sive etiam  $y =$   
 $cx : a$ , quæ quidem æquatio similiter ad re-  
 ctam nos ducit.

Hinc problema, contentum in æquatio-  
 ne  $x = ab : c$ , construi poterit duobus hisce  
 locis geometricis  $y = cx : a$ , &  $y = b$ ; ut quæ  
 non modo singulas ejus condiciones seorsim  
 continent, sed ambo etiam lineis rectis termi-  
 nantur. Hunc in finem sit AB recta, per cujus  
 portiones AN designantur in utroque loco  
 valores incognitæ  $x$ ; & AC ea, cui in utro-  
 que pariter loco æquidistantes esse debent va-  
 lores alterius incognitæ  $y$ .

FIG.  
 11C.

Quum igitur æquatio primi loci sit  $y =$   
 $cx : a$ ,

$x:a$ , constructur ille, si abscissa ex AB portione  $AD = a$ , ductaq; per punctum D recta DE, ipsi AC parallela, fiat  $DE = c$ , & jungatur AE. Quumque æquatio secundi loci sit  $y = b$ , fiet alterius hujus loci constructio, abscindendo ex AC portionem  $AF = b$ , & ducendo per punctum F rectam FH, alteri AB parallelam.

Jam rectæ duæ AE, FH, omnino necesse est, ut sibi mutuo occurrant. Fiat itaque earum occurfus in puncto M. Et, demissa exinde super AB recta MN, ipsi AC parallela; erit AN valor, quem habet incognita  $x$  in æquatione  $x = ab:c$ . Ponatur enim  $AN = x$ . Et quoniam, ob triangula æquiangula ADE, ANM, AD est ad DE, ut AN ad NM, sive AF: erit, ut  $a$  ad  $c$ , ita  $x$  ad  $b$ : & propterea erit  $x = ab:c$ .

IV. Exhibita constructione problematis, contenti in æquatione  $x = ab:c$ ; jam, ope ejus, omnia alia, quæ primi sunt generis, construere licebit; quum facile sit, ea mediante, æquationes omnes primi gradus ad formam illam revocare. Ita, si æquatio problematis sit  $x = abc:de$ ; capiendo  $f = ab:d$ , fiet  $x = cf:e$ . Et, si æquatio sit  $x = abcd:efg$ ; sumendo, tam  $m = ab:e$ , quam  $n = cd:f$ , habebitur  $x = mn:g$ .

Fieri autem potest, ut incognita  $x$  plures hujusmodi quantitates adæquet. Et tunc, eas seorsim reperiendo, adhuc problema construere poterit. Sed, si habeatur  $x = ab:(c+d)$ , vel  $x = ab:(c-d)$ ; fiet constructio, ponendo  $f$  loco ipsius  $c+d$ , vel  $c-d$ ; quum sic æquatio evadat  $x = ab:f$ . Atque ita quoque, si fue-

IV.  
Quomodo  
ad constru-  
endum pro-  
blema om-  
nia alia pri-  
mi generis  
problemato  
reducuntur.

si fuerit  $x = abc : (de \mp fg \dashv bl)$ , capiatur  $m = (de \mp fg \dashv bl) : a$ , & habebitur  $x = bc : m$ .

Prætera, si in resolutione alicujus problematis perventum sit ad æquationem  $x = (ab \dashv cd) : (m \mp n)$ ; construetur illud, capiendo  $f = m \mp n$ ; quum hac ratione habeatur æquatio  $x = ab : f \mp cd : f$ , quæ jam construi potest. Pariterque, si æquatio problematis sit  $x = (abc \dashv adf) : (gb \dashv mn)$ , capiatur  $l = gb : a \dashv mn : a$ , ita ut sit  $al = gb \dashv mn$ ; & habebitur loco ejus hæc alia æquatio  $x = bc : l \dashv df : l$ , quam similiter construe-  
re licet.

Opus est autem solertia Geometræ in æquationum reductionibus instituendis, ut quæ contrahi quandoque possunt. Ita, si habeatur æquatio  $x = (abc \dashv bbcc) : (abc \mp a^3)$ , facillime fiet ejus reductio, capiendo  $d = bc : a$ . Nam, quum sit  $ad = bc$ , &  $aadd = bbcc$ ; substitutione peracta, habebitur  $x = (ad \dashv dd) : (d \mp a)$ . Unde, ponendo postea, tum  $m = a \dashv d$ , cum  $n = d \mp a$ ; fiet  $x = dm : n$  æquatio reducta.

V.  
Quorsum  
reducatur  
construillo  
problemata  
tam primi  
generis, aperitur.

V. Non igitur dubitari potest, quin omnia problemata primi generis nullo negotio construantur, ubi semel constructum est problema, quod exhibet æquatio  $x = ab : c$ . Et quoniam problema istud non aliud involuit, quam ut, datis tribus rectis lineis, quarta proportionalis inveniatur; liquet, *cuncta primi generis problemata, per inventionem quartæ alicujus proportionalis, construi posse.*

Sed notetur hoc loco velim, ejusdem illius problematis, quod continetur in æquatio-

tio-



tione  $x = ab : c$ , plures alias constructiones dari posse. Placuit autem eam eligere, quæ superius allata est; tum quia est omnium simplicissima; tum etiam, quia affinis est illi, quæ usus est Euclides in suis Elementis, pro invenienda quarta proportionali post tres rectas lineas datas.

Plane enim, si quemadmodum æquatio construenda est  $x = ab : c$ , sive  $cx = ab$ , ita capiatur æquatio ad rectam  $dx : a = y$ , sive  $dx = ay$ ; fiet, addendo eas simul,  $cx + dx = ab + ay$ , quæ similiter ad rectam nos ducit. Unde æquatio  $cx = ab$  construi quoque poterit, adhibitis duobus hisce locis geometricis  $dx = ay$ , &  $cx + dx = ab + ay$ .

Quin etiam, si æquatio assumpta  $dx = ay$  subducatur ex ipsa  $cx = ab$ , habebitur tertius locus ad rectam  $cx - dx = ab - ay$ . Unde ejusdem illius æquationis constructio fieri pariter poterit, tum ope locorum  $dx = ay$ , &  $cx - dx = ab - ay$ , cum ope istorum  $cx + dx = ab + ay$ , &  $cx - dx = ab - ay$ . Interim, si fuerit  $c = d$ , ex prima harum constructionum rursus superior orietur.

VI. Ostensa constructione problematum primi generis, videamus modo, quæ ratione ea, quæ secundi sunt generis, construi debeant. Et simplicior quidem æquatio, quæ ex aliquo horum problematum potest oriri, est  $xx = ab$ . Quumque eo res redeat, ut inter duas rectas datas media proportionalis inveniatur; construi poterit illiusmodi problema eo quidem artificio, quo utitur Euclides in Elementis pro mediæ proportionalis inventione.

VI.  
Constructio  
problematis  
secundi ge-  
neris, ad  
quod omnia  
illa, quæ  
ejusdem  
sunt generis,  
reducuntur.

Ve-

Verum, ut methodo nostro tale artificium inquiramus, capiatur locus ad rectam simplicissimus  $y = c$ . Et quoniam habetur, tum  $xx = ab$ , cum  $yy = cc$ ; fiet additione  $xx + yy = ab + cc$ . Quemadmodum autem hæc æquatio ad circulum nos ducit, quum valores incognitarum rectos angulos continent; ita, ut descriptio hujus circuli problema primi generis fiat, oportebit, quantitatem  $ab + cc$  quadratum esse perfectum: quo radix ejus, quæ circuli radium refert, rationalis oriatur.

Jam quantitas illa talis esse non potest, nisi adæquet  $c$  semissem differentiæ ipsarum  $a$ , &  $b$ . Nam, ponendo  $a$  majorem esse, quam  $b$ , fiet  $c = a:2 - b:2$ ; adeoque, quum sit  $cc = aa:4 - ab:2 + bb:4$ , erit  $ab + cc = aa:4 + ab:2 + bb:4$ . Hinc ex duobus locis geometricis, quibus construendum est problema, contentum in æquatione  $xx = ab$ , erit  $y = a:2 - b:2$  locus ad rectam, &  $xx + yy = aa:4 + ab:2 + bb:4$  locus ad circulum.

FIG.

III.

Sit igitur  $AB$  recta, super qua sumi debent valores incognitiæ  $x$ . Et quoniam æquatio circuli nulla eget reductione, erit centrum illius ipsum punctum  $A$ ; adeoque, abscissa ex  $AB$  portione  $AD = a:2 + b:2$ , fiet  $AD$  ejusdem circuli radius. Erigatur deinde super  $AB$  perpendicularis  $AC$ . Jamque, si ex ea auferatur portio  $AE = a:2 - b:2$ , & per punctum  $E$  ducatur recta  $GH$ , ipsi  $AB$  parallela; terminabitur recta ista  $GH$  locus alter  $y = a:2 - b:2$ .

VII.

Veritas con-  
structionis

VIII. Neque vero difficile erit, ostendere, quod compositione horum locorum fiat satis pro-

*problematis*, contento in æquatione  $xx = ab$ .  
Jam enim recta GH secare debet circulum,  
qui describitur centro A, intervalloque AD,  
in duobus punctis M, O. Quare, demissis  
exinde super AB perpendicularibus MN, OR,  
fient AN, AR valores duo, quos habet in-  
cognita  $x$  in æquatione  $xx = ab$ ; eritque AN  
valor positivus, & AR valor negativus.

Ponatur siquidem  $AN = x$ . Et quo-  
niam inter se sunt æquales, tam duæ AM,  
AD, quam duæ MN, AE; erit  $AM = a : 2$   
 $+ b : 2$ , &  $MN = a : 2 - b : 2$ . Sed, ob trian-  
gulum ANM, rectangulum in N, quadra-  
tum ex AM est æquale duobus quadratis  
AN, NM simul sumptis. Itaque erit  $xx + aa : 4$   
 $- ab : 2 + bb : 4 = aa : 4 + ab : 2 + bb : 4$ , un-  
de infertur æquatio problematis  $xx = ab$ .

Ponatur quoque  $AR = -x$ . Et quia  
pariter sunt æquales inter se, tam duæ AO,  
AD, quam duæ OR, AE; erit  $AO = a : 2$   
 $+ b : 2$ , &  $OR = a : 2 - b : 2$ . Sed, ob trian-  
gulum ARO, rectangulum in R, quadra-  
tum ex AO æquale est summæ quadratorum  
AR, OR. Quare erit rursus  $xx + aa : 4 -$   
 $ab : 2 + bb : 4 = aa : 4 + ab : 2 + bb : 4$ , unde  
eruitur æquatio problematis  $xx = ab$ .

Quod autem hæc constructio recidat in  
eam, qua utitur Euclides, pro mediæ pro-  
portionalis inventionem, non est dubitandum.  
Si enim circuli circumferentia, quæ describi-  
tur centro A, intervalloque AD, secet re-  
ctam AC in punctis C, & F; fiet portio CE =  
b, & portio EF = a. Unde, quum ipsis AN, AR  
æquales sint duæ EM, EO; omnino liquet,

Eu-

VIII.  
 Impossibilitas problematis non dissimilis ea ipsa ejus constructione deducitur.

VIII. Sed notetur hoc loco velim, quod si æquatio problematis sit  $xx = -ab$ , tunc ejus impossibilitatem, non modo ex duabus æquationis radicibus imaginariis, sed ex ipsa etiam constructione eruere licebit. Nam, assumpto rursus loco ad rectam simplicissimo  $y = c$ , fiet locus ad circulum  $xx + yy = cc - ab$ . Unde oportebit, esse in hoc casu quadratum perfectum, non quidem quantitatem  $cc + ab$ , sed  $cc - ab$ .

Talis vero hæc quantitas esse non potest, nisi semisummæ ipsarum  $a$ , &  $b$  sit  $c$  æqualis. Nam, semper ac habetur  $c = a : 2 + b : 2$ , fiet  $cc = aa : 4 + ab : 2 + bb : 4$ ; adeoque erit  $cc - ab = aa : 4 - ab : 2 + bb : 4$ . Hinc ex duobus locis geometricis, quibus problema construi debet, erit  $y = a : 2 + b : 2$  locus ad rectam, &  $xx + yy = aa : 4 - ab : 2 + bb : 4$  locus ad circulum.

FIG.  
 112.

Sit itaque rursus  $AB$  recta, super qua sumi debent valores incognitæ  $x$ . Et quoniam æquatio circuli hic pariter nulla eget reductione, erit adhuc punctum  $A$  centrum illius. Unde, abscissa ex  $AB$  portione  $AD = a : 2 - b : 2$ , fiet  $AD$  radius ejusdem. Erigatur deinde super  $AB$  perpendicularis  $AC$ , ex qua auferatur portio  $AE = a : 2 + b : 2$ . Quumque locus ad rectam sit  $y = a : 2 + b : 2$ , construetur ille, ducendo per punctum  $E$  rectam  $GH$ , ipsi  $AB$  parallelam.

Patet autem, rectam istam  $GH$  nullo pacto secari posse cum circumferentia circuli, quæ describitur centro  $A$ , & intervallo  $AD$ ;  
 quan-

quandoquidem ejus a centro distantia major est ipsa AD. Unde, quemadmodum constructa loca nulla habent puncta communia; ita nec etiam dari poterunt valores tales incognitæ  $x$ , qui utriusque loci condiciones adimpleant: proindeque problema, quod simul continet eas condiciones, omnino contradictionem involvet.

IX. Constructo problemate, quod continet æquatio  $xx = ab$ ; jam, ope ejus, omnia alia, quæ secundi sunt generis, construere licebit; quum facile sit, æquationes omnes secundi gradus, per constructiones problematum primi generis, ad formam illam revocare. Ita, si æquatio problematis sit  $xx = ab + cd$ ; capiendo  $f = b + cd : a$ , fiet  $af = ab + cd$ ; atque adeo erit  $xx = af$ . Et, si æquatio sit  $xx = ab + cc + dd$ ; sumendo  $f = b + cc : a + dd : a$ , erit  $af = ab + cc + dd$ ; & consequenter fiet  $xx = af$ .

IX.  
Quomodo  
ad constru-  
endum proble-  
ma omnia  
alia secundi  
generis pro-  
blemata re-  
vocantur.

Fieri autem potest, ut æquatio problematis oriatur affecta, & contineat quoque secundum terminum. Sed quum facile sit, terminum illum ex æquatione delere; adhuc quidem eodem artificio problema construi poterit. Ita, si æquatio problematis sit  $xx + 2ax = ab$ ; faciendo  $x + a = z$ , erit  $xx + 2ax = zz - aa$ . Unde, per substitutionem, erit  $zz - aa = ab$ , sive etiam  $zz = ab + aa$ , quæ quidem æquatio jam construi potest.

Eadem ratione, si in resolutione alicujus problematis perventum sit ad æquationem  $2ax - xx = bb$ , ponendum erit  $x - a = z$ . Nam, quum habeatur  $2ax - xx = bb$   
 $- zz$

—  $zz$  ; erit , substitutionis ope ,  $aa - zz = bb$  , sive etiam  $zz = aa - bb$  : Sed nihil vetat , quin hujusmodi problema quandoque impossibile fiat : nimirum , quum fuerit  $b$  major , quam  $a$  . Tunc enim poni debet  $a - bb$  ;  $a = -f$  ; adeoque æquatio ultimo reducta erit  $zz = -af$  , quæ construi nequit.

Hic quoque in æquationum reductionibus instituendis Geometræ solertia debet locum suum habere . Ita , si habeatur  $zz = aa + ab$  , sumi poterit  $f = a + b$  ; & erit  $zz = af$  æquatio reducta . Pariterque , si fuerit  $zz = aa - bb$  , fiat , tum  $a + b = c$  , cum  $a - b = d$  ; ita , ut sit  $aa - bb = cd$  ; & habebitur loco ejus hæc alia  $zz = cd$  .

X.  
Quorsum  
reducatur  
constructio  
problemata-  
rum secundi  
generis , o-  
stenditur.

X. Non itaque in dubium verti potest , quin omnia problemata secundi generis nullo negotio construantur , ubi semel constructum est problema quod continet æquatio  $xx = ab$  . Et quoniam problema istud non aliud involvit , quam ut inter duas rectas datas media proportionalis inveniatur ; liquet , *cuncta secundi generis problemata , per inventionem mediæ alicujus proportionalis , construi posse.*

Interim , si in resolutione alicujus problematis occurrat æquatio , in qua quadratum incognitæ  $x$  adæquet duo alia quadrata cognita ; tunc longe facilius , per hypothensam dati alicujus trianguli rectanguli , poterit ipsius incognitæ valor designari . Ut , si habeatur  $xx = aa + bb$  , fiat triangulum rectangulum , cujus crus unum sit  $a$  , & crus alterum  $b$  ; eritque hypotenusam ejusdem trianguli rectanguli valor incognitæ  $x$  .

Nec

Nec item reticebimus, quod si æquatio, ex aliquo problemate orta, ejusmodi sit, ut in ea quadratum incognitæ  $x$  adæquet differentiam, quæ inter duo alia quadrata cognita deprehenditur; tunc designari queat valor ipsius incognitæ, per crus unum dati alicujus trianguli rectanguli. Ut, si habeatur  $xx = aa - bb$ , fiat triangulum rectangulum, cujus  $a$  sit hypotenusæ, &  $b$  crus unum; eritque crus alterum valor incognitæ  $x$ .

Et ad constituendum quidem triangulum rectangulum, cujus data sint crura; satis est, crura illa conjungere ad rectos angulos, tum eorum extrema per rectam aliam connectere. Sed, ut construatur triangulum rectangulum, in quo data sit hypotenusæ cum crure uno; oportet primo super hypotenusæ, velut diametro, semicirculum describere; tum in eo aptare crus datum, quod portionem ejus semicirculi subtendat; ac denique chordam ducere reliquæ portionis.

XI. Cæterum in constructione problematum secundi generis reducendæ sunt eorum æquationes ad formam illam simplicissimam, quo constructio ipsa uno circulo peragi possit. Ut enim ostensum est, reductiones hic fiunt, per constructiones problematum primi generis, quæ rectis tantum absolvuntur. Quare, reductione peracta, non alium circulum in constructione problematis oportebit assumere, quam qui pro mediæ proportionalis inventionem omnino requiritur.

XI.  
Cur æquationes aliorum problematum secundi generis ad formam illam simplicissimam sunt reducendæ.

Interim, si hanc nobis legem imponere nollemus, etiam absque reductione unum.

Tom. II.

T

quod.



quodque problema secundi generis construi poterit. Sit enim  $xx \rightarrow 2ax = ab$  æquatio, ex resolutione problematis orta. Capiatur locus ad rectam simplicissimus  $y = c$ . Quumque fiat  $yy = cc$ , habebitur additione locus ad circulum  $yy \dagger xx \rightarrow 2ax = ab \dagger cc$ : qui tamen non aliter potest describi, quam adhibito circulo alio; quum sit  $\sqrt{(aa \dagger ab \dagger cc)}$ , hoc est media proportionalis inter  $a$ , &  $a \dagger b \dagger cc$ :  $a$  radius ipsius.

Sit etiam  $xx \rightarrow 2ax \dagger ab = 0$  æquatio, ex resolutione alicujus problematis nata. Capiatur quoque locus ad rectam simplicissimus  $y = c$ . Quumque habeatur  $yy = cc$ , sive  $yy \rightarrow cc = 0$ ; adhuc additione fiet locus ad circulum  $yy \dagger xx \rightarrow 2ax \dagger ab \rightarrow cc = 0$ . Sed radius circuli hujus est  $\sqrt{(aa \rightarrow ab \dagger cc)}$ , hoc est media proportionalis inter  $a$ , &  $a \rightarrow b \dagger cc$ :  $a$ ; nec proinde describi potest, nisi circulus alter adhibeatur.

Juvat autem hoc loco notare, quod quemadmodum radices duæ æquationis  $xx \rightarrow 2ax \dagger ab = 0$  fiunt imaginariæ, quum  $ab$  major est, quam  $aa$ ; ita ipse etiam circulus impossibilis evadat, quotiescumque in eadem hypothese  $ab \rightarrow aa$  major est, quam  $cc$ . Sed etsi, ob quantitatem  $c$  ad libitum sumptam, eludere liceat circuli impossibilitatem; contradictionem tamen ex problemate nunquam delere licebit; enim vero, cujuscumque valoris capiatur quantitas  $c$ , semper ea major erit, quam  $\sqrt{(aa \rightarrow ab \dagger cc)}$ .

XII.  
Quomodo  
problema se-

XII. Illud etiam nolo hic silentio pretere-  
rire, quod hoc artificio licebit interdum, pro-  
ble-



*blema secundi generis dato etiam circulo construere*. Jam enim, assumpto loco ad rectam simplicissimo  $y = c$ , reperire licet, additionis ope, locum alium, qui ad circulum nos ducat. Quare non aliud superest, quam ut, comparatione instituta, inveniatur, quinam esse debeat valor assumptæ quantitatis  $c$ , quo compertus circulus possit datum illum nobis exhibere.

*cundi generis dato circulo construere possit, aperitur.*

Sit ergo  $xx - 2ax = ab$  æquatio, ex resolutione alicujus problematis orta. Et oporteat, eam construere mediante circulo, cujus radius sit  $f$ . Capiatur locus ad rectam simplicissimus  $y = c$ . Quumque fiat  $yy = cc$ ; erit additione  $yy + xx - 2ax = ab + cc$  locus ad circulum. Jam radius hujus circuli est  $\sqrt{aa + ab + cc}$ . Quare, ut idem possit nobis circulum datum exhibere, oportebit, esse  $f = \sqrt{aa + ab + cc}$ , sive etiam  $ff = aa + ab + cc$ . Unde erit  $cc = ff - aa - ab$ , &  $c = \sqrt{ff - aa - ab}$ .

Hinc, ut problema, contentum in æquatione  $xx - 2ax = ab$ , construi possit mediante circulo, cujus radius sit  $f$ , necesse est, ut locus ad rectam sit  $y = \sqrt{ff - aa - ab}$ . Nam, quum habeatur  $yy = ff - aa - ab$ ; fiet additione  $yy + xx - 2ax = ff - aa$  locus ad circulum; cujus radium esse  $f$ , liquet abunde. Sed perspicuum est, constructionem istam non semper possibilem esse. Nam, si fuerit  $f$  minor, quam  $\sqrt{aa + ab}$ ; quantitas  $\sqrt{ff - aa - ab}$  fiet imaginaria; adeoque locus ad rectam nullibi reperietur.

Eadem ratione, si æquatio problematis

T 2 sit

fit  $xx \rightarrow 2ax + ab = 0$ , & in ejus constructione adhiberi velit circulus, cujus radius sit  $a$ ; fiet  $y = \sqrt{ab}$  locus ad rectam. Nam, quum habeatur  $yy = ab$ , sive  $yy \rightarrow ab = 0$ ; erit additione  $yy + xx \rightarrow 2ax = 0$  locus ad circulum; cujus radium esse  $a$ , nemo non videt. Hic autem locus ad rectam semper realis deprehenditur. Sed non ideo constructio problematis semper possibilis erit. Nam, si fuerit  $ab$  major quam  $aa$ , sive etiam  $b$  major quam  $a$ ; nulla erunt utriusque loci puncta communia; adeoque problema contradictionem involvet.

XIII.  
*Problema-  
 tum secundi  
 generis con-  
 structiones  
 Cartesianæ  
 afferuntur.*

FIG.  
 113.

XIII. Denique, ne aliquid hic missum faciamus, quod scitu sit dignum, *subjunge-  
 mus constructiones Cartesianas problematum  
 secundi generis.* Itaque, si problematis æqua-  
 tio induat formam, vel hujus  $xx + ax \rightarrow bb = 0$ , vel etiam istius  $xx \rightarrow ax \rightarrow bb = 0$ , fiet constructio, formando prius angulum rectum ABC, in quo sit  $AB = b$ , &  $CB = a$ ; 2; tum describendo circulum ex puncto C, tamquam centro, & intervallo CB. Nam, si deinde jungatur AC, quæ circulo occurrat in punctis D, & E; erunt rectæ AD, AE valores duo incognitæ  $x$ .

Et in prima quidem æquatione  $xx + ax \rightarrow bb = 0$ , erit AD valor positivus, & AE valor negativus: enim vero, sive ponatur  $AD = x$ , sive  $AE = \rightarrow x$ , ope trianguli rectanguli ABC, semper æquatio illa nobis suborietur. Vicissim autem in secunda æquatione  $xx \rightarrow ax \rightarrow bb = 0$ , erit AE valor positivus, & AD valor negativus; quum, bene-  
 ficio

ficio ejusdem trianguli rectanguli, restituatur nobis illiusmodi æquatio, ponendo  $AE = x$ , &  $AD = -x$ .

Quod si autem æquatio problematis sit, vel hujus formæ  $xx - ax + bb = 0$ , vel etiam istius  $xx + ax + bb = 0$ ; constructur problema, si iisdem ut supra peractis, ducatur recta ADE, parallela ipsi BC. Et hic quoque fient AD, AE valores incognitæ  $x$ : qui tamen erunt positivi, quum habetur  $xx - ax + bb = 0$ ; & vicissim negativi, quum problematis æquatio est  $xx + ax + bb = 0$ .

In secundo hoc casu nihil obstat, quin recta ADE circulo non occurrat: nimirum si fuerit AB major, quam CB, hoc est  $b$  major, quam  $a: 2$ . Sed, quum id contingit, ut nulla sunt puncta occursum, sic problema impossibile erit. Fieri etiam potest, ut eadem recta ADE circulum tangat: scilicet, si fuerit  $b = a: 2$ . Et tunc, coeuntibus in unum punctis D, & E, æquales fient inter se valores duo incognitæ  $x$ .

XIV. Sed quod iudicium de hisce Cartesianis constructionibus ferendum sit, nec etiam subdicere gravabimur: Quin eluceat in eis simplicitas, ac elegantia; non est dubitandum. Ea tamen ex formulis potius æquationum tota proficiscitur: quæ profecto non amplius apparebit, ubi non formulæ, sed ipsæ problematum æquationes, quæ ut plurimum compositæ esse solent, ad illas constructiones exiguntur.

Jam enim pro iis constructionibus duabus rectis opus est, scilicet tangente AB, &

FIG.  
114.

XIV.  
Quod iudicium ferri debeat de Cartesianis constructionibus, ostenditur.

FI. 113.  
114.

294 SECTIONUM CONICARUM  
radio circuli CB. Ex his autem posterior  
CB, quum semissem adæquet coefficientis se-  
cundi termini, semper per problema primi  
generis potest definiri. Sed, quantum ad prio-  
rem AB, raro quidem evenit, ut per proble-  
ma secundi generis determinari non debeat;  
quum ejus quadratum ultimo æquationis ter-  
mino sit æquale.

Hinc Cartesianæ constructiones pro-  
blematum secundi generis ponendæ sunt in-  
ter eas, quas lubet admittere, etsi non uno  
circulo fiant. Qua autem ratione eas detexe-  
rit Auctor; id quidem minime nobis explica-  
re dignatus est. Sed probabile est, in eas in-  
cidisse, considerando expressiones valorum,  
quos in singulis iis formulis habet incognita;  
quum non aliter earum veritatem ostendat,  
quam quia rectæ illæ AD, AE eodem modo  
oriuntur expressæ.

Illud etiam nolo hic reticere, constru-  
ctionibus suis Cartesium exhibuisse tantum  
valores positivos, & non item negativos. Istud  
autem vitio ei verti non debet. Nam, etsi, be-  
neficio earundem constructionum, habeantur  
quoque valores negativis; eos tamen negligen-  
dos esse putavit; quia non adhuc ostenderat,  
posse æquationes utriusque generis valores  
admittere. Et inde pariter factum, ut constru-  
ctio quartæ formulæ omnino apud ipsum  
omissa videatur.

CAP.

## CAP. III.

*Methodus construendi problemata solida generatim ostenditur.*

1, **S**olida problemata vocabant Veteres ea, quæ construi non possunt, nisi adhibita aliqua conic sectione. Talia autem, juxta Recentiorum distinctionem, sunt problemata illa, quæ sive ad tertium, sive ad quartum genus revocantur. Debent siquidem hujusmodi problemata per loca duo secundi generis construi. Quare omnino necesse est, in eorum constructione aliquam conic sectionem assumere.

I.  
Quæ sint  
problemata  
solida, juxta  
Recentiorum  
distinctio-  
nem, ostenditur.

Neque enim esse potest ad circulum uterque locus. Nam, etsi circulus sit locus secundi generis, & per æquationem secundi gradus definiatur; ex duabus tamen æquationibus ad circulum, in quibus incognitæ eundem angulum continent, numquam licebit, æquationem determinatam eruere, quæ ad tertium, quartumve gradum ascendat: nec proinde unquam poterit constructio problematis tertii, vel quarti generis intersectione duorum circulorum obtineri.

Ponamus etenim primo, incognitas duas in utroque ad circulum loco rectum angulum continere. Et quoniam in isto casu nequit in eorum æquationibus reperiri productum ip-

farum incognitarum; necesse est, ut ex æquationes formas induant istarum  $xx + yy \dots ax \dots by \dots cc = 0$ , &  $xx + yy \dots dx \dots fy \dots gg = 0$ . Quare, exterminando unam incognitarum, nunquam poterit incognita alia ad tres, aut quatuor dimensiones ascendere.

Ponamus secundo, incognitas duas obliquum angulum continere, ita ut in æquationibus, loca ad circulum designantibus, reperiat productum ipsarum incognitarum. Et quoniam obliquus ille angulus debet esse idem in utroque loco, induent eorum æquationes in hoc casu, vel formas istarum  $yy + mxy : n + mmxx : ss \dots ax \dots by \dots cc = 0$ , &  $yy + mxy : n + mmxx : ss \dots dx \dots fy \dots gg = 0$ ; vel harum, quæ sequuntur,  $yy \rightarrow mxy : n + mmxx : ss \dots ax \dots by \dots cc = 0$ , &  $yy \rightarrow mxy : n + mmxx : ss \dots dx \dots fy \dots gg = 0$ . Unde, eliminata incognita una, nec etiam incognita alia ad tres, aut quatuor dimensiones poterit attolli.

II.  
Quod ex æquationibus problematum solidorum omnes species locorum secundæ generis erui queant.

II. Non itaque in dubium verti potest, quin, juxta Recentiorum distinctionem, ea quidem problemata sint solida, quæ tum ad tertium, cum ad quartum genus revocantur. Hujusmodi autem problemata construere licebit, tam duabus coni sectionibus, quam circulo, & una coni sectione. Sed præferendæ sunt semper ex constructiones, quas circulus ingreditur; quandoquidem circulus in plano longe facilius describitur, quam quælibet sectio coni.

Potest vero cum circulo conjungi quæcumque sectio conica; quia ex æquationibus  
pro-

problematum solidorum omnes secundi generis locorum species erui possunt. Et quoniam, comparatis locis geometricis, naturæ problematum consonis, constructiones ipsæ nullo negotio peraguntur; ostendemus potissimum hoc capite, *qua ratione ex solidi alicujus problematis æquatione singulæ species locorum secundi generis colligi queant.*

Etsi autem æquationes problematum solidorum possint, tum ad tertium, cum ad quartum gradum attolli; nihilo tamen minus, quæ hic a nobis in exemplum afferentur, ad quatuor semper dimensiones ascendent. Id vero multum abest, ut difficultatem facere debeat. Nam, quum æquatio quarti gradus deprimatur ad tertium, ubi ultimus ejus terminus zero æqualis supponitur; considerari poterit æquatio tertii gradus velut alia quarti, postremo termino carens.

Potius discrimen fieri debet inter æquationes, secundo termino præditas, & eas, in quibus idem ille terminus deest. Nam longe aliter eruenda sunt loca secundi generis, quum æquatio problematis solidi secundo termino caret, quam quum eodem illo termino est referta. Et quamquam facillimum sit, delere secundum terminum ex quacumque æquatione; construere tamen præparatione ista problemata solida, non semper subinde facile deprehenditur.

III. Primo igitur ostendemus, *quo pacto erui debeant species omnes locorum secundi generis ex æquatione problematis solidi, quæ secundo termino caret.* Hunc in finem sit  $x^4$  —

$abxx$

III.  
Quomodo eruenda sint loca illa ex æquationibus, quæ secundo termino

no caent.  
Exemplum  
primum.

$abxx + aacx - a^3d = 0$  æquatio ista . Ca-  
piatur locus ad parabolam simplicissimus  $xx = ay$ , five  $xx - ay = 0$ . Quumque fiat  $x^2 = ayy$ ; substitutione peracta, erit  $ayy - abxx + aacx - a^3d = 0$ , five etiam  $yy - bxx : a + cx - ad = 0$ , qui est locus ad hyperbolam, relate ad diametros consideratam.

Ponatur deinde in æquatione ista ad hyperbolam loco  $xx$  valor ejus  $ay$ ; & habebitur hoc pacto æquatio altera ad parabolam  $yy - by + cx - ad = 0$ . Sed duabus hisce æquationibus ad parabolam facillime poterit obtineri, tam locus ad circulum, si incognitæ duæ rectos angulos continent, quam locus ad hyperbolam æquilateram. Nam, addendo eas simul, fiet  $xx + yy - ay - by + cx - ad = 0$ , qui est locus ad circulum; subducendo vero unam ex alia, orietur  $xx - yy - ay + by - cx + ad = 0$ , qui est locus ad hyperbolam æquilateram.

Ellipsis porro, quæ deest, habebitur, si æquatio ad parabolam simplicissima  $xx - ay = 0$  per fractionem aliquam cognitam multiplicetur. Sit enim  $b : a$  fractio ista. Jamque, multiplicatione peracta, fiet  $bxx : a - by = 0$ . Sed habetur quoque  $yy - by + cx - ad = 0$ . Quare, addendo simul duas istas æquationes, orietur tertia  $yy - by - by + bxx : a + cx - ad = 0$ , quæ proculdubio per ellipsim debet explicari.

Notetur hic autem, quod si ultimus æquationis terminus nihilo æqualis supponatur, tunc æquatio fiet tertii gradus, & loco ejus habebitur hæc alia  $x^3 - abx + aac = 0$ .

Un-



Unde, si ista fuerit problematis æquatio, erunt relate ad eam  $xx \rightarrow ay = 0$  locus ad parabolam;  $yy \rightarrow bxx: a \mp cx = 0$  locus ad hyperbolam;  $yy \rightarrow by \mp cx = 0$  locus alter ad parabolam;  $xx \mp yy \rightarrow ay \rightarrow by \mp cx = 0$  locus ad circulum;  $xx \rightarrow yy \rightarrow ay \mp by - cx = 0$  locus ad hyperbolam aliam æquilateram; &  $yy \rightarrow by \rightarrow by \mp bxx: a \mp cx = 0$  locus ad ellipsum.

IV. Sed, ut ejusdem rei aliud exemplum afferamus, sit  $x^4 \mp abxx \rightarrow aacx \mp a^3d = 0$  æquatio, orta ex resolutione alicujus problematis solidi. Capiatur quoque locus ad parabolam simplicissimus  $xx = ay$ , sive  $xx \rightarrow ay = 0$ . Et quoniam habetur  $x^4 = aayy$ ; substitutione peracta, erit  $aayy \mp abxx \rightarrow aacx \mp a^3d = 0$ , sive etiam  $yy \mp bxx: a \rightarrow cx \mp ad = 0$ , qui est locus ad ellipsum.

IV.  
Exemplum  
secundum.

Ponatur postea in æquatione ista ad ellipsum loco  $xx$  valor ejus  $ay$ ; & habebitur hoc pacto æquatio altera ad parabolam  $yy \mp by \rightarrow cx \mp ad = 0$ . Unde hic quoque, si duæ istæ æquationes ad parabolam simul addantur, fiet locus ad circulum  $xx \mp yy \rightarrow ay \mp by \rightarrow cx \mp ad = 0$ ; si vero una ex alia subducatur, orientur locus ad hyperbolam æquilateram  $xx \rightarrow yy \rightarrow ay \rightarrow by \mp cx \rightarrow ad = 0$ .

Deest hic autem hyperbola non æquilatera; sed facili negotio ea comparabitur, si æquatio ad parabolam simplicissima  $xx \rightarrow ay = 0$  per datam aliquam fractionem multiplicetur. Sit enim  $b:a$  fractio ista. Jamque, multiplicatione peracta, fiet  $bxx: a \rightarrow by = 0$ . Sed habetur quoque  $yy \mp by \rightarrow cx \mp ad = 0$ .

Qua-

Quare, subductis a se mutuo duabus hisce æquationibus, orietur tertia  $yy + by + by - bxx: a - cx + ad = 0$ , quæ per hyperbolam non æquilateram debet explicari.

Etiam in hoc exemplo, si ultimus æquationis terminus nihilo æqualis supponatur, habebitur loco ejus hæc alia  $x^3 + abx - aac = 0$ . Unde, si ista fuerit problematis æquatio, erunt relate ad eam  $xx \rightarrow ay = 0$  locus ad parabolam;  $yy + bxx: a - cx = 0$  locus ad ellipsim;  $yy + by \rightarrow cx = 0$  locus alter ad parabolam;  $xx + yy \rightarrow ay + by \rightarrow cx = 0$  locus ad circulum;  $xx \rightarrow yy \rightarrow ay - by + cx = 0$  locus ad hyperbolam æquilateram; &  $yy + by + by \rightarrow bxx: a - cx = 0$  locus ad hyperbolam aliam non æquilateram.

V.  
Quomodo eruen-  
da sint  
eadem loca  
ex æquationibus,  
secundo termino  
præditis. Ex-  
emplum primi.

V. Ostendemus deinde, qua ratione eruen-  
da sint species omnes locorum secundi generis  
ex æquatione problematis solidi, in qua secun-  
das terminus reperitur. Hunc in finem sit  $x^4$   
 $+ 2fx^3 \rightarrow abxx + aacx \rightarrow a^3d = 0$  æquatio  
ista. Capiatur locus ad parabolam paulo com-  
positus  $xx + fx = ay$ , sive  $xx + fx \rightarrow ay = 0$ .  
Quumque fiat  $x^4 + 2fx^3 = aayy \rightarrow ffx$ ; substitutione peracta, erit  $aayy \rightarrow ffx \rightarrow$   
 $abxx + aacx - a^3d = 0$ , sive etiam  $yy \rightarrow$   
 $ffxx: aa \rightarrow bxx: a + cx \rightarrow ad = 0$ , qui est lo-  
cus ad hyperbolam, relate ad diametros con-  
sideratam.

Ex eo autem, quod sit  $xx + fx = ay$ ,  
erit etiam  $xx = ay \rightarrow fx$ . Unde in inventa  
æquatione ad hyperbolam poterit quoque lo-  
co  $xx$  valor ille subrogari. Plane vero mane-  
bit locus semper ad hyperbolam, si substitu-  
tio

tio in uno tantum termino fiat. Nam erit  $yy \rightarrow ffy: a \dagger f^3x: ad \rightarrow bxx: a \dagger cx \rightarrow ad = 0$ , si substituatur ille valor tantum in termino  $ffxx: aa$ ; &  $yy \rightarrow ffxx: aa \rightarrow by \dagger bfx: a \dagger cx \rightarrow ad = 0$ , si substitutio fiat dumtaxat in termino  $bxx: a$ . Sed si in utroque termino valor ille subrogetur; locus fiet ad parabolam, & erit  $yy \rightarrow ffy: a \dagger f^3x: aa \rightarrow by \dagger bfx: a \dagger cx \rightarrow ad = 0$ .

Compertis duobus locis ad parabolam, habebitur eorum additione locus ad circum  $xx \dagger fx \rightarrow ay \dagger yy \rightarrow ffy: a \dagger f^3x: aa \rightarrow by \dagger bfx: a \dagger cx \rightarrow ad = 0$ . Sed si eadem illa loca complicantur simul subtractione, orietur locus ad hyperbolam æquilateram  $xx \dagger fx \rightarrow ay \rightarrow yy \dagger ffy: a \rightarrow f^3x: aa \dagger by \rightarrow bfx: a \rightarrow cx \dagger ad = 0$ . Unde non aliud superest, quam ut locum exhibeamus ad ellipsum, quem facillime reperire licebit, si termini omnes prioris æquationis ad parabolam per datam aliquam fractionem multiplicentur, tum ea cum altera ad parabolam æquatione jungatur.

VI. Et ut aliud ejusdem rei exemplum afferamus, sit  $x^4 \rightarrow 2fx^3 \dagger abxx \rightarrow aacx \dagger a^3d = 0$  æquatio, orta ex resolutione alicujus problematis solidi. Capiatur quoque locus ad parabolam paulo compositus  $xx \rightarrow fx = ay$ , sive  $xx \rightarrow fx \rightarrow ay = 0$ . Et quoniam habetur  $x^4 \rightarrow 2fx^3 = aayy \rightarrow ffxx$ ; substitutione peracta, erit  $aayy \rightarrow ffxx \dagger abxx \rightarrow aacx \dagger a^3d = 0$ , sive etiam  $yy \rightarrow ffxx: aa \dagger bxx: a \rightarrow cx \dagger ad = 0$ ; qui est locus ad parabolam, si sit  $ff = ab$ ; locus ad hyperbolam, si sit  $ff$  major, quam  $ab$ ; ac denique locus ad ellipsum,

VI.  
Exemplum  
secundum.

psim, sit sit  $ff$  minor, quam  $ab$ .

Quum autem sit  $xx = ay + fx$ ; poterit in hac alia æquatione subrogari valor iste loco ipsius  $xx$ . Et quidem, si substitutio fiat tantum in termino  $ffxx:aa$ ; habebitur  $yy - ffy:a - f^3x:aa + bxx:a - cx + ad = 0$ , qui est locus ad ellipsim. Quod si vero fiat dumtaxat in termino  $bxx:a$ , orietur  $yy - ffxx:aa + by + bfx:a - cx + ad = 0$ , qui est locus ad hyperbolam. Et denique, si valor ille substituat in utroque termino; æquatio fiet  $yy - ffy:a - f^3x:aa + by + bfx:a - cx + ad = 0$ , quæ ad parabolam nos ducet.

Compertis duobus ad parabolam locis, habebitur eorum additione locus ad circum  $xx - ay - fx + yy - ffy:a - f^3x:aa + by + bfx:a - cx + ad = 0$ . Et, si eadem complicentur simul subtractione, orietur locus ad hyperbolam æquilateram  $xx - ay - fx - yy + ffy:a + f^3x:aa - by - bfx:a + cx - ad = 0$ . Possentque adhuc duo alia ad ellipsim, & hyperbolam loca reperiri, si multiplicatis terminis omnibus prioris æquationis ad parabolam per notam aliquam fractionem, eadem tum additionis, cum subtractionis ope cum altera ad parabolam æquatione complicetur.

VII.  
Discrimen  
inter utramque  
que loca eruendi  
rationem ostenditur.

VII. His igitur rationibus eruendæ sunt species omnes locorum secundi generis ex æquationibus problematum solidorum. Nec difficile erit intelligere, quale quidem sit discrimen inter æquationes, secundo termino præditas, & eas, in quibus idem ille terminus deest. Jam enim in utroque casu debet esse

esse ad parabolam locus, qui assumitur ab initio. Sed, quum æquatio secundo termino caret, referenda est parabola per suam æquationem ad axem ipsius; quum vero eodem illo termino est prædita, ad aliquam axis parallelam oportet referatur.

Necesse est autem, referre parabolam ad aliquam axis parallelam, quum adest in æquatione secundus terminus; ut, substitutione peracta, possit ex ipsa æquatione, tum primus, cum secundus terminus deleri. Atque hinc est, ut locus ad parabolam debeat esse  $xx + fx = ay$ , quum æquatio problematis est  $x^4 + 2fx^3 - abxx + aacx - a^3d = 0$ ; &  $xx \rightarrow fx = ay$ , quum eadem problematis æquatio est  $x^4 - 2fx^3 + abxx - aacx + a^3d = 0$ . Nam aliter, substitutionis ope, priores duo æquationis termini deleri non poterunt.

Delendi sunt porro, per locum ad parabolam, qui assumitur, priores duo æquationis termini; ut aliæ locorum secundi generis species non ita compositæ orientur. Si enim, existente  $x^4 + 2fx^3 - abxx + aacx - a^3d = 0$  problematis æquatione, capiatur locus ad parabolam  $xx - ay = 0$ ; substitutionis ope habebitur, tum  $yy + 2fxy : a \rightarrow bxx : a + cx \rightarrow ad = 0$ , cum  $yy + 2fxy : a \rightarrow by + cx - ad = 0$ , quorum uterque est locus ad hyperbolam.

Et, si multiplicatis terminis æquationis ad parabolam per fractionem aliquam indeterminatam  $m : a$ , jungatur eadem cum æquatione  $yy + 2fxy : a \rightarrow by + cx \rightarrow ad = 0$ ; orietur hæc alia æquatio  $yy + 2fxy + mxx : a \rightarrow by$

$\rightarrow by \rightarrow my \mp cx \rightarrow ad = 0$ , quæ, pro vario valore ipsius  $m$ , ad omnes coni sectiones, tum item ad circulum, si duæ incognitæ obliquum angulum continent, nos ducere poterit. Sed perspicuum est, omnes hæcæ æquationes casus valde compositos locorum secundi generis continere.

VIII.  
Quod constructio problematum solidorum fieri possit, data parabola.

VIII. Ne aliquid hic omittamus, quod ad rem faciat, *illud quoque sedulo notari debet*, quod etsi, in eruendis locis secundi generis ex æquatione problematis solidi, capi debeat ab initio locus ad parabolam; parameter tamen ejus parabolæ haud quidem datæ alicujus longitudinis esse debet, sed ad libitum potest assumi. Unde, etsi in allatis exemplis assumpta fuerit quantitas  $a$  pro parametro ejus parabolæ; attamen, si alia quælibet quantitas tale munus obiret, adhuc easdem locorum species eruere liceret.

Poterit ergo, ut parabolæ parameter assumi, indeterminata aliqua quantitas. Et tunc ipse locus, non ad unam, sed ad infinitas parabolas erit. Quumque eadem quantitas indeterminata omnes alias locorum species, quæ deinceps eruuntur, ingrediatur; perspicuum est, etiam loca ista infinitis prope modis posse explicari. Interim, ut constructio problematis, quantum fieri potest, simplex oriatur; præstat, ut parametrum assumere quantitatem illam, quæ vel in singulis æquationis terminis, vel in maxima eorum parte reperitur.

Capiendo autem indefinite parabolæ parametrum, licebit deinceps, construere  
pro-

problema per parabolam, cujus parameter sit data; quum non aliud fieri debeat, quam loco ejus inderminatæ quantitatis parametrum datam substituere. Et, quamquam eadem inderminata quantitas reperiatur quoque, tum in loco ad circulum, cum in loco ad hyperbolam æquilateram; nihilominus, si ope ejus fieri velit, ut datus sit alteruter horum locorum, non aliter, quam per problema solidum, id poterit obtineri.

Sit enim  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  æquatio problematis. Capiatur indefinite locus ad parabolam simplicissimus  $xx = my$ , sive  $xx - my = 0$ . Et, methodo tradita, fiet  $xx + yy - my - aby : m + aacx : mm - a^3d : mm = 0$  locus ad circulum. Jam radius hujus circuli est  $\sqrt{(a^4cc : 4m^4 + mm : 4 + ab : 2 + aabb : 4mm + a^3d : mm)}$ . Quare, si fuerit  $r$  radius circuli dati, oportebit esse  $r = \sqrt{(a^4cc : 4m^4 + mm : 4 + ab : 2 + aabb : 4mm + a^3d : mm)}$ . Unde infertur æquatio sexti gradus, derivativa tertii,  $m^6 - 4rrm^4 + 2abm^4 + aabmm + 4a^3dmm + a^4cc = 0$ . Et par est ratio, si data esse debeat hyperbola æquilatera.

IX. Non deest interim methodus, qua mediante, solius Geometriæ planæ præsidio, fieri possit, ut sive locus ad circulum, sive locus ad hyperbolam æquilateram sit datus. Sit enim rursus  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  æquatio problematis. Fiat primo  $x = az : m$ , adeo ut per substitutionem migret æquatio illa in hanc aliam  $a^4z^4 : m^4 - a^3bzz : mm + a^3cz : m - a^3d = 0$ ; sive etiam  $z^4 - bmmzz : a + cm^3z : a - dm^4 : a = a$ . Jamque, si deinde

IX. Quomodo eadem con- struatio per- rari queat, vel dato cir- culo, vel da- ta hyperbola æquilatera.

capiatur locus ad parabolam simplicissimus  
 $zz \rightarrow my = 0$ , fiet methodo superius tradita  
 $zz + yy \rightarrow my \rightarrow bmy : a + cz : a - dmm : a$   
 $= 0$  locus ad circulum.

Hujus autem circuli radius est  $\sqrt{(ccmm : 4aa + mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa + dmm : a)}$ .  
 Quare, si fuerit  $r$  radius circuli dati, oportebit esse  $r = \sqrt{(ccmm : 4aa + mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa + dmm : a)}$ . Unde, quum habeatur  $rr = ccmm : 4aa + mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa + dmm : a$ , sive etiam  $4arr = ccmm + aamm + 2abmm + bbmm + 4admm$ ; fiet  $mm = 4arr : (cc + aa + 2ab + bb + 4ad)$ , &  $m = 2ar : \sqrt{(cc + aa + 2ab + bb + 4ad)}$ .

Iisdem porro manentibus, locus ad hyperbolam æquilateram erit  $zz \rightarrow yy \rightarrow my + bmy : a \rightarrow cmz : a + dmm : a = 0$ . Et quoniam semiaxis hujus hyperbolæ est  $\sqrt{(mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa - ccmm : 4aa + dmm : a)}$ ; si utique vocetur  $f$  semiaxis hyperbolæ datæ, erit  $f = \sqrt{(mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa - ccmm : 4aa + dmm : a)}$ . Quare, quum habeatur  $ff = mm : 4 + bmm : 2a + bbmm : 4aa - ccmm : 4aa + dmm : a$ ; fiet  $mm = 4aff : (aa - 2ab + bb - cc + 4ad)$ , &  $m = 2af : \sqrt{(aa - 2ab + bb - cc + 4ad)}$ .

Notetur hic vero, quod si fuerit  $cc$  major, quam  $aa - 2ab + bb + 4ad$ , tunc valor ipsius  $m$  prodibit imaginarius. Sed quum id contingit, explicandus est locus per hyperbolas conjugatas. Sic enim semiaxis erit  $\sqrt{(ccmm : 4aa - mm : 4 + bmm : 2a - bbmm : 4aa - dmm : a)}$ . Unde habebitur  $m = 2af : \sqrt{(cc - aa + 2ab - bb - 4ad)}$ .

Fieri



Fieri etiam potest, ut sit  $cc = aa \rightarrow 2ab + bb + 4ad$ . Et tunc valor ejusdem  $m$  fiet infinitus. Verum in hoc casu, quum habeatur  $ad = cc: 4 \rightarrow aa: 4 + ab: 2 \rightarrow bb: 4$ , æquatio evadet  $x^4 \rightarrow abxx + aacx \rightarrow aacc: 4 + a^4: 4 \rightarrow a^3b: 2 + aabb: 4 = 0$ , quæ non erit in propria sua sede; quum dividi possit in hæc duas secundi gradus  $xx + ax \rightarrow ac: 2 + aa: 2 \rightarrow ab: 2 = 0$ , &  $xx \rightarrow ax + ac: 2 + aa: 2 \rightarrow ab: 2 = 0$ .

X. Sed non abs re erit hoc loco subjungere, quid factu sit opus, ut problema construi possit, vel per datam ellipsim, vel per hyperbolam non æquilateram datam. Sane determinatio harum curvarum ex duplici capite oritur; primo nempe ex axis longitudine; tum ex ratione, quam habet axis ad suam parametrum. Unde, ut id, quod quæritur, possit obtineri; oportebit, duas quidem indeterminatas quantitates in illiusmodi locis contineri.

X.  
Quomodo etiam absolvenda, vel per datam ellipsim, vel per datam hyperbolam non æquilateram.

Sit ergo rursus  $x^4 \rightarrow abxx + aacx \rightarrow a^3d = 0$  problematis æquatio; & posito  $x = az: m$ , transformetur iterum ea in hanc aliam  $z^4 \rightarrow bmmzz: a + cm^3z: a \rightarrow dm^4: a = 0$ . Capiatur adhuc locus ad parabolam simplicissimus  $zz \rightarrow my = 0$ . Jamque, si ponatur  $my$  loco  $zz$ , &  $mmy$  loco  $z^4$ ; habebitur locus alter ad parabolam  $mmy \rightarrow bm^3y: a + cm^3z: a \rightarrow dm^4: a = 0$ , sive etiam  $yy \rightarrow bmy: a + cmz: a \rightarrow dmm: a = 0$ .

Multiplicetur deinde prior locus ad parabolam per fractionem indeterminatam  $n: a$ , ita ut habeatur  $nz: a \rightarrow nmy: a = 0$ . Et siquidem

idem iste locus complicitur, tam additione, quam subtractione, cum altero ad parabolam loco  $yy - bmy : a + cmz : a - dmm : a = 0$ ; habebitur additione quidem locus ad ellipsim  $zz : a + yy - nmy : a - bmy : a + cmz : a - dmm : a = 0$ ; subtractione vero locus ad hyperbolam non æquilateram  $zz : a - yy - nmy : a + bmy : a - cmz : a + dmm : a = 0$ .

Quum itaque in utroque horum locorum duæ indeterminatæ quantitates contineantur; facile quidem erit, iis mediantibus, unumquemque eorundem locorum subinde determinare, ut exhibeat, vel datam ellipsim, vel datam hyperbolam non æquilateram. Nam, quemadmodum indeterminata  $m$  usui nobis esse debet, ut ellipsis, aut hyperbola datum habeat axem; sic indeterminata altera  $n$  inserviet nobis, ut idem ille axis ad suam parametrum datum habeat rationem.

XI.  
Ostenditur  
exemplo  
quomodo fieri  
possit, ut  
data sit, vel  
ellipsis, vel  
hyperbola  
non æquila-  
tera.

XI. Et, ne ullus supersit dubitandi locus, videamus primo, quomodo æquatio ad ellipsim  $zz : a + yy - nmy : a - bmy : a + cmz : a - dmm : a = 0$  illiusmodi determinationem suscipere possit. Nimirum in ea ratio axis ad parametrum est æqualis ei, quam habet  $n$  ad  $a$ ; tum item ipsa axis longitudo est  $2\sqrt{(bbmm : 4aa + bmm : 2aa + nmm : 4aa + dmm : a)}$ . Quare, si in data ellipsi sit axis ad parametrum, ut  $r$  ad  $s$ , &  $2f$  longitudo ipsius axis; erit, tum  $n : a = r : s$ , cum  $f = \sqrt{(bbmm : 4aa + bmm : 2aa + nmm : 4aa + dmm : a)}$ . Unde infertur  $n = ar : s$ , &  $m = 2afs\sqrt{r} : (bbrss + 2abrss + aar^2 + ccs^2 + 4adrss)$ .

Osten-

Ostendamus deinde, quomodo æquatio ad hyperbolam  $nzz: a - yy \rightarrow nmy:a + bmy: a \rightarrow cmz: a + dmm: a = 0$  eandem illam determinationem subire queat. Nimirum in ea ratio axis ad parametrum est æqualis ei, quam habet  $n$  ad  $a$ ; tum item est  $2\sqrt{(bbmm: 4aa - bnm: 2aa + nmm: 4aa - cmm: 4an + dmm: a)}$  ipsa axis longitudo. Quare, si in data hyperbola sit axis ad parametrum, ut  $r$  ad  $s$ , &  $2f$  longitudo ipsius axis; erit, tum  $n: a = r: s$ , cum  $f = \sqrt{(bbmm: 4aa - bnm: 2aa + nmm: 4aa - cmm: 4an + dmm: a)}$ . Unde eruitur  $n = ar: s$ , &  $m = 2afs\sqrt{r}: \sqrt{(bbrss - 2abrss + aar^3 - ccs^3 + 4adrss)}$ .

Fieri autem hic potest, ut sit  $ccs^3$  major, quam  $bbrss - 2abrss + aar^3 + 4adrss$ . Et tunc, ne valor ipsius  $m$  prodeat imaginarius, explicandus est locus per hyperbolas conjugatas; quia sic erit  $m = 2afs\sqrt{r}: \sqrt{(ccs^3 - bbrss + 2abrss - aar^3 - 4adrss)}$ . Sed nihil vetat, quin habeatur quoque  $ccs^3 = bbrss - 2abrss + aar^3 + 4adrss$ . Et in isto casu, sicuti valor ipsius  $m$  evadit infinitus, sic nec etiam in propria sede erit æquatio, de qua agitur,  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$ . Nam, quum fiat  $ad = ccs: 4r - bb: 4 + abr: 2s - aarr: 4ss$ ; habebitur loco ejus hæc alia  $x^4 - abxx + aacx - aaccs: 4r + aabb: 4 - a^3br: 2s - a^4rr: 4ss = 0$ , quæ quidem dividitur in duas hæc secundi gradus  $xx + ax\sqrt{(r: s)} - ac\sqrt{(s: 4r)} + aar: 2s - ab: 2 = 0$ , &  $xx - ax\sqrt{(r: s)} + ac\sqrt{(s: 4r)} + aar: 2s - ab: 2 = 0$ .

XII. Ex duobus itaque locis geometricis, quibus constructio problematis solidi fieri de-

XII.  
Quod ellip-  
psis, aut by-

*parabola non  
æquilatera  
assumi possit  
similis tan-  
tum alteri  
data.*

bet, nihil obstat, quin unus quandoque sit datus. Sed, si eadem constructio duobus datis locis peragi vellet; id sane tantum non impossibile foret. Plane vero, *si ellipsis, aut hyperbola non æquilatera deberet esse similis dumtaxat alteri datæ; tunc data etiam esse posset, vel parabola, vel circumferentia circuli, vel hyperbola æquilatera;* quandoquidem, ad adstruendam similitudinem illam, nonnisi unica quantitas indeterminata requiritur.

Dicuntur quippe duæ ellipses, aut duæ hyperbolæ non æquilateræ similes inter se, quotiescumque eadem in utraque est ratio axis ad parametrum. Unde, non aliud exigit quæsitæ illa similitudo, quam ut axis ad parametrum datam habeat rationem. Profecto autem, ope datæ hujus rationis, tam in loco ad ellipsim, quam in loco ad hyperbolam non æquilateram, dumtaxat determinatur valor ipsius  $n$ . Quare, quum maneat indeterminata alia  $m$ ; licebit, ope hujus, efficere, ut data sit, vel parabola, vel circumferentia circuli, vel hyperbola æquilatera.

Obiter autem notetur hoc loco velim, de similitudine sectionum conicarum fuse egisse Apollonium in libro sexto suorum conicorum; & præter definitionem ejus similitudinis, quam ipse Apollonius ibidem assumpsit, plures alias, a subsequentibus Geometris excogitatas, passim circumferri. Hujusmodi argumentum, velut parum utile, in nostris hisce Elementis omisimus omnino. Sed, si de eo agendum esset, posthabitis aliorum de-

definitionibus, vocarem libenter *similes con-  
sectiones, quæ ex uno, eodemque cono per plana  
parallela erui possunt.*

Ex hac vero definitione ultro liquet,  
parabolas omnes debere esse similes inter se;  
quum omnes, quot quot fuerint, possint per  
plana parallela ex eodem cono deduci. Patet-  
que etiam, tam ellipses, quam hyperbolas  
tunc demum eandem similitudinem sortiri,  
quotiescumque eadem in iis est ratio axis ad  
parametrum. Nam, ob eandem istam ratio-  
nem, licebit quidem, eas eruere ex uno, eo-  
demque cono per plana æquidistantia.

XIII. Meretur interim, *ut speciatim hoc  
loco ostendatur*, quod si duarum ellipsium, aut  
hyperbolarum axes eandem habeant ratio-  
nem ad suas parametros; omnino necesse sit,  
ut etiam diametri, quæ æqualiter ad suas or-  
dinatas inclinantur, eandem seruent rationem  
cum parametris suis. Hunc in finem sint AM,  
*am* duæ istæ ellipses, aut hyperbolæ, quæ ita  
quidem disponantur, ut habeant, tum com-  
mune centrum C, cum axes AB, *ab* sibi mu-  
tuo coincidentes.

XIII.  
Ellipsium, &  
hyperbola-  
rum simi-  
lium specia-  
lis quadam  
proprietas  
demonstra-  
tur.

FI. 115.  
116.

Ducatur ex centro C recta quævis CE,  
secans utramque earum curvarum in punctis  
E, & e. Tum ex punctis istis demittantur  
ad axes ordinatæ EG, *eg*. Et quoniam in utra-  
que curva eadem est ratio axis ad parame-  
trum; erit, ut rectangulum AGB ad EG qua-  
dratum, ita rectangulum *agb* ad *eg* quadra-  
tum. Sed EG quadratum est ad CG quadra-  
tum, ut *eg* quadratum ad Cg quadratum. Ita-  
que erit ordinando, ut rectangulum AGB ad

$$V \quad 4 \quad CG$$

312 SECTIONUM CONICARUM  
CG quadratum, ita rectangulum  $agb$  ad  $Cg$   
quadratum.

Hinc erit pariter, ut CA quadratum ad  
CG quadratum, ita  $Ca$  quadratum ad  $Cg$   
quadratum; sive etiam, ut CA ad CG, ita  
 $Ca$  ad  $Cg$ . Et permutando erit quoque, ut  
CA ad  $Ca$ , ita CG ad  $Cg$ . Sed CG est ad  $Cg$ ,  
ut CE ad  $Ce$ . Quare erit ex æquali, ut CA ad  
 $Ca$ , ita CE ad  $Ce$ : & propterea duabus iis el-  
lipsibus, aut hyperbolis illud etiam accidet,  
ut omnis recta, quæ ad eas ducitur ex centro  
C, secetur ab ipsis in data ratione.

Extendatur jam recta CE ad partem al-  
teram versus F, ita ut EF,  $ef$  sint duæ earun-  
dem curvarum diametri; sitque porro AM  
ordinata una diametri EF. Et quoniam, jun-  
cta CM, fit, ut GM ad  $Gm$ , ita CA ad  $Ca$ ,  
erit  $am$  ipsi AM parallela. Sed, ob AM bise-  
ctam in O, etiam  $am$  biseccatur in  $o$ . Quare  
erit  $am$  similiter ordinata una ipsius  $ef$ : proin-  
deque duæ diametri EF,  $ef$  æqualiter ad suas  
ordinatas inclinabuntur.

Denique, quum in eadem ratione ipsa-  
rum CA,  $Ca$  sit, tam CE ad  $Ce$ , quam CO  
ad  $Co$ ; proportionalia erunt quadrata, quæ  
fiunt ex ipsis CE, CO,  $Ce$ ,  $Co$ . Unde erit  
quoque, ut rectangulum EOF ad CO quadra-  
tum, ita rectangulum  $eof$  ad  $Co$  quadratum.  
Sed CO quadratum est ad AO quadratum, ut  
 $Co$  quadratum ad  $ao$  quadratum. Quare erit  
ordinando, ut rectangulum EOF ad AO  
quadratum, ita rectangulum  $eof$  ad  $ao$  qua-  
dratum: & propterea diametri EF,  $ef$  ad pa-  
rametros suas eandem rationem habebunt.

CAP.

## CAP. IV.

*Elegantiores problematum solidorum constructiones exhibentur.*

I. **V**idimus præcedenti capite, ex æquationibus problematum solidorum omnes secundi generis locorum species eruere licere. Inde autem abunde liquet, constructiones eorundem problematum, tam duabus conï sectionibus, quam circulo, & una conï sectione peragi posse. Sed, ut ibidem innuimus, præferendæ sunt eæ constructiones, quas circulus ingreditur; quum circulus in plano longe facilius describatur, quam quælibet sectio conï.

Quamquam vero cum circulo conjungi possit quæcumque sectio conica; non omnis tamen sectio conï, unita circulo, elegantio-rem nobis suppetit problematis constructionem. Unde, quia in construendis problematibus, non modo vitandæ sunt eæ constructiones, quæ naturæ problematum consonæ non sunt, sed in id etiam sedulo incumbendum, ut faciliores, simplicioresque eligantur; illud jam oportet inquiramus, *quæ conï sectio cum circulo sit conjungenda, ut problematis constructio, quoad fieri potest, elegans oriatur.*

Hunc in finem meminisse oportet, facilitatem, simplicitatemque constructionis geometricæ.

I.  
Quod cum  
circulo con-  
jungi debeat  
vel parabo-  
la, vel elli-  
psis, ut pro-  
blematis  
constructio  
simplex, ac  
facilis oria-  
tur.

314 SECTIONUM CONICARUM  
 metricæ generaliter ex duplici capite æstimari  
 debere; primo nempe ex faciliore ratione,  
 qua lineæ, loca terminantes, describuntur; &  
 secundo ex simpliciore apparatu, quo opus  
 est, pro determinatione earundem linearum.  
 Hinc enim fit, ut sectio conica, cum circulo  
 jungenda, esse debeat ellipsis, si descri-  
 ptionis facilitas consideretur; parabola vero,  
 si simplicior eam determinandi ratio inspi-  
 ciatur.

Primo siquidem dubitari non potest,  
 quin ex conicis sectionibus ellipsis sit illa,  
 quam paulo facilius in plano describere licet.  
 Nam, ubi ad ejus descriptionem foci adhiben-  
 tur, describitur eadem fere facilitate, qua  
 circulus ipse delineatur. Et deinde nec etiam  
 in dubium verti potest, quin ex curvis omni-  
 bus, quæ ex æquatione problematis solidi  
 eruuntur, parabola sit ea, quæ simpliciore  
 apparatu determinatur. Nam liquet, ejus æ-  
 quationem non esse adeo compositam, quem-  
 admodum æquationes aliarum curvarum.

Hæc quum ita sint, duo nobis hoc ca-  
 pite præstanda sunt. Primo enim oportet  
 ostendamus, qua ratione problemata solida  
 parabola, & circulo construantur. Deinde  
 explicandum nobis erit, quo pacto eorundem  
 problematum constructiones ellipsi, & circu-  
 lo peragi debeant. Et quamquam, ad hæc o-  
 stendenda, exemplis primum utemur spe-  
 cialibus; deinceps tamen non gravabimur, ad  
 regulas generales rem omnem revocare.

II.  
*Quomodo  
 problemata*

II. Ut igitur ostendamus primo loco, *qua  
 ratione problemata solida parabola, & circulo*  
 lo



lo *construantur*, sit primum  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  problematis æquatio, quæ secundo termino caret. Sumpto itaque loco ad parabolam simplicissimo  $xx - ay = 0$ ; fiet methodo superius tradita  $xx + yy - ay - by + cx - ad = 0$  locus ad circulum. Unde duobus hisce locis constructio problematis est peragenda, quo parabola, & circulo construi possit.

*solida parabola, & circulo construantur, quoniam æquationes secundo termino carent. Exemplum.*

Sit ergo positione data recta quævis AB. Et quoniam æquatio ad parabolam est  $xx - ay = 0$ ; designandi sunt per portiones ejus valores incognitæ  $y$ . Unde, erecta super ea perpendiculari AC; fient huic æquidistantes valores alterius incognitæ  $x$ : proindeque, abscissa ex AC portione AD =  $a$ ; oportebit, eam describere, axe quidem AB, parametro vero AD.

FIG. 117.

Ad circulum vero quod attinet, quia ipsius æquatio est  $xx + yy - ay - by + cx - ad = 0$ , invenietur centrum ejus; abscindendo ex AB, tum AE =  $a : 2$ , cum EF =  $b : 2$ ; & capiendo super AC ad partem oppositam AG =  $c : 2$ . Nam, completo deinde parallelogrammo rectangulo FG, fiet H centrum quæsitum.

Radius porro ejusdem circuli est  $\sqrt{(aa : 4 + ab : 2 + bb : 4 + cc : 4 + ad)}$ . Unde, quum propter triangulum rectangulum AFH sit AH =  $\sqrt{(aa : 4 + ab : 2 + bb : 4 + cc : 4)}$ ; si erigatur super AH perpendicularis AI =  $\sqrt{ad}$ , fiet HI =  $\sqrt{(aa : 4 + ab : 2 + bb : 4 + cc : 4 + ad)}$ ; adeoque circulus describendus erit centro H, & intervallo HI.

De-

Describatur itaque hujusmodi circulus. Et siquidem ex punctis, in quibus idem parabolæ occurrit, perpendiculares demittantur super AB; dabunt eæ valores, quos habet incognita  $x$  in æquatione  $x^4 \rightarrow abxx + aacx - a^3d = 0$ . Nec dubium esse potest, quin occurfus fieri debeat in totidem punctis, quot sunt valores illi. Nam, si quæratæ æquatio, definiens eum occursum; non alia nobis sese offeret, quam illa ipsa, de qua agitur,  $x^4 \rightarrow abxx + aacx - a^3d = 0$ .

Quum ergo hujus æquationis tres radices sint positivæ, & una negativa; fiet occurfus in quatuor punctis, quorum tria erunt in portione AX, & unum in portione AZ. Quumque duæ ex radicibus positivis possint quandoque, vel æquales fieri, vel etiam imaginariæ; hinc etiam est, ut ex tribus punctis, in quibus circulus secat portionem AX, duo interdum, vel in unum coire queant, vel nulli etiam reperiri.

III.  
Constructio  
precedentis  
exempli ad  
omnes casus  
extenditur.

III. Neque vero difficile erit, *specialem istam constructionem ad omnes casus extendere, suamque ei universalitatem conciliare*. Quæcumque enim sit æquatio quarti gradus, secundo termino carens; per constructiones problematum primi generis, fieri semper potest, ut sit  $ab$  coefficientis tertii termini,  $aac$  coefficientis quarti, &  $a^3d$  ultimus terminus. Quare, nulla habita signorum ratione, poterunt æquationes omnes quarti gradus, quæ secundo termino carent, exhiberi per istam  $x^4 \dots abxx \dots aacx \dots a^3d = 0$ .

Hinc, si quæ mutatio facienda sit in constru-

structionibus aliarum æquationum, ea ex diversitate signorum, quibus affici possunt ipsarum termini, tota proficiscitur. Quare, sicuti in allato exemplo, ubi erat  $\rightarrow abxx$ , portio  $EF = b:2$  sumpta est in directum cum  $AE$ ; sic capienda erit ad partem oppositam, quum habetur  $\dagger abxx$ . Atque ita quoque, quemadmodum in eodem exemplo, ubi erat  $\dagger aacx$ , portio  $AG = c:2$  sumpta est ad partem alteram rectæ  $AC$ ; sic oportebit, eam sumere super ipsa  $AC$ , quum habetur  $\rightarrow aacx$ .

FIG.  
117.

Non perinde autem se res habet, si ultimus æquationis terminus  $a^3d$  signo  $\dagger$  afficiatur. Tunc enim haud quidem ducenda erit  $AI = \sqrt{ad}$  ad plagam oppositam; sed oportebit, talem ei positionem tribuere, ut angulus  $HIA$  rectus oriatur. Nec obscura est hujus rei ratio. Nam, sicuti quadratum radii circuli describendi est æquale summæ quadratorum, quæ fiunt ex ipsis  $AH$ ,  $AI$ , quum ultimus æquationis terminus afficitur signo  $\rightarrow$ ; sic ejusdem radii quadratum æquale fiet differentie eorum quadratorum, quum idem ultimus terminus signo  $\dagger$  affectus reperitur.

Fieri autem potest, ut in æquatione non omnes ii termini reperiantur. Et tunc nullæ evadunt rectæ illæ, quæ per coefficientes deficientium terminorum definiuntur. Sic, deficiente tertio termino  $abxx$ , nulla fiet ipsa  $EF$ ; adeoque punctum  $F$  accedet ad  $E$ . Pariterque, deficiente quarto termino  $aacx$ , ad nihilum reducetur ipsa  $AG$ , sive  $FH$ : unde punctum  $H$  coincidet cum puncto  $F$ . Et quoniam, quum deest ultimus terminus  $a^3d$ ,  
æqua-

æquatio deprimitur ad tertium gradum; li-  
quet, circulum describendum esse centro H,  
& intervallo HA, quotiescumque æquatio  
problematis est  $x^3 \dots abx \dots aac = 0$ .

IV.  
Quomodo  
eadem pro-  
blemata sint  
construenda  
parabola, &  
circulo, quoniam  
eorum aqua-  
tiones secun-  
dum termi-  
num habent.  
Exemplum.

IV. Sit deinde  $x^4 + 2fx^3 - abxx + aacx - a^3d = 0$  problematis æquatio, in qua se-  
cundus terminus reperitur. Capiatur locus ad  
parabolam paulo compositus  $xx + fx - ay = 0$ . Et, methodo superius tradita, fiet  $xx + fx - ay + yy - ffy : a + f^3x : aa - by + bfx : a + cx - ad = 0$  locus ad circulum. Un-  
de duobus hisce locis constructio problema-  
tis fieri debet, quo parabola, & circulo con-  
strui possit.

FIG.  
118.

Designentur itaque per portiones rectæ  
AB valores incognitæ  $y$ . Tum, erecta super  
ea perpendiculari AC, sint huic æquidistan-  
tes valores alterius incognitæ  $x$ . Et quoniam  
æquatio ad parabolam est  $xx + fx - ay = 0$ ;  
perspicuum est, quod si ad partem alteram ip-  
sius AC capiatur  $AD = f:2$ , & ducta per  
punctum D recta EF, ipsi AB parallela, fiat  
 $DE = ff:4a$ , debeat esse EF axis parabolæ,  
&  $EG = a$  parameter ejus.

Quantum vero ad circulum, quia ipsius  
æquatio est  $xx + fx - ay + yy - ffy : a + f^3x : aa - by + bfx : a + cx - ad = 0$ , invenietur  
centrum ejus, abscindendo successive ex AB  
primo  $AH = ff:2a$ , tum  $HI = a:2$ , ac de-  
nique  $IK = b:2$ ; nec non capiendo ad par-  
tem alteram ipsius AC itidem successive, non  
modo  $AD = f:2$ , verum etiam  $DL = f^3:2aa$ ,  
 $LO = bf:2a$ , &  $OR = c:2$ . Nam, com-  
pleto deinde rectangulo KR, fiet S centrum  
quæsitum. Ra.

Radius porro ejusdem circuli est  $\sqrt{(f^4: 4aa \dagger ff: 2 \dagger aa: 4 \dagger bff: 2a \dagger ab: 2 \dagger bb: 4 \dagger ff: 4 \dagger f^4: 2aa \dagger f^6: 4a^4 \dagger bff: 2a \dagger bf^4: 2a^3 \dagger bbff: 4aa \dagger cf: 2 \dagger cf^3: 2aa \dagger cbf: 2a \dagger cc: 4 \dagger ad)}$ . Unde, quum propter triangulum rectangulum AKS sit  $AS = \sqrt{(f^4: 4aa \dagger ff: 2 \dagger aa: 4 \dagger bff: 2a \dagger ab: 2 \dagger bb: 4 \dagger ff: 4 \dagger f^4: 2aa \dagger f^6: 4a^4 \dagger bff: 2a \dagger bf^4: 2a^3 \dagger bbff: 4aa \dagger cf: 2 \dagger cf^3: 2aa \dagger cbf: 2a \dagger cc: 4)}$ ; si erigatur super AS perpendicularis AV =  $\sqrt{ad}$ , fiet SV radius quæsitus; adeoque circulus describendus erit centro S, & intervallo SV.

Describatur ergo hujusmodi circulus. Et siquidem ex punctis, in quibus idem parabolæ occurrit, perpendiculares demittantur super AB, dabunt eæ valores, quos habet incognita  $x$  in æquatione  $x^4 \dagger 2fx^3 \dashv abxx \dagger aacx \dashv a^3d = 0$ . Nec dubium esse potest, quin occurfus fieri debeat in totidem punctis, quot sunt valores illi. Nam, si quæretur æquatio, definiens eum occursum; non alia nobis sese offeret, quam illa ipsa, de qua agitur  $x^4 \dagger 2fx^3 \dashv abxx \dagger aacx \dashv a^3d = 0$ .

V. Sed facile quoque erit, *specialem istam constructionem ad suam universalitatem revocare, eandemque ad omnes alios casus extendere*. Quæcumque enim sit æquatio quarti gradus, secundo termino prædita; per constructiones problematum primi generis, fieri semper potest, ut sit  $2f$  coefficientis secundi termini,  $ab$  coefficientis tertii,  $aac$  coefficientis quarti, &  $a^3d$  ultimus terminus. Quare, nulla habita signorum ratione, poterunt æquationes omnes quarti gradus, quæ secundum terminum

V.  
Constructio  
precedentis  
exempli ad  
suam uni-  
versalitatem  
revocatur.

320 SECTIONUM CONICARUM  
 num continent, exhiberi per istam  $x^4 \dots 2fx^3$   
 $\dots abxx \dots aacx \dots a^3d = 0$ .

FIG.  
 118.

Hinc, si quæ mutatio facienda sit in constructionibus aliarum æquationum, ea ex diversitate signorum, quibus affici possunt ipsarum termini, tota proficiscitur. Qualis autem esse debeat hæc mutatio, haud difficile erit intelligere. Nimirum primo portiones duæ  $AD = f: 2$ , &  $DL = f^3: 2aa$  sumendæ sunt super ipsa AC, quum habetur  $\rightarrow 2fx^3$ . Secundo portio  $IK = b: 2$  capienda est ad plagam oppositam, quum fuerit  $\dagger abxx$ . Tercio portionem  $LO = bf: 2a$  oportet sumere ex L versus A, quum termini duo  $2fx^3$ ,  $abxx$  iisdem signis sunt affecti. Quarto portio  $OR = c: 2$  sumenda est ad partem contrariam, quum habetur  $\rightarrow aacx$ . Ac denique ipsa  $AV = \sqrt{ad}$  subinde aptanda est super AS, ut rectus sit angulus SVA, quum fuerit  $\dagger a^3d$ .

Hic quoque, si desit in æquatione terminus aliquis, nulla evadit recta illa, quæ per coefficientem ejus termini definitur. Et inde duo consequuntur, notatu digna. Primum est, quod hujusmodi constructio recidat in eam, quæ paulo ante allata est, quotiescumque deest in æquatione secundus terminus  $2fx^3$ ; quandoquidem, per defectum hujus termini, non modo evanescit AD, sed nullæ quoque fiunt, tam duæ DL, LO, quam duæ DE, AH. Alterum est, quod si æquatio problematis sit  $x^3 \dots 2fxx \dots abx \dots aac = 0$ , circulus describi debeat centro S, & intervallo SA. Nam æquatio, de qua agitur,  $x^4 \dots 2fx^3 \dots abxx \dots aacx \dots a^3d = 0$  non aliter abit

abit in eam, quam deficiente ultimo termino  $a^3d$ : quo casu ipsa  $AV = \sqrt{ad}$  nulla fiat oportet.

VI. Ostenso, qua ratione problemata solida parabola, & circulo construantur, videamus nunc, quo pacto eorundem problematum constructio ellipsi, & circulo peragi debeat. Hunc in finem referat rursus  $ax^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  problematis æquationem, quæ secundo termino caret. Jamque, si capiatur locus ad parabolam simplicissimus  $xx - ay = 0$ ; habebitur substitutione locus alter ad parabolam  $yy - by + cx - ad = 0$ . Et, quemadmodum istorum additione oritur locus ad circulum  $xx - ay + yy - by + cx - ad = 0$ ; ita si prior ad parabolam æquatio multiplicetur per fractionem  $b:a$ , fiet etiam additione  $bxx:a - by + yy - by + cx - ad = 0$  locus ad ellipsim.

VI.  
Quomodo  
problemata  
solida ellipsi,  
& circulo  
construan-  
tur, quum  
eorum æqua-  
tiones secun-  
do termino  
carent. Ex-  
emplum.

Sit nunc AB recta illa, per cujus portiones designantur valores incognitæ  $y$ . Et, erecta super ea perpendiculari AC, sint huic æquidistantes valores alterius incognitæ  $x$ . Quia ergo locus ad circulum est  $xx - ay + yy - by + cx - ad = 0$ ; oportebit, ut supra, primo quidem abscindere ex AB, tam  $AE = a:2$ , quam  $EF = b:2$ ; deinde vero ad partem alteram ipsius AC sumere  $AG = c:2$ . Nam, completo postea rectangulo FG, & erecta super AH perpendiculari  $AI = \sqrt{ad}$ ; fiet H centrum ejus, & HI radius ejusdem.

FIG.  
119.

Quantum vero ad ellipsim, quum ejus æquatio sit  $bxx:a - by + yy - by + cx - ad = 0$ ; necesse est pariter, primo quidem ex

Tom. II.

X

AB

AB abscindere, tum  $AK = b:2$ , cum  $KL = b:2$ ; deinde vero ad plagam oppositam ipsius AC sumere AO, quæ sit ad AG, ut est a ad b. Nam, completo postea rectangulo LO, sumptisque super RO hinc inde a puncto R portionibus RP, RQ talis longitudinis, ut cujusque quadratum sit æquale quadratis AL, AI una cum quadrato alio, quod sit ad AO quadratum, ut est b ad a; fiet R centrum ejus, PQ axis ejusdem, & ratio axis ad parametrum æqualis ei, quam habet b ad a.

Describatur itaque, tum ille circulus, cum ista ellipsis. Et siquidem ex punctis, in quibus sibi mutuo occurrunt, perpendiculares demittantur super AB; dabunt eæ valores, quos habet incognita x in æquatione  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$ . Nec in dubium verti potest, quin occurfus fieri debeat in totidem punctis, quot sunt valores illi. Nam, si invenienda proponatur æquatio, per quam occurfus ille definitur, non alia nobis sese offeret, quam ipsa illa, de qua agitur,  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$ .

VII.  
*Quod ellipsis, in præcedenti constructione assumpta, possit esse infinitarum specierum, & consequenter in parabolam verti.*

VII. Non hic subjungam, quo pacto specialis ista constructio ad suam universalitatem sit revocanda; quum facile id intelligi possit ex iis, quæ paulo ante dicta sunt de constructionibus, quæ parabola, & circulo fiunt. Potius loco ejus notari hic poterit, *ellipsim, in constructione problematis assumptam, pro multiplici valore ipsius b, posse esse infinitarum specierum*. Et quamquam hac ratione in circulum pariter possit abire; non hinc tamen duobus circulis problema construere licet

cet



cet ; quum non aliter verti queat in circulo, quam ubi fuerit  $b = a$ : quo casu rursus prior circulus oritur.

Quum autem parabola, velut species quædam ellipsis, considerari possit; omnino necesse est, ut in allata constructione contineatur ea, quæ parabola, & circulo perficitur. Et sane fiet locus huic constructioni, ubi quantitas  $b$  infinita supponitur. Tunc enim, quemadmodum, ob infinitam longitudinem ipsius  $AK$ , in infinitum abit centrum ellipsis; sic axis ejus  $PQ$  coincidat cum  $AB$ , ob rectam  $AO$ , quæ evanescit, & ad nihilum reducitur. Quumq; in eadem hypothese æquales fiant duæ  $RO, RP$ , coincidat etiam punctum  $P$  cum puncto  $A$ ; adeoque, non modo ellipsis vertetur in parabolam, sed erit quoque  $A$  vertex parabolæ principalis,  $AB$  axis ejus, & recta  $AD = a$  parameter axis.

FI. 119.  
117.

Illud etiam reticendum hoc loco non est, quod si æquatio problematis sit  $x^3 - abx + aac = 0$ ; tunc satis erit in ea, de qua agitur,  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  delere ultimum terminum  $a^3d$ . Et quoniam, deleto isto termino, nulla evadit recta  $AI = \sqrt{ad}$ ; duo hinc consequuntur, notatu digna. Primum est, quod circulus describi debeat centro  $H$ , & intervallo  $HA$ . Alterum, quod portiones  $RP, RQ$ , quæ super  $RO$  sumuntur hinc inde a puncto  $R$ , debeant esse talis longitudinis, ut cujusque quadratum sit æquale quadrato ex  $AL$  una cum quadrato alio, quod sit ad  $AO$  quadratum, ut est  $b$  ad  $a$ .

VIII. Sit ulterius  $x^4 + 2fx^3 - abxx + aacx$  VIII. Quomodo  
X 2  $aacx$

*eadem pro-  
blemata el-  
lipsi, & cir-  
culo sint con-  
struenda,  
quum eorum  
æquationes  
secundum  
terminum  
habent.*

$axcx \rightarrow a^3d = 0$  æquatio problematis, ellipsi  
& circulo construendi. In ea, ut vides, adest  
secundus terminus. Quare capiendus est lo-  
cus ad parabolam paulo compositus  $xx + fx$   
 $\rightarrow ay = 0$ ; eritque substitutione  $yy \rightarrow ffy: a$   
 $+ f^3x: aa \rightarrow by + bfx: a + cx \rightarrow ad = 0$  locus  
alter ad parabolam. Unde, quemadmodum  
eorum additione fit locus ad circulum  $xx + fx$   
 $\rightarrow ay + yy \rightarrow ffy: a + f^3x: aa \rightarrow by + bfx: a$   
 $+ cx \rightarrow ad = 0$ ; ita, si prior ad parabolam æ-  
quatio multiplicetur per fractionem  $b: a$ , ha-  
bebitur etiam additione locus ad ellipsim  
 $bxx: a + fbx: a \rightarrow by + yy \rightarrow ffy: a + f^3x: aa$   
 $\rightarrow by + bfx: a + cx \rightarrow ad = 0$ .

FIG.  
120.

Sit jam AB recta, per cujus portiones  
designantur valores incognitæ  $y$ . Et, erecta  
super ea perpendiculari AC, sint huic æqui-  
distantes valores alterius incognitæ  $x$ . Quia  
ergo locus ad circulum est  $xx + fx \rightarrow ay + yy$   
 $\rightarrow ffy: a + f^3x: aa \rightarrow by + bfx: a + cx \rightarrow ad$   
 $= 0$ ; oportebit, ut supra, primo quidem  
ex AB abscindere successive AH =  $ff: 2a$ , HI  
=  $a: 2$ , & IK =  $b: 2$ ; deinde vero ad par-  
tem alteram ipsius AC sumere itidem subse-  
cutive AD =  $f: 2$ , DL =  $f^3: 2aa$ , LO =  
 $bf: 2a$ , & OR =  $c: 2$ . Nam, completo postea  
rectangulo LR, & erecta super AS perpendi-  
culari AV =  $\sqrt{ad}$ ; fiet S centrum ejus, & SV  
radius ejusdem.

Quantum vero ad ellipsim, quum ejus  
æquatio sit  $bxx: a + fbx: a \rightarrow by + yy \rightarrow ffy: a$   
 $+ f^3x: aa \rightarrow by + bfx: a + cx \rightarrow ad = 0$ ; ne-  
cesse est pariter, primo quidem ex AB abscin-  
dere, HT =  $b: 2$ , & TX =  $b: 2$ ; deinde ve-

ro ex DR, producta si opus, auferre portio-  
nem DZ, quæ sit ad DR, ut est  $a$  ad  $b$ . Nam,  
completo postea reetangulo XZ, sumptisque  
super YZ hinc inde a puncto Y portionibus  
YP, YQ talis longitudinis, ut cujusque qua-  
dratum sit æquale quadratis AX, AV una  
cum quadrato alio, quod sit ad AZ quadra-  
tum, ut est  $b$  ad  $a$ ; fiet Y centrum ejus, PQ  
axis ejusdem, & ratio axis ad parametrum  
æqualis ei, quam habet  $b$  ad  $a$ .

Describatur itaque, tum ille circulus,  
cum ista ellipsis. Et siquidem ex punctis, in  
quibus sibi mutuo occurrunt, perpendiculara-  
res demittantur super AB; dabunt eæ valo-  
res, quos habet incognita  $x$  in æquatione  $x^4$   
 $\mp 2fx^3 \mp abxx \mp aacx \mp a^3d = 0$ . Nec ul-  
li dubium esse potest, quin occurfus fieri de-  
beat in totidem punctis, quot sunt valores  
illi. Nam, si quæratæ æquatio, per quam  
occurfus ille definitur, & assumatur velut  
incognita perpendicularis, quæ exinde de-  
mittitur super AB, non alia nobis sese offe-  
ret, quam ipsa illa, de qua agitur,  $x^4 \mp 2fx^3$   
 $\mp abxx \mp aacx \mp a^3d = 0$ .

IX. Nec etiam hic subjungemus, qua  
ratione specialis ista constructio ad omnes ca-  
sus sit extendenda; quum similiter intellige-  
re id liceat ex iis, quæ superius dicta sunt de  
constructionibus, quæ parabola, & circulo  
fiunt. Meretur autem, ut hic quoque note-  
tur, *ellipsim, in constructione problematis as-*  
*sumptam, pro multiplici valore ipsius b, posse*  
*esse infinitarum specierum.* Et quamquam hac  
ratione possit pariter in circulum abire; non

IX.  
*Quod in hac  
etiam con-  
structione el-  
lipsis assu-  
pta possit ef-  
se infinita-  
rum specie-  
rum, atque  
adeo in pa-  
rabolam ver-  
si.*

hinc tamen duobus circulis problema construere licet; quum non aliter verti queat in circulum, quam ubi fuerit  $b = a$ : quo casu rursus prior circulus oritur.

FI. 120.  
118.

Ob eandem rationem necesse est, ut in allata constructione contineatur ea, quæ parabola, & circulo perficitur; quum parabola, velut species quædam ellipsis, possit considerari. Ei autem fit locus, quum quantitas  $b$  infinita supponitur. Tunc enim, quemadmodum, ob infinitam longitudinem ipsius  $HT$ , in infinitum abit centrum ellipsis; sic axis ejus  $PQ$  coincidat cum recta  $EF$ , ducta per punctum  $D$  ipsi  $AB$  æquidistanter, ob rectam  $DZ$ , quæ evanescit, & ad nihilum reducitur. Quumque, sumpta super  $EF$  portione  $DE = ff: 4a$ , coincidat in eadem hypothese punctum  $P$  cum puncto  $E$ ; non modo ellipsis vertetur in parabolam, sed erit quoque  $E$  vertex parabolæ principalis,  $EF$  axis ejus, & recta  $EG = a$  parameter axis.

Hic vero non ita liquido patet, quod punctum  $P$  coincidere debeat cum puncto  $E$ , quotiescumque quantitas  $b$  infinita supponitur. Quare, ne dubium ullum supersit, ostendemus illud in hunc modum. Quoniam habetur  $AX = ff: 2a + b: 2 + b: 2$ , &  $AZ = f: 2 + f^3: 2ab + ff: 2b + ac: 2b$ ; utique, supposita  $b$  infinita, fiet  $AX = b: 2$ , &  $AZ = f: 2$ . Sed ex constructione,  $YP$  quadratum est æquale quadratis  $AX$ ,  $AV$  una cum quadrato alio, quod sit ad  $AZ$  quadratum, ut est  $b$  ad  $a$ . Quare, posita  $PZ = t$ ; erit  $tt + tb + hb: 4 = bb: 4 + ad + ffb: 4a$ ; hoc est  $tt + tb = ad$

$= ad + ffb: 4a$  ; five etiam, ob  $b$  infinitam,  $tb$   
 $= ffb: 4a$  : & propterea erit  $PZ = t = ff: 4a$ .  
 Unde, quum sit etiam  $DE = ff: 4a$  , omnino  
 necesse est, ut accedente  $PQ$  ad ipsam  $EF$ , ca-  
 dat punctum  $P$  super punctum  $E$ .

Illud quoque notandum hoc loco est,  
 quod si æquatio problematis sit  $x^3 + 2fx^2 -$   
 $abx + aac = 0$  ; tunc satis erit in ea , de qua  
 agitur,  $x^4 + 2fx^3 - abxx + aacx - a^3d = 0$   
 delere ultimum terminum  $a^3d$  . Et quoniam,  
 deleto isto termino , nulla evadit recta  $AV$   
 $= \sqrt{ad}$  ; duo hinc consequuntur , notatu di-  
 gna . Primum est , quod circulus describi de-  
 beat centro  $S$  , & intervallo  $SV$  . Alterum,  
 quod portiones  $YP$  ,  $YQ$  , quæ super  $YZ$  su-  
 muntur hinc inde a puncto  $Y$  , debeant esse  
 talis longitudinis , ut cujusque quadratum sit  
 æquale quadrato ex  $AX$  una cum quadrato  
 alio, quod sit ad  $AZ$  quadratum, ut est  $b$  ad  $a$ .

X. Cæterum, etsi constructiones proble-  
 matum solidorum , quæ hyperbola , & circu-  
 lo fiunt, ob rationes superius allatas, non sint  
 comparandæ cum iis , quæ five circulo, & pa-  
 rabola , five circulo , & ellipsi peraguntur; at-  
 tamen , si eæ velint adhiberi , poterit locus ad  
 hyperbolam eodem fere artificio reperiri , quo  
 invenitur locus ad ellipsim ; hoc est, multipli-  
 cando per fractionem aliquam priorem locum  
 ad parabolam , tum eum subducendo ex loco  
 altero , qui etiam ad parabolam nos ducit.

X.  
 Quomodo  
 inveniendus  
 est locus ad  
 hyperbolam,  
 quum hyper-  
 bola, & cir-  
 culo proble-  
 mata solida  
 sunt constru-  
 enda.

Ita , si  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$   
 sit problematis æquatio , sumpto loco ad pa-  
 rabolam simplicissimo  $xx - ay = 0$  , fiet sub-  
 stitutione  $yy - by + cx - ad = 0$  locus al-

X 4 ter

ter ad parabolam. Unde, quemadmodum additione horum locorum habebitur locus ad circulum  $xx \rightarrow ay + yy \rightarrow by + cx \rightarrow ad = 0$ ; ita, si prior ad parabolam æquatio  $xx \rightarrow ay = 0$  multiplicetur per fractionem  $b : a$ , orietur subtractione locus ad hyperbolam  $yy \rightarrow by + by \rightarrow bxx : a + cx \rightarrow ad = 0$ .

Similiter, si  $xx^4 + 2fx^3 \rightarrow abxx + aacx \rightarrow a^3d = 0$  sit æquatio problematis, sumpto loco ad parabolam paulo composito  $xx + fx \rightarrow ay = 0$ , habebitur substitutione locus alter ad parabolam  $yy \rightarrow ffy : a + f^3x : aa \rightarrow by + bfx : a + cx \rightarrow ad = 0$ . Unde, sicuti additione istorum locorum oritur locus ad circulum  $xx + fx \rightarrow ay + yy \rightarrow ffy : a + f^3x : aa \rightarrow by + bfx : a + cx \rightarrow ad = 0$ ; ita, si prior ad parabolam æquatio  $xx + fx \rightarrow ay = 0$  multiplicetur per fractionem  $b : a$ , fiet subtractione  $yy \rightarrow ffy : a \rightarrow by + by \rightarrow bxx : a \rightarrow bfx : a + f^3x : aa + bfx : a + cx \rightarrow ad = 0$  locus ad hyperbolam.

Sed hic quoque notare oportet, quod hujusmodi hyperbola, pro multiplici valore ipsius  $b$ , possit esse infinitarum specierum. Speciaticim vero erit æquilatera, si fuerit  $b = a$ . Et quoniam parabola considerari potest velut species quædam hyperbolæ; omnino necesse est, ut in constructione, quæ hyperbola, & circulo perficitur, contineatur ea, quæ circulo, & parabola peragitur: quemadmodum revera abit in illam, quotiescumque ipsa quantitas  $b$  infinita supponitur.

XI.  
Quomodo  
haberi potest

XI. Hyperbola vero sub contemplationem hic venit relate ad aliquam ejus diametrum

trum. Sed quid, *si adhiberi velit, in ordine ad suas asymptotos considerata?* Plane, quum æquatio problematis est tertii gradus, sive trium dimensionum, inter alia loca, quæ tradita methode exinde eruuntur, ille etiam reperitur, qui ad hyperbolam nos ducit, relate ad ipsius asymptotos consideratam. Unde facile erit, ope ejus, problematis constructionem exhibere.

locus ad hyperbolam, relate ad suas asymptotos consideratam.

Sit enim primo  $x^3 \rightarrow abx + aac = 0$  problematis æquatio. Capiatur locus ad parabolam simplicissimus  $xx = ay$ . Et quoniam, multiplicata utraque ejus parte per  $x$ , fit  $x^3 = axy$ ; erit substitutione  $axy \rightarrow abx + aac = 0$ , sive etiam  $xy \rightarrow bx + ac = 0$ : quæ quidem æquatio non aliter, quam per hyperbolam, relate ad suas asymptotos consideratam, potest explicari.

Sit etiam  $x^3 + 2fxx \rightarrow abx + aac = 0$  æquatio, ex problemate nata. Capiatur adhuc locus ad parabolam paulo compositus  $xx + fx = ay$ . Quumque, multiplicata utraque ejus parte per  $x$ , fiat  $x^3 + fxx = axy$ ; erit substitutione  $axy + fxx \rightarrow abx + aac = 0$ , sive etiam  $xy + fxx : a \rightarrow bx + ac = 0$ : quæ sane æquatio per hyperbolam, utroque modo consideratam, potest explicari.

Quod si autem æquatio problematis sit quatuor dimensionum; tunc tradita methode numquam ex ea erui poterit locus ad hyperbolam, relate ad suas asymptotos consideratam. Verum, si æquatio subinde transformetur, ut ultimus ejus terminus sit quadratum perfectum, & afficiatur etiam signo  $\mp$ ; licebit circulum, & hyperbolam reperire in hunc

hunc, qui sequitur, modum.

Sit  $x^4 + 2fx^3 - abxx \rightarrow adcx + aadd = 0$  hujuscemodi problematis æquatio. Capiatur locus simplicissimus ad hyperbolam, relate ad asymptotos consideratam,  $xy = ad$ . Et quoniam fit, tum  $x = ad : y$ , cum  $xx = aadd : yy$ ; erit substitutione  $aaddxx : yy + 2aaddfx : yy \rightarrow a^2bdd : yy \rightarrow a^2cd : y + aadd = 0$ . Quare, reducta æquatione ista, habebitur locus ad circulum  $xx + 2fx \rightarrow ab \rightarrow acy : d + yy = 0$ .

XII.  
Cur occur-  
sus locorum  
feri debet in  
totidem pun-  
ctis, quot va-  
lores in æ-  
quatione prob-  
lematis ha-  
bet incogni-  
ta.

XII. Illud jam superest, ut paulo clariùs hic explicemus, cur omnino opus sit, ut *occursus duorum locorum, quibus problema construitur, fiat in totidem punctis, quot valores in ejus æquatione habet incognita.* Nam, quod sæpius supra dictum est, id exinde oriri, quia æquatio, per quam occursus ille definitur, ab ipsa problematis æquatione non differt, etsi verissimum sit; rem tamen non adeo luculenter ostendit, ut omnis dubitandi ratio remota videatur.

Propria ergo ejus rei ratio repeti debet ex illo Algebrae principio, quod æquatio, ex resolutione alicujus problematis nata, radicibus suis omnes ejus problematis casus nobis ostendat. Inde enim fit, ut æquatio, qua duarum linearum occursus definitur, debeat per suas radices puncta omnia exhibere, in quibus occursus ille contingit. Unde omnino necesse est, ut occursus duorum locorum, quibus problema construitur, fiat in totidem punctis, quot valores in ejus æquatione habet incognita; quum eadem problematis æ-  
qua-



quatione etiam occurfus ille definiatur.

Quod autem æquatio, definiens occursum duorum locorum, quibus problema conſtruitur, non differat ab ipſa problematis æquatione; id notius eſt, quam ut poſſit in dubium revocari. Invenienda eſt enim æquatio illa per conditiones, quæ ſeorſim in utroque loco continentur. Unde, quum iſtæ conditiones ſint illæ eædem, quæ ſimul in problemate reperiuntur; oportebit, eam invenire per ipſas problematis conditiones; proindeque omnino neceſſe eſt, ut non differat ab æquatione, ad quam problema ipſum revocatur; quum ex iisdem conditionibus utraque æquatio erui debeat.

Ex eo porro, quod æquatio, definiens duarum linearum occurſum, debeat radicibus ſuis puncta omnia exhibere, in quibus occurſus ille contingit, perſpicuum eſt, non melius intelligi poſſe, in quot punctis duarum linearum occurſus fiat, quam quærendo æquationem, per quam illiuſmodi occurſus definitur. Unde, quod nimio labore oſtendit Apollonius libro quarto ſuorum Conicorum de numero punctorum, in quibus aliqua ſectio conici convenire poteſt, vel cum circumferentia circuli, vel cum alia conici ſectione; ope ejus principii, facili quidem negotio demonſtrare licebit.

Nimirum æquatio, definiens occurſum, ſive duarum conici ſectionum, ſive circumferentiæ circuli, & unius conicæ ſectionis, regulariter ad quatuor dimensiones aſcendit. Unde non plura, quam quatuor, poterunt eſſe

ſe

332 SECTIONUM CONICARUM  
 se puncta ejus occurfus. Sed duo quævis horum punctorum possunt, vel in unum coire, vel nullibi etiam reperiri: si scilicet radices, iis correspondentes, vel æquales fiant, vel etiam evadant imaginariæ. Et quoniam, quum coeunt in unum, abeunt in punctum contactus; hinc est, ut eadem curvæ in pluribus, quam duobus, punctis nequeant se mutuo contingere.

## C A P. V.

### *Constructio problematum solidorum plenius expenditur.*

I.  
*Quædam problemata quarti generis construi possunt mediantibus iis, quæ genus tertium constituunt.*

I. **U**bi de constructione egimus problematum planorum, ad rem visum fuit ostendere, ad quos terminos constructiones eorum possint revocari. Eadem autem ratione non abs re erit, hic etiam aperire, quorsum constructio problematum solidorum proprie reducatur. Id vero ut commodius exequi valeamus, præstat prius advertere, quod *problemata quarti generis facillimum sit construere mediantibus iis, quæ tertiam genus constituunt.*

Sunt quippe problemata quarti generis, quorum æquationes ad quatuor dimensiones ascendunt; sunt vero problemata tertii generis, quorum dimensiones ad tres tantum dimensiones assurgunt. Unde constabit, priora problemata posse istorum beneficio construi, si utique ostendi possit, quod quælibet æquatio quar-

quarti gradus ad aliam trium dimensionum deprimi queat.

Id autem demonstravit primus omnium Raphael Bombellius. Et facillime illud idem ostendere licebit in hunc modum. Sit  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  æquatio quarti gradus. Supponatur ea orta ex multiplicatione istarum secundi gradus  $xx - yx + ff = 0$ , &  $xx + yx - gg = 0$ . Jamque, iis per se mutuo multiplicatis, fiet  $x^4 - yyxx + ffxx - ggxx + ffyx + ggyx - ffgg = 0$  ejusdem naturæ cum æquatione proposita.

Comparentur itaque simul, & ex mutua terminorum collatione habebitur  $yy - ff + gg = ab$ ,  $ff + gg = aac$ , &  $ffgg = a^3d$ . Hinc, quum sit  $gg + ff = aac : y$ , &  $gg - ff = ab - yy$ ; erit  $2gg = aac : y + ab - yy$ ,  $2ff = aac : y - ab + yy$ , &  $4ffgg = a^4cc : yy - aabb + 2abyy - y^4$ . Sed habetur quoque  $4ffgg = 4a^3d$ . Itaque erit  $4a^3d = a^4cc : yy - aabb + 2abyy - y^4$ , sive etiam  $y^6 - 2aby^4 + aabbyy + 4a^3dyy - a^4cc = 0$ , quæ est æquatio sexti gradus, derivativa tertii.

Verum quidem est, quod æquatio quarti gradus assumpta sit carens secundo termino. Sed id difficultatem facere non debet; quum facillimum sit ex æquationibus delere secundum terminum. Qua autem ratione æquatio quarti gradus  $x^4 - abxx + aacx - a^3d = 0$  censenda sit reducta ad hanc aliam cubicam  $y^6 - 2aby^4 + aabbyy + 4a^3dyy - a^4cc = 0$ ; facile quidem erit intelligere: nimirum, quia cognito valore incognitæ  $y$ , innotescet quoque valor incognitæ  $x$ .

Jam

Jam enim habetur, tum  $ff = aac: 2y \rightarrow ab: 2 \dagger yy: 2$ , cum  $gg = aac: 2y \dagger ab: 2 \rightarrow yy: 2$ . Quare ex duabus iis æquationibus secundi gradus  $xx \rightarrow yx \dagger ff = 0$ , &  $xx \dagger yx \rightarrow gg = 0$ , ex quarum multiplicatione concipitur orta æquatio, de qua agitur,  $x^4 \rightarrow abxx \dagger aacx \rightarrow a^3d = 0$ , prior fiet  $xx \rightarrow yx \dagger aac: 2y \rightarrow ab: 2 \dagger yy: 2 = 0$ , & posterior  $xx \dagger yx \rightarrow aac: 2y \dagger ab: 2 \rightarrow yy: 2 = 0$ : proindeque, cognito valore incognitæ  $y$ , facile erit iis mediantibus invenire quatuor valores, quos habet incognita  $x$  in æquatione proposita.

II.  
Quorsum  
reducatur  
construendo  
problemata  
tertii  
generis, quo-  
rum æqua-  
tiones sunt  
simplicissi-  
ma.

II. Quum ergo problemata quarti generis facili negotio construantur per ea, quæ tertium genus constituunt; satis erit, inquirere, *quorsum constructio problematum tertii generis reducatur*. Et simplicior quidem æquatio, quæ ex aliquo horum problematum potest oriri, est  $x^3 = aac$ . Ei autem fit satis per primam duarum medio loco proportionalium inter  $a$ , &  $c$ . Nam, si ista vocetur  $x$ , fiet altera  $xx: a$ ; adeoque, quum sit, ut  $a$  ad  $x$ , ita  $xx: a$  ad  $c$ , erit  $x^3: a = ac$ , sive etiam  $x^3 = aac$ .

Nec aliter fiet satis problemati, si æquatio ejus sit  $x^3 = \rightarrow aac$ . Tum enim duæ mediæ proportionales inveniendæ sunt inter  $a$ , &  $\rightarrow c$ ; & adhuc prima ipsarum valorem exhibebit incognitæ  $x$ . Nam, vocando  $x$  primam duarum medio loco proportionalium inter  $a$ , &  $\rightarrow c$ ; fiet altera  $xx: a$ . Unde, quum sit, ut  $a$  ad  $x$ , ita  $xx: a$  ad  $\rightarrow c$ ; erit  $x^3: a = \rightarrow ac$ , sive etiam  $x^3 = \rightarrow aac$ , quæ est ipsa problematis æquatio.

Sed

Sed notare oportet hoc loco, valorem incognitæ  $x$  oriri positivum, quum æquatio problematis est  $x^2 = aac$ ; & vicissim negativum, quum eadem æquatio est  $x^2 = -aac$ . Constat id autem facili negotio, si regulis, præcedenti capite traditis, utrumque problema construatur. Patebit enim, occursum locorum, quibus constructio peragitur, fieri ex parte radicum positivarum, quum habetur  $x^2 = aac$ ; & ex parte radicum negativarum, quum per contrarium est  $x^2 = -aac$ .

Hoc idem repeti quoque potest ex ipso criterio, quo magnitudines proportionales dignoscuntur. Ut enim vidimus in nostris Algebræ Elementis dicendæ sunt proportionales quatuor magnitudines, quotiescumque quicquid efficitur ab uno antecedentium, ut consequentem suum adæquet, id omne fieri debet ab alio antecedente, ut adæquet quoque suum consequentem. Unde, non aliter inter magnitudines diversi status proportio subsistere potest, quam si servantes legem proportionis, qua quantitates, duæ fuerint unius status, & aliæ duæ status oppositi.

Hinc autem prono alveo fluit, ut duarum medio loco proportionalium inter  $a$ , &  $-c$  prima debeat esse negativa, & secunda positiva. Debent enim in iis magnitudinibus, velut continue proportionalibus, tres analogiæ distingui. Nam, non modo necesse est, ut prima sit ad secundam, veluti est tertia ad quartam; sed oportet quoque, ut tam prima sit ad secundam, veluti est secunda ad tertiam; quam secunda ad tertiam, veluti est tertia ad quar-

quartam. Profecto autem non aliter omnes istæ analogiæ subsistere queunt, quam si duarum mediarum proportionalium prima sit negativa, & secunda positiva.

Atque hinc etiam ratio repeti potest, cur problema planum sit impossibile, quum ejus æquatio est  $xx = \dashrightarrow ab$ . Pro eo enim inveniendâ esset inter  $a$ , &  $\dashrightarrow b$  una media proportionalis. Sed cujuscumque status ea capiatur, numquam efficere licet, ut in ipsa analogia duo termini sint positivi, & alii duo negativi. Plane vero media proportionalis inter  $a$ , &  $b$  potest esse, tum positiva, cum negativa. Nam, sicuti in priorè casu omnes analogiæ termini fiunt positivi; sic in secundo duo erunt unius status, & alii duo status oppositi.

III.  
Quomodo  
reddi possint  
simplicissimi  
ma æquatio-  
nes aliorum  
problemata-  
rum tertii  
generis.

III. Quemadmodum autem per inventionem duarum mediarum proportionalium fit satis problemati, cujus æquatio est, vel  $x^2 = aac$ , vel  $x^2 = \dashrightarrow aac$ ; sic eodem artificio omnia alia problemata tertii generis construere liceret, si eorum æquationes ad formas illas simplicissimas possent revocari. Fieri vero id facile potest, quum æquatio problematis secundo, & tertio termino caret. Nam, si habeatur, exempli gratia,  $x^2 = aab \dagger ac \dashrightarrow bcd$ ; capiendò  $f = b \dagger cc: a \dashrightarrow bcd: aa$ , fiet utique  $x^2 = aaf$ .

Sed non perinde se res habet, si in æquatione problematis, vel secundus, vel tertius, vel etiam uterque terminus reperiat. Tunc enim in id primo incumbendum, ut, remotis ab æquatione illiusmodi terminis, pu-

ra reddatur, & ab omni affectione immunis æquatio ipsa. Et quamquam, delere secundum terminum, facillimum sit; non est tamen peræque facile, subinde etiam auferre terminum tertium, ut iterum secundus non oriatur.

Obtineri interim id potest sequenti ratione. Sit  $x^3 + abx - aac = 0$  æquatio cubica, tertio termino prædita. Ponatur  $x = y + z$ . Et quoniam habetur, tum  $x^3 = aac - abx$ , cum  $x^3 = y^3 + 3yyz + 3yzz + z^3$ ; erit  $aac - abx = y^3 + 3yyz + 3yzz + z^3$ . Sed, multiplicata per  $zyz$  utraque parte æquationis  $x = y + z$ , fit etiam  $zyzx = 3yyz + 3yzz$ . Quare, substitutionis ope, erit  $aac - abx = y^3 + 3zyzx + z^3$ .

Ponatur porro, quod sit  $aac = y^3 + z^3$ . Quumque fiat  $-abx = 3zyzx$ , erit  $-ab = 3yz$ : unde infertur  $z = -ab : 3y$ , &  $z^3 = -a^3b^3 : 27y^3$ . Hinc, rursus per substitutionem, erit  $aac = y^3 - a^3b^3 : 27y^3$ , hoc est  $y^6 - aacy^3 = a^3b^3 : 27$ , sive etiam  $y^6 - aacy^3 + a^4cc : 4 = a^4cc : 4 + a^3b^3 : 27$ . Et quoniam, per extractionem quadratæ radicis, eruitur  $y^3 - aac : 2 = \sqrt{a^4cc : 4 + a^3b^3 : 27}$ ; fiet demum  $y^3 = aac : 2 + \sqrt{a^4cc : 4 + a^3b^3 : 27}$ .

Quemadmodum autem abunde liquet, deficere in æquatione ista, tam secundum, quam tertium terminum; ita nec etiam dubitari potest, quin ad eam reduci queat æquatio proposita  $x^3 + abx - aac = 0$ . Est enim ex hypothese  $x = y + z$ ; estque etiam  $z = -ab : 3y$ . Quare erit  $x = y - ab : 3y$ : & propterea cognito valore, quem habet inco-

gnita  $y$  in æquatione  $y^3 = aac : 2 \mp \sqrt{(a^4cc : 4 \mp a^3b^3 : 27)}$ , innotescet quoque valor, quem habet incognita alia  $x$  in æquatione principali  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ .

IV.  
*Quorsum  
 educatur  
 constructio  
 problema-  
 tum tertii  
 generis, quo-  
 rum aqua-  
 tiones uni-  
 cum valo-  
 rem realem  
 admittunt.*

IV. Et sane, quin hujusmodi reductio recte procedat, quum æquatio problematis induit hanc formam  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ , non est dubitandum. Tunc enim incognita  $x$  unicum valorem realem, eumque positivum admittit: quem semper determinare licebit, adhibita æquatione  $y^3 = aac : 2 \mp \sqrt{(a^4cc : 4 \mp a^3b^3 : 27)}$ ; quum nihil impedimento esse possit inventioni ejus. Et par est ratio, si æquatio problematis accipiat hanc aliam formam  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ , ubi etiam incognita  $x$  unicum valorem realem, eumque negativum admittit.

Sed non perinde res est, si æquatio problematis sit hujus formæ  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ . Nam in hoc casu procedit reductio tunc tantum, quum incognita  $x$  unico valore reali, eoque negativo potest explicari; & deprehenditur omnino impossibilis, quotiescumque, præter valorem illum negativum, alios duos positivos admittit. Nec aliter se res habet, si æquatio fuerit  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ , ubi etiam incognita  $x$ , præter valorem unum positivum, potest quandoque duobus aliis negativis pariter explicari.

Ut autem id liquido constet, meminisse oportet ejus, quod in Algebra demonstratur: nimirum in duabus hisce æquationibus  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ , &  $x^3 \mp abx \mp aac = 0$ , admittere incognitam  $x$  unicum tantum valorem realem, quum cubus ex triente coef-

ficiens.



ficientis tertii termini minor est quadrato, quod fit ex ultimo termino dimidiato, hoc est quum  $a^3b^3 : 27$  minor est, quam  $a^4cc : 4$ ; explicari vero tribus valoribus realibus, quum vicissim  $a^3b^3 : 27$  major est, quam  $a^4cc : 4$ .

Jam, quotiescumque habetur  $x^3 \rightarrow abx + aac = 0$ , tunc æquatio reducta est  $y^3 = aac : 2 + \sqrt{(a^4cc : 4 - a^3b^3 : 27)}$ . Unde, quemadmodum in ista valor incognitæ  $y$  tunc tantum oritur realis, quum  $a^3b^3 : 27$  minor est, quam  $a^4cc : 4$ ; sic etiam in æquatione principali  $x^3 \rightarrow aax + aac = 0$  tunc tantum, adhibita ejus reducta, reperire licebit valorem incognitæ  $x$ , quum fuerit  $a^3b^3 : 27$  minor, quam  $a^4cc : 4$ , hoc est quum ipsa incognita  $x$  unicum valorem realem admittit.

Et similiter, quum æquatio problematis est  $x^3 \rightarrow abx - aac = 0$ , tunc æquatio reducta est  $y^3 = -aac : 2 + \sqrt{(a^4cc : 4 - a^3b^3 : 27)}$ . Unde adhuc, sicuti in ista valor incognitæ  $y$  tunc demum realis deprehenditur, quum  $a^3b^3 : 27$  minor est, quam  $a^4cc : 4$ ; sic pariter in æquatione principali  $x^3 \rightarrow abx - aac = 0$  tunc demum, mediante ejus reducta, determinari poterit valor incognitæ  $x$ , quum fuerit  $a^3b^3 : 27$  minor, quam  $a^4cc : 4$ , hoc est, quum ipsa incognita  $x$  unico tantum valore reali potest explicari.

Id quum ita sit, liquet, per inventionem duarum mediarum proportionalium, ea sola problemata tertii generis construi posse, quorum æquationes unicum tantum valorem realem admittunt; quum in solis hisce æquatio-

340 SECTIONUM CONICARUM  
 nibus reductio rite procedat. Sed supersunt  
 problemata illa, in quorum æquationibus  
 tres valores reales occurrunt. Unde, quorsum  
 istorum constructiones reducendæ sint, nunc  
 oportet ostendamus.

V.  
 Quorsum  
 reductur  
 constructio  
 problema-  
 tum tertii  
 generis, in  
 quorum æ-  
 quationibus  
 tres valores  
 reales occur-  
 runt.

FIG.  
 121.

V. Et quidem constructiones problema-  
 tum tertii generis, in quorum æquationibus  
 tres valores reales occurrunt, per dati cujus-  
 dam arcus trisectionem commode paragi pos-  
 sunt. Nam, si oporteat, datum aliquem ar-  
 cum tripartito dividere; invenietur æquatio  
 cubica, cujus omnes radices erunt reales.  
 Quod ut liquido constet, detur circulus  
 ADE, cujus centrum sit punctum F; & as-  
 sumpta in ejus circumferentia portione qua-  
 vis AD, secanda sit ea in tres partes æquales.

Ponatur jam factum, quod quæritur,  
 sintque AB, BC, CD partes quæsitæ. Du-  
 cantur radii AF, BF, CF, DF; & junctis  
 chordis AB, BC, CD, agatur per punctum  
 B recta BG, parallela ipsi CF, quæ conve-  
 niat cum chorda arcus dati AD in puncto G;  
 ponaturque radius dati circuli  $AF = r$ , chor-  
 da arcus similiter dati  $AD = p$ , & chorda  
 arcus quæsitæ  $AB = x$ .

Itaque, quia angulus BFD duplus est,  
 tam anguli BAD, quam anguli BFA; erunt  
 duo anguli BAD, BFA æquales inter se;  
 adeoque, ob triangula æquiangula BFA,  
 BAH, erit, ut AF ad AB, ita AB ad BH.  
 Et quoniam, propter parallelas BG, CF an-  
 gulus GBF æqualis est angulo BFC, sive  
 BFA; erit idem angulus GBF æqualis quo-  
 que angulo BAD; & consequenter, ob trian-  
 gula

gula æquiangula ABH, BGH, erit, ut AB ad BH, ita BH ad HG. Hinc quatuor rectæ AF, AB, BH, HG continue proportionales erunt: & propterea erit  $BH = \pi x: r$ , &  $HG = \pi^2: rr$ .

Uterius, quum triangula duo BFA, BAH ostensa sint æquiangula, & trianguli BFA æqualia sint latera AF, BF; erunt quoque trianguli BAH æqualia latera AB, AH. Unde, quum eadem ratione ostendantur etiam æqualia latera CD, DK trianguli CDK; erit AD una cum GH æqualis tribus AB, BC, CD simul sumptis, sive etiam triplo unius AB. Quare, instituta æqualitate inter valores istarum linearum, fiet  $p + \pi^2: rr = 3x$ , hoc est  $\pi^2 = 3rrx + prr = 0$ , quæ est ejusdem formæ cum æquatione  $\pi^2 = abx + aac = 0$ .

Jam vero, quod in ista æquatione  $\pi^2 = 3rrx + prr = 0$  radices omnes sint reales, facile erit ostendere. Quum enim AD sit linea in circulo inscripta, ea diametro AL æqualis quidem esse potest, major autem esse non potest. Itaque, omisso casu æqualitatis, veluti speciali, AL major est, quam AD; proindeque, quum sit  $AL = 2r$ , &  $AD = p$ ; erit  $2r$  major, quam  $p$ ; adeoque  $r$  major, quam  $p: 2$ . Est igitur in æquatione  $\pi^2 = 3rrx + prr = 0$  cubus ex triente coefficientis tertii termini major quadrato, quod fit ex ultimo termino dimidiato; & idcirco erunt in ea tres radices reales.

VI. Sed non ita liquido patet, per quas rectas in schemate tres illæ radices reales exhibentur. Eæ igitur habebuntur, si secetur in

VI.  
Æquationis,  
ad quam re-  
ducitur pro-  
blema de tri-

Y 3 tres

seſſione ar-  
cus, tres ra-  
dices reales  
exhibentur.

FIG.

121.

tres partes æquales, tam arcus DMA, qui est complementum ad circulum ipsius ABD, quam arcus DIL, qui est complementum ad semicirculum ejusdem ABD. Si enim DM, MN, NA sint partes arcus prioris DMA, & DO, OI, IL sint partes arcus alterius DIL; designabit recta AB radicem unam, recta AN radicem alteram, & recta AI radicem tertiam. Quumque ex tribus radicibus æquationis  $x^3 - 3rx^2 + pr = 0$  duæ quidem sint positivæ, & una negativa; erunt rectæ AB, AN radices positivæ, & recta AI radix negativa.

Et quidem, rectam AN esse radicem æquationis  $x^3 - 3rx^2 + pr = 0$  perinde, ac est recta AB, facili negotio suaderi potest; quia quotiescumque trifariam secandus proponitur arcus AD, potest hic esse tam arcus ABD, quam arcus AND; quum uterque istorum punctis A, & D terminetur. Sed, quod ejusdem æquationis radix sit etiam recta AI, quæ nec subtendit trientem arcus ABD, nec trientem arcus AND: id equidem non ita facile concipitur; quia, quam relationem habeat recta AI cum problemate de trisectione arcus AD, sane non apparet.

Constabit id autem, si sedulo consideremus, quo pacto procedimus in resolutione problematis, in quo arcus, duobus datis punctis interceptus, in certum æqualium partium numerum dividendus proponitur. Nimirum, quum in resolutione ejus problematis procedamus, inveniendo valorem chordæ, quæ unam ex iis partibus subtendat; perspicuum est, problema ipsum eo quidem redire, ut  
in.

inveniatur valor rectæ lineæ, quæ incipiendo ab uno puncto, toties aptari possit in circuli circumferentia, donec perveniatur ad punctum alterum, quot sunt partes, in quas dividere oportet arcum, qui inter duo illa puncta intercipitur.

Atque hac ratione facile modo intelligimus, cur æquatio  $x^3 - 3rx + pr = 0$  tres habeat radices reales, designatas per rectas AB, AN, AI. Orta est namque æquatio illa ex resolutione problematis, in quo arcus, punctis A, & D interceptus, in tres partes æquales proponitur dividendus. Itaque, ut illi æquationi satisfiat, rectam oportet invenire, quæ a puncto A ter aptari queat in circumferentia circuli, donec ad punctum alterum D perveniatur. Unde, quum id præstari possit per quamlibet rectarum AB, AN, AI; consequens est, ut valor incognitæ  $x$  in æquatione  $x^3 - 3rx + pr = 0$  sit unaquæque rectarum AB, AN, AI.

VII. Ne aliquid hic omittamus, *illud etiam ostendendum nobis est*, quod in eadem æquatione  $x^3 - 3rx + pr = 0$  referant radices positivas rectæ AB, AN, & designet radicem negativam recta AI. Id autem facile constabit, si utique ostendi possit, rectam AI ipsis AB, AN simul sumptis æqualem esse. Deest enim in æquatione illa secundus terminus; adeoque, per ea, quæ in Algebra demonstrantur, debet radix negativa ejusmodi esse, ut adæquet summam ex duabus radicibus positivis.

Ostendemus vero rectam AI æqualem  
Y 4 sum.

VII.  
*Quæ sint  
 ejusdem æ-  
 quationis  
 radices duæ  
 positiva, &  
 quæ radix  
 negativa, an-  
 peritur.*

FIG.  
 121.

FIG.  
122.

summæ ipsarum  $AB, AN$ , præmissis prius hoc lemmate. Nimirum, quod si in circulo aliquo  $ABC$  describatur triangulum æquilaterum  $BCD$ , & ex uno trianguli angulo, veluti  $C$ , ducatur recta  $AB$ , quæ terminata ad circuli circumferentiam, secet latus oppositum  $BD$  in puncto  $E$ ; quod, inquam, recta ista  $CA$  ipsis  $AB, AD$  simul sumptis sit æqualis.

Hujus lemmatis veritas ostendi potest in hunc modum. Angulus  $DAC$ , velut æqualis angulo  $DBC$ , adæquat angulum  $BDC$ . Itaque duo triangula  $CDE, CAD$  æquiangulara erunt; adeoque erit, ut  $CD$  ad  $DE$ , ita  $CA$  ad  $AD$ . Eadem ratione angulus  $BAC$ , velut æqualis angulo  $BDC$ , adæquat angulum  $DBC$ . Itaque duo triangula  $CBE, CAB$  æquiangulara erunt; adeoque erit, ut  $CB$  ad  $BE$ , ita  $CA$  ad  $AB$ .

Jam, propter triangulum æquilaterum  $BCD$ , duæ  $CB, CD$  inter se sunt æquales. Quare erit quoque, ut  $CD$  ad  $BE$ , ita  $CA$  ad  $AB$ . Sed ostensum est pariter, quod  $CD$  sit ad  $DE$ , ut  $CA$  ad  $AD$ . Itaque erit, ut  $CD$  ad summam ipsarum  $BE, DE$ , ita  $CA$  ad summam ipsarum  $AB, AD$ . Unde, quemadmodum  $CD$  ipsis  $BE, DE$  simul sumptis est æqualis; ita  $CA$  ipsas  $AB, AD$  simul adæquabit.

FIG.  
121.

Hoc lemmate præmissis, facile modo erit, ostendere, rectam  $AI$  ipsis  $AB, AN$  simul sumptis æqualem esse. Quum enim arcus  $AB$  sit tertia pars arcus  $ABD$ , & arcus  $AN$  tertia pars arcus  $AND$ ; erit arcus  $BAN$  tertia pars totius circumferentiæ. Et rursus, quoniam arcus  $BD$  continet duas tertias partes arcus  $ABD$ ,

ABD, & arcus DI duas tertias partes arcus DIL; continebit arcus BDI duas tertias partes semicircumferentiæ ADL; adeoque tertia pars erit circumferentiæ integræ.

Hinc arcus BAN, BDI, non modo æquales erunt inter se, verum etiam adæquabunt arcum reliquum IMN. Unde, si puncta tria B, I, N rectis totidem jungantur, æquilaterum erit triangulum, sub iis comprehensum: & consequenter, per lemma jam ostensum, recta AI ipsis AB, AN simul sumptis æqualis esse debebit.

VIII. Quemadmodum ergo in problemate de trisectione arcus AD invenitur æquatio  $x^3 - 3rx + pr = a$ , cujus omnes radices sunt reales; ita nulli dubium esse potest, quin referant radices duas positivas rectæ AB, AN, & radicem negativam rectæ AI. Sed, qua ratione, per trisectionem alicujus arcus, construi possint problemata omnia tertii generis, in quorum æquationibus tres valores reales occurrunt, jam superest, ut ostendamus.

VIII.  
Quomodo per trisectionem alicujus arcus construi possint problemata tertii generis, quorum æquationes tres radices reales admittunt.

Sit itaque primo  $x^3 - abx + aac = 0$  æquatio problematis, quæ duas admittit radices positivas, & unam negativam. Conferatur æquatio ista cum ea de trisectione arcus, superius inventa,  $x^3 - 3rx + pr = 0$ . Et, comparatione instituta, habebitur  $3r = ab$ , &  $pr = aac$ . Unde, quemadmodum ex prima harum æquationum infertur  $r = \sqrt{ab:3}$ , sic ex secunda eruitur  $p = 3ac:b$ .

FIG.  
121.

Jam in problemate de trisectione arcus erat  $r$  radius circuli, &  $p$  chorda arcus triseccandi. Quare, si describatur circulus ABL,

346 SECTIONUM CONICARUM  
 cujus radius sit  $\sqrt{ab:3}$ , & in eo aptetur re-  
 cta  $AD = 3ac:b$ ; erunt propositæ æquationis  
 radices positivæ rectæ AB, AN, quæ subten-  
 dunt trientes arcuum ABD, AND; & radix  
 negativa recta AI, quæ subtendit trientem  
 arcus ABDNABD.

Sit secundo  $x^3 - abx - ac^2 = 0$  æqua-  
 tio problematis, in qua sunt duæ radices ne-  
 gativæ, & una positiva. Jam ista a præceden-  
 te non in alio differt, quam quod terminorum,  
 locis paribus existentium, mutata sint signa.  
 Quare per ea, quæ in Algebra ostenduntur,  
 erunt istius radices negativæ, quæ in illa erant  
 positivæ; & per contrarium erit hujus radix  
 positiva, quæ illic erat negativa.

Hinc, descripto rursus circulo ABL,  
 cujus radius sit  $\sqrt{ab:3}$ , & aptata adhuc in  
 eo recta  $AD = 3ac:b$ ; oportebit, tripartito  
 dividere, non modo arcus ABD, AND, ve-  
 rum etiam arcum ABDNABD. Nam erunt  
 propositæ æquationis radices negativæ rectæ  
 AB, AN, quæ subtendunt trientes arcuum  
 ABD, AND; & erit radix positiva recta AI,  
 quæ subtendit trientem arcus ABDNABD.

IX.  
*Ad quod pro-  
 blema, tum  
 arcus trise-  
 ctio, cum in-  
 ventio dua-  
 rum media-  
 rum propor-  
 tionalium  
 possit revoca-  
 ri.*

IX. Omnia igitur problemata solida, vel  
 inventionem duarum mediarum proportiona-  
 lium inter duas rectas datas, vel trisectione  
 arcus alicujus construere licebit. Sed nolo  
 hic silentio reticere, quod *utrumque horum,  
 problematum nullo negotio construatur, si uti-  
 que intra datum angulum, sive rectilineum  
 sive mixtilineum, aptari possit recta data lon-  
 gitudinis, quæ convergat ad punctum datum.*

Oporteat etenim primo invenire duas  
 me-



medias proportionales inter rectas  $AB$ ,  $AC$ . **FIG.**  
 Jungatur  $æ$  ad rectos angulos; & completo **123.**  
 rectangulo  $AC$  secetur utraque ipsarum bi-  
 fariam in  $E$ , &  $F$ . Tum, juncta  $DE$ , produ-  
 catur eadem, usque donec ipsi  $BC$  occurrat  
 in  $G$ ; & erecta super  $BC$  perpendiculari  $FH$   
 talis longitudinis, ut fiat  $CH$  æqualis ipsi  
 $AE$ , jungatur  $GH$ , cui per punctum  $C$  pa-  
 rallela agatur  $Cl$ . Extendatur postea  $BC$  ver-  
 sus  $K$ , & intra angulum rectilineum  $KCl$   
 aptetur recta  $Kl$ , eidem  $AE$  æqualis, quæ  
 convergat ad punctum  $H$ . Denique per pun-  
 ctum  $D$  ducatur recta  $KL$ , ipsi  $AB$  occurrens  
 in  $L$ ; & dico,  $CK$ ,  $AL$  medias esse propor-  
 tionales inter duas  $AB$ ,  $AC$ .

Quum enim  $AB$  secta sit bifariam in  $E$ ;  
 erit  $BG$  ipsi  $AD$ , seu  $BC$  æqualis; adeoque  
 erit, ut  $AE$  ad  $AB$ , ita  $BC$  ad  $CG$ . Sed  $AB$   
 est ad  $AL$ , ut  $CK$  ad  $BC$ . Quare, pertur-  
 bando, erit, ut  $AE$  ad  $AL$ , ita  $CK$  ad  $CG$ ;  
 & addendo antecedentes consequentibus, erit  
 etiam, ut  $AE$  ad  $EL$ , ita  $CK$  ad  $GK$ . Unde,  
 quum  $CK$  sit ad  $GK$ , ut est  $Kl$  ad  $KH$ ; erit  
 ex æquali, ut  $AE$  ad  $EL$ , ita  $Kl$  ad  $KH$ : &  
 propterea, ob æquales  $AE$ ,  $Kl$ , erunt etiam æ-  
 quales  $EL$ ,  $KH$ : proindeque erit quadratum  
 ex  $EL$  æquale quadrato ex  $KH$ .

Jam quadratum ex  $EL$  est æquale re-  
 ctangulo  $ALB$  una cum  $AE$  quadrato; &  
 quadratum ex  $KH$  est æquale quadratis  $KF$ ,  
 $FH$ , sive etiam rectangulo  $BKC$  una cum  $CH$   
 quadrato. Quare erit rectangulum  $ALB$  una  
 cum  $AE$  quadrato æquale rectangulo  $BKC$   
 una cum  $CH$  quadrato; adeoque, ablatis æ-  
 qua-

qualibus quadratis  $AE$ ,  $CH$ , erit rectangulum  $ALB$  æquale rectangulo  $BKC$ . Unde erit, ut  $BL$  ad  $BK$ , ita  $CK$  ad  $AL$ . Sed  $BL$  est ad  $BK$ , ut  $AB$  ad  $CK$ , & ut  $AL$  ad  $BC$ . Et igitur ex æquali erit, ut  $AB$  ad  $CK$ , ita  $CK$  ad  $AL$ , & ita  $AL$  ad  $BC$ .

FIG.  
124.

Oporteat secundo, secare trifariam arcum  $AB$ , sumptum in circumferentia circuli  $ABD$ ,cujus centrum est punctum  $C$ . Extendatur diameter  $AD$  versus  $E$ , & intra angulum mixtilineum  $EDF$  aptetur recta  $EF$  æqualis radio  $CA$ , quæ convergat ad punctum  $B$ . Agatur postea per centrum  $C$  recta  $CG$ , ipsi  $EF$  parallela; & erit  $AG$  tertia pars arcus  $AB$ . Nam, ob æquales  $CB$ ,  $CF$ ,  $EF$ , isosceles erunt triangula  $BCF$ ,  $CFE$ ; adeoque erit angulus  $ACB$  triplus anguli  $AEB$ , sive  $ACG$ .

X.

Quomodo  
prafatum  
problema  
solvebat Ni-  
chomedes  
Conchoide  
fua, & num  
legitima fit  
illa solutio.

X. Non ergo dubitari potest, quin facili negotio resolvatur, tam problema de duabus mediis proportionalibus; quam problema de anguli trisectione, ubi aptari possit intra datum angulum, sive rectilineum, sive mixtilineum recta datæ longitudinis, quæ convergat ad punctum datum. Præstabat id autem Nichomedes sua *conchoide*. Si enim super recta positione data  $AB$  feratur centrum circuli  $DEF$  interea, ac recta  $CH$ , transiens per centrum illud, revolvitur circa  $C$ ; continua rectæ hujus, & circuli intersectione describetur conchois Nichomedis  $XMZ$ .

FIG.  
125.

Jam curvæ hujus illud est accidens præcipuum, ut ducta ad eam ex puncto  $C$  recta quavis  $CM$ , sit æqualis radio circuli  $DEF$  portio ejus  $MO$ , quæ recta  $AB$ , & curva ipsa con-

ci-

tinetur. Unde, si  $AB$  sit crux rectilineum anguli dati,  $C$  punctum, ad quod convergere debet recta, intra angulum applicanda, & radius circuli  $DEF$  longitudo ejusdem rectae solvetur problema, faciendo, ut recta convergat quoque ad punctum illud, in quo aliud anguli crux a conchoide secatur.

Obiter autem notetur hic velim, quod sicuti curva  $XMZ$  conchois appellatur; sic dicitur polus ejus punctum  $C$ , regula recta  $AB$ , & intervallum radius circuli  $DEF$ , quo mediante describitur. Regula porro est etiam asymptotus curvae. Nam, si super ea ex quolibet curvae puncto  $M$  perpendicularis demittatur  $MN$ ; fiet ista eo minor, quo magis a polo receditur, nec tamen unquam evanescet. Unde, curva ipsa accedet quidem continuo ad rectam  $AB$ , ei tamen numquam occurret.

Cæterum conchois est curva tertii generis. Nam, demisso super  $AB$  perpendiculo  $CA$ , positisque  $CA = a$ ,  $MO = b$ ,  $AN = x$ , &  $MN = y$ ; invenietur æquatio quarti gradus  $xxyy + y^4 + 2ay^3 + aayy - bbyy - 2abby - aabb = 0$ . Unde, etsi problema de applicanda intra datum angulum recta datæ longitudinis, quæ convergat ad punctum datum, sit solidum natura sua; est tamen legitima constructio ejus, quæ conchoide perficitur, quum sit ad rectam locus alter, qui cum conchoide jungitur.

F I N I S.

I N.

# INDEX

LIBRORUM, ET CAPITUM,

Quæ in hoc Secundo Tomo  
continentur.

---

## LIBER V.

### *De Tangentibus, & Secantibus Sectionum Conicarum.*

- CAP. I. *Proprietates, quæ ellipsis tangenti-  
bus competunt, ostenduntur.* 3
- CAP. II. *Proprietates, quæ secantibus elli-  
psis competunt, ostenduntur.* 16
- CAP. III. *Demonstrantur proprietates, quæ  
competunt tangentibus hyperbo-  
lae.* 27
- CAP. IV. *Demonstrantur proprietates, quæ  
competunt secantibus hyperbo-  
lae.* 41
- CAP. V. *Proprietates, quæ hyperbolæ asym-  
ptotis competunt, in medium affe-  
runtur.* 54
- CAP. VI. *Proprietates, quæ parabola tan-  
gentibus, & secantibus compe-  
tunt, ostenduntur.* 67

Li-

351

L I B E R VI.

*De Focis, seu Umbilicis Sectionum Conicarum.*

- CAP. I. Focorum ellipsis proprietates generales ostenduntur. 78
- CAP. II. Focorum ellipsis proprietates speciales ostenduntur. 92
- CAP. III. Demonstrantur focorum hyperbolæ proprietates generales. 102
- CAP. IV. Demonstrantur proprietates speciales focorum hyperbolæ. 116
- CAP. V. Ostenduntur proprietates generales, ad parabolæ focum pertinentes. 126
- CAP. VI. Ostenduntur proprietates speciales, ad parabolæ focum pertinentes. 135

L I B E R VII.

*De Locis Geometricis, Coni Sectionibus terminatis.*

- CAP. I. Quid loci geometrici nomine veniat, & quot ejus species distinguantur. 144
- CAP. II. De divisione locorum ad lineam, & quomodo ea construi possint. 160
- CAP.





- 342
- CAP.III. *Qua ratione loca ad parabolam con-*  
*strui possint, ostenditur.* 177
- CAP.IV. *Ratio construendi loca ad ellipsim,*  
*& circulum aperitur.* 195
- CAP.V. *De constructione locorum ad hyper-*  
*bolam, relate ad diametros consi-*  
*deratam.* 216
- CAP.VI. *De constructione locorum ad hyper-*  
*bolam, relate ad asymptotos consi-*  
*deratam.* 238

## L I B E R VIII.

### *De Constructione Problematum* *Solidorum.*

- CAP.I. *Ratio construendi problemata geo-*  
*metrica generatim explicat-*  
*tur.* 259
- CAP.II. *Ratio construendi problemata pla-*  
*na in medium affertur.* 277
- CAP.III. *Methodus construendi problemata*  
*solida generatim ostenditur.* 295
- CAP.IV. *Elegantiores problematum solidorum*  
*constructiones exhiben-*  
*tur.* 313
- CAP.V. *Constructio problematum solidorum*  
*plenius expenditur.* 332


JUL 17 1921



Tom. II.


1





.....  
 .....  
 .....  
 .....







Tom. II.




42.



45.




43.



Tom. II.










Tom. II.















Tam. 11.







Tom. II.



















—







UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06525 5781

51

