


234

157



QA  
31  
E88  
S72  
M39  
1746



<sup>Euclidis,</sup>  
ELEMENTA

GEOMETRIÆ PLANÆ

SEU

ELEMENTORUM

EUCLIDIS

PRIORES SEX LIBRI

OPERA, AC STUDIO

NICOLAI

DE MARTINO

In Illustri Lyceo Neapolitano  
MATHEMATUM PROFESSORIS  
Recogniti, ac Illustrati.



Excudebat Neapoli Petrus Palumbo  
*Superioribus annuentibus.*

A N N O M. DCC. XLVI.

---

Expensis Stephani Elia.

12

LIBR  
Edward  
2-12-46  
54169

# GEOMETRIÆ<sup>3</sup>

STUDIOSÆ.

## JUVENTUTI.



*Elementa Geometriae Plana in  
Tui commodum, & usum edi-  
turi, non alia forma, ac me-  
thodo illa Tibi sistimus, quam  
prout in prioribus sex libris  
Elementorum Euclidis continentur. Id au-  
tem nemo nobis vitio vertat. Primum; quia  
mutato ordine Euclideo perdifficilis eva-  
dit lectio Archimedis, Apollonii, Theo-  
dosi, aliorumque prisca ætatis Geometra-  
rum, in quibus elementares propositiones  
laudantur eo ordine, quo extant in Eu-  
clidis Elementis. Et deinde quia expe-  
rientia edocti sumus, longè uberiores fru-  
ctum percipere Juventutem ex sola Eucli-  
dis lectione, quam si omnia illa Geome-  
tria Elementa perlustraret, quæ ætate  
nostra Viri alioquin doctissimi methodo a-  
lia adornare conati sunt. Interim priores  
illos sex libros Euclidis, Geometriae Planae  
Elementa continentes, nos ita rudes, ac  
nudos Tibi exhibemus, quemadmodum Ma-  
jores Nostri in hac nostra Urbe facere con-*

4  
sueverunt, sed nonnihil recognitos, ac  
illustratos; quandoquidem & definitio-  
nes singulis libris præfixas brevibus qui-  
busdam notis explicuimus, & demonstra-  
tiones ipsas propositionum paulò nitidio-  
res reddere curavimus. Quin etiam, ne  
accedens ad hæc studia, Geometriae pene-  
tralia statim ingredi cogaris, ad rem vi-  
sum est, præliminarem quamdam disser-  
tationem præmittere, quæ ostenderet tum  
naturam quantitatum, quas Geometria  
considerat, tum differentias principio-  
rum, quæ in ea velut indubitata adbi-  
bentur, tum denique discrimina ipsarum  
propositionum, quæ ex iis principiis per  
demonstrationes deducuntur. Cæterum,  
quod de Geometriae utilitate tum ad men-  
tem perficiendam, cum ad sanioris Phy-  
sices intellectum in eadem dissertatione  
nihil adjecerim, non est, quod Exteros  
offendat, si ad eorum forte manus Opu-  
sculum istud, studiosæ nostræ Juventuti  
dumtaxat destinatum, pervenerit. Enim-  
verò veritas ista in hac nostra Civitate  
adeo cunctis nota est ac explorata, ut  
nec ipse sexus muliebris, qui dici vix  
potest, quantam disciplinis adipiscendis  
operam impendat, à Geometria studio  
arceri patiatur. Vale.

DIS-



# DISSERTATIO<sup>5</sup> PRÆLIMINARIS.

---

**E**ometria nomine intelligitur pars illa Matheseos, quæ circa extensionem, seu quantitatem continuam occupatur: eaque tale nomen sortita est à Terræ dimensione; quia, si Proclo præstanda fides, ad campos dimetiendo, quorum limites Nili alluvione confundebantur, primum fuit ab Ægyptiis adhibita. Vocatur autem extensum, seu continuum omne id, quod tribus dimensionibus constat, longitudine, latitudine, & profunditate: cujusmodi sunt corpora omnia, quæ in hac rerum universitate existunt; quum nullum eorum sit, quod tribus iis dimensionibus non gaudeat.

Tres istæ dimensiones, ex quibus constat extensio, seu quantitas continua, semper quidem in hoc mundo simul conjunctæ reperiuntur: nec certè res perlustranti occurret ulla, quæ vel unica dumtaxat dimensione, vel etiam duabus tantum sit referta. Interim eo mentis concipiendi modo, quem Scholæ abstractionem appellant, possunt tres illæ dimensiones à se mutuo separari. Atque hac ratione non modò corpora, verum etiam lineas, superficies, & puncta Geometriae considerant.

## DISSERTATIO

Ubi enim à corpore profunditatem separant, id, quod remanet, vocant superficiem, quæ proinde longitudine, & latitudine referata, omnino profunditate caret. Quotiescumque verò a superficie amoveant latitudinem, gradum faciunt ad lineam, quæ idcirco dumtaxat longitudinem habens, caret tam latitudine, quàm profunditate. Denique, quum à linea auferunt longitudinem, & attendunt tantum ad ejus extrema, puncta eis suboriuntur; quorum propterea nulla est pars, nulla dimensio.

Vicissim autem à puncto ad corpus ascendunt in hunc modum. Primò concipiunt, punctum fluere per planum aliquod: & quoniam puncti nulla est pars, nulla dimensio, relinquetur fluxu ipsius in plano vestigium, solam longitudinem habens; atque adeo linea describetur. Deinde lineam istam intelligunt moveri lateraliter: & quia motu isto laterali, accedit ei latitudo, orietur superficies, quæ longitudinem, & latitudinem habet. Denique superficiem istam concipiunt moveri, vel in altum, vel in profundum: & quia hac ratione adjungitur ei altitudo, seu profunditas, nascetur corpus, quod longitudine, latitudine, & profunditate referatur.

Ex quo patet, inanes, & ridiculas esse Scepticorum argutias, dum ipsam Geometriæ certitudinem in dubium revocare conantur ex eo, quod Geometriæ præter corpora supponant dari puncta, lineas, & superficies, quæ nusquam sunt. Neque enim assumptum est unquam a Geometris, ut detur, aut dari possit punctum separatum a linea, linea se-

juu-

## P R Æ L I M I N A R I S. 7

juncta a superficie, & superficies a corpore avulsa. Sed quod supponunt, huc redit, ut tres corporis dimensiones, longitudo, latitudo, & profunditas possint, tum simul, cum separatim considerari: quod extra omnem dubitationis aleam est; nam in dimetiendo intervallo, quo Urbs ab Urbe distat, ipsam tantum viarum longitudinem metimur, nihil omnino solliciti de earumdem latitudine.

Sed deinde etsi puncta, lineæ, & superficies nec existant, nec existere possint à corpore separata, nihil tamen vetat, quominus dicamus, ea omnia verè, ac realiter existere in ipso corpore. Quum enim corpus non sit infinitum, suos habere debet terminos veros, ac reales: qui quidem, quum profunditate careant oportet, habebunt tantum longitudinem, & latitudinem: proindeque non corpora, sed superficies erunt. Et quoniam istarum superficierum unaquæque nec etiam est infinita, sui in ea pariter erunt termini veri, ac reales: qui, quum latitudinis expertes esse debeant, habebunt dumtaxat longitudinem; atque adeo meræ lineæ erunt. Quumque demum quælibet harum linearum finita sit, ei quoque sui competent termini veri, ac reales: quibus quum nec longitudo, nec latitudo, nec profunditas inesse possint, non aliud erunt, quàm puncta.

Hinc itaque perspicuum est, quod etsi puncta, lineæ, & superficies abstractione mentis à Geometris considerentur, in ipso tamen corpore verè, ac realiter existant. Sed exinde liquet etiam, ea omnia existere in corpore, non velut ejus partes physicas, sed

## § DISSERTATIO

tantum ut partes modales, quum suboriatur eorum omnium consideratio non ex ipsa corporis substantia, sed ex eo, quod corpus sit magnitudine finitum, ac terminatum adeo nempe, ut si adesset corpus aliquod omni ex parte infinitum, in eo nec puncta, nec lineæ, nec superficies possent considerari; quam velut undique infinitum nullos terminos, seu fines admittat.

Sed licet puncta, lineæ, & superficies, prout à Geometris considerantur, ad physici corporis compositionem non pertineant, quum solam habeant rationem terminorum; extitere tamen nonnulli, qui vi suæ imaginationis concedentes punctis, lineis, & superficiebus existentiam realem, & omnino distinctam à corporibus, ea omnia ut physicas corporis partes habuere, nec asserere veriti sunt, lineas quidem ex punctis, superficies verò ex lineis, ac denique corpora ex superficiebus proximè coalescere: ea fortasse decepti ratione, quod ipsi etiam Geometræ, ut paulò ante dictum est, ex motu puncti lineam, ex motu lineæ superficiem, & ex motu denique superficiei oriri corpus traderint.

Qui istam opinionem amplectuntur, non possunt in gravissima absurda non impingere. Nam primò, si lineæ constarent ex punctis, sequeretur, lineam majorem quamcunque minorem adæquare. Si enim circa idem centrum duas quascumque circumferentias, seu lineas circulares describamus, & ex centro illo intelligamus ductas ad puncta omnia circumferentia majoris rectas totidem; transibunt rectæ istæ per puncta totidem diversa  
cir-

P R Æ L I M I N A R I S. 9

circumferentiæ minoris. Unde, quum in utraque circumferentia sit idem punctorum numerus, conitabit ex eodem numero partium utraque circumferentia: & propterea, quum earum circumferentiarum inæqualitas nec ex diverso partium numero, nec ex diversa partium mole repeti possit, eas inter se æquales esse oportebit.

Similiter autem, si superficies constarent ex lineis, ostendi posset, superficiem majorem aliam minorem adæquare. Constituantur etenim duo triangula, quorum bases sint æquales, altitudines autem utcumque inæquales. Hæc inter se altitudinum rationem habere, à Geometris demonstratur. Verumtamen, quia quælibet recta, quæ in uno triangulo aptari potest basi æquidistanter, duci etiam potest in altero similiter basi parallela, eadem lineæ, quæ erunt in uno triangulo, reperientur etiam in altero: & propterea, si lineæ forent partes superficieum, conitaret utrumque triangulum eodem numero partium, atque adeo unum alterum adæquaret.

Nec aliter liceret ostendere, solidum majus alterum minus adæquare, si utique solida, seu corpora ex superficiebus coalescerent. Fiant etenim duo coni, quorum bases sint æquales, sed non item altitudines. Jam demonstrant Geometræ, conos istos habere inter se eandem cum suis altitudinibus rationem. Sed quoniam quilibet circulus, qui oritur, secando conum unum plano æquidistante basi, erui quoque potest ex cono altero, cum plano alio similiter secando; iidem circuli, qui erunt in uno cono, reperientur

A 5

etiam

etiam in altero. Quocirca, si superficies essent partes solidorum, constaret uterque conus iisdem omnino partibus; proindeque unus alterum adæquaret.

Ne igitur in hæc labamur absurda, dicendum est, nec lineas ex punctis, nec superficies ex lineis, nec corpora demum ex superficiebus constare. Quod adeo quidem Euclidi innotuit, ut inter axiomata posuerit, quod duæ lineæ non habeant segmentum commune, sed in unico puncto se secent. Neque dicas, in indivisibilium methodo a Cavalerio tradita id velut fundamentum assumi, ut omnis quantitas ex suis indivisibilibus constet; hoc est, ut lineæ quidem ex punctis, superficies verò ex lineis, ac denique corpora ex superficiebus coalescant. Nam in methodi hujus applicatione aliud etiam adhibetur, quod falsum illud assumptum corrigit, ipsamque methodum verissimam reddit.

Ut enim per hanc methodum inter duas lineas, aut duas superficies, vel etiam duo solida æqualitas adstruatur, haud quidem satis est ostendere, in utraque earum quantitarum eadem semper indivisibilia capi posse, sed necesse est ulterius, ut ostendatur, inter ipsa illa indivisibilia adesse quoque eadem intervalla. Indeque est, ut nec inter duas illas circumferentias, nec inter duo illa triangula, nec inter duos illos conos, de quibus modò locuti sumus, æqualitas consistat; quia etsi eadem indivisibilia sumi possint in utraque quantitate, attamen intervalla indivisibilium unius intervallis indivisibilium alterius nequaquam sunt æqualia.

Jam horum intervallorum consideratio,  
quæ

quæ indivisibilium contemplationi superadditur, hypothefim ipsam indivisibilium corrigit, eandemque veritati suæ restituit. Nam semper ac in quantitatuum compositione, non modò ad ea indivisibilia, verum etiam ad eorundem intervalla debeat attendi; vera quantitatuum componentia erunt illa, quæ ex iis indivisibilibus per sua respectivè intervalla latis oriuntur. Quare lineæ, non quidem ex punctis, sed ex aliis lineolis; superficies, non jam ex lineis, sed ex aliis exiguis superficiebus; & corpora demum, non jam ex superficiebus, sed ex aliis corpusculis coalescent.

Hanc autem esse veram harum omnium quantitatuum compositionem, facilè sibi quisque in animum inducet, si sedulò consideret, in omni quantitatuum genere partem debere esse semper ejusdem naturæ cum toto, ad quod refertur. Hinc etenim fit, ut pars corporis debeat esse similiter corpus, pars superficiæ similiter superficies, & pars denique lineæ similiter linea. Quare corpus quidem constabit ex aliis corpusculis, superficies verò coalescet ex aliis exiguis superficiebus, & linea demum ex aliis lineolis componetur.

Nec ad rem facit, quod ipsi etiam Geometræ accipiant puncta in lineis, lineas in superficiebus, & superficies in corporibus. Hinc enim non sequitur, lineas ex punctis, superficies ex lineis, & corpora ex superficiebus constare. Nam in lineis accipiunt Geometræ puncta illa, quæ velut termini referuntur ad eas lineolas, ex quibus lineæ componuntur. Quare adsunt quidem puncta

A 6

per

12      D I S S E R T A T I O  
per totam cujusque lineæ longitudinem, sed  
linea ipsa ex punctis nequaquam composita  
erit. Et par est ratio de superficie relatè ad  
lineas, nec non de corpore relatè ad super-  
ficies.

Verfatur itaque Geometria circa lineas,  
superficies, & corpora, nec aliud in iis con-  
siderat, quàm magnitudinem, seu quantita-  
tem. Propositum est autem Geometris, nihil  
prorsus asserere, cui possit contradici. Quem  
in finem omnes suas propositiones ex certis,  
indubitatisque principiis deducunt. Princi-  
pia ista sunt triplicis generis: nempe defini-  
tiones, postulata, & axiomata. Definitiones  
sunt explicationes terminorum, quibus utun-  
tur. Postulata autem, & axiomata sunt pro-  
positiones, in quibus nihil, quod difficulta-  
tem faciat, reperitur; & distinguuntur à se  
mutuò perinde, ac problemata, & theoremata  
à se invicem differunt.

Hinc, ut rectius discrimen intelligatur;  
quod inest inter postulata, & axiomata, scien-  
dum est prius, propositiones illas, quas ex  
principiis antea positis colligunt Geometræ,  
esse duplicis speciei. Quædam etenim quid-  
piam faciendum docent, & dicuntur proble-  
mata; quædam verò quidpiam nobis osten-  
dunt, & theoremata appellantur. Hæc au-  
tem differentia deprehenditur etiam inter  
eas propositiones, in quibus nihil occurrit,  
quod difficultatem faciat, quæque velut prin-  
cipia indubitata ponuntur. Sed ut diversis  
nominibus distinguerentur, eæ, quæ opus re-  
spiciunt, dicuntur postulata; illæ verò, quæ  
veritatem aliquam continent, axiomata vo-  
cantur.

Ex



Ex quo patet, postulatum non aliud esse, quàm problema facile; pariterque axioma non aliud, quàm facile theorema. Jam, ut aliquod problema possit velut postulatum assumi, debet esse adeo facile, ut id, quod in problemate quæritur, unico mentis conceptu possit absolvi. Sic, à puncto ad punctum rectam lineam ducere, est problema, quod ultro velut postulatum habendum; quia ut id perficiatur, satis est concipere, ut unum punctum directè fluat versus aliud. Et similiter, rectam lineam terminatam in directum, & continuum protendere, est problema, quod à postulati natura non excidit; quia ut illud fiat, non aliud concipi debet, quàm ut punctum, quod fluxu suo datam rectam lineam describit, directè fluere pergat.

Præter duo ista postulata, aliud etiam apud Euclidem reperitur; nempe quovis centro, & quovis intervallo circulum describere. Interim de sensu ejus non satis conveniunt Geometræ. Quidam etenim adeo latè illud assumunt, ut etiamsi intervallum non sit prope centrum, adhuc tamen possit vi ejus postulati circulus describi. Alii vero paulò strictiùs illud accipiunt; scilicet, ut tunc demum liceat, dato centro, datoque intervallo circulum describere, quum datum centrum est in extremitate una dati intervalli.

Quin secundo hoc sensu tale postulatum Euclides admiserit, non est dubitandum; quia aliter frustra posuisset inter problemata propositiones illas; ad datum punctum datæ rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere; datis duabus rectis lineis inæqualibus, de maiore minori partem æqualem abscindere: ut  
quæ

quæ in illo postulato continerentur. Sed num possit etiam admitti priore sensu, id ex tradita postulati natura dijudicandum. Itaque quia in illo sensu duo concipi debent; primum, ut intervallum transferatur prope centrum; & deinde, ut circa idem centrum revolvatur: dicendum est, excidere a natura postulati, quod unicum mentis conceptum debet involvere.

Quod autem illud tantum problema velut postulatum haberi debeat, cui ut satisfiat, unicus mentis conceptus exigitur; id extra omnem dubitationis aleam esse videtur. Nam semper ac in constructione alicujus problematis plura a nobis concipi debent, facile fieri potest, ut pluralitate eorum conceptuum mens distrahatur, nec satis attendat, num plura illa, quæ concipi debent, pugnent inter se. Quare, ut omnis errandi suspicio arceatur, necesse est ostendere, posse inter se mutuo convenire ea omnia, quæ ad ejus problematis constructionem concipi debent: proindeque tale problema velut postulatum haberi non poterit.

Quantum ad axiomata, sciendum est, illud tantum theorema poni posse velut axioma, cujus veritas a nemine sanæ mentis in dubium vertitur; quodque proinde demonstratione ulla non eget. Id autem contingit, quum connexio idearum subjecti, & attributi innotescit nobis sola earum idearum consideratione, absque eo, quod idæ aliæ in subsidium advocentur. Nam semper, ac constat nobis ideam attributi contineri in idea subjecti sine subsidio alterius idæ, sed iis solis inspectis; nulla equidem adhibenda demonstratio,

tio,

tio, ut quæ non aliud præstat, quam aliis in subsidium accersitis ideis connexionem idearum subjecti, & attributi in propatulo ponere.

Sed quod vulgò dici solet, axiomata demonstratione non indigere, id non ita intelligendum est, quasi omnis ratiocinatio procul ab axiomatibus esse debeat. Sunt enim nonnulla axiomata, quæ explicari debent, ut melius intelligantur. At hæc explicatio naturam eorum axiomatum non evertit; quum non sit eorum demonstratio, sed tantum expositio clarior eorundem aliis, uberioribusque verbis concepta. Id cernere licet in illo axioma, quod enunciat, æqualia esse, quæ inter se mutuò congruunt. Neque enim hoc axioma rectè intelligi potest, nisi prius explicetur, quæ dicantur congruere inter se.

Notetur etiam hoc loco velim, fieri facile posse, ut aliquod theorema, quod uno loco positum sua eget demonstratione, si loco alio ponatur, ex se sit evidens, ac apertum, atque adeo velut merum axioma possit admitti. Tale est Euclidis axioma decimum tertium: si in duas rectas lineas tertia incidat recta linea, & efficiat angulos internos ad eandem partem duobus rectis minores; duæ illæ rectæ lineæ non erunt parallelæ, sed convenient versus eam partem, in qua anguli duobus rectis minores sunt. Nam istud axioma non quidem in principio poni debet, sed meretur locum suum post propositionem vicesimam octavam libri primi; quum eo in loco omnem suam evidentiam, ac certitudinem nanciscatur.

Hujus igitur indolis sunt principia, ex quibus

bus Geometrae omnes suas deducunt propositiones, sive sint problemata, sive theorematata. Jam quantum ad problemata, sciendum est in quolibet ipsorum, praeter id, quod quaeritur, contineri etiam quasdam conditiones, quibus quaesitum ipsum determinatur: ex quo fit, ut in omni problemate duo sedulo sint distinguenda, nempe datum, & quaesitum. Sic in primo problemate, quod in data recta linea terminata triangulum aequilaterum faciendum proponit, datum quidem est ipsa recta linea terminata, quaesitum vero est triangulum aequilaterum in ea describendum. Atque ita quoque in secundo problemate, ubi ad datum punctum datae rectae lineae aequalem rectam lineam oportet applicare; data quidem sunt duo, scilicet punctum, & recta linea, quaesitum vero est, ut ad datum punctum ponatur recta, quae alteri datae sit aequalis.

Et puncta quidem, velut omnis magnitudinis expertia, non aliter, quam positione, dari possunt; sed lineae, superficies, & corpora dari queunt non modo positione, verum etiam magnitudine. Sic in quinto problemate, in quo data recta linea terminata bifariam proponitur dividenda, recta illa linea terminata magnitudine datur. Vicissim autem in sexto problemate, ubi ex puncto in recta linea dato oportet perpendicularem ad rectam illam erigere, datur positione, tam punctum in recta linea, quam ipsa recta, cui perpendicularis ex puncto illo est erigenda.

Datum autem problematis quandoque determinat id, quod in problemate quaeritur, interdum vero illud indeterminatum relinquit:

quit: indeque oritur vulgata problematum distinctio in determinata, & indeterminata. Sic problema, quod dato triangulo æquale parallelogrammum faciendum proponit in dato angulo rectilineo, indeterminatum est; quia per duo illa data problematis quæsitum parallelogrammum nequaquam determinatur, sed possunt infinita exhiberi, quæ iisdem datis respondeant. Vicissim verò, quum ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum oportet applicare in dato angulo rectilineo, problema determinatum est, quia tribus iis datis determinatur parallelogrammum, quod quæritur.

Ne autem quisquam decipiatur, notetur hic velim, quod ut problema dicatur determinatum, haud quidem opus sit, unicam tantum solutionem habere. Fieri enim potest, ut problema sit determinatum, & tamen ut duas, pluresve solutiones admittat: quod quidem contingit, quum aliquod ex datis varios casus suscipere potest. Sic problema de describenda circuli portione super data recta linea, quæ suscipiat angulum æqualem dato angulo rectilineo, determinatum quidem est. Sed nihilominus, quia angulus datus potest esse, vel rectus, vel acutus, vel obtusus; hinc est, ut ob tres hosce casus, tres quoque problematis ejus solutiones afferantur. Atque ita quoque, quum data circuli portione, inveniendum est centrum ejus, problema tamen si determinatum tribus solutionibus gaudet: quia nempe data circuli portio potest esse, vel æqualis, vel minor, vel major semicirculo.

**Itaque tunc demum problema dici debet, inde-**

indeterminatum, quum defectu alicujus conditionis id, quod in problemate quaeritur, infinitis planè modis potest exhiberi. Sed fieri quoque potest, ut problema sit plusquam determinatum: nempe si plures habeat condiciones appositas, quàm quæ ad quaesiti determinationem requiruntur. Atque hoc casu problema dicetur impossibile, si superfluae condiciones pugnent cum necessariis; dicetur verò redundans, si vicissim cum iis conveniant. Sic problema de constituendo triangulo æquilatero in data recta linea, cujus omnes anguli sint æquales, redundans dicendum esset; quia æqualitas angulorum pro trianguli æquilateri constitutione est quidem conditio superflua, sed non pugnat cum natura ejus trianguli. Per contrarium autem, si triangulum æquilaterum constituendum deberet habere duos, aut omnes angulos inæquales, problema foret impossibile; quia inæqualitas ista pugnat cum natura trianguli æquilateri.

Quantum ad theoremata, in iis quoque duo sunt sedulò distinguenda; scilicet hypothesis, & conclusio. Hypothesis est id, quod in theoremate assumitur, seu supponitur. Conclusio autem est id, quod ex suppositione, seu assumpto deducitur. Sic, quod duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, itemque æquales angulos sub æqualibus lateribus contentos; id in primo theoremate horum Elementorum hypothesis quidem est. Quod autem sit basis basi æqualis, triangulum æquale triangulo, & reliqui anguli unius æquales reliquis angulis alterius, alter alteri, quibus æqualia latera sub-

subtenduntur; id quum ex hypothefi illa confequatur, pro conclufione ejus theorematis haberi debet.

Quum theoremata conditionali particula funt concepta, facile erit in iis tum hypothefim, cum conclufionem diftinguere. Sic in tertio theoremate horum Elementorum nemo non videt, hypothefim efle, quod triangulum habeat duos angulos æquales; conclufionem verò, quòd æqualia fint latera, angulos illos subtendentia. Veruntamen, quum theoremata abfolutè propofita funt, tunc facile erit, ut in diftinguenda hypothefi hæreant Tyrones. Sic quum oftendit Euclides, angulos ad bafim trianguli ifofcelis æquales efle inter fe; nulli quoque non conftat, hypothefim hujus theorematis efle, quòd triangulum fit ifofceles. Sed in eo theoremate, in quo idem Euclides oftendit, angulos omnes cujuscumque trianguli fimul efle duobus reftis æquales, quid pro hypothefi haberi debeat, non omnes peræquè percipiunt.

Jam omnis difficultas in diftinguenda hypothefi theorematis abfolutè propofiti oritur ex eo, quod fubjectum ejus non femper eft complexum, hoc eft duobus, aut pluribus terminis circumfcriptum, fed quandoque incomplexum, ac unico tantum termino definitum. Neque enim aliunde evenit, ut in theoremate proprietatem trianguli ifofcelis oftendente, hypothefim quisque diftinguat; quàm quia fubjectum illius theorematis eft triangulum ifofceles, quod duobus terminis designatur; atque adeo nemo non videt poffe idem theoremata conditionali particula in hunc modum efferri: fi triangulum fit ifofceles,

les, erunt anguli ad basim æquales. Neque etiam alia de causa accidit, ut in altero theoremate, quod ostendit æqualitatem angulorum cujuscumque trianguli duobus rectis; non ita facile sit hypothese[m] discernere, quàm quia ejus subjectum est triangulum, quod unico tantum termino exprimitur, nec apparet, quo pacto tale theoremata possit conditionaliter concipi.

Id quum ita sit, licebit in unoquoque theoremate hypothese[m] nullo negotio distinguere, si subjectum ex incompleto fieri possit complexum. Fiet id autem, si loco termini, subjectum exprimentis, substituamus definitionem suam plures semper terminos involventem. Qua ratione in eo theoremate, in quo ostendit Euclides, omnes angulos cujuscumque trianguli simul duos rectos adæquare, cognoscetur hypothesis, si loco trianguli definitionem suam, hoc est figuram tribus lateribus contentam, subrogemus. Sic enim perspicuum est, subjectum theorematis evadere complexum, ipsumque adeo theoremata posse conditionali particula in hunc modum concipi: si figura tribus lateribus sit contenta, erunt ejus anguli omnes simul duobus rectis æquales.

Theorema porro, vel est simplex, vel compositum. Simplex dicitur theoremata, quum vel unica res in theoremate demonstratur, vel plures illæ, quæ ostenduntur, ex una eademque hypothesi descendunt. Sic simplex est, tum illud theoremata; si trianguli duo anguli æquales fuerint, & latera angulos illos subtendentia pariter æqualia erunt; cum hoc aliud: si in duas rectas parallelas tertia incidat

dat



dat recta linea, hæc efficiet, & angulos alternos æquales, & exteriorem æqualem interiori, & opposito ad eandem partem, & internos ad eandem partem duobus rectis æquales. Nam in illo unica tantum res demonstratur; in isto autem ostenduntur quidem res plures, sed omnes ex una eademque hypothese deducuntur.

Vicissim autem vocatur theorema compositum, quum plura illa, quæ in eo ostenduntur, non descendunt ex una, eademque hypothese; cuiusmodi est illud; si quatuor magnitudines proportionales fuerint, prima, & secunda erunt vel una æquales, vel una maiores, vel una minores tertia, & quarta. Patet namque, conclusionem illius theorematris tripartitam esse, ut quæ asserit secundam magnitudinem posse, vel quartam adæquare, vel eam excedere, vel ab illa deficere. Sed perspicuum est quoque, tres illas Conclusionis partes ex una, eademque hypothese non fluere. Nam etsi in singulis partibus quatuor magnitudines semper proportionales supponantur; prima tamen magnitudo respectu tertiæ non semper ponitur in eodem statu manere, sed modò fingitur illam adæquare, modò eam excedere, modò demum ab illa deficere.

Sed simplex theorema subdividitur rursus in complexum, & incomplexum. Vocatur theorema incomplexum, quum unicam rem continet, tum ejus hypothesis, cum ejusdem conclusio; veluti est illud theorema, quod ostendit, duo latera cujuscumque trianguli simul reliquo majora esse, quomodocumque sumpta. Per contrarium verò vocatur complexum, quum vel sola hypothesis, vel sola

CON-

conclusio, vel denique tam hypothesis, quàm conclusio res plures involvit: adeo nempe ut theorema dicendum erit complexum, vel ratione solius hypothesis, vel ratione solius conclusionis, vel demum ratione tam hypothesis, quàm conclusionis.

Et ratione quidem solius hypothesis complexa sunt omnia illa theoremata, quæ ostendunt æqualitatem parallelogrammorum, & triangulorum, eandem vel æquales bases habentium, & in iisdem parallelis positorum. Ratione autem solius conclusionis complexum est illud, quod ostendit æquales angulos tam supra, quàm infra basim isoscelium triangulorum. Ac denique ratione tam hypothesis, quàm conclusionis complexum est primum theorema horum Elementorum; si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & angulos sub æqualibus lateribus contentos pariter æquales; habebunt & basim basi æqualem, erit triangulum æquale triangulo, & erunt reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur.

Ulterius circa theoremata notare etiam oportet, quòd quum duo ex iis ejusmodi sunt, ut hypothesis unius sit conclusio alterius, & vicissim conclusio unius sit hypothesis alterius, tunc duo illa theoremata se mutud convertere dicantur. Sic, quum ostenditur, in omni triangulo majus latus majorem angulum subtendere; hypothesis quidem est, quod unum trianguli latus sit altero majus; conclusio autem, quod majori lateri major quoque angulus oppo-

opponatur. At verò, quum demonstratur, in omni triangulo majorem angulum majus latus subtendere; tunc hypothesis est, quod unus angulus trianguli sit altero major; conclusio autem, quod majori angulo majus quoque latus sit oppositum. Quocirca, quum duo ista theoremata talia sint, ut hypothesis unius sit conclusio alterius; & per contrarium conclusio unius sit hypothesis alterius; alterum alterius conversum appellabitur.

Sed præter istam conversionis speciem, in qua theoremata hypotheses, & conclusiones suas perfectè convertunt, alia quoque notari potest, in qua conclusio, quæ integra in hypothesis vertitur, aliquid retinet prioris hypothesis, & tantum id, quod relinquitur, conversi theorematis conclusio evadit. Id cernere licet in eo theoremate, in quo Euclides ostendit, triangula æqualia, & in eadem basi constituta, esse etiam in iisdem parallelis. Neque enim hoc theoremata perfectè convertit illud, in quo idem Euclides ostenderat, æqualia esse triangula illa, quæ sunt in eadem base, & in iisdem parallelis; sed adsciscens ejus conclusionem, quod triangula sint æqualia, retinet adhuc eam partem hypothesis, quod triangula habeant eandem basem, tantumque infert partem alteram, quod eadem triangula debeant esse in iisdem parallelis.

Perpicuum est autem, hanc aliam conversionis speciem, quam imperfectam licebit appellare, non posse locum habere, nisi theoremata saltem ratione hypothesis sit comple-

plexum. Sed manifestum est quoque, quod quum sic theorematum convertuntur, possint unius ejusdemque theorematis plures esse conversiones. Sic theorema, quod perpendicularis ex extremitate diametri ducta circulum contingat, non modò convertitur per illud, quod diameter, ducta ad punctum contactus, sit perpendicularis ad tangentem, verum etiam per hoc aliud, quod perpendicularis, erecta ad contingentem ex puncto contactus, sit circuli diameter.

Problemata quoque suas conversiones patiuntur; quod quidem contingit, quotiescunque datum alicujus problematis mutatur in quæsitum, & vicissim quæsitum mutatur in datum. Hujusmodi sunt duo illa problemata, in quorum altero describenda est in data recta linea circuli portio, quæ suscipiat angulum, æqualem angulo dato; in altero abscindenda ex dato circulo portio, quæ angulum, dato angulo æqualem, assumat. In illo enim quæritur circulus, in quo si data recta ponatur, abscindat ex eo portionem, quæ suscipiat angulum, æqualem angulo dato. In isto autem quæritur per contrarium recta, quæ posita in dato circulo, abscindat ex eo portionem, quæ dati anguli sit capax.

Tam constructiones problematum, quàm theorematum conclusiones ex principiis antea positis per suas demonstrationes Geometræ deducunt. Est autem demonstratio duplicis speciei, una quidem directa, seu positiva, altera indirecta, seu negativa. Vocatur demonstratio directa, seu positiva, quum quid ostenditur per ipsa rei principia, hoc est

est quum inter demonstrandum tales adhibentur propositiones, ut ex iis directè fluat id, quod oportet ostendere. Vocatur verò demonstratio indirecta, seu negativa, aut etiam per impossibile, quum demonstratur per aliquod inde subsequutum absurdum, si res aliter sese haberet.

Utraque demonstrationis species in his Geometriæ planæ Elementis adhibetur: Sic, quum ostendimus: isoscelium triangulorum angulos tum supra, cum infra basim æquales esse inter se, demonstratione utimur directâ, ac positiva; quandoquidem ex iis triangulorum comparationibus, quas inter demonstrandum instituimus, proprietatem illam isoscelium triangulorum directè deducimus. At ubi per contrarium ostendimus, quod si trianguli duo anguli æquales fuerint inter se, & latera angulos illos subtendentia pariter æqualia sint, demonstrationem adhibemus indirectam, ac negativam; quum ostendamus, fore totum suæ parti æquale, si utique latera non essent æqualia.

Innititur autem demonstratio indirecta, ac negativa huic quidem principio, quod etsi ex hypothese falsa possit quandoque colligi verum, ex hypothese tamen vera nunquam falsum possit inferri. Hinc enim fit, ut semper ac quidpiam supponitur, & ex ea suppositione absurdum aliquod infertur, ipsam illam suppositionem falsam esse dicendum sit. Non posse autem ex hypothese vera unquam falsum inferri, nemo non videt. Neque enim aliter esse possunt vitiosæ demonstrationes, hoc est consequentium ex antecedentibus deductiones, quàm quia, vel

B

ante-

antecedentia seorsim considerata vera non sunt, vel consequentia non sunt legitime ex antecedentibus deducta. Quocirca semper ac ex aliqua hypothesis legitime quidpiam deducitur; hoc quod infertur, non alia ratione falsum esse poterit, quam si ipsa hypothesis sit falsa.



# GEOMETRIÆ PLANÆ

# ELEMENTORUM

## LIBER PRIMUS.

### DEFINITIONES.

#### I.

**P**unctum est id, cujus nulla est pars, seu quod magnitudinem nullam habet. *Vel clarius, est signum in extensione, seu quantitate continua, quod concipitur expers longitudinis, latitudinis, & profunditatis.*

#### II.

Linea verò est longitudo latitudinis expers. *Sive etiam, est quantitas, quæ longitudinem, seu unam tantum dimensionem habere concipitur. Unde ex fluxu puncti vulgò dicitur oriri.*

#### III.

Lineæ fines sunt puncta. *Nam non modò latitudine, & profunditate, ad instar ipsius lineæ, verum etiam longitudine carent. Unde punctum definiri quoque potest, terminus lineæ.*

#### IV.

Superficies autem est id, quod longitudinem, & latitudinem tantum habet. *Sive*

A 2

etiam,

etiam est quantitas, quæ duas tantum dimensiones, longitudinem, & latitudinem, habere concipitur. Unde ex motu lineæ laterali vulgè dicitur oriri.

## V.

Superficiæ verò fines sunt lineæ. Nam longitudinem, seu unicam tantum dimensionem habentes, tum latitudine, cum profunditate carent. Unde lineæ definiri quoque potest, terminus superficiæ.

Ceterum quantitas, in qua omnes tres dimensiones considerantur, corpus, seu solidum appellatur; & generari intelligitur ex motu superficiæ vel in altum, vel in profundum. Quumque quantitas ista superficiibus terminetur; fit hinc, ut definiri quoque possit superficies, terminus corporis.

Linea duplex est, una recta, & altera curva.

## VI.

Linea recta est, quæ ex æquali suis interficitur punctis. Hoc est, quæ ex æquo jacet inter sua extrema, ita ut ad neutram partem annuat. Unde lineæ curva erit illa, quæ inter sua puncta, seu extrema, ex æquo non jacet.

Linea recta definiri quoque potest cum Archimede, quod sit brevissima omnium linearum, quæ duci possunt à puncto ad punctum. Atque hac ratione, quæ earum linearum brevissima non est, lineæ curva dicetur.

Similiter superficies duplex est, una plana, seu recta, & altera curva.

## VII.

Superficies plana est, quæ ex æquali suis interjicitur lineis. Hoc est, quæ ex æquo jacet inter sua extrema, ita ut nec sursum ascendat, nec descendat deorsum. Unde superficies

cur-



*curva erit illa, quæ inter suas lineas ex æqua non jacet.*

*Superficies plana definiri quoque potest cum Herone, quod sit illa, cui omni ex parte potest aptari recta linea. Atque hac ratione ea, cui non omni ex parte aptari potest recta linea, superficies curva dicetur.*

*Angulus planus est duarum linearum in plano [ hoc est in superficie plana ] se mutuo tangentium, & non in directum jacentium, alterius ad alteram inclinatio. Unde ejus quantitas, seu magnitudo, non in longitudine, sed inclinatione linearum consistit.*

*Dividitur angulus ratione linearum, quæ ipsum continent, in rectilineum, curvilineum, & mixtilineum.*

## IX.

*Quando lineæ, quæ angulum continent, rectæ fuerint, rectilineus ille angulus dicetur. Quum verò fuerint curvæ, dicetur curvilineus. Et denique, quum sub una recta, & altera curva continetur, mixtilineus appellabitur.*

*Angulus rectilineus ratione inclinationis dividitur in rectum, acutum, & obtusum.*

## X.

*Quum recta linea super aliam insistens rectam lineam efficit angulos deinceps [ hoc est hinc inde existentes ] æquales; rectus erit uterque æqualium angulorum; & linea insistens dicetur perpendicularis ad eam, cui insistit. Unde definiri potest angulus rectus, quod sit ille, cui, uno latere producto, alter æqualis ex parte altera oritur.*

## XI.

*Angulus acutus est recto minor. Sive*

B 3

*etiam,*

*etiam, cui, si unum latus produxeris, alter oritur ex parte altera major.*

## XII.

*Angulus obtusus est recto major. Sive etiam, cui, uno latere producto, alter nascitur ex parte altera minor.*

## XIII.

*Terminus est, quod alicujus est extremum. Sic punctum est terminus lineæ; lineæ est terminus superficiei; superficies verò est terminus corporis.*

## XIV.

*Figura est, quæ sub aliquo, vel aliquibus terminis comprehenditur. Sive clarius, est superficies uno, vel pluribus terminis comprehensa.*

## XV.

*Circulus est figura plana unius lineæ circuitu comprehensa, quæ circumferentia dicitur, ad quam omnes ab uno punctorum intra figuram existentium cadentes rectæ lineæ inter se sunt æquales.*

## XVI.

*Hoc verò punctum centrum circuli dicitur. Unde circuli proprietas hæc est, ut æquales sint omnes rectæ lineæ, quæ ducuntur à centro ad circumferentiam.*

*Circulus generari intelligitur ex revolutione rectæ lineæ circa unum ejus extremum fixum, & immobile, usque donec redeat ad eum locum, unde cæperat moveri.*

*Cujuscumque circuli circumferentia dividitur in tercentum sexaginta partes æquales, quæ gradus dicuntur. Unusquisque gradus in sexaginta minuta prima. Unumquodque minutum primum in sexaginta minuta secunda. Atque ita deinceps.*

## XVII.

## XVII.

Diameter circuli est recta linea, quæ ducta per centrum, utrimque ad circumferentiam terminatur. Dicitur autem diameter, quia transit per medium circuli, eumque secat in duas partes æquales. Hinc.

## XVIII.

Semicirculus est figura plana contenta sub diametro, & dimidia circuli circumferentia.

## XIX.

Portio, seu segmentum circuli est figura plana contenta sub qualibet alia recta linea, intra circulum ducta, & portione circumferentiæ, per eam abscissa.

Generaliter autem figuræ omnes ratione linearum, quibus continentur, dividuntur in rectilneas, curvilineas, & mixtilneas.

## XX.

Rectilineæ figuræ sunt, quæ sub rectis lineis continentur. Quæ ratione curvilineæ erunt, quæ comprehenduntur sub lineis curvis. Mixtilineæ verò, quæ rectis, & curvis clauduntur.

Insuper rectilineæ figuræ pro numero laterum, quibus continentur, dividuntur in trilateras, quadrilateras, & multilateras.

## XXI.

Trilateræ sunt, quæ sub tribus lateribus continentur; quæque, quum tres angulos pariter contineant, dici possunt quoque triangula.

## XXII.

Quadrilateræ verò, quæ quatuor lateribus clauduntur; quæque dici possunt etiam quadrangula, quia quatuor angulis sunt referta.

## A 4

## XXIII.

Ac denique multilateræ, quæ sub pluribus, quàm quatuor, lateribus comprehenduntur; quæque dici possunt quoque multangula, quia plures, quàm quatuor, angulos habent.

Triangulum porro considerari potest vel quo ad latera, vel quo ad angulos. Ratione laterum dividitur in æquilaterum, isosceles, & scalenum.

## XXIV.

Triangulum æquilaterum est illud, cujus omnia latera sunt æqualia.

## XXV.

Triangulum isosceles, seu æquicrurum, cujus duo tantum latera sunt æqualia.

## XXVI.

Ac denique triangulum scalenum, quod omnia latera inæqualia habet.

Ratione autem angulorum dividitur triangulum in rectangulum, obtusangulum, & acutangulum.

## XXVII.

Triangulum rectangulum, seu orthogonium, est illud, quod habet unum angulum rectum.

## XXVIII.

Triangulum obtusangulum, seu amblygonium, quod habet unum angulum obtusum.

## XXIX.

Ac denique triangulum acutangulum, seu oxygonium, cujus omnes anguli sunt acuti.

Quantum ad figuras quadrilateras, eæ multiplicis etiam speciei sunt, quas sequenti ordine recenset Euclides.

## XXX.

## XXX.

Quadratum est figura quadrilatera, reſtan-  
gula ſimul, & æquilatera. Hoc eſt, quæ la-  
tera omnia æqualia habet, & omnes angulos  
reſtos.

## XXXI.

Quæ autem reſtangula quidem eſt, ſed  
non æquilatera, [*hoc eſt angulos habet reſtos,*  
*ſed non latera æqualia*] figura altera parte  
longior appellatur.

## XXXII.

Rhombus porro eſt figura æquilatera, ſed  
non reſtangula. Hoc eſt habet latera omnia  
æqualia, ſed non item angulos reſtos.

## XXXIII.

Quæ verò nec æquilatera eſt, nec reſtan-  
gula, ſed tantum habet latera oppoſita æqua-  
lia, Rhomboides appellatur.

## XXXIV.

Omnis autem alia figura quadrilatera, quæ  
ad quatuor ſpecies recensitas non refertur,  
Trapetium dicitur.

## XXXV.

Parallelæ, ſeu æquidistantes reſtæ lineæ  
ſunt, quæ in eodem plano exiſtentes, &  
in infinitum utrimque productæ, in neu-  
tram partem conveniunt.

Hec definitio parallelarum, ubi lineæ ſunt  
reſtæ, nullo vitio laborat; ſecus verò, ſi ad  
omnes lineas ſit extendenda, quia dantur  
quæ plurimæ lineæ, quæ exiſtentes in eodem  
plano, accedunt ſemper ad ſe mutuo, nec um-  
quam conveniunt.

## XXXVI.

Parallelogrammum eſt figura quadrilatera,  
cujus bina oppoſita latera ſunt parallela.  
Ejus autem ſpecies ſunt quadratum, figura

B S

alto

*altera parte longior, rhombus, & rhomboides.*

*Hinc figurarum quadrilaterarum duo sunt summa genera, parallelogrammum & trapezium. Nam vel habent latera opposita parallela, & dicuntur parallelogramma; vel non habent, & trapezia appellantur.*

*Parallelogrammi porro vel omnia latera sunt equalia, vel tantum opposita. Si primum; vel est rectangulum, & dicitur quadratum; vel non est rectangulum, & vocatur rhombus. Si secundum; similiter vel ejus anguli omnes sunt recti, & dicitur figura altera parte longior; vel non sunt recti, & rhomboides appellatur.*

## POSTULATA.

### I.

**A** Puncto ad punctum rectam lineam ducere. Perficitur in praxi hoc postulatum ope regula, una sui parte iis punctis applicanda.

### II.

Rectam lineam terminatam in directum, & continuum protendere. Quod ope ejusdem regula, una sui parte ad datam rectam lineam applicata, in praxi peragitur.

### III.

Quovis centro, & quovis intervallo circulum describere. Quod perficitur in praxi ope circini, cujus pes alter ponitur in centro, alter in extremo altero dati intervalli, & fixo illo manente, iste in gyrum agitur.

## AXIOMATA.

### I.

**Q**Uæ eidem sunt æqualia, inter se sunt æqualia. Et quod uno æqualium majus  
jus

ius est, aut minus, erit etiam majus, aut minus altero æqualium.

II.

Si æqualibus æqualia addas, quæ fiunt sunt æqualia.

III.

Si ab æqualibus æqualia demas, quæ remanent sunt æqualia.

IV.

Si inæqualibus æqualia addas, quæ fiunt sunt etiam inæqualia.

V.

Si ab inæqualibus æqualia demas, quæ remanent sunt adhuc inæqualia.

VI.

Quæ ejusdem sunt dupla, tripla, aut quadrupla, inter se sunt æqualia.

VII.

Quæ ejusdem sunt dimidia, tertia, aut quarta pars, inter se sunt æqualia.

VIII.

Totum sua parte majus est; omnibus autem suis partibus simul sumptis est æquale.

IX.

Quæ congruunt, sunt æqualia. Congruere autem dicuntur, quorum unum alteri superimpositum, nec illud excedit, nec ab eo deficit.

X.

Duæ rectæ lineæ spatium non comprehendunt. Unde figura rectilinea omnium simplicissima triangulum est.

XI.

Duæ lineæ non habent segmentum commune, sed unico puncto se secant. Hoc est, ubi duarum linearum fit intersectio, ibi li-

A 6

nee


*nec ipsæ nihil habent commune, præter punctum.*

## XII.

*Omnes anguli recti sunt æquales; quia nempe anguli magnitudo consistit non in longitudine, sed in inclinatione linearum, quæ est eadem in omnibus angulis rectis.*

## PROP. I. PROBL. I.

*In data recta linea terminata triangulum æquilaterum constituere.*



Sit data recta linea terminata AB. Oportet, in ipsa triangulum æquilaterum constituere.

Centro quidem A, intervallo autem AB describatur [1] circulus BCD. Rursus centro quidem B, intervallo autem BA describatur alter circulus ACE. Tum ex puncto C, in quo se secant circumferentiæ horum circulorum, ad puncta A, & B ducantur [2] rectæ CA, CB. Dico, triangulum ACB æquilaterum esse.

Quoniam enim A centrum est circuli BCD, erit [3] AB æquali AC. Et similiter, quoniam B centrum est circuli ACE, erit BA æqualis BC. Eidem itaque AB est æqualis, tum AC, cum BC. Quare & AC ipsi BC [4] æqualis erit; atque aded triangulum ACB [5] æquilaterum erit.

In

(1) Post. 3.

(2) Post. 1.

(3) Def. 15.

(4) Axi. 1.

(5) Def. 24.



In data igitur recta linea terminata  $AB$  descriptum est triangulum æquilaterum  $ACB$ . Quod fecisse oportebat.

## S C H O L I U M.

Non dissimili ratione in data recta terminata  $AB$  fiet triangulum isosceles, seu æquiterre: nempe si intervalla equalium circulorum sumantur vel æquè majora, vel æquè minora, quàm  $AB$ .

## PROP. II. PROBL. II.

Ad datum punctum datæ rectæ lineæ æqualem rectam lineam ponere.



Datum sit punctum  $A$ , data verò recta  $BC$ . Oportet, ad datum punctum  $A$  ponere rectam lineam æqualem ipsi  $BC$ .

Ab  $A$  ad  $B$  ducatur (1)  $AB$ , super qua constituitur [2] triangu-

lum æquilaterum  $ADB$ ; cujus latera  $DA$ ,  $DB$  (3) protrahantur in directum versus  $E$ , &  $F$ . Tum centro  $B$ , intervallo  $BC$  describatur, [4] circulus  $CGH$ . Denique centro  $D$ , intervallo  $DG$  describatur alter circulus  $GLK$ , Dico, rectam  $AL$  æqualem esse ipsi  $BC$ .

Quoniam enim  $D$  centrum est circuli  $GLK$  erit

[1] Post. 1.

[2] Prop. 1.

(3) Post. 2.

(4) Post. 3.

erit (1)  $DG$  æqualis  $DL$ . Sed, ob triangulum æquilaterum  $ADB$ , est etiam  $DB$  æqualis  $DA$ . Itaque si ex  $DG$  auferatur  $DB$ , & ex  $DL$  auferatur  $DA$  remanebit [2]  $BG$  æqualis  $AL$ ; Est autem  $B$  centrum circuli  $CGH$ ; adedque (3)  $BG$  æqualis est ipsi  $BC$ . Quare &  $AL$  [4] eidem  $BC$  æqualis erit.


Ad datum igitur punctum  $A$  posita est recta  $AL$  æqualis datæ  $BC$ . Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

Nonnulli problemati huic satisfieri posse sibi persuadent, si per postulatum tertium centro  $A$ , intervallo datæ rectæ  $BC$  circulus describatur. Sed perperam; quia tunc demum quovis centro, & quovis intervallo circulum describere licet, quum centrum est in una extremitate intervalli.

## PROP. III. PROBL. III.

Datis duabus rectis lineis inæqualibus, de majore minori partem æqualem abscindere.



Datae sint duæ rectæ inæquales,  $AB$  quidem major,  $CD$  verò minor. Oportet, ex majore  $AB$  abscindere portionem æqualem minori  $CD$ .

Po-

(1) Def. 15.

(2) Axi. 3.

(3) Def. 15.

[4] Axi. 1.

Ponatur (1) ad punctum  $A$  recta  $AE$  æqualis ipsi  $CD$ . Tum centro  $A$ , intervallo  $AE$  describatur circulus (2)  $EFG$ . Dico, portionem abscissam  $AF$  æqualem esse ipsi  $CD$ .

Quoniam enim  $A$  centrum est circuli  $EFG$ , erit (3)  $AE$  æqualis ipsi  $AF$ . Est autem ex constructione  $AE$  æqualis  $CD$ . Quare &  $AF$ , ipsi  $CD$  (4) æqualis erit.

Ex majore itaque  $AB$  abscissa est portio  $AF$  æqualis minori  $CD$ . Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc etiam problema resolvi posse nonnullis visum est, si per tertium postulatum centro  $A$ , intervallo rectæ minoris  $CD$  statim circulus describatur. Sed falluntur ob eandem rationem, quam paulò superiùs indicavimus.*


## PROP. IV. THEOR. I.

*Si duo triangula duo latera duobus lateribus æqualia habeant, alterum alteri, & angulos sub iis lateribus contentos æquales; habebunt & basim basi æqualem, erit triangulum æquale triangulo, & erunt reliqui anguli reliquis angulis æquales, alter alteri, quibus æqualia latera subtenduntur.*

**S**int duo triangula  $ABC$ ,  $DEF$ , quæ habeant duo latera  $AB$ ,  $AC$  æqualia duobus lateribus  $DE$ ,  $DF$ , alterum alteri: nempe la-  
tus

---

(1) Prop. 2.      (2) Post. 3.  
(3) Def. 15.    (4) Axi. 1.



æquale triangulo DEF, angulum CBA æqualem angulo FED, & angulum BCA æqualem angulo EFD.

Concipiatur etenim triangulum ABC mente superimpositum triangulo DEF hac lege, ut punctum A incidat in punctum D, latus autem AB in latus DE. Et quoniam æquales ponuntur anguli BAC, EDF, incidet quoque latus AC in latus DF. Quumque ex hypothese latera AB, AC æqualia sint lateribus DE, DF, alterum alteri; incidet etiam & punctum B in punctum E, & punctum C in punctum F. Quare & basis BC incidet in basim EF; quia aliter duæ rectæ lineæ clauderent spatium, quod planè (1) repugnat. Quum igitur congruant inter se tum bases, tum triangula, tum reliqui anguli; consequens est, ut (2) basis BC æqualis sit basi EF, triangulum ABC æquale triangulo DEF, angulus CBA æqualis angulo FED, & angulus BCA æqualis angulo EFD. Quod erat ostendendum.

### S C H O L I U M.

*Sedulò autem notetur hoc loco velim, ex reliquis triangulorum angulis eos quidem inter se æqua-*

[1] Axi. 10.

[2] Axi. 9.

*æquales fieri, quibus æqualia latera subten-  
duntur. Sic æquales ostensi sunt anguli CBA,  
FED, quibus opponuntur latera æqualia AC,  
DF; pariterque æquales anguli BCA, EFD, qui  
habent sibi ipsis opposita latera æqualia AB,  
DE. Hinc verò liquet, quod si triancula ABC,  
DEF fuerint isoscelia, ita ut quatuor latera  
ipsorum AB, AC, DE, DF æqualia sint inter  
se; tunc quia latus AC est æquale tum DE,  
tum DE, erit angulus CBA æqualis tam an-  
gulo FED, quàm angulo EFD; pariterque,  
quia latus AB æquale est tum DE, cum DF,  
erit angulus BCA æqualis tam angulo EFD,  
quàm angulo EFD. Unde jam liquet veritas  
primæ partis theorematis subsequenti: nempe,  
quod isoscelium triangulorum anguli, qui supra  
basim sunt, inter se sunt æquales. Nam sem-  
per ac eidem angulo CBA æqualis est tam an-  
gulus FED, quàm angulus EFD, per axioma  
primum æquales erunt inter se duo anguli  
FED, EFD, qui sunt supra basim trianguli  
isoscelis DEF.*


## PROP. V. THEOR. II.

*Isoscelium triangulorum anguli ad basim in-  
ter se sunt æquales, & productis æqualibus la-  
teribus, anguli infra basim etiam inter se  
æquales erunt.*

**S**it triangulum isosceles ABC, habens la-  
tus AB æquale lateri AC, & producantur  
(1) latera æqualia AB, AC in directum versus  
D, & E. Dico æquales esse inter se, tam an-  
gulos

---

[1] Post. 2.



gulos supra basim  
 $ABC, ACB$ , quàm  
 angulos infra ba-  
 sim  $CBD, BCE$ .

Sumatur in  $BD$   
 quodvis punctum  
 $F$ , tum ex majore  
 $AE$  abscindatur [1]  
 portio  $AG$  æqua-  
 lis minori  $AF$ , jun-  
 ganturque [2]  $BG$   
 $CF$ .

Et quoniam ex hypothesei latus  $AB$  est æ-  
 quale lateri  $AC$ , ex constructione autem la-  
 tus  $AG$  æquatur lateri  $AF$ ; erunt duo latera  
 $AB, AG$  trianguli  $BAG$  æqualia duobus late-  
 ribus  $AC, AF$  trianguli  $CAF$ , alterum alteri.  
 Est verò angulus  $BAG$ , contentus sub lateri-  
 bus illius, æqualis angulo  $CAF$ , contento  
 sub lateribus istius; quum sit unus idemque  
 angulus  $A$ . Quare erit [3] basis  $BG$  æqualis  
 basi  $CF$ , angulus  $ABG$  æqualis angulo  $ACF$ ,  
 & angulus  $BGA$  æqualis angulo  $CFA$ .

Et quoniam tota  $AF$  est æqualis toti  $AG$ ,  
 pars verò  $AB$  æqualis parti  $AC$ ; erit etiam  
 [4] reliqua  $BF$  æqualis reliquæ  $CG$ . Ostensa  
 est autem  $CF$  æqualis  $BG$ . Itaque duo latera  
 $BF, CF$  trianguli  $BFC$  æqualia erunt duobus  
 lateribus  $CG, BG$  trianguli  $CGB$ , alterum al-  
 teri. Est verò ex ostensis angulus  $BFC$ , con-  
 tentus sub lateribus illius, æqualis angulo  
 $CGB$ , contento sub lateribus istius. Quare  
 erit [5] angulus  $FBC$  æqualis angulo  $GCB$ ,  
 (qui

[1] Prop. 3.

[2] Post. 1.

[3] Prop. 4.

[4] Axi. 3.

[5] Prop. 4.

(qui quidem anguli sunt infra basim trianguli isoscelis, ) & angulus  $FCB$  æqualis angulo  $GBC$ .

Quum igitur angulus  $ABG$  ostensus sit æqualis angulo  $ACF$ , & angulus  $GBC$  æqualis angulo  $FCB$ ; fit hinc, ut si ex angulo  $ABG$  auferatur angulus  $GBC$ , & ex angulo  $ACF$  auferatur angulus  $FCB$ , reliqui anguli  $ABC$ ,  $ACB$  etiam inter se (1) sint æquales. Hi autem sunt supra basim trianguli isoscelis  $ABC$ ; qui verò sunt infra basim. jam ostensi sunt æquales. Quare isoscelium triangulorum tam anguli supra basim, quàm anguli infra basim inter se æquales sunt. Quod erat ostendendum.

## COROLLARIUM.

*Hinc patet, triangulum æquilaterum esse etiam equiangulum, hoc est non modò latera omnia equalia habere, verùm etiam angulos omnes. Nam triangulum æquilaterum, nihil obstat, quominùs velut isosceles consideretur: quod utique si fiat, quodlibet ejus latus velut basis sumi poterit.*


## PROP. VI. THEOR. III.

*Si trianguli duo anguli æquales fuerint, & latera eos angulos subtendentia pariter equalia erunt.*

**S**it triangulum  $AEC$ , in quo angulus  $CBA$  æqualis sit angulo  $BCA$ . Dico latera  $AB$ ,  
 $AC$

---

(1) *Axi. 3.*



AC angulos illos subtendentia etiam æqualia esse.

Si enim non sint æqualia, alterum ipsorum majus erit. Sit itaque majus AB, ex quo abscindatur [1] portio BD æquali minori AC, & jungatur [2] CD.

Quoniam igitur BD est æqualis AC, BC vero communis; erunt duo latera BD, BC trianguli DBC æqualia duobus lateribus AC, BC trianguli ACB, alterum alteri. Est autem ex hypothese angulus DBC, contentus sub lateribus illius, æqualis angulo ACB, contento sub lateribus istius. Quare (3) triangulum DBC triangulo ACB æquale erit, hoc est pars æqualis toti, quod fieri (4) nequit.

Non itaque latus AB majus est latere AC. Sed ob eandem rationem nec minus esse potest. Quare ei æquale erit: & propterea si trianguli duo anguli æquales fuerint, & latera eos angulos subtendentia pariter æqualia erunt. Quod demonstrare oportebat.

### COROLLARIUM.

*Ex quo patet, triangulum equiangulum esse etiam æquilaterum, hoc est non modò angulos omnes, sed & latera omnia inter se æqualia habere.*

SCHO.

(1) Prop. 3.

(2) Post. 1.

(3) Prop. 4.

[4] Axi. 8.




## S C H O L I U M.

Ceterum hoc theorema convertit primam partem theorematis præcedentis. Nam quemadmodum ibi ex æqualitate laterum deducta est æqualitas angulorum; sic per contrarium in theoremate isto ex æqualitate angulorum ostensa est æqualitas laterum.

## PROP. VII. THEOR. IV.

Ad eandem rectam lineam duabus eisdem rectis lineis non constituentur aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri, ad aliud, atque aliud punctum, ad eandem partem, eosdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes.



Sit recta linea AB, ex cuius extremis A, & B ducantur duæ rectæ lineæ AC; BC, quæ convenient in puncto C. Dico, ex iisdem extremis non posse duci alias duas rectas lineas ipsis AC, BC æquales, alteram alteri, ad eandem partem, nisi convenient in eodem puncto C.

Si enim fieri potest, ducatur AD æqualis AC, & BD æqualis BC, quæ convenient in puncto D alio, quàm C; & jungatur (1) CD.

Quia igitur ex hypothese AC est æqualis AD, isosceles erit triangulum CAD; proindeque angulus ACD (2) æqualis erit angulo ADC.

(1) Post. I.

(2) Prop. 5.

ADC. Jam verò angulus BDC major est angulo ADC. Quare idem angulus BDC erit etiam (1) major angulo ACD, & consequenter multò major angulo BCD.

Et quoniam ex hypothese BC est æqualis BD, isosceles erit quoque triangulum CBD; adeòque angulus BDC æqualis erit (2) angulo BCD. Ostensus est autem major. Itaque idem angulus BDC erit simul major, & æqualis angulo BCD, quod fieri nequit.

Ad eandem igitur rectam lineam duabus eisdem rectis non constituentur aliæ duæ rectæ lineæ æquales, altera alteri, ad aliud, atque aliud punctum, ad eandem partem, eosdem, quos primæ rectæ lineæ, terminos habentes. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema est lemma theorematis sequentis: nam ei ostendendo unicè inservit, & de cætero alium usum non habet in his Elementis.*

## PROP. VIII. THEOR. V.

*Si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & basim basi æqualem; & angulos sub æqualibus lateribus contentos pariter æquales habebunt.*


**S**int duo triangula ABC, DEF, quæ habeant duo latera AB, AC æqualia duobus lateribus DE, DF, alterum alteri, & basim BC æqualem basi EF. Dico, angulum BAC æqualem esse angulo EDF.

Con

---

(1) Axi. I.

(2) Prop. 5.



Concipiatur etenim triangulum ABC mente superimpositum triangulo DEF hac lege, ut punctum B incidat in punctum E,

basis autem BC in basim EF. Et quoniam ex hypothesi æquales sunt bases BC, EF, incidet etiam punctum C in punctum F. Quumque latera AB, AC posita sint æqualia lateribus DE, DF, alterum alteri; necesse est, ut incidat quoque punctum A in punctum D; quia aliter in eadem recta linea EF duabus iisdem rectis lineis DE, DF constituerentur duæ aliæ æquales, altera alteri, ad aliud, atque aliud punctum, ad eandem partem, eosdem, quos primæ, terminos habentes: quod fieri (1) nequit.

Quum igitur puncta A, B, C incidant in puncta D, E, F, incident etiam latera AB, AC in latera DE, DF; atque adeo angulus BAC in angulum EDF. Unde quum congruant inter se duo isti anguli, erunt iidem inter se (2) æquales: & propterea, si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & basim basi æqualem; & angulos sub æqualibus lateribus contentos pariter æquales habebunt. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I O N.

Hoc theorema priorem tantum partem convertit propositionis quartæ. In utroque enim


(1) Prop. 7.

(2) Axi. 9.

enim Theoremate supponitur, quod duo trian-  
gula habeant duo latera duobus lateribus æqua-  
lia, alterum alteri. Sed ibi ex æqualitate an-  
gulorum sub æqualibus lateribus contentorum  
ostensa est æqualitas basium; hic verò per con-  
trarium ex æqualitate basium deducta est præ-  
dictorum angulorum æqualitas.

## PROP. IX. PROBL. IV.

*Datum angulum rectilineum bifariam  
dividere.*



Esto angulus rectilineus  
BAC. Oportet, eum bifa-  
riam dividere.

Sumatur in AB quodvis  
punctum D. Tum ex majore  
AC abscindatur (1) por-  
tio AE æqualis minori  
AD. Jungatur porrò (2)  
DE, super qua constitua-  
tur (3) triangulum æquila-  
terum DEF. Denique ab A ad F ducatur (4)  
recta AF. Dico, rectam AF dividere angulum  
BAC bifariam.

Quoniam enim ex constructione AD est  
æqualis AE, communis autem AF; erunt duo  
latera AD, AF trianguli DAF æqualia duo-  
bus lateribus AE, AF trianguli EAF. Jam ve-  
rò æquales etiam sunt bases eorundem trian-  
gulorum DF, EF, utpote latera trianguli æ-  
quilateri DEF. Quare erit (5) angulus DAF  
æqua-

(1) Prop. 3. (2) Post. 1. (3) Prop. 1.

(4) Post. 1. (5) Prop. 8.


æqualis angulo EAF. Et propterea angulus BAC bifariam sectus est per rectam AF, Quod erat faciendum.

S C H O L I U M.

Ex ipsa hujus problematis demonstratione patet, super recta DE non alia ratione constituendum esse triangulum æquilaterum, quàm ut triangulorum DAF, EAF æquales oriantur bases DF, EF. Unde perinde res erit, si loco trianguli æquilateri constituatur super eadem recta DE per scholium propositionis primæ triangulum isosceles.

PROP. X. PROBL. V.

*Datam rectam lineam terminatam bifariam dividere.*



Sit data recta linea terminata AB. Oportet, eam dividere bifariam.

Constituatur super AB (1) triangulum æquilaterum ACB. Tum angulus ejus ACB secetur (2) bifariam per rectam CD. Dico, rectam CD dividere quoque ipsam AB bifariam in puncto D.

Quoniam enim ex constructione triangulum ACB est æquilaterum, erit latus CA æquale lateri CB. Est autem CD commune. Quare duo latera CA, CD trianguli ACD

C æqua-

(1) Prop. 1. (2) Prop. 9.

æqualia erunt duobus lateribus  $CB$ ,  $CD$  trianguli  $BCD$ , alterum alteri. Jam verò ex constructione angulus  $ACD$ , contentus sub lateribus illius, æqualis est angulo  $BCD$ , qui sub istius lateribus continetur. Itaque erit (1) basis  $AD$  æqualis basi  $BD$ . Et propterea recta  $AB$  secta est bifariam in  $D$ . Quod erat faciendum.

### S C H O L I U M.

Hic quoque perspicuum est, non alia ratione constitui super  $AB$  triangulum æquilaterum  $ACB$ , quàm ut latus  $CA$  æquale fiat lateri  $CB$ , Unde quod præstat triangulum æquilaterum, poterit etiam per triangulum isosceles obtineri.

### PROP. XI. PROBL. VI.

*Ex puncto in recta linea dato perpendiculararem rectam lineam excitare.*



Data sit recta  $AB$ , & datum in ea punctum  $C$ . Oportet, ex puncto isto  $C$  erigere perpendiculararem super  $AB$ .

Sumatur in  $CA$  quodvis punctum  $D$ . Tum ex maiore  $CB$  abscindatur portio  $CE$  æqualis (2) minori  $CD$ . Porro super  $DE$  constituatur (3) triangulum æquilaterum

(1) Prop. 4.

(2) Prop. 3.

(3) Prop. 1.

LIBER PRIMUS.

51

rum DFE. Ac demum a C ad F ducatur (1) re-  
cta CF. Dico, rectam CF perpendicularem  
esse super AB.

Quoniam enim ex constructione recta CD  
æqualis est rectæ CE, communis autem CF;  
erunt duo latera CD, CF trianguli DCF æqua-  
lia duobus lateribus CE, CF trianguli ECF;  
alterum alteri. Jam verò æquales sunt etiam  
inter se eorundem triangulorum bases DF,  
EF, utpote latera trianguli æquilateri DEF.  
Quare angulus DCF, contentus sub lateri-  
bus illius, [2] æqualis erit angulo ECF, qui  
sub istius lateribus continetur. Unde, quum  
recta CF subinde incidat super AB, ut efficiat  
angulos deinceps æquales, ea perpendicularis  
erit (3) ad AB. Et propterea ex puncto C  
erecta est super AB perpendicularis CF. Quod  
erat faciendum.

S C H O L I U M.

*In hujus etiam problematis constructione  
præstat observare, triangulum æquilaterum  
DFE non alia ratione constitui super recta  
DE, quàm ut triangulorum DCF, ECF æqua-  
les oriantur bases DF, EF. Unde perinde res  
erit, si loco trianguli æquilateri describatur  
super eadem recta DE triangulum ifosceles.*

PROP. XII. PROBL. VII.

*Super rectam infinitam ex puncto, quod in  
ea non est, perpendicularem rectam  
lineam demittere.*

**D**ata sit recta infinita AB, & datum extra  
eam punctum C. Oportet, ex puncto  
C 2 isto

(1) Post. 1. (2) Prop. 8. [3] Def. 10.:



isto C perpendicularem demittere super AB.

Respectu puncti C ad alteram partem ipsius AB capiatur punctum aliquod G. Tum centro C, intervallo CG describatur [1] circulus GEF, qui secabit rectam AB in punctis E, & F. Secetur porro recta EF [2] bifariam in H. Ac demum jungatur [3] CH. Dico, rectam CH perpendicularem esse super AB.

Nam ductis rectis CE, CF, quia ex constructione EH est æqualis FH communis verò CH; erunt duo latera EH, CH trianguli CHE æqualia duobus lateribus FH, CH trianguli CHF, alterum alteri. Sunt autem æquales etiam inter se eorundem triangulorum bases CE, CF, utpote lineæ ductæ à centro ad circumferentiam. Quare æquales quoque erunt (4) anguli CHE, CHF. Unde, quum recta CH subinde incidat super AB, ut angulos deinceps efficiat æquales; ea erit perpendicularis AB. Et propterea ex puncto C, dato extra rectam infinitam AB, demissa est recta CH perpendicularis ad ipsam AB. Quod erat faciendum.

### S C H O L I U M.

*Appositè autem dicitur super rectam infinitam AB; quia si sit finita, fieri potest, ut*  
*pro-*


(1) Post.3. (2) Prop.10.  
 (3) Post.1. (4) Prop.8.



*producta transeat per datum punctum C: quo casu nulla perpendicularis exinde demitti potest super AB, quia punctum datum in ipsa producta reperitur.*

## PROP. XIII. THEOR. VI.

*Recta linea insistens super aliam rectam lineam efficit angulos deinceps, vel rectos, vel duobus rectis æquales.*



Recta AB insistat super rectam CD. Dico, angulos deinceps ABC, ABD vel esse rectos, vel simul sumptos duobus rectis æquales.

Nam, vel anguli deinceps ABC, ABD sunt æquales, & rectus erit (1) uterque eorum. angulorum; vel non sunt æquales, & erigatur ex puncto B recta BE (2) perpendicularis ad CD, ita ut anguli deinceps EBC, EBD sint recti.

Quoniam itaque angulus EBC æqualis est duobus angulis EBA, ABC simul sumptis; apposito comuni EBD, erunt (3) duo anguli EBC, EBD æquales tribus angulis ABC, EBA, EBD. Jam verò duo anguli EBA, EBD æquales sunt simul angulo ABD; adeoque apposito communi ABC, fiunt tres anguli ABC, EBA, EBD æquales (4) duobus angulis ABC, ABD. Quare erunt duo anguli ABC, ABD (5) æquales duobus angulis

C 3

EBC

[1] Def. 10. [2] Prop. 11.

[3] Axi. 2. [4] Axi. 2. (5) Axi. 1.


$EBC$ ,  $EBD$ . Unde; quum uterque istorum sit rectus, erunt illi simul duobus rectis æquales. Et propterea recta linea, insistens super aliam rectam lineam, efficiet angulos deinceps, vel rectos, vel duobus rectis æquales. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Alternativa est ista propositio, ob duplicem modum, quo recta  $AB$  insistere potest super aliam  $CD$ . Vel enim insistit perpendiculariter, & tunc efficiet angulos deinceps  $ABC$ ,  $ABD$  æquales, adeoque rectos. Vel insistit oblique, & tunc unum ex iis angulis efficiet acutum, alterum obtusum. Verum, quia erecta perpendiculari  $BE$ , quantum angulus acutus  $ABC$  deficit à recto  $EBC$ , tantumdem obtusus  $ABD$  excedit rectum alium  $EBD$ ; fit hinc, ut duo anguli deinceps  $ABC$ ,  $ABD$ , etsi unus acutus, alter obtusus, simul tamen æquivalent duobus rectis  $EBC$ ,  $EBD$ .*

## PROP. XIV. THEOR. VII.

*Si è puncto unius rectæ lineæ ducantur ad partes oppositas duæ aliæ rectæ lineæ, quæ constituent cum illa angulos deinceps duobus rectis æquales, in directum erunt duæ illæ rectæ lineæ.*



Sit recta aliqua  $AB$ , ex cuius puncto  $B$  ducantur ad partes oppositas aliæ duæ rectæ lineæ  $BC$ ,  $BD$ , quæ constituent cum ipsa  $AB$  angulos deinceps  $ABC$ ,  $ABD$ , duobus rectis æquales. Dico,  $BD$  ipsi  $BC$  in directum esse.

Si

Si enim ipsi BC non sit BD in directum, ponatur ei in directum BE. Et quoniam super rectam CBE insitit AB, erunt anguli deinceps ABC, ABE (1) duobus rectis æquales. Sed ex hypothese anguli ABC, ABD sunt etiam æquales duobus rectis. Quare erunt (2) duo anguli ABC, ABE æquales duobus angulis ABC, ABD: proindeque ablato communi ABC, supererit [3] angulus minor ABE æqualis majori ABD, quod fieri [4] non potest. Non igitur BE in directum est ipsi BC. Quare erit ei in directum recta BD. Et propterea, si è puncto unius rectæ lineæ ducantur ad partes oppositas duæ aliæ rectæ lineæ, quæ constituent cum illa angulos deinceps duobus rectis æquales, in directum erunt duæ istæ rectæ lineæ. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema est conversum præcedentis. In illo enim ex eo, quod rectæ BC, BD sint in directum, hoc est unicam rectam lineam constituent; ostensum est, angulos deinceps ABC, ABD duobus rectis æquales esse. Vicissim autem in isto ex eo, quod anguli deinceps ABC, ABD sint æquales duobus rectis, ostenditur veritas BC, BD in directum esse.*

## PROP. XV. THEOR. VIII.

*Si duæ rectæ lineæ se mutuo secent, anguli, quos ad verticem faciunt, inter se sunt æquales.*

**R**ectæ duæ AB, CD se mutuo secent in E. Dico, angulos, qui ad verticem sunt,

---

(1) Prop. 13. [2] Axi. 1. (3) Axi. 3. [4] Axi. 8.



sunt, inter se æquales esse; hoc est angulum AEC æqualem esse angulo BED, & angulum AED æqualem angulo BEC.

Nam anguli AEC, AED, velut anguli deinceps, sunt [1] æquales duobus rectis; & ob eandem rationem duobus etiam rectis æquales sunt anguli DEB, DEA. Quare duo anguli AEC, AED sunt æquales [2] duobus angulis DEB, DEA: & propterea ablato communi AED, supererit (3) angulus AEC æqualis angulo BED.

Simili modo ostendetur, angulum AED æqualem esse angulo CEB: nempe, quia duobus rectis æquales sunt, tam anguli DEA, DEB, quàm anguli BEC, BED. Quare, si duæ rectæ lineæ se mutuo secent, anguli, quos ad verticem faciunt, inter se æquales sunt. Quod demonstrare oportebat.

### S C H O L I U M.

*Conversum hujus theorematis etiam obtinet: nempe, quod si in recta AB sumatur punctum aliquod E, ex quo ducantur ad partes oppositas duæ aliæ rectæ lineæ EC, ED, quæ efficiant cum priori angulos ad verticem æquales, in directum sint ipsæ EC, ED. Nam si ipsi EC non sit in directum ED, fit ei in directum EF. Quare per ostensum theoremata erit angulus AEC æqualis angulo BEF. Ponitur autem angulus AEC æqualis angulo BED. Quare erit angulus BEF æqualis angulo BED: quod fieri non potest.*


PROP.

---

(1) Prop. 13. (2) Axi. 1. [3] Axi. 3.

## PROP. XVI. THEOR. IX.

*Omnis trianguli, uno latere producto;  
exterior angulus est major utroque  
interiore, & opposito.*



Sit triangulum ABC, & producatum unum ejus latus BC versus D. Dico, angulum exteriorem ACD majorem esse utroque interiore, & opposito, hoc est majorem, tum angulo CAB, cum angulo CBA.

Secetur namque latus AC (1) bifariam in E, & juncta [2] BE, producatum [3] ad F, ponatur ipsi BE (4) æqualis EF. Jungatur porro [5] CF, & AC producatum [6] ad G,

Quoniam igitur ex constructione AE est æqualis EC, & BE æqualis EF; erunt duo latera EA, EB trianguli AEB æqualia duobus lateribus EC, EF trianguli CEF. Sed angulus AEB, contentus sub lateribus illius, æqualis est [7] angulo CEF, qui sub istius lateribus continetur; quum sint anguli ad verticem. Quare & anguli BAE, ECF, oppositi

C 5

[1] Prop. 10.

[2] Post. 1.

(3) Post. 2.

[4] Prop. 3.

(5) Post. 1.

(6) Post. 2.

[7] Prop. 15.

58 ELEM. GEOM. PL.  
fiti lateribus æqualibus BE, EF, similiter (1)  
æquales erunt; adeoque, quum angulus ACD  
major sit angulo ACF, erit etiam (2) major  
angulo CAB.

Quemadmodum autem ostensus est angulus  
ACD major angulo CAB, ita quoque  
ostendetur, angulum BCG majorem esse an-  
gulo CBA. Sed angulus BCG æqualis est [3]  
angulo ACD; quum sint anguli ad verticem.  
ataque erit idem angulus ACD major quo-  
que angulo CBA. Et propterea omnis trian-  
guli, uno latere producto, exterior angulus  
est major utroque interiore, & opposito.  
Quod erat ostendendum.

### S C H O L I U M.

*De angulo ACB, qui respectu exterioris ACD  
dici potest interior deinceps, nihil quidem de-  
terminari potest; quum ipse exterior ACD pos-  
sit esse major, minor, & æqualis angulo ACB.  
quum enim duo anguli ACD, ACB, velut hinc  
inde existentes, sint æquales duobus rectis; fit  
hinc, ut si ACD sit rectus, rectus sit etiam ACB,  
si verò ACD acutus, obtusus sit ACB; & si de-  
mum ACD obtusus, acutus sit ACF.*


### PROP. XVII. THEOR. X.

*Omnis trianguli duo anguli simul duobus re-  
ctis minores sunt, quomodocumque sumpti.*

**S**it triangulum ABC. Dico, duos ejus an-  
gulos, quomodocumque sumptos, puta  
CBA,

---

[1] Prop. 4. (2) Axi. 1. [3] Prop. 15.



CBA, BCA, simul duobus rectis minores esse. Producatur etenim latus BC in directum versus D. Et quoniam angulus exterior ACD est major (1) interiore, & opposito CBA, appposito communi BCA,

erunt duo anguli ACD, ACB majores (2) duobus angulis CBA, BCA. Jam vero duo anguli ACD, ACB, velut hinc inde existentes, sunt æquales (3) duobus rectis. Quare duo anguli CBA, BCA simul duobus rectis minores erunt. Et propterea omnis trianguli duo anguli simul duobus rectis minores sunt, quomodocumque sumpti. Quod erat demonstrandum.

## COROLLARIUM.

Hinc patet, ex puncto A ad lineam BC unicam tantum perpendicularem duci posse. Nam si duci possent duæ perpendiculares AB, AC, forent in triangulo ABC duo anguli CBA, BCA duobus rectis æquales: quod est absurdum. Et ob eandem rationem, si, ex duobus punctis B, & C unius ejusdemque rectæ BC erigantur ad rectam istam duæ perpendiculares, hæc nunquam inter se convenient, atque adeo parallele erunt.

C 6

PROP.


(1) Prop. 16.

(2) Axi. 4.

[3] Prop. 13.

## PROP. XVIII. THEOR. XI.

*Omnis trianguli majus latus majorem  
angulum subtendit.*



Sit triangulum  $ABC$ , in quo latus  $AC$  majus sit latere  $AB$ . Dico, angulum  $ABC$ , oppositum majori lateri, majorem esse angulo  $ACB$ , qui opponitur lateri minori.

Quoniam enim latus  $AC$  majus est latere  $AB$ , abscindatur ex eo (1) portio  $AD$  æqualis minori  $AB$ , jungaturque [2]  $BD$ .

Quia igitur  $AD$  est æqualis  $AB$ , erit triangulum  $BAD$  isosceles, adeoque angulus  $ABD$  æqualis [3] angulo  $ADB$ . Sed angulus  $ABC$  major est angulo  $ABD$ . Quare idem angulus  $ABC$  erit etiam [4] major angulo  $ADB$ .

Et quoniam in triangulo  $BDC$  latus  $CD$  productum est in  $A$ , erit angulus exterior  $ADB$  (5) major interiori, & opposito  $ACB$ . Ostensus est autem angulus  $ABC$  major angulo  $ADB$ . Quare idem angulus  $ABC$  multò major erit angulo  $ACB$ . Et propterea omnis trianguli majus latus majorem angulum subtendit. Quod demonstrare oportebat.

SCHO.

(1) Prop. 3. (2) Post. 1.  
[3] Prop. 5. (4) Axi. 1.  
[5] Prop. 16.




## S C H O L I U M.

Hoc theorema supplet casum omissum in theoremate quintæ propositionis. Ibi enim ostensum est, quod si triangulum sit isosceles, hoc est habeat duo latera æqualia, anguli, iis lateribus oppositi, sint etiam æquales. Hic autem ostenditur, quod si unum ex iis lateribus sit altero majus, major sit angulus ille, qui majori lateri opponitur.

## PROP. XIX. THEOR. XII.

Omnis trianguli major angulus majus latus subtendit.



Sit triangulum  $ABC$ , habens angulum  $ABC$  majorem angulo  $ACB$ . Dico, latus  $AC$ , oppositum angulo majori, majus esse latere  $AB$ , quod opponitur angulo minori.

Si enim latus  $AC$  non est majus latere  $AB$ , erit vel ei æquale, vel eodem minus. Æquale autem esse non potest, quia aliter foret (1) angulus  $ABC$  æqualis angulo  $ACB$ , quod est contra hypothesim. Neque etiam minus; quia esset [2] angulus  $ABC$  minor angulo  $ACB$ , quod est etiam contra hypothesim. Quare erit latus  $AC$  majus latere  $AB$ .

Et

(1) Prop. 5.

(2) Prop. 18.


Et propterea in omni triangulo majori angulo majus latus opponitur. Quod erat ostendendum.

### SCHOLIUM.

Hoc theorema est conversum precedentis. Nam quemadmodum in eo ostensum est, majori lateri majorem angulum opponi; sic vicissim in isto ostenditur, quod majori angulo majus semper latus sit oppositum. Sed idem theorema supplet quoque casum omissum in theoremate propositionis sextæ. In eo enim ostensum est, æquales angulos trianguli æqualia quoque latera subtendere; in isto autem demonstratur, majori angulo majus semper latus opponi.

### PROP. XX. THEOR. XIII.

In omni triangulo duo latera simul majora sunt reliquo, quomodocumque sumpta.



Sit triangulum ABC. Dico, duo quælibet ipsius latera simul, puta AB, BC, majora esse reliquo AC.

Protrahatur AB (1) versus D, & fiat [2] BD æqualis BC, jungaturque (3) CD.

Et

[1] Post. 2.

[2] Prop. 3.

[3] Post. 1.

Et quoniam  $BD$  est æqualis  $BC$ , erit  $BCD$  triangulum isosceles; adeoque angulus  $BCD$  [1] æqualis angulo  $BDC$ . Est autem angulus  $ACD$  major angulo  $BCD$ . Quare idem angulus  $ACD$  erit etiam [2] major angulo  $BDC$ : atque adeo, quia majori angulo (3) majus semper latus opponitur, erit  $AD$  majus, quam  $AC$  in triangulo  $ADC$ . Sed ex constructione  $AD$  est æquale ipsis  $AB$ ,  $BC$  simul sumptis. Duo igitur latera  $AB$ ,  $BC$  simul sumpta reliquo  $AC$  majora sunt. Et propterea in omni triangulo duo latera simul majora sunt reliquo, quomodocumque sumpta. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema nulla eget demonstratione, & velut axioma ultro ab omnibus concedi debet, si lineæ rectæ Archimedeam definitionem admittamus. Definitur etenim ab Archimede lineæ recta, quod sit brevissima omnium linearum, quæ duci possunt à puncto ad punctum. Itaque, quia  $AC$  est lineæ recta,  $AB$  verò, &  $BC$  simul unicam rectam non constituunt, sed angulum continent; erit  $AC$  minor ipsis  $AB$ ,  $BC$  simul sumptis.*

## PROP. XXI. THEOR. XIV.


*Si ex terminis unius lateris trianguli ducantur intra triangulum duæ rectæ lineæ; eæ simul minores erunt duobus aliis lateribus trian-*

---

(1) Prop. 5.      (2) Axi. 1.

[3] Prop. 19.

trianguli, angulum verò majorem continebunt.



Sit triangulum  $ABC$ , & ex punctis  $A$ , &  $B$  ducantur intra triangulum rectæ duæ  $AD$ ,  $BD$ . Dico, rectas istas  $AD$ ,  $BD$  simul minores esse ipsis  $AC$ ,  $BC$  simul sumptis; at verò angulum  $ADB$  majorem esse angulo  $ACB$ .

Protrahatur etenim (1)  $AD$  usque donec cum  $BC$  conveniat in  $E$ . Et quoniam in triangulo  $ACE$  duo latera  $AC$ ,  $CE$  simul (2) majora sunt reliquo  $AE$ ; addito communi  $EB$ , erunt duo latera  $AC$ ,  $CB$  (3) majora quoque duobus  $AE$ ,  $EB$ .

Rursus, quoniam in triangulo  $DEB$  duo latera  $DE$ ,  $EB$  simul (4) majora sunt reliquo  $DB$ ; appposito communi  $AD$ , erunt duo latera  $AE$ ,  $EB$  (5) majora etiam duobus  $AD$ ,  $DB$ . Ostensum est autem, latera duo  $AC$ ,  $CB$  majora esse duobus  $AE$ ,  $EB$ . Quare eadem  $AC$ ,  $CB$  ipsis  $AD$ ,  $DB$  multò majora erunt.

Deinde, quoniam in triangulo  $BED$  latus  $ED$  productum est in  $A$ , erit angulus exterior  $ADB$  (6) major interiore, & opposito  $BED$ . Atque ita quoque, quoniam in triangulo  $ACE$  latus  $CE$  productum est in  $B$ , erit angulus exterior  $BED$  major interiore, & opposito  $ACE$ .

Quum

[1] *Post.* 2. (2) *Prop.* 20.


(3) *Axi.* 4. (4) *Prop.* 20.

(5) *Axi.* 4. [6] *Prop.* 16.

Quum itaque angulus ADB major sit angulo BED, & angulus BED major angulo ACB, erit idem angulus ADB multò major angulo ACB. Quare, si ex terminis unius lateris trianguli ducantur intra triangulum duæ rectæ lineæ, eæ simul minores erunt duobus aliis lateribus trianguli, angulum verò majorem continebunt. Quod demonstrare oportebat.

PROP. XXII. PROBL. VIII.

*Ex tribus rectis lineis, quæ tribus aliis datis sint æquales, triangulum constituere. Oportet autem, ut ex tribus datis duæ simul reliqua majores sint, quomodocumque sumptæ.*



Datae sint tres rectæ lineæ A, B, C, quæ ejusmodi sint, ut duæ simul majores sint reliqua, quomodocumque sumantur.

Oportet, ex tribus rectis lineis, quæ tribus iis datis æquales sint, triangulum constituere.

Exponatur recta quævis DE, terminata versus D, & indefinita versus E, ex qua (1) abscindatur primò DF æqualis A, tum FG æqua-

(1) Prop. 3.

$\alpha$ qualis B, ac denique GH  $\alpha$ qualis C. Deinde centro F, & intervallo FD describatur (1) circulus DKL; nec non centro G, & intervallo GH alter circulus HKL. Demum ex puncto K, in quo se secant circumferentiæ horum circulorum ducantur [2] ad puncta F, & G rectæ KF, KG. Dico, FKG esse triangulum quæsitum.

Quoniam enim F centrum est circuli DKL, erit [3] FD  $\alpha$ qualis FK. Sed ex constructione FD est  $\alpha$ qualis A. Quare & FK [4] ipsi A  $\alpha$ qualis erit. Similiter, quoniam G centrum est circuli HKL, erit GH [5]  $\alpha$ qualis GK. Sed ex constructione GH est  $\alpha$ qualis C. Quare & GK (6) ipsi C  $\alpha$ qualis erit.

Sunt itaque trianguli FKG latera duo FK GK  $\alpha$ qualia rectis datis A, & C. Sed & latus FG ex constructione  $\alpha$ quale est alteri B. Constitutum est igitur triangulum FKG, cujus latera FK, FG, GK  $\alpha$ qualia sunt tribus rectis datis A, B, C. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc problema majorem extensionem habet, quàm problema primæ propositionis. Ibi enim agebatur de construendo triangulo æquilatere, cujus latera  $\alpha$ qualia datæ essent longitudinis. Hic verò agitur de construendo quolibet triangulo, cujus latera singula datam habeant longitudinem. Necessè est autem, ut datæ tres rectæ lineæ, quibus  $\alpha$ qualia esse debent tria latera*

[1] Post. 3. (2) Post. 1.


(3) Def. 15. (4) Axi. 1.

(5) Def. 15. (6) Axi. 1.

*tera trianguli constituendi, ejusmodi sint, ut duæ simul reliqua majores sint, quomodocumque sumptæ; quia, ut superius ostensum est, hæc est proprietas essentialis trianguli, ut duo latera simul majora sint reliquo, quomodocumque sumpta.*

## PROP. XXIII. PROBL. IX.

*Ad datam rectam lineam, atque ad datum in ea punctum angulum dato angulo rectilinea æqualem constituere.*



Data sit recta AB, & datum in ea punctum A; datus verò angulus rectilineus CDE. Oportet ad datam

rectam AB, atque ad datum in ea punctum A constituere angulum æqualem angulo rectilineo dato CDE.

In lateribus anguli dati DC, DE sumantur duo quævis puncta C, & E, quæ jungantur [1] per rectam CE. Itaque, quia tres rectæ lineæ DC, DE, CE constituunt triangulum DCE, eæ ejusmodi erunt [2], ut duæ simul majores sint reliqua, quomodocumque sumptæ. Quare ad rectam datam AB constituitur (3) aliud triangulum ABF, cujus latera tria

[1] Post. I. (2) Prop. 20.


(3) Prop. 22.

tria  $AB$ ,  $AF$ ,  $BF$  æqualia sint tribus rectis  $DC$ ,  $DE$ ,  $CE$ , Dico, angulum  $BAF$  æqualem esse angulo  $CDE$ .

Quoniam enim ex constructione  $AB$  est æqualis  $DC$ , &  $AF$  æqualis  $DE$ ; erunt duo latera  $AB$ ,  $AF$  trianguli  $BAF$  æqualia duobus lateribus  $DC$ ,  $DE$  trianguli  $CDE$ , alterum alteri. Est etiam ex constructione basis illius  $BF$  æqualis basi istius  $CE$ . Quare erit (1) angulus  $BAF$  æqualis angulo  $CDE$ . Et propterea ad datam rectam  $AB$ , atque ad datum in ea punctum  $A$  constitutus est angulus  $BAF$  æqualis angulo dato  $CDE$ . Quod erat faciendum.

### PROP. XXIV. THEOR. XV.

*Si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & angulum sub iis lateribus contentum angulo majorem; & basin basi majorem pariter habebunt.*



Sint duo triangula  $ABC$ ,  $DEF$  quæ habeant duo latera  $AB$ ,  $AC$  æqualia duobus lateribus  $DE$ ,  $DF$ , alterum alteri, angulum verò  $BAC$  majorem angulo  $EDF$ .

(1) Prop. 8.



EDF. Dico, habere quoque basim BC majorem basi EF.

Quoniam enim angulo BAC minor est angulus EDF; fiat ad lineam DF, atque ad datum in ea punctum D (1) angulus FDG æqualis angulo BAC. Tum fiat quoque (2) DG æqualis ipsi AB. Ac denique jungantur [3] GE, GF.

Et quoniam ex constructione AB est æqualis DG, ex hypothese autem AC est æqualis DF; erunt duo latera AB, AC trianguli ABC æqualia duobus lateribus DG, DF trianguli DGF, alterum alteri. Est etiam ex constructione angulus BAC, contentus sub lateribus illius, æqualis angulo GDF, qui sub istius lateribus continetur. Quare & basis BC (4) basi GF pariter æqualis erit.

Rursus, quoniam ex constructione DG est æqualis AB, ex hypothese autem eidem AB æqualis est etiam DE, erit (5) DE æqualis DG: atque adeo, quum isosceles fit triangulum GDE, erit [6] angulus DGE æqualis angulo DEG, Est autem angulus FEG major angulo DEG. Quare idem angulus FEG (7) major quoque erit angulo DGE; ac propterea multò major angulo FGE.

Quum igitur in triangulo GEF angulus FEG major sit angulo FGE, erit (8) latus GF, oppositum majori angulo, majus latere EF, quod opponitur angulo minori. Ipsi autem GF ostensa est æqualis BC. Quare & BC eadem

[1] Prop. 23.

[2] Prop. 3.

[3] Post. 1.

(4) Prop. 4.

(5) Axi. 1.

(6) Prop. 5.

(7) Axi. 1.

[8] Prop. 19.


eadem EF major quoque erit. Et propterea, si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & angulum sub lateribus iis contentum angulo majorem; & basim basi majorem pariter habebunt. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

Hoc theorema supplet casum omissum in theoremate propositionis quartæ. Ibi enim ostensum est, quod duorum triangulorum, duo latera duobus lateribus æqualia habentium, alterum alteri, si æquales fuerint anguli sub lateribus iis contenti, bases etiam sint æquales. In hoc autem ostenditur, quod eorundem triangulorum si angulus angulo major sit, & basis basi etiam major erit.

## PROP. XXV. THEOR. XVI.

Si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & basim basi majorem; habebunt & angulum, sub iis lateribus contentum, angulo quoque majorem.



Sint duo triangula A-BC DEF, quæ habeant duo latera A-B, AC æqualia duobus lateribus DE, DF alterum

alteri; habeant verò basim BC majorem basi EF. Dico, habere quoque angulum BAC majorem angulo EDF. Si

Si enim angulus BAC major non sit angulo EDF, erit vel ei æqualis, vel eodem minor. Æqualis autem esse non potest, quia aliter foret (1) basis BC æqualis basi EF, quod est contra hypothefim. Neque etiam minor, quia esset [2] basis BC minor basi EF, quod est etiam contra hypothefim. Quare consequens est, ut angulus BAC major sit angulo EDF. Et propterea, si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & basim basi majorem; habebunt & angulum, sub iis lateribus contentum, angulo quoque majorem. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema, convertit, quod præcedenti propositione positum est. In utroque enim supponitur, quod duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri; sed in illo ex eo, quod angulus, sub æqualibus lateribus contentus, sit angulo major, ostensum est, & basim basi majorem esse: in isto verò vicissim ex eo, quod basis sit major basi, ostenditur, angulum angulo majorem esse. Idem etiam theorema supplet casum omissum in theoremate propositionis octavæ: quum ostensum sit in illo, quod si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & basim basi æqualem, angulos sub æqualibus lateribus contentos etiam æquales sint habitura.*


PROP.

(1) Prop. 4.

[2] Prop. 24.

## PROP. XXVI. THEOR. XVII.

*Si duo triangula habeant duos angulos duobus angulis æquales, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, sive quod æqualibus adjacet angulis, sive quod uni æqualium angulorum opponitur; omnia alia etiam æqualia habebunt.*



Sint duo triangula  $AB, C, DEF$ , quæ habeant duos angulos  $CBA, BCA$  æquales duobus angulis  $FEDE, FDF$ , alterum alteri.

Et habeant primum æqualia quoque latera  $BC, EF$ , quæ adjacent æqualibus angulis. Dico, omnia alia æqualia esse, nempe latus  $AB$  æquale lateri  $DE$ , latus  $AC$  æquale lateri  $DF$ , angulum  $BAC$  æqualem angulo  $EDF$ , ipsumque triangulum  $ABC$  æquale triangulo  $DEF$ .

Si enim latus  $AB$  æquale non sit lateri  $DE$ , alterum ipsorum majus erit. Sit itaque majus latus  $AB$ , ex quo abscindatur [1] portio  $BG$  æqualis minori  $DE$ , & jungatur [2]  $CG$ .

Quoniam itaque ex constructione  $GB$  est æqualis  $DE$ , ex hypothese verò  $BC$  æqualis  $EF$ ; erunt duo latera  $BG, BC$  trianguli  $GBC$ ; æqua-

[1] Prop. 3.

(2) Post. 1.

æqualia duobus lateribus DE, EF trianguli DEF, alterum alteri. Est etiam angulus GBC, sub illius lateribus contentus, æqualis ex hypothese angulo DEF, qui sub lateribus istius continetur. Quare erit (1) angulus BCG æqualis quoque angulo EFD. Sed angulo EFD æqualis est ex hypothese angulus BCA. Itaque erit angulus BCG (2) æqualis angulo BCA: quod planè [3] repugnat.

Non igitur latus AB majus est latere DE. Sed ob eandem rationem nec etiam minus esse potest. Quare consequens est, ut latus AB æquale sit lateri DE. Quumque ex hypothese latus BC æquale sit lateri EF, & angulus CBA æqualis angulo FED; habebunt duo triangula ABC, DEF duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & angulos sub æqualibus lateribus contentos æquales. Unde omnia alia etiam (4) æqualia erunt.

Sed eadem triangula ABC, DEF habeant secundò æqualia latera duo AB, DE, quæ opponuntur angulis æqualibus BCA, EFD. Dico quoque, omnia alia æqualia esse; scilicet latus AC æquale lateri DF, latus BC æquale lateri EF, angulum BAC æqualem angulo EFD, ipsumque triangulum ABC æquale triangulo DEF.

Si enim latus BC non sit æquale lateri EF, alterum ipsorum majus erit. Sit itaque majus latus BC, ex quo abscindatur (5) portio BH æqualis minori EF, & jungatur (6) AH.

Quoniam itaque ex hypothese AB est æ-

D

qua-

(1) Prop.4. [2] Axi.1.

[3] Axi.8. (4) Prop.4.

[5] Prop.3. (6) Post.1.

qualis DE, ex constructione autem BH est æqualis EF, erunt duo latera AB, BH trianguli ABH æqualia duobus lateribus DE, EF trianguli DEF, alterum alteri. Est etiam ex hypothese angulus ABH, contentus sub lateribus illius, æqualis angulo DEF, qui sub istius lateribus continetur. Quare erit (1) angulus BHA æqualis angulo EFD. Sed ex hypothese angulo EFD æqualis est angulus BCA. Itaque erit angulus BHA (2) æqualis angulo BCA, hoc est exterior æqualis interiori, & opposito: quod planè [3] repugnat.

Non igitur latus BC majus est latero EF. Sed ob eandem rationem neque etiam minus esse potest. Quare consequens est, ut latus BC æquale sit lateri EF. Quumque ex hypothese latus AB æquale sit lateri DE, & angulus CBA æqualis angulo FED; habebunt triangula duo ABC, DEF duo latera duobus lateribus æqualia, alterum alteri, & angulos sub æqualibus lateribus contentos pariter æquales. Quare omnia alia (4) etiam æqualia erunt.

Itaque, si duo triangula habeant duos angulos duobus angulis æquales, alterum alteri, & unum latus uni lateri æquale, sive quod æqualibus adjacet angulis, sive quod uni æqualium angulorum opponitur; & omnia alia æqualia pariter habebunt. Quod erat demonstrandum.

SCHO-

(1) Prop.4. [2] Axi.1.


(3) Prop.16. (4) Prop.4.

## S C H O L I U M.

Theorematis hujus pars prior perfectè convertit id, quod propositione quarta positum est, Nam quemadmodum ibi ex eo, quod triangula duo  $ABC$ ,  $DEF$  habeant duo latera  $AB$ ,  $AC$  equalia duobus lateribus  $DE$ ,  $DF$ , alterum alteri, & angulum  $BAC$  æqualem angulo  $EDF$ , ostensum est, basim  $BC$  æqualem esse basi  $EF$ , angulum  $CBA$  æqualem angulo  $FED$ , & angulum  $BCA$  æqualem angulo  $EFD$ ; sic vicissim in theorematis hujus parte prioris ex eo, quod triangula duo  $ABC$ ,  $DEF$  habeant duos angulos  $CBA$ ,  $BCA$  æquales duobus angulis  $FED$ ,  $EFD$ , alterum alteri, & basim  $BC$  æqualem basi  $EF$ , ostenditur, latus  $AB$  æquale esse lateri  $DE$ , latus  $AC$  æquale lateri  $DF$ , & angulum  $BAC$  æqualem angulo  $EDF$ .

## PROP. XXVII. THEOR. XVIII.

Si in duas rectas lineas, in eodem plano jacentes, tertia incidat recta linea, & efficiat angulos alternos æquales; parallelæ erunt duæ illæ rectæ lineæ.



Sint duæ rectæ lineæ  $AB$ ,  $CD$ , quæ existant in uno, eodemque plano, & in eas incidat tertia recta linea  $EF$ , quæ efficiat angulos alternos æquales, hoc est angulum  $AEF$  æqualem angulo  $EFD$ . Dico, rectas duas  $AB$ ,  $CD$  parallelas esse inter se.

D 2 Si

Si enim non sint parallelæ, eæ productæ versus aliquam partem convenient. Producantur itaque, & convenient in G. Figura igitur EFG, velut contenta sub tribus rectis lineis, triangulum est. Unde, quum latus GE productum sit in A, erit [1] angulus exterior major utroque interiore, & opposito, hoc est angulus AEF major tam angulo EGF, quàm angulo EFG. Est autem ex hypothese angulus AEF æqualis angulo EFG. Idem igitur angulus AEF est major simul, & æqualis angulo EFG: quod fieri non potest. Non igitur rectæ duæ AB, CD productæ convenient inter se. Quare, quum in eodem consistant plano, [2] eædem parallelæ erunt. Et propterea, si in duas rectas lineas, in eodem plano jacentes, tertia incidat recta linea, & efficiat angulos alternos æquales; parallelæ erunt duæ illæ rectæ lineæ. Quod erat demonstrandum.

## PROP. XXVIII. THEOR. XIX.


*Si in duas rectas lineas, in eodem plano jacentes, tertia incidat recta linea, & efficiat, vel angulum exteriorem æqualem interiori, & opposito ad eandem partem, vel duos angulos interiores ad eandem partem positos, duobus rectis æquales; parallelæ erunt duæ illæ rectæ lineæ.*

**S**int duæ rectæ lineæ AB, CD, quæ existant in uno, eodemque plano, & in eas incidat tertia recta linea EFG. Dico primò, quod

---

[1] Prop. 16. [2] Def. 35.





quod si angulus exterior EFB sit æqualis interiori, & opposito ad eandem partem FGD, duæ illæ rectæ lineæ AB, CD inter se sint parallelæ.

Anguli enim AFG, EFB, velut ad verticem positi, inter se (1) sunt æquales. Un-

de semper ac angulus EFB æqualis ponitur angulo FGD; erit etiam (2) angulus AFG æqualis angulo FGD. Jam vero isti duo anguli sunt alterni. Itaque lineæ AB, CD [3] parallelæ erunt inter se.

Dico secundò, quod si duo anguli interiores, ad eandem partem positi, BFG, FGD sint simul duobus rectis æquales, duæ illæ rectæ lineæ AB, CD etiam inter se sint parallelæ.

Nam anguli AFG, BFG, velut hinc inde positi, sunt simul (4) duobus rectis æquales. Sed ex hypothesi æquales sunt etiam duobus rectis anguli duo BFG, FGD. Quare erunt duo anguli AFG, BFG æquales [5] duobus angulis BFG, FGD; & propterea, ablato communi BFG, supererit [6] angulus AFG æqualis angulo FGD. Sunt autem anguli isti alterni. Itaque lineæ AB, CD (7) parallelæ erunt inter se. Et propterea, si in duas, re-

D 3

ctas

- 
- (1) Prop. 15. (2) Axi. 1.  
 (3) Prop. 27. (4) Prop. 13.  
 (5) Axi. 1. (6) Axi. 3.  
 (7) Prop. 27.

Etas lineas, in eodem plano jacentes, tertia incidat recta linea, & efficiat vel angulum exteriorem æqualem interiori, & opposito ad eandem partem, vel duos angulos interiores, ad eandem partem positos, duobus rectis æquales; duæ illæ rectæ lineæ parallelæ erunt inter se. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M I.

*Ex duabus propositionibus præcedentibus perspicuum fit, parallelismum linearum tripliciter cognosci posse. Primò nempe, si in iis anguli alterni sint æquales. Secundò, si angulus exterior sit æqualis interiori, & opposito ad eandem partem. Ac tertid demum, si duo anguli interiores, ad eandem partem positi, sint simul duobus rectis æquales.*

## S C H O L I U M II.

*Rectæ igitur AB, CD, parallelæ sunt inter se, siquidem duo anguli BFG, FGD simul sint duobus rectis æquales. Revolvatur jam recta AB circa punctum F, ita ut positionem acquirat rectæ ab: & perspicuum est, revolutione ista nec rectas ab, CD esse amplius parallelas, utpote convenientes versus bD, nec angulos bFG, FGD æquales esse simul duobus rectis, utpote minores. Unde nihil obstat, quominus hoc loco tamquam verum agnoscamus sequens axioma Euclideum.*


## A X I O M A XIII.

Si in duas rectas lineas, in eodem plano  
ja-

jacentes, tertia incidat recta linea, & efficiat duos angulos interiores, ad eandem partem positos, duobus rectis minores; duæ illæ rectæ lineæ non erunt parallelæ, sed convenient versus eam partem, in qua fiunt duo illi anguli, qui simul duobus rectis minores sunt.

## PROP. XXIX. THEOR. XX.

*Si in duas rectas lineas parallelas tertia incidat recta linea; hæc efficiet & angulos alternos æquales; & angulum exteriorem æqualem interiori, & opposito ad eandem partem; & duos angulos interiores, ad eandem partem positos, duobus rectis æquales.*



Sint duæ rectæ lineæ parallelæ AB CD, in quas incidat tertia EFG. Dico primò, angulos alternos AFG FGD æquales esse inter se.

Si enim non sint æquales, alter ipsorum major erit. Sit itaque angulus AFG major angulo FGD. Quare appposito communi BFG, erunt (1) duo anguli AFG, BFG majores duobus angulis BFG, FGD. Sunt autem duo anguli AFG, BFG [2] æquales duobus

D 4

re-

---

(1) Axi. 4. [2] Prop. 13.

rectis. Itaque anguli duo BFG, FGD, qui sunt interiores ad eandem partem positi, duobus rectis minores erunt; & propterea rectæ AB, CD [1] non erunt parallelæ: quod est contra hypothesim. Non itaque angulus AFG major est angulo FGD. Et quoniam ob eandem rationem nec minor etiam esse potest, concludendum est, angulum AFG æqualem esse angulo FGD.

Dico secundò, angulum exteriorem EFB æqualem esse interiori, & opposito ad eandem partem FGD.

Angulus enim AFG ostensus est æqualis angulo FGD. Jam verò idem angulus AFG [2] æqualis est etiam angulo EFB. Quare erit [3] angulus EFB æqualis angulo FGD.

Dico tertidò, duos angulos BFG, FGD, qui sunt interiores, ad eandem partem positi, esse simul duobus rectis æquales.

Nam quum angulus AFG ostensus sit æqualis angulo FGD; appposito communi BFG, erunt [4] duo anguli AFG, BFG æquales duobus angulis BFG, FGD. Sed duo anguli AFG, BFG simul (5) sunt æquales duobus rectis. Quare etiam (6) duobus rectis æquales erunt duo anguli BFG, FGD.

Igitur, si in duas rectas lineas parallelas tertia incidat recta linea, hæc efficiet & angulos alternos æquales; & angulum exteriorem æqualem interiori, & opposito ad eandem partem; & duos angulos interiores, ad eandem partem positos, duobus rectis æqua-

(1) *Axi.* 13. [2] *Prop.* 15.

(3) *Axi.* 1. [4] *Axi.* 2.

(5) *Prop.* 13. [6] *Axi.* 1.


æquales. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M.

Convertit hæc propositio utramque propositionem præcedentium. In iis enim ex hypothesis, quod vel anguli alterni sint æquales, vel angulus exterior æqualis sit interiori & opposito ad eandem partem, vel duo anguli interiores, ad eandem partem positi, sint æquales duobus rectis, colligitur semper lineas esse parallelas. Vicissim autem in ista, ex supposito parallelismo linearum tria illa necessariò consequi, demonstratur.

## PROP. XXX. THEOR. XXI.

*Quæ eidem sunt parallelæ, inter se sunt parallelæ.*



Eidem rectæ lineæ EF parallelæ sit tantum recta AB, quam recta CD. Dico, rectas AB, CD parallelas esse inter se.

Ducatur enim recta alia, GHI, quæ eas utcumque se-


cet in tribus punctis G, H, I. Et quoniam ex hypothesis rectæ AB, EF, sunt parallelæ; erunt (1) anguli alterni AGI, GIF æquales  
D 5 in-

(1) Prop. 29.

inter se. Pariterque quoniam ex hypothesi parallelæ sunt rectæ  $CD$ ,  $EF$ ; erit (1) angulus exterior  $GHD$  æqualis interiori, & opposito ad eamdem partem  $GIF$ . Eidem igitur angulo  $GIF$  æqualis est tam angulus  $AGH$ , quàm angulus  $GHD$ . Quare erit (2) angulus  $AGH$  æqualis angulo  $GHD$ : qui quum sint alterni, erunt lineæ  $AB$ ,  $CD$  [3] inter se parallelæ. Et propterea, quæ eidem sunt parallelæ, inter se parallelæ sunt. Quod erat demonstrandum.

## PROP. XXXI. PROBL. X.

*Per datum punctum datæ rectæ lineæ parallelam rectam lineam ducere.*



Datum sit punctum  $A$ , data verò recta  $BC$ . Oportet, per datum punctum  $A$  ducere rectam parallelam datæ  $BC$ .

Capiatur in  $BC$  p punctum quodvis  $D$ , & juncta (4)  $AD$ , fiat (5) ad rectam istam  $AD$ , atque ad datum in ea punctum  $A$  angulus  $DAE$  æqualis angulo  $ADB$ , & extendatur (6)  $EA$  versus  $F$ . Dico, rectam  $EF$  parallelam esse ipsi  $BC$ .

Sunt enim ex constructione æquales inter se anguli  $DAE$ ,  $ADB$ . Sed isti anguli sunt al-


---

(1) Prop. 29. (2) Axi. 1.  
 (3) Prop. 27. [4] Post. 1.  
 (5) Prop. 23. [6] Post. 2.

alterni. Quare rectæ EF, CB [1] parallelæ erunt inter se. Et propterea per datum punctum A ducta est recta EF parallela datæ BC. Quod erat faciendum.

## PROP. XXXII. THEOR. XXII.

*Cujuscumque trianguli, uno latere producto, angulus exterior est æqualis duobus interioribus, & oppositis simul sumptis; & anguli omnes simul duobus rectis sunt æquales.*



Sit triangulum ABC, & unum ejus latus BC extendatur versus D. Dico, angulum exteriorem ACD æqualem esse duobus interioribus, & oppositis simul sumptis, CAB, ABC.

Per punctum C ducatur (2) recta CE ipsi AB parallela. Et quoniam parallelæ sunt rectæ lineæ AB, CE, & in ipsas incidit AC; erit [3] angulus ACE æqualis angulo CAB. Similiter, quoniam rectæ AB, CE sunt parallelæ, & in ipsas incidit BD, erit [4] angulus exterior DCE æqualis interiori, & opposito ad eandem partem ABC. Ostensus est autem angulus ACE æqualis angulo CAB. Itaque erit totus angulus ACD æqualis duobus angulis simul sumptis CAB, ABC.

Dico etiam, omnes angulos ejusdem trianguli ABC simul duobus rectis æquales esse

D 6

Osten-

(1) Prop. 27. (2) Prop. 31.

[3] Prop. 29. (4) Prop. 29.

Ostensum est enim, angulum  $ACD$  æqualem esse duobus angulis  $CAB$ ,  $ABC$ . Quare appposito communi  $BCA$ , erunt [1] duo anguli  $BCA, ACD$  æquales tribus angulis  $CAB, ABC, BCA$ . Sed duo anguli  $BCA, ACD$  simul (2) sunt æquales duobus rectis. Itaque tres anguli  $CAB, ABC, BCA$  simul etiam duobus rectis æquales erunt. Et propterea cujuscumque trianguli, non modo uno latere producto angulus exterior est æqualis duobus interioribus, & oppositis simul sumptis, sed & anguli omnes simul duobus rectis æquales sunt. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Theorematis hujus duæ sunt partes, quarum altera paullo specialius determinat id, quod propositione XVI. positum est; altera specialio-rem continet determinationem ejus, quod propositione XVII. posuimus. In iis enim ostensum est, cujuscumque trianguli, uno latere producto, angulum exteriorem majorem esse unoquoque ex duobus interioribus, & oppositis; nec non duos angulos simul duobus rectis minores esse. Hic autem ostenditur, cujuscumque trianguli angulum exteriorem æqualem esse duobus interioribus, & oppositis simul sumptis, omnesque angulos internos simul duos rectos adæquare.*


PROP.

[1] Axi. 2. (2) Prop. 13.



## PROP. XXXIII. THEOR. XXIII.

*Quæ æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt rectas lineas, sunt etiam æquales, & parallelæ.*



Sint rectæ duæ  $AB$ ,  $DC$  æquales, & parallelæ, quæ conjungantur ad easdem partes per duas alias rectas lineas  $AD$ ,  $BC$ . Dico, rectas istas  $AD$ ,  $BC$ ,

illas conjungentes ad easdem partes, esse etiam æquales, & parallelas.

Ducatur etenim (1) recta  $AC$ . Et quoniam  $AB$ ,  $DC$  sunt parallelæ, & in ipsas incidit  $AC$ ; erit [2] angulus  $BAC$  æqualis angulo  $ACD$ . Unde, quum duo triangula  $BAC$ ,  $DCA$  habeant duo latera  $AB$ ,  $AC$  æqualia duobus lateribus  $CD$ ,  $CA$  alterum alteri, nec non æquales angulos, sub iis lateribus contentos; habebunt (3) & basim  $BC$  æqualem basi  $AD$ , & angulum  $ACB$  æqualem angulo  $DAC$ . Quare, quum in duas rectas  $AD$ ,  $BC$  incidat tertia  $AC$ , & efficiat angulos alternos æquales; eæ erunt [4] inter se parallelæ. Ostensæ sunt autem æquales. Erunt igitur æ-


(1) Post. 1. [2] Prop. 29.

(3) Prop. 4. (4) Prop. 27.

quales, & parallelæ. Et propterea, quæ æquales, & parallelas ad easdem partes conjungunt rectas lineas, sunt etiam æquales, & parallelæ. Quod erat ostendendum.

## PROP. XXXIV. THEOR. XXIV.

*Parallelogrammorum spatiorum latera, quæ ex adverso sunt, inter se sunt æqualia; similiter autem & anguli; diagonalis verò ea bifariam dividit.*



Sit parallelogrammum  $ABCD$ . Dico, latera opposita inter se æqualia esse, hoc est latus  $AB$  æquale esse lateri  $DC$ , & latus

$AD$  æquale lateri  $BC$ ; similiter æquales esse inter se angulos oppositos, hoc est angulum  $BAD$  æqualem esse angulo  $BCD$ , & angulum  $ABC$  æqualem angulo  $ADC$ ; ac denique diagonalem  $AC$  ipsum bifariam, hoc est in duo triangula æqualia, dividere.

Quoniam enim  $ABCD$  parallelogrammum est, erunt (1) latera ejus opposita inter se parallela: proindeque erit (2) tam angulus  $BAC$  æqualis angulo  $ACD$ , quàm angulus  $DAC$  æqualis angulo  $ACB$ . Unde, quum duo triangula  $ABC$ ,  $CDA$  habeant duos angulos  $BAC$ ,  $ACB$  æquales duobus angulis  $ACD$ ,  $DAC$ , alterum alteri, & latus  $AC$ , quod

(1) Def. 36. [2] Prop. 29.

quod æqualibus adjacet angulis, commune; omnia alia similiter æqualia (1) habebunt. Quare erit latus  $AB$  æquale lateri  $DC$ , latus  $BC$  æquale lateri  $AD$ , angulus  $ABC$  æqualis angulo  $ADC$ , ipsumque triangulum  $ABC$  ipsi triangulo  $CDA$  æquale erit. Sed & angulus  $BAD$  æqualis etiam est angulo  $BCD$ , quum partes illius ostensæ sint æquales partibus istius. Itaque parallelogrammorum spatiorum latera, quæ ex adverso sunt, inter se sunt æqualia; similiter autem & anguli; diagonalis verò ea bifariam dividit. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

Quemadmodum autem, si figura  $ABCD$  sit parallelogramma, habebit ea latera, quæ ex adverso sunt, inter se æqualia. Sic vicissim ostendere licet, quod si figuræ  $ABCD$  opposita latera sint æqualia, ea sit parallelogramma. Nam semper ac figuræ  $ABCD$  opposita latera sunt æqualia, habebunt triangula  $ABC$ ,  $CDA$  singula latera singulis lateribus æqualia. Quare per octavam hujus habebunt etiam singulos angulos singulis angulis æquales; atque adeo per vigesimam septimam erit tam recta  $AB$  parallela ipsi  $DC$ , quam recta  $AD$  parallela ipsi  $BC$ .


## PROP. XXXV. THEOR. XXV.

Parallelogramma in eadem basi, & in iisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia.

Sint duo parallelogramma  $ABCD$ ,  $EECF$ , quæ habeant eandem basim  $EC$ , & sint  
con-

---

[1] Prop. 26.



constituta in iisdem parallelis  $BC$ ,  $AF$ . Dico, ista duo parallelogramma inter se æqualia esse.

Quoniam enim  $ABCD$  parallelogrammum est, erit (1) latus  $AD$  æquale lateri  $BC$ . Et si-

militer, quoniam  $EBCF$  est parallelogrammum, erunt ejus latera opposita  $EF$ ,  $BC$  inter se æqualia. Eidem itaque  $BC$  æqualis est, tam recta  $AD$ , quam recta  $EF$ . Quare erit (2)  $AD$  æqualis  $EF$ : & propterea addita communi  $DE$ , erit [3]  $AE$  æqualis  $DF$ , Est autem, propter parallelogrammum  $ABCD$ ,  $AB$  æqualis etiam  $DC$ . Quare latera duo  $AE$ ,  $AB$  trianguli  $BAE$  æqualia erunt lateribus duobus  $DF$ ,  $DC$  trianguli  $CDF$ , alterum alteri. Est etiam propter parallelas  $AB$ ,  $DC$  angulus  $BAE$ , contentus sub lateribus illius, æqualis angulo  $CDF$ , qui sub istius lateribus continetur. Quare erit [4] triangulum  $BAE$  æquale triangulo  $CDF$ ; atque adeo, ablato communi triangulo  $DGE$ , erit (5) trapetium  $BADG$  æquale trapetio  $CGEF$ ; additoque triangulo communi  $BGC$ , fiet (6) parallelogrammum  $ABCD$  æquale parallelogrammo  $EBCF$ . Parallelogramma igitur in eadem basi, & in iisdem parallelis constituta inter se æqualia sunt. Quod erat ostendendum.

PROP.


[1] Prop. 34. (2) Axi. 1.

(3) Axi. 2. [4] Prop. 4.

(5) Axi. 3. [6] Axi. 2.

## PROP. XXXVI. THEOR. XXVI.

*Parallelogramma in æqualibus basibus, & in iisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia.*



Sint duo parallelogramma ABCD, EFGH, quæ constituta in eisdem parallelis AH, BG habeant bases æquales BC, FG. Dico, ista duo parallelogramma inter se æqualia esse.

Ducantur etenim rectæ [1] AF, DG. Et quoniam ABCD est parallelogrammum, erunt [2] latera ejus opposita AD, BC inter se æqualia. Est autem ex hypothesi BC æqualis FG. Quare & AD [3] ipsi FG æqualis erit. Quum igitur rectæ duæ AD, FG sint æquales, & parallelæ; erunt etiam [4] æquales, & parallelæ rectæ AF, DG, quæ illas conjungunt ad easdem partes: & propterea ADGF parallelogrammum erit. Et quoniam parallelogramma duo ABCD, ADGF habent eandem basim AD, & sunt in iisdem parallelis, erunt ea [5] æqualia inter se. Pariterque, quoniã parallelogramma duo EFGH, ADGF habent eandem basim FG, & sunt in iisdem parallelis, erunt ea inter se æqualia. Eidem  
igi-

(1) Post. 1. [2] Prop. 34.

(3) Axi. 1. (4) Prop. 33. (5) Prop. 35.


igitur parallelogrammo ADGF æquale est tam parallelogrammum ABCD, quàm parallelogrammum EFGH. Quare erit (1) parallelogrammum ABCD æquale parallelogrammo EFGH. Et propterea parallelogramma in æqualibus basibus, & in iisdem parallelis constituta, inter se æqualia sunt. Quod erat ostendendum.

S C H O L I U M.

*Perspicuum est igitur ex duabus præcedentibus propositionibus, parallelogramma, quæ in iisdem parallelis sunt constituta, æqualia esse inter se, sive habeant eandem basim, sive bases æquales. Sed hoc idem in duabus sequentibus propositionibus de triangulis etiam ostenditur.*

PROP. XXXVII. THEOR. XXVII.

*Triangula in eadem basi, & in iisdem parallelis constituta, inter se sunt æqualia.*



Sint duo triangula ABC, DBC, quæ habeant eandem basim BC, & sint constituta in iisdem parallelis AD, BC. Dico, ista duo triangula inter se æqualia esse.


Producatur enim AD (2) utrimque versus E, & F; tum per puncta B, & C (3) ducantur rectæ

(1) Axi.1. [2] Post.2. (3) Prop.31.

rectæ BE, CF parallelæ ipsi CA, BD. Sunt igitur ACBE, DBCF parallelogramma duo, quæ quum habeant eandem basim BC, & constituta sint in iisdem parallelis, æqualia ea erunt (1) inter se. Jam verò diagonalis dividit [2] parallelogrammum bifariam; atque adeo triangula ABC, DBC semisses sunt eorum parallelogrammorum. Itaque triangula ABC, DBC similiter inter se sunt [3] æqualia. Et propterea triangula in eadem basi, & in iisdem parallelis constituta æqualia sunt inter se. Quod erat demonstrandum.

PROP. XXXVIII. THEOR. XXVIII.

*Triangula in æqualibus basibus, & in iisdem parallelis constituta inter se sunt æqualia.*



Sint duo triangula ABC, DEF, quæ constituta in iisdem parallelis AD, BF, habeant æquales bases BC, EF. Dico, ista duo triangula inter se æqualia esse.

Producatur etenim AD (4) utrimque versus puncta G, & H. Tum per punctum B agatur [5] recta BG parallela ipsi AC, & per punctum F recta FH parallela ipsi DE. Sunt igitur ACEG, DEFH parallelogramma duo, quæ quum habeant bases

[1] Prop. 35. [2] Prop. 34.  
 [3] Axi. 7. (4) Post. 2.  
 (5) Prop. 31.

ses æquales  $BC$ ,  $EF$ , & sint constituta in iisdem parallelis, æqualia ea erunt (1) inter se. Jam verò diagonalis dividit [2] parallelogrammum bifariam, atque adeo triangula  $ABC$ ,  $DEF$  semisses sunt eorum parallelogrammorum. Itaque triangula  $ABC$ ,  $DEF$  similiter inter se sunt [3] æqualia. Et propterea triangula in æqualibus basibus, & in iisdem parallelis constituta æqualia sunt inter se. Quod erat ostendendum.

### S C H O L I U M.

*Non solum igitur parallelogramma, verùm etiam triangula, quæ in iisdem parallelis sunt constituta, æqualia inter se sunt, sive habeant eandem basim, sive bases æquales. Unde quatuor præcedentes propositiones sic poterunt in unum contrahi: triangula, & parallelogramma in iisdem parallelis, & in eadem, vel æqualibus basibus constituta, inter se sunt æqualia.*

### PROP. XXXIX. THEOR. XXIX.

*Triangula æqualia, in eadem basi & ad eandem partem constituta, sunt etiam in iisdem parallelis.*

**S**int duo triangula æqualia  $ABC$ ,  $DBC$ , quæ constituta sint ad eandem partem in eadem basi  $BC$ . Dico, duo ista triangula esse etiam


---

(1) Prop. 36.

(2) Prop. 34.

[3] Axi. 7.





etiam in iisdem parallelis, hoc est rectam AD parallelam esse ipsi BC.

Si enim recta AD non sit parallela ipsi BC, huic BC per punctum A parallela agatur (1) AE, quæ conveniat cum DB in puncto E, & jungatur (2) CE.

Quoniam igitur triangula duo ABC, EBC, habent eandem basim BC, & sunt constituta in iisdem parallelis AE, BC, æqualia ea erunt [3] inter se. Sed ex hypothese triangulum ABC æquale est triangulo DBC. Quare erit (4) triangulum EBC æquale triangulo DBC, quod fieri non potest. Non igitur AE, sed AD parallela est ipsi BC. Et propterea triangula æqualia in eadem basi, & ad eandem partem constituta, sunt etiam in iisdem parallelis. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.


*Hoc theorema, licet non omni ex parte, convertit id, quod propositione trigesima septima positum est. Nimirum ibi ex eo, quod triangula duo habeant eandem basim, & constituta sint in iisdem parallelis, deducitur æqualitas eorum triangulorum. Hic autem ex eo, quod duo triangula sint æqualia, & ad eandem partem in eadem basi sint constituta, colligitur vicissim, ea triangula esse in iisdem parallelis.*

PROP.

[1] Prop. 31. (2) Post. 1.  
 (3) Prop. 37. (4) Axi. 1.

## PROP. XL. THEOR. XXX.

*Triangula æqualia, in æqualibus basibus,  
ac in directum jacentibus ad eandem  
partem constituta, sunt etiam in  
iisdem parallelis.*



Sint duo triangula æqualia  $ABD$ ,  $DEF$ , quæ constituta sint ad eandem partem in basibus  $BD$ ,  $DF$ , quæ æquales sint, & in directum jaceant. Dico, duo ista triangula esse etiam in iisdem parallelis, hoc est rectam  $AE$  parallelam esse ipsi  $BF$ .

Si enim recta  $AE$  non sit parallela ipsi  $BF$ , huic  $BF$  per punctum  $A$  parallela [1] ducatur  $AG$ , quæ conveniat cum  $DE$  in puncto  $G$ , & jungatur (2)  $FG$ .

Et quoniam triangula duo  $ABD$ ,  $GDF$  habent æquales bases  $BD$ ,  $DF$ , & constituta sunt in iisdem parallelis  $AG$ ;  $BF$ ; erunt ea [3] æqualia inter se. Sed ex hypothese triangulum  $ABD$  est æquale triangulo  $DEF$ . Quare erit (4) triangulum  $DEF$  æquale triangulo  $GDF$ , quod est absurdum. Non igitur  $AG$ , sed  $AE$  parallela est ipsi  $BF$ . Et propterea triangula æqualia in æqualibus basibus, & in dire-

(1) Prop. 31. (2) Post. 1.

(3) Prop. 38. [4] Axi. 1.

directum jacentibus ad eandem partem constituta, sunt etiam in iisdem parallelis. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

Hoc theorema, licet non omni ex parte, convertit id, quod propositione trigesima octava positum est. Ibi enim ex eo, quod triangula duo habeant bases æquales, & constituta sint in iisdem parallelis, deducitur æqualitas eorum triangulorum. Hic autem ex eo, quod duo triangula sint æqualia, & ad eandem partem in basibus æqualibus, ac in directum jacentibus sint constituta, colligitur vicissim, ea triangula in iisdem esse parallelis.


## S C H O L I U M.

Ex duabus autem præcedentibus propositionibus liquet, triangula, quæ æqualia sunt, esse quoque in iisdem parallelis, si constituta ad eandem partem habeant, vel eandem basim, v. c. bases æquales, ac in directum positas. Quod quidem verum est etiam de parallelogrammis; ut cuilibet demonstrationes à præcedentibus non dissimiles instituenti notum fiet.

## PROP. XLI. THEOR. XXXI.

Si parallelogrammum, & triangulum habeant eandem basim, & sint in iisdem parallelis constituta, erit parallelogrammum duplum trianguli.

**S**It parallelogrammum ABCD, sitque triangulum EBC, quæ constituta in iisdem parallelis



parallelis  $AE$ ,  $BC$  habeant eandem basim  $BC$ . Dico, parallelogrammum  $ABCD$  duplum esse trianguli  $EBC$ .

Ducatur etenim [1]  $AC$ . Et quoniam diago-

nalis dividit (2) parallelogrammum bifariam, erit parallelogrammum  $ABCD$  duplum trianguli  $ABC$ . Sed triangulum  $ABC$  [3] est æquale triangulo  $EBC$ , quum sint constituta in eadem basi, & in iisdem parallelis. Quare erit parallelogrammum  $ABCD$  duplum quoque trianguli  $EBC$ . Et propterea, si parallelogrammum, & triangulum habeant eandem basim, & constituta sint in iisdem parallelis, erit parallelogrammum duplum trianguli. Quod demonstrare oportebat.

### S C H O L I U M.


Non dissimiliter ostendetur parallelogrammum duplum esse trianguli, si constituta in iisdem parallelis, habuerint non eandem, sed æquales bases. Sed tam hujus, quàm precedentis conversum pariter etiam obtinet: nempe, si parallelogrammum duplum fuerit trianguli, & constituta ad eandem partem habuerint, vel eandem basim, vel bases æquales, ac in directum positas, ea erunt etiam in iisdem parallelis.

PROP.

(1) Post. 1. (2) Prop. 34. [3] Prop. 37.

## PROP. XLII. PROBL. XI.

*Dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo rectilineo.*



Datum sit triāgulum  $ABC$ , datus verò angulus rectilineus  $D$ . Oportet, constituere parallelogrammum, quod sit æquale dato triangulo  $ABC$ , habeat-

que angulum, æqualem dato angulo rectilineo  $D$ .

Secetur  $BC$  [1] bifariam in  $E$ ; tum ad lineam  $CE$ , atque ad datum in ea punctum  $E$  constituatur (2) angulus  $CEF$  æqualis angulo  $D$ . Agatur deinde (3) tam per punctum  $A$  recta  $AG$  ipsi  $BC$  parallela, quàm per punctum  $C$  recta  $CG$  parallela ipsi  $EF$ , eæque convenient in  $G$ . Dico,  $CEFG$  esse parallelogrammum quæsitum.

Jungatur enim [4]  $AE$ . Et quoniam triangula duo  $ABE$ ,  $ACE$  habent bases æquales  $BE$ ,  $CE$ , & constituta sunt in iisdem parallelis  $BC$ ,  $AG$ ; erunt ea (5) æqualia inter se: proindeque triangulum totum  $ABC$  duplum erit ipsius  $ACE$ . Sed ejusdem trianguli  $ACI$  duplum est [6] etiam parallelogrammum  $CEFG$ .

E

Qua-

(1) Prop. 10. [2] Prop. 23.

(3) Prop. 31. (4) Post. 1.

[5] Prop. 38. (6) Prop. 41.

Quare erit (1) parallelogrammum  $CEFG$  æquale triangulo  $ABC$ . Habet autem idem parallelogrammum ex constructione angulum  $CEF$  æqualem angulo dato  $D$ . Constitutum est igitur parallelogrammum  $CEFG$ , æquale triangulo  $ABC$ , habens angulum æqualem dato angulo  $D$ . Quod erat faciendum.

### COROLLARIUM.

*Ex ipsa autem problematis hujus demonstratione inferre licet, quod si triangulum, & parallelogrammum sint in iisdem parallelis, & basis trianguli dupla sit basis parallelogrammi, ea equalia sint inter se. Ostensum est enim, triangulum  $ABC$  æquale esse parallelogrammo  $CEFG$ , quæ quidem non modò sunt in iisdem parallelis  $BC$ ,  $AG$ , verùm etiam bases habent tales, ut quæ triangulo competit, dupla sit ejus, quæ ad parallelogrammum refertur.*

### PROP. XLIII. THEOR. XXXIII.


*Parallelogrammorum spatiorum, eorum, quæ circa diametrum sunt, complementa, inter se sunt equalia.*

**S**it parallelogrammum  $ABCD$ , in cujus diagonali  $AC$  sumpto puncto quovis  $E$ , agantur per illud (2) rectæ  $FG$ ,  $HI$  parallelæ lateribus  $AB$ ,  $BC$ . Dico, equalia esse parallelogramma  $BGEH$ ,  $EFDI$ , quæ sunt complementa eorum, quæ sunt circa diametrum, seu diagonalem  $AC$ .

Quo-

---

(1) Axi. 6. [2] Prop. 31.



Quoniam diagonalis dividit (1) parallelogrammum in duo triangula æqualia, erit tum triangulum  $ABC$  æquale triangulo  $ADC$ , cum triangulum  $AHE$  æquale triangulo  $AFE$ , cum denique triangulum  $CGE$  æquale triangulo  $CIE$ . Quocirca, si ex triangulo

$ABC$  auferantur triangula  $AHE$ ,  $CGE$ , & ex triangulo  $ADC$  auferantur triangula  $AFE$ ,  $CIE$ ; quia ex æqualibus æqualia auferuntur, remanebit [2] parallelogrammum  $BGEH$  æquale parallelogrammo  $EFDI$ . Et propterea in parallelogrammis spatiis eorum, quæ circa diametrum sunt, complementa, inter se æqualia sunt. Quod demonstrare oportebat.

### PROP. XLIV. PROBL. XII.

*Ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo.*


**D**ata quidem fit recta  $AB$ , datum verò triangulum  $C$ , & datus demum angulus  $D$ . Oportet, ad rectam ipsi  $AB$  æqualem constituere parallelogrammum, æquale triangulo  $C$ , habens angulum æqualem angulo  $D$ .

E 2

Con-

---

[1] Prop. 34. [2] Axi. 3.



Constituatur parallelogrammum (1) EFGH æquale triangulo C, habens angulum GHE æqualem angulo D; tum extendatur (2) GH versus I,

& ponatur [3] HI æqualis ipsi AB. Ducatur deinde per punctum I (4) recta KL ipsis EH, FG parallela, quæ conveniat cum FE producta in K.

Et quoniam parallelæ sunt rectæ FG, KI, & in ipsas incidit FK, erunt (5) duo anguli GFK, FKI duobus rectis æquales: & propterea, quia, juncta KH, fiunt duo anguli GFK, FKH duobus rectis minores, conveniet (6) KH producta cum FG similiter producta in puncto aliquo. Conveniant itaque in puncto M, per quod agatur recta ML ipsi FK parallela, quæ conveniat cum EH in N, & cum KI in L. Dico, HILN esse parallelogrammum quæsitum.

Nam parallelogramma duo EFGH, HILN velut supplementa eorum, quæ sunt circa diametrum, æqualia sunt [7] inter se. Sed ex constructione parallelogrammum EFGH est æquale triangulo C. Quare eidem triangulo C erit

(1) Prop. 42. (2) Post. 2.

[3] Prop. 2. (4) Prop. 31.

(5) Prop. 29. (6) Axi. 13.

[7] Prop. 43.



C erit etiam æquale [1] parallelogrammum  $HILN$ . Est autem  $HI$  æqualis  $AB$ , & angulus  $NHI$ , velut æqualis angulo  $EHG$ , adæquat angulum  $D$ , cui ipse  $EHG$  ex constructione æqualis est, Constitutum est igitur super rectam  $HI$ , ipsi  $AB$  æqualem, parallelogrammum  $HILN$ , æquale triangulo  $C$ , habens angulum  $NHI$  æqualem angulo  $D$ . Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc problema determinat magis id, quod propositione quadragesima secunda positum est. Ibi enim quærebatur parallelogrammum duplici conditione refertum; una, ut æquale esset dato triangulo; altera, ut angulum haberet dato angulo æqualem. Hic autem quæritur parallelogrammum, quod præter duas illas condiciones debet quoque tertiam habere: scilicet, ut constitutum sit super rectam, alteri datæ rectæ lineæ æqualem.*

## PROP. XLV. PROBL. XIII.


*Dato rectilineo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo.*

**D**ATA sit figura quævis rectilinea  $ABCD$ , datus verò angulus  $E$ . Oportet, constituere parallelogrammum, quod æquale ipsi  $ABCD$ , habeat angulum æqualem angulo  $E$ .

Dividatur figura  $ABCD$  per rectam  $AC$   
 $E$  3 in

---

(1) *Axiom.*



in duo triangu-  
la ABD, BCD.  
Tum constitua-  
tur parallelo-  
grammūFGHI  
[1] æquale triā-  
gulo ABD, ha-  
bens angulum  
GFI æqualem  
angulo E. Con-  
stituatur porro

super rectam HI parallelogrammum aliud  
[2] HIKL, quod æquale alteri triangulo BC-  
D, habeat quoque angulum HIK æqualem  
eidem angulo E. Dico, FGLK esse paral-  
lelogrammum quæsitum.

Quoniam enim ex constructione eidem an-  
gulo E æqualis est tum angulus GFI, cum  
angulus HIK, erit (3) angulus GFI æqualis  
angulo HIK. Quare, appposito communi  
HIF, erunt (4) duo anguli GFI, HIF æqua-  
les duobus angulis HIK, HIF. Sunt autem  
propter parallelas GF, HI duo anguli GFI,  
HIF [5] duobus rectis æquales. Erant igitur  
æquales etiam duobus rectis duo anguli  
HIK, HIF: & propterea rectæ duæ IF, IK  
(6) erunt in directum.

Simili modo ostendetur in directum esse  
rectas duas GH, HL: quandoquidem anguli  
GHI, HLK, velut æquales [7] angulis GFI,  
HIK, æquales sunt inter se. Unde quum sit

ex

- 
- (1) Prop. 42. (2) Prop. 44.  
(3) Axi. 1. (4) Axi. 2.  
[5] Prop. 19, [6] Prop. 14.  
(7) Prop. 34.

ex constructione GH parallela ipsi FI, erit tota GL toti FK pariter parallela. Est autem GF ipsi LK [1] etiam parallela, quum utraque ex constructione parallela sit eidem HI. Parallelogrammum est igitur FGLK, quod quum æquale sit rectilineo ABCD, habeatque angulum GFK æqualem angulo E, ipsum erit illud, quod quæritur. Constitutum est itaque parallelogrammum FGLK, æquale rectilineo ABCD, habens angulum æqualem angulo E. Quod facere oportebat.

## S C H O L I U M I.

*Hoc problema paulò generalius est illo, quod propositum est propositione quadragesima secunda. Ibi enim quærebatur parallelogrammum, quod habens angulum, dato angulo æqualem, æquale esset dato triangulo. Hic verò quæritur parallelogrammum, quod habeat quidem angulum æqualem dato angulo, sed æquale sit ipsum datæ cuilibet figuræ rectilineæ.*

## S C H O L I U M II.

*Cæterùm si figura rectilinea data plura habeat latera, quàm quatuor, atque adeo dividenda esset in plura triangula, quàm duo; tum oportet super rectam LK constituere aliud parallelogrammum æquale tertio triangulo, habens in K angulum æqualem angulo E; sicque pergendum erit in infinitum. Demonstratio autem semper est eadem, ut rem attentè considerandi liquidò patet.*

E 4

SCHO-


[1] Prop. 30.

## S C H O L I U M III.

*Sed quemadmodum in propositione quadragesima quarta ex tradita ratione constituendi parallelogrammum, quod æquale dato triangulo habeat angulum dato angulo æqualem, licuit nobis ad datam rectam lineam dato triangulo æquale parallelogrammum constituere in dato angulo; ita quoque ex tradita ratione constituendi parallelogrammum, quod æquale dato rectilineo habeat angulum æqualem angulo dato, licebit nobis methodo non dissimili ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum constituere in angulo dato.*

## PROP. XLVI. PROBL. XIV.

*In data recta linea terminata quadratum  
constituere.*



Sit data recta linea terminata AB. Oportet, in ipsa quadratum constituere.

Ipsi AB ex puncto A [1] perpendicularis erigatur AC, ex qua abscindatur (2) portio AD eidem AB æqualis. Ducantur deinde (3) per puncta B, & D rectæ BE, DE ipsis AD, AB resp.

[1] Prop. 12. [2] Prop. 3.  
[3] Prop. 31.

ſpectivè æquidistantes. Dico,  $ABED$  eſſe quadratum quæſitum.

Eſt enim  $ABED$  ex conſtructione parallelogrammum. Quare, quum in parallelogrammo latera (1) oppoſita ſint æqualia, erit, tum  $AB$  æqualis ipſi  $DE$ , cum  $AD$  æqualis ipſi  $BE$ . Eſt autem ex conſtructione &  $AB$  ipſi  $AD$  æqualis. Quatuor itaque  $AB$ ,  $AD$ ,  $DE$ ,  $BE$  æquales ſunt inter ſe: proindeque figura  $ABED$  æquilatera erit.

Et quoniam ex conſtructione rectus eſt angulus  $BAD$ , ob parallelas verò  $AD$ ,  $BE$  duo anguli  $BAD$ ,  $ABE$  (2) duobus rectis æquales ſunt; erit etiam rectus angulus  $ABE$ . Jam verò in parallelogrammis anguli oppoſiti (3) æquales ſunt inter ſe. Itaque anguli  $ADE$ ,  $BED$ , velut æquales angulis  $ABE$ ,  $BAD$ , recti pariter erunt: proindeque eadem figura  $ABED$  non ſolum æquilatera, verùm etiam rectangula erit; & conſequenter erit [4] quadratum, Conſtitutum eſt igitur in data recta linea terminata  $AB$  quadratum  $ABED$ . Quod erat faciendum.

### COROLLARIUM I.

*Ex ipſa autem problematis hujus demonſtratione colligere licet, quod ſi in parallelogrammo unus angulorum ſit rectus, reliqui etiam recti ſint. Ex eo enim, quod in parallelogrammo  $ABED$  rectus ſit ex conſtructione angulus  $BAD$ , oſenſum eſt, reliquos quoque angulos rectos eſſe.*

E 5

CO.

[1] Prop. 34. [2] Prop. 29.


(3) Prop. 34. [4] Def. 30.

## COROLLARIUM II.

*Sed ex definitione quadrati, vel etiam ex ipsa problematis constructione perspicuum est quoque, quadrata, super æqualibus rectis lineis descripta, æqualia esse inter se. Unde & illud facile consequitur, quod si vicissim æqualia sint quadrata, æquales etiam esse debeant rectæ lineæ, super quibus quadrata illa sunt descripta.*

## PROP. XLVII. THEOR. XXXIII.

*In triangulis rectangulis quadratum, quod fit ex latere, rectum angulum subtendente, æquale est quadratis laterum, rectum angulum continentium.*



*ex lateribus BA, BC, eundem angulum rectum continentibus.*

Sit triangulū ABC rectum habens angulum in B. Dico, quadratum ex latere AC, subtendente angulū rectum, æquale esse quadratis, quæ fiunt

De-

Describantur (1) ex singulis trianguli lateribus quadrata. Deinde ducta (2) BL ipsi AE, CD parallela, jungantur tum rectæ BE, BD, cum rectæ CG, AI [3].

Et quoniam ex hypothese rectus est angulus ABC, & ABF, velut angulus quadrati, similiter est rectus; erunt duo anguli ABC, ABF duobus rectis æquales; & propterea indirectum erunt [4] rectæ duæ BC, BF. Unde non modo BF, sed & tota CF ipsi AG parallela erit. Simili ratione ostendetur, indirectum esse rectas duas AB, BH, atque adeo non modò BH, sed & totam AH ipsi CI parallelam esse.

Rursus, quia, propter quadrata ABFG, AEDC, æqualia sunt inter se, tum latera AB, AG, cum latera AC, AE; erunt duo latera AB, AE trianguli BAE æqualia duobus lateribus AG, AC trianguli GAC, alterum alteri. Jam verò æquales sunt etiam anguli BAE, GAC, sub lateribus illis comprehensi; quum uterque ipsorum CAE, BAG ex constructione sit rectus, & utrique communis sit angulus BAC. Erit igitur triangulum BAE æquale (5) triangulo GAC. Est autem [6] trianguli BAE duplum parallelogrammum AELK, & trianguli CAG duplum parallelogrammum, seu quadratum ABFG. Quare erit (7) parallelogrammum AELK æquale quadrato ABFG.

Simili modo, ope triangulorum DCB, ACI ostendetur, parallelogrammum CDLK æ-

E 6

quale

[1] Prop. 46. [2] Prop. 31.

[3] Post. 1. [4] Prop. 14.

[5] Prop. 4. [6] Prop. 41.

[7] Axi. 6.


quale esse quadrato  $BCIH$ . Unde erit quadratum totum  $ACDE$ , æquale duobus quadratis simul sumptis  $ABFG$ ,  $BCIH$ . Et propterea in triangulis rectangulis quadratum ex latere, rectum angulum subtendente, æquale est quadratis, quæ fiunt ex lateribus rectum angulum continentibus. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Latus, quod in triangulis rectangulis rectum angulum subtendit, græcè dicitur hypotenusa. Unde idem theorema enunciari quoque solet à nonnullis in hunc modum: in triangulis rectangulis quadratum hypotenuse æquale est quadratis laterum simul sumptis.*

## PROP. XLVIII. THEOR. XXXIV.

*Si quadratum ex uno latere trianguli æquale sit quadratis, quæ ex aliis duobus lateribus fiunt; angulus, sub his lateribus contentus, rectus erit.*



Sit triangulum  $ABC$ , & in eo quadratum ex latere  $AC$  æquale sit quadratis, quæ fiunt ex lateribus  $AB$ ,  $BC$ . Dico, angulum  $ABC$  rectum esse.

Erigatur [1] ex puncto  $B$ , super  $BC$  per-

(1) Prop. 11.



perpendicularis  $BD$ , quæ constituatur [1] ipsi  $AB$  æqualis, & jungatur [2]  $DC$ .

Quoniam igitur ex constructione  $AB$  est æqualis  $BD$ , erit etiam quadratum ex  $AB$  æquale quadrato ex  $BD$ . Quare appposito communi quadrato ex  $BC$ , erunt quadrata duo; alterum ex  $AB$ , alterum ex  $BC$ , æqualia [3] duobus quadratis, quæ fiunt ex  $BD$ , &  $BC$ . Est autem ex hypothesi quadratum lateris  $AC$  æquale quadratis laterum  $AB, BC$ ; & ob triangulum  $DBC$ , rectum habens angulum in  $B$ , quadratum hypotenusæ  $DC$  est æquale (4) quadratis laterum  $BD, BC$ . Itaque erit [5] quadratum ex  $AC$  æquale quadrato ex  $DC$ : & propterea  $AC$  ipsi  $DC$  æqualis erit.

Quum igitur triangula duo  $ABC, DBC$  habeant duo latera  $BA, BC$  æqualia duobus lateribus  $BD, BC$ , alterum alteri, itemque basim  $AC$  æqualem basi  $DC$ ; habebunt quoque [6] angulum  $ABC$  æqualem angulo  $DBC$ . Est autem angulus  $DBC$  ex constructione rectus: itaque rectus quoque erit angulus  $ABC$ . Et propterea, si quadratum ex uno latere trianguli æquale sit quadratis, quæ ex aliis duobus lateribus fiunt, angulus, sub his lateribus contentus, rectus erit. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema est conversum præcedentis. Ibi enim ex eo, quod triangulum sit rectangulum, osten-*

---

[1] Prop. 3. [2] Post. 1.

(3) Axi. 2. (4) Prop. 47.

[5] Axi. 1. [6] Prop. 8.

Ostensum est, quadratum lateris, rectum angulum subtendentis, æquale esse quadratis, quæ sunt ex lateribus rectum angulum continentibus. Hic verò per contrarium ex eo, quod quadratum lateris unius æquale sit quadratis, quæ sunt ex aliis duobus lateribus, ostenditur, triangulum esse rectangulum, & rectum esse angulum illum, quem latus illud subtendit.



III

# GEOMETRIÆ PLANÆ

## ELEMENTORUM

### LIBER SECUNDUS.

---

#### DEFINITIONES.

##### I.



**O**mnē parallelogrammum re-  
ctangulum dicitur factum, seu  
contentum sub duobus late-  
ribus, quæ rectum angulum  
comprehendunt. Nempe quia  
alterum ex iis lateribus designat  
longitudinem, alterum latitudinem parallelo-  
grammi rectanguli. Quod de parallelogram-  
mo obliquangulo dici non potest, quia ex  
duobus lateribus, quæ sunt circa ipsius an-  
gulum aliquem, etsi unum designet longitu-  
dinem ejus, alterum tamen, velut inclinatum  
ad primum, ejusdem latitudinem nequaquam  
ostendit.

Parallelogrammum rectangulum vocabitur  
in posterum simpliciter rectangulum, ejusque  
contentum habebitur, multiplicando inter se  
mutuò latera, quæ rectum angulum comprehen-  
dunt. Unde, si fuerit quadratum, propter æ-  
qualitatem laterum, satis erit, unum ex ejus  
lateribus in se ipsum ducere, ut quadrati area,  
seu contentum habeatur.

Sed notandum hoc loco est aream rectanguli

ORIT

oriri quidem ex multiplicatione laterum, quæ sunt circa angulum rectum, eamque quadrati ex multiplicatione unius ex ejus lateribus per seipsum; verum aliam esse mensuram laterum, aliam mensuram reſtangularum, vel quadratorum: nempe longitudines laterum mensurantur per pedes lineares, areas verò reſtangularum, vel quadratorum per pedes quadratos, hoc eſt per quadrata, ſuper pedibus linearibus deſcripta.

Itaque ſi ex lateribus, quæ ſunt circa angulum rectum alicujus parallelogrammi reſtangulari, unum quidem ſit pedum trium, alterum pedum quinque, area reſtangulari erit pedum quadratorum 15. quia multiplicando 3. per 5. producitur 15. Et ſimiliter ſi latus quadrati ſit pedum ſex, quadrati area erit pedum quadratorum 36. quia multiplicando numerum 6. per ſe ipſum, producitur 36.


I.

Unumquodque parallelogrammorum circa diametrum una cum duobus ſupplementis, Gnomon vocetur. Unde ſi Gnomoni addatur parallelogrammum alterum circa diametrum exſiſtens, figura tota orietur.

## PROP. I. THEOR. I.

Si fuerint duæ reſtæ lineæ, una quidem ſecta in quotcumque partes, altera verò inſecta, reſtangulum, quod fit ex tota, & inſecta æquale erit reſtangulis, quæ ſunt ex partibus totius, & eadem inſecta.

Sint duæ reſtæ lineæ A quidem inſecta, BE verò ſecta in tres partes BC, CD, DE.  
Di-



Dico, rectangulum, quod fit ex BE in A; æquale esse tribus rectangulis, uni ex BC in A, alteri ex CD in A, tertio ex DE in A.

Erigatur [1] ex puncto B super BE perpendicularis BF, quæ ipsi A

(2) constituatur æqualis. Tum ducta per punctum F recta FI ipsi BE parallela [3], excidentur ex punctis C, D, E perpendiculares aliæ CG, DH, EI, quæ conveniant cum FI in punctis G, H, I.

Et quoniam rectæ BF, CG, DH (4) æquales sunt inter se, estque BF ipsi A æqualis ex constructione; erit eidem A æqualis, tam recta CG, quàm recta DH. Jam verò ex quatuor rectangulis EF, CF, DG, EH primum quidem continetur sub lateribus BE, BF, secundum sub lateribus BC, BF, tertium sub lateribus CD, CG, & quartum sub lateribus DE, DH. Quare ex iisdem quatuor rectangulis EF, CF, DG, EH primum quidem fiet ex BE in A, secundum ex BC in A, tertium ex CD in A, & quartum ex DE in A. Est autem rectangulum EF ipsis CF, DG, EH simul sumptis æquale: totum enim omnes suas partes simul sumptas adæquat. Itaque rectangulum, quod fit ex tota BE in A, æquale erit tribus rectangulis, uni ex BC in A, alteri ex CD in A, & tertio ex DE in A. Ac propterea, si duæ fuerint rectæ lineæ, una quidem  
secta

[1] Prop. 11. lib. 1. (2) Prop. 3. lib. 1.

[3] Prop. 31. lib. 1. [4] Prop. 34. lib. 1.

secta in quocumque partes, altera verò insecta, rectangulum, quod fit ex tota, & insecta, æquale erit rectangulis, quæ fiunt ex partibus totius, & eadem insecta. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

Hæc cum sequentibus novem propositionibus potest numeris illustrari. Nempe si  $A$  sit quatuor pedum, &  $BE$  pedum quatuordecim, subinde divisa in punctis  $C$ , &  $D$ , ut  $BC$  sit pedum duorum,  $CD$  quinque, &  $DE$  septem; erit rectangulum ex  $BE$  in  $A$  pedum quadratorum 56; rectangulum ex  $BC$  in  $A$  pedum quadratorum 8; rectangulum ex  $CD$  in  $A$  pedum quadratorum 20; & rectangulum ex  $DE$  in  $A$  pedum quadratorum 28. Unde quia postremi isti tres numeri 8, 20, & 28 simul sumpti adæquant priorem numerum 56; liquet, rectangulum ex tota  $BE$  in  $A$  æquale esse tribus rectangulis, uni ex  $BC$  in  $A$ , alteri ex  $CD$  in  $A$ , & tertio ex  $DE$  in  $A$ .

## PROP. II. THEOR. II.


*Si recta linea secta fuerit utcumque, quadratum, quod fit à tota, æquale erit rectangulis, quæ fiunt ex tota, & partibus.*

**S**It recta  $AB$ , secta utcumque in  $C$ . Dico, quadratum ex  $AB$  æquale esse duobus rectangulis, uni ex  $AB$  in  $AC$ , alteri ex  $AB$  in  $BC$ .

Describatur [1] super  $AB$  quadratū  $ABDE$ ,  
& du-

---

(1) Prop. 46. lib. 1.



& ducatur (1) per punctum C recta CF ipfis AE, BD parallela.

Quoniã igitur ABDE quadratum est, erit ipsi AB æqualis, tum AE, cum BD. Jam verò ex duobus rectangulis CE, CD primum quidem continetur sub lateribus AE, AC, alterum

sub lateribus BD, BC. Quare ex iisdem duobus rectangulis CE, CD primum quidem fiet ex AB in AC, alterum ex AB in BC. Est autem quadratum totum ABDE rectangulis CE, CD simul sumptis æquale: totum enim omnes suas partes simul sumptas adæquat. Itaque quadratum, quod fit ex tota AB, æquale erit duobus rectangulis, uni ex AB in AC, alteri ex AB in BC. Et propterea, si recta linea secta fuerit utcumque, quadratum, quod fit à tota, æquale erit rectangulis, quæ fiunt ex tota, & partibus. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Sit AB pedum decem, subinde divisa in C, ut AC sit pedum quatuor, BC pedum sex. Erit igitur quadratum ex AB pedum quadratorum 100; rectangulum ex AB in AC pedum quadratorum 40; & rectangulum ex AB, in BC pedum quadratorum 60. Duo autem isti numeri 40, & 60 simul conficiunt 100. Itaque quadratum ex AB æquale est rectangulis duobus, uni ex AB in AC, alteri ex AB in BC.*


PROP.

---

[1] Prop. 31. lib. I.

## PROP. III. THEOR. III.

*Si recta linea secta fuerit utcumque, rectangulum ex tota, & parte una æquale erit rectangulo sub partibus, una cum quadrato quod fit ex parte prædicta.*



Sit recta AB secta utcumque in C. Dico, rectangulum ex tota AB, & parte una BC æquale esse rectangulo sub ipsis partibus AC, BC, una cum quadrato, quod fit ex parte illa BC.

Describatur (1) etenim super BC quadratum BCDF, & ducatur per punctum A recta AE [2] ipsis CD, BF parallela, quæ conveniat cum FD producta in E.

Quoniam igitur BCDF ex constructione quadratum est, erit ipsi BC æqualis tum recta BF, cum recta CD. Unde, quum rectangulum AF contineatur sub lateribus AB, BF, & rectangulum AD sub lateribus AC, CD; fiet rectangulum quidem AF ex tota AB, & parte una BC, rectangulum verò AD ex ipsis partibus AC, BC. Est autem rectangulum AF ipsis AD, CF simul sumptis æquale. Rectangulum igitur ex tota AB, & parte una BC æquale erit rectangulo sub ipsis partibus AC, BC, una cum quadrato, quod fit ex parte illa BC. Et propterea, si recta linea secetur  
ut-

(1) Prop. 46. lib. 1. [2] Prop. 31. lib. 1.



utcumque, rectangulum, quod fiet ex tota, & parte una, æquale erit rectangulo sub partibus, una cum quadrato, quod fit ex parte prædicta. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Sit recta tota AB pedum octo, secta subinde in puncto C, ut AC sit pedum trium, BC pedum quinque. Erit igitur rectangulum ex tota AB, & parte una BC pedum quadratorum 40; rectangulum sub ipsis partibus AC, BC pedum quadratorum 15; & quadratum ex parte BC pedum quadratorum 25. Unde, quum duo isti posteriores numeri 15, & 25 simul additi conficiant priorem 40; erit rectangulum ex tota AB, & parte una BC æquale rectangulo sub ipsis partibus AC, BC, una cum quadrato ex parte illa BC.*

## PROP. IV. THEOR. IV.


*Si recta linea secetur utcumque, quadratum, quod fit à tota; æquale erit quadratis partium, una cum rectangulo, bis sub partibus contento.*

**S**it recta AB secta utcumque in C. Dico, quadratum ex AB æquale esse quadratis partium AC, BC, una cum rectangulo, quod bis sub ipsis partibus AC, BC continetur.

Describatur etenim [1] super AB quadratum ABDE, & juncta BE, agatur [2] per punctum C recta CF ipsis AE, BD parallela, quæ

---

(1) Prop. 46. lib. 1. (2) Prop. 31. lib. 1.



quæ faciet ipsam BE in G. Denique per punctum G ducatur recta HI parallela ipsis AB, ED.

Et quoniam propter quadratum ABDE æqualia sunt latera AB, AE, erit triangulum BAE isosceles; adeoque [1] angulus ABE æqualis erit angulo AEB. Est autem, propter parallelas AE, CF, angulus AEB (2) æqualis angulo CGB. Itaque erit [3] angulus ABE æqualis angulo CGB; atque adeo latera CB, CG, quæ in triangulo BCG angulos illos subtendunt, inter se (4) æqualia erunt. Unde, quum sit [5] CB æqualis GI, & CG æqualis BI, erunt quatuor lineæ BC, CG, GI, IB inter se æquales; & consequenter figura BCGI æquilatera erit. Sed est etiam rectangula: habet enim, propter quadratum ABDE, angulum CBI rectum; & in parallelogrammis ubi unus angulorum est rectus, reliqui etiam recti esse debent. Est igitur figura BCGI æquilatera, & rectangula; adeoque quadratum, & quadratum, quod fit ex parte BC.

Simili ratione ostendetur, figuram EFGH quadratum esse ex HG, seu AC. Nam, propter quadratum ABDE, æqualia sunt latera DB, DE. Quare triangulum BDE isosceles erit; adeoque angulus DBE æqualis erit angulo

(1) Prop. 5. lib. 1. (-) Prop. 29. lib. 1.

[3] Axi. 1.

[4] Prop. 6. lib. 1.

[5] Prop. 34. lib. 1.

gulo DEB. Sed, propter parallelas BD, CF, idem angulus DBE æqualis est angulo FGE: & propterea latera FE, FG, quæ in triangulo, EFG angulos illos subtendunt, pariter æqualia erunt. Est autem EF æqualis HG, & FG æqualis EH. Quatuor igitur EF, FG, GH, HE inter se æquales erunt; atque adeo figura EFGH æquilatera erit. Estque etiam rectangula, quum propter quadratum ABDE habeat angulum FEH rectum. Itaque quadratum erit; & quadratum, quod fit ex parte AC, quæ est æqualis ipsi HG.

Sunt igitur FH, CI quadrata partium AC, BC. Sed rectangulum AG, velut contentum sub lateribus AC, CG, fit ex ipsis partibus AC, BC. Et rectangulum DG, velut æquale (1) ipsi AG, fit similiter ex ipsis partibus AC, BC. Quare, quum quadratum totum ABDE ipsis FH, CI, AG, DG simul sumptis æquale sit; erit quadratum ex tota AB æquale quadratis partium AC, BC, una cum rectangulo, quod bis sub ipsis partibus AC, BC continetur. Et propterea, si recta linea secetur utcumque, quod à tota fit quadratum, æquale erit quadratis partium, una cum rectangulo bis sub partibus contento. Quod erat ostendendum.

## COROLLARIUM.

*Ex ipsa autem hujus theorematis demonstratione perspicuum est, parallelogramma, quæ sunt circa diagonalem quadrati, esse etiam quadrata. Sunt enim FH, CI parallelogramma, exsi-*

---

[1] Prop. 43. lib. I.

*existentia circa diagonalem quadrati ABDE, quorum utrumque ostensum est, quadratum esse.*

### S C H O L I U M.

*Sit recta AB pedum octo, secta subinde in C, ut AC sit pedum quinque, BC pedum trium. Erit igitur quadratum ex tota AB pedum quadratorum 64; quadratum ex parte AC pedum quadratorum 25; quadratum ex parte alia BC pedum quadratorum 9; & rectangulum bis contentum sub ipsis partibus AC, BC pedum quadratorum 30. Unde, quia tres isti posteriores numeri 25, 9, 30 simul additi dant priorem 64; liquidò patet, quadratum ex tota AB æquale esse quadratis partium AC, BC, una cum rectangulo, quod bis sub ipsis partibus AC, BC continetur.*

### PROP. V. THEOR. V.


*Si recta linea secetur bifariam, & non bifariam, erit rectangulum ex partibus inæqualibus, una cum quadrato portionis, quæ inter utramque sectionem interjicitur, æquale ei, quod à dimidia describitur quadrato.*

**S**it recta AB secta bifariam in C, & non bifariam in D. Dico, rectangulum ex partibus inæqualibus AD, DB, una cum quadrato portionis CD, inter utramque sectionem interjectæ, æquale esse quadrato ex dimidia BC.

Describatur etenim [1] super BC quadratum

---

[1] Prop. 46. lib. I.



tum BCEF;  
& compleatur figura,  
prout eam  
schema re-  
præsentat.

Quoniam  
igitur CH,  
HF sūt sup-  
plemēta eo-  
rum , quæ

sunt circa diametrum , erunt ea (1) æqualia  
inter se . Quare , addito communi DI , erit  
[2] CI æquale ipsi DF . Est autem [3] CI æ-  
quale CM: sunt enim parallelogramma, quæ  
habent bases æquales , & sunt in iisdem pa-  
rallelis constituta . Et igitur (4) DF ipsi CM  
æquale erit ; adeoque apposito rursus com-  
muni CH , erit rectangulum totum AH æ-  
quale gnomoni NOR.

Jam rectangulū istud AH continetur sub  
lateribus AD, DH . Sed parallelogrammum  
DI , quum existat circa diagonalem quadra-  
ti , est etiam quadratum ; adeoque DH est  
æqualis DB . Fiet igitur rectangulum idem  
AH ex partibus AD, DB ; & consequenter  
rectangulū ex partibus AD, DB æquale erit  
gnomoni NOR. Addatur cōmune GL, quod  
est quadratum ex parte intermedia CD ; &  
erit rectangulum ex partibus inæqualibus  
AD, DB, una cum quadrato portionis inter-  
mediæ CD æquale gnomoni NOR, una cum  
GL. Gnomon autem NOR, una cum GL, est  
F qua-

(1) Prop. 43. lib. I. (2) Axi. 2.

(3) Prop. 36. lib. I. (4) Axi. 1.

quadratum totum BGEF. Itaque rectangulum sub partibus inæqualibus AD, DB una cum quadrato portionis CD, inter utramque sectionem interjectæ, æquale erit quadrato, quod fit ex dimidia BC. Quod erat ostendendum.

### COROLLARIUM.

Ex quo patet, rectangulum ADB æquale esse differentie quadratorum BC, CD. Ostensum est enim, rectangulum ADB, hoc est sub partibus AD, DB, una cum quadrato ex CD, æquale esse quadrato ex CB. Quare dempto communi quadrato ex CD, fiet rectangulum ADB æquale differentie quadratorum, quæ sunt ex BC, & CD.


### SCHOLIUM.

Sit recta AB pedum decem, quæ quum secta sit bifariam in C, erit tam AC, quàm BC pedum quinque. Sit autem eadem AB subinde secta non bifariam in D, ut AD sit pedum septem, DB pedum trium: adeo ut portio inter utramque sectionem interjecta CD sit pedum duorum. Erit igitur rectangulum ADB pedum quadratorum 21; quadratum ex CD pedum quadratorum 4; & quadratum ex BC pedum quadratorum 25. Unde, quum priores duo muneri 21, & 4 simul additi dent postremum 25; erit rectangulum ADB, una cum quadrato portionis intermedie CD, æquale quadrato ex dimidia BC.

PROP.

## PROP. VI. THEOR. VI.

*Si recta linea secetur bifariam, eique alia in directum adjiciatur; erit rectangulum, quod fit ex tota, & adjecta, velut ex unica linea, in ipsam adjectam, una cum quadrato dimidiæ, æquale quadrato, quod fit ex dimidia, & adjecta, similiter tamquam ex unica linea.*



Sit recta AB seceta bifariam in C, eique in directum sit adjecta alia BD. Dico, rectangulum, quod fit ex AD in DB, una cum quadrato di-

midia BC, æquale esse quadrato, quod fit ex GD.

Describatur etenim super CD (1) quadratum CDEI, & compleatur figura, quam schema repræsentat.

Et quoniam AL, CH sunt parallelogramma duo, quæ habent bases æquales, & sunt in iisdem parallelis constituta, ea æqualia (2) erunt inter se. Est autem [3] CH æquale ipsi HE, quum sint supplementa eorum, quæ sunt circa diametrum. Quare erit AL ipsi HE æquale [4]; & consequenter appposito communi CI, erit rectangulum totum AI (5) æquale gnomoni NOR.


F 2

Jam

[1] Prop. 46. lib. 1. (2) Prop. 36. lib. 1.

[3] Prop. 43. lib. 1. [4] Axi. 1.

(5) Axi. 2.



Jam rectangulum  $AI$  continetur sub lateribus  $AD, DI$ . Sed parallelogrammum  $BI$ , quum existat circa diagonalem quadrati, est etiam quadratum; adeoque  $DI$  est æqualis  $DB$ . Fiet igitur rectangulum idem  $AI$  ex  $AD$  in  $DB$ ; & consequenter rectangulum ex  $AD$  in  $DB$  æquale erit gnomoni  $NOR$ . Addatur commune  $GL$ , quod est quadratum, quod fit ex  $BC$ . Itaque erit rectangulum ex  $AD$  in  $DB$ , una cum quadrato ex  $BC$ , æquale gnomoni  $NOR$ , una cum  $GL$ . Gnomon autem  $NOR$ , una cum  $GL$ , constituit quadratum totum  $CDEF$ . Idem igitur rectangulum ex  $AD$  in  $BD$ , una cum quadrato dimidiæ  $BC$ , æquale erit quadrato, quod fit ex  $CD$ . Quod erat demonstrandum.

### COROLLARIUM.

Unde patet, rectangulum  $ADB$  æquale esse differentiæ quadratorum  $BC, CD$ . Ostensum est enim, rectangulum  $ADB$ , una cum quadrato ex  $BC$ , æquale esse quadrato, quod fit ex  $CD$ . Quare dempto communi quadrato ex  $BC$ , supererit rectangulum  $ADB$  æquale differentiæ quadratorum  $BC, CD$ .

### SCHOLIUM.


Sit recta  $AB$  pedum decem, quæ quum secta sit bisariam in  $C$ , erit tam  $AC$ , quàm  $BC$  pedum



*dum quinque. Sit portio BD pedum duorum, ita ut ipsa AD, quæ componitur ex tota AB, & adjecta BD, sit pedum duodecim, & ipsa CD, quæ componitur ex dimidia AC, & adjecta BD, sit pedum septem. Erit igitur re-ctangulum ADB pedum quadratorum 24; qua-dratum ex BC pedum quadratorum 25; & qua-dratum ex CD pedum quadratorum 49. Unde, quia priores duo numeri 24, & 25 simul additi constituunt proxtremum 49; dicendum est, re-ctangulum ADB, una cum quadrato ex BC, æ-quate esse quadrato ex CD.*

## PROP. VII. THEOR. VII.

*Si recta linea secetur utcumque, quadrata, quæ sunt ex tota, & parte una, equalia erunt re-ctangulo bis contento sub tota, & di-cta parte, una cum quadrato partis alterius.*




Sit re-cta AB, se-cta utcumque in C. Dico, quadrata duo, alterum ex to-ta AB, alterum ex parte BC, simul sumpta, æqualia es- se re-ctangulo bis contento sub tota AB, & dicta parte BC, una cum qua-

drato, quod fit ex parte altera AC.

Describatur etenim (1) super AB quadra-  
F 3 tum

[1] Prop. 26. lib. 1.



tum ABDE, & compleatur figura, prout eam schema repræsentat.

Quoniam igitur parallelogramma duo AG, DG, velut supplementa eorum, quæ circa diametrum sunt, inter se sunt (1) æqualia; addito communi CH, erit totum AH toti CD [2] pariter æquale; adeoque utraque simul AH, CD dupla erunt unius AH. Sed AH, CD simul constituunt gnomonem MNO, una cum CH, quod est quadratum ex BC; & rectangulum AH, velut contentum sub lateribus AB, BH, fit ex tota AB, & parte BC. Gnomon igitur MNO, una cum quadrato ex BC, æqualis erit rectangulo bis contento sub tota AB, & parte BC. Addatur rursus IF, quod est quadratum ex AC. Et erit quadratum ex tota AB una cum quadrato ex parte BC æquale rectangulo bis contento sub tota AB, & dicta parte BC, una cum quadrato partis alterius AC. Proindeque, si recta linea secetur utcumque, quæ à tota, & parte una describuntur quadrata, æqualia erunt rectangulo bis contento sub tota, & dicta parte, una cum quadrato partis alterius. Quod erat demonstrandum.

SCHO.


[1] Prop. 43. lib. 1. [2] Axi. 2.

SCHOLIUM

Sit recta AB pedum decem, secta subinde in C, ut AC sit pedum septem, BC pedum trium. Erit igitur quadratum ex tota AB pedum quadratorum 100; quadratum ex parte BC pedum quadratorum 9; rectangulum bis contentum sub tota AB, & dicta parte BC pedum quadratorum 60; & quadratum ex parte altera AC pedum quadratorum 49. Unde, quia priores duo muneris 100, & 9 simul tantundem constituunt, quantum posteriores duo 60, & 49; liquet, quadrata, quæ fiunt ex tota AB, & parte una BC, æqualia esse rectangulo bis contento sub tota AB, & dicta parte BC, una cum quadrato partis alterius AC.


PROP. VIII. THEOR. VIII.

Si recta linea secetur utcumque, quadratum, quod fit ex tota, & parte una, velut ex unica linea, æquale erit rectangulo quater contento sub tota, & dicta parte, una cum quadrato partis alterius.



Sit recta AB, secta utcumque in C, extendaturque usque in D, ut sit BD æqualis BC. Dico, quadratum ex AD, quæ componitur ex tota AB, & parte una BC, æquale esse rectangulo quater contento

F 4



tento sub tota AB,  
& dicta parte BC,  
una cum quadrato  
partis alterius AC.

Describatur ete-  
nim [1] super AD  
quadratum ADEF,  
& compleatur figu-  
ra, prout eam sche-  
ma exhibet.

Quoniam igitur  
ex constructione  
BC est æqualis BD,

erit quoque IM æqualis IL, & PK æqualis  
PO: unde erit, tum BM æquale BL, cum  
PM æquale PL (2). Est autem BM [3] æqua-  
le PL. Quatuor igitur BM, PM, PL,  
BL inter se mutuo æqualia erunt: & propte-  
rea omnia simul, constituentia quadratum  
CDOK, æqualia erunt quadruplo unius BM.

Rursus, quia BL quadratum est, erit BD  
ipsi DL, seu CM æqualis. Est autem BD æ-  
qualis BC, seu PK; & propter quadratum  
PM est PK æqualis KM. Itaque erit CM ipsi  
KM æqualis: proindeque parallelogramma  
duo CN, MQ, velut constituta in æqualibus  
basibus, & in iisdem parallelis, inter se æ-  
qualia erunt.

Jam ob eandem rationem æqualia sunt  
quoque parallelogramma PE, PH. Quum igi-  
tur duo MQ, PH, velut supplementa eorum,  
quæ circa diametrum sunt, inter se sint æ-  
qualia; erunt quatuor CN, MQ, PE, PH æ-  
qua-

(1) Prop. 46. lib. 1. [2] Prop. 36. lib. 1.  
(3) Prop. 43. lib. 1.

qualia inter se mutud; & propterea omnia simul æqualia erunt quadruplo unius CN'.

Ostensum est autem, quatuor BM, PM, PL, BL simul esse etiam quadrupla unius BM, Octo igitur BM, PM, PL, BL, CN, MQ, PE, PH, constituentia gnomonem RST, quadrupla erunt ipsius AI: atque adeo, quia AI rectangulum est ex AB, & BC, quum BI sit æqualis ipsi BD, seu BC, erit gnomon RST æqualis rectangulo quater contento sub AB, & BC.

Addatur jam commune QH, quod est quadratum ex AC; & erit gnomon RST una cum QH, hoc est quadratum totum ADEF æquale rectangulo quater contento sub AB, & BC, una cum quadrato ipsius AC. Proindeque, si recta secetur utcumque, erit quadratum, quod fit ex tota, & parte una velut ex unica linea, æquale rectangulo quater contento sub tota, & dicta parte, una cum quadrato partis alterius. Quod erat demonstrandum.


## S C H O L I U M.

*Sit recta AB pedum octo, secta subinde in C, ut AC sit pedum sex, BC pedum duorum. Itaque quia AD fit pedum decem, erit quadratum ex AD pedum quadratorum 100. Est autem rectangulum quater contentum sub AB, & BC pedum quadratorum 64, & quadratum ex AC pedum quadratorum 36. Quum igitur duo isti numeri 64, & 36 simul additi constituent priorum 100; evidens est, quadratum ex AD equal e esse rectangulo quater contento sub tota AB, & parte una BC, una cum quadrato alterius partis AC.*

F 5

PROP.

*Si recta linea secetur bifariam, & non bifariam, quadrata partium inæqualium dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex dimidia, & portione inter utramque sectionem interjecta.*



Sit recta  $AB$ , secta bifariam in  $C$ , & non bifariam in  $D$ . Dico, quadrata, quæ fiunt ex partibus inæqualibus  $AD$ ,  $BD$ , dupla esse quadratorum, quæ fiunt ex dimidia  $AC$ , & portione inter utramque sectionem interjecta  $CD$ .

Erigatur [1] etenim ex puncto  $C$  perpendicularis  $CE$ , quæ ipsi  $AC$ , seu  $BC$  constituatur (2) æqualis. Jungantur deinde rectæ  $AE$   $BE$ , & erecta ex puncto  $D$  perpendiculari alia  $DF$ , agatur (3) per punctum  $F$  recta  $FG$  parellela ipsi  $AB$ , jungaturque  $AF$ .

Quia igitur ex constructione  $AC$  est æqualis  $CE$ , isosceles est triangulum  $ACE$ , adeoque angulus  $CAE$  æqualis [4] erit angulo  $CEA$ . Est autem angulus  $ACE$  rectus. Itaque, quum omnes anguli cujuscumque trianguli duobus rectis æquales [5] esse debeant, emirectus erit tam angulus  $CAE$ , quàm angulus  $CEA$ . Eadem ratione ostendetur, semi-

re-

[1] Propp. 11. lib. 1. (2) Prop. 3. lib. 1.

(3) Prop. 31. lib. 1. [4] Prop. 5. lib. 1.

[5] Prop. 32. lib. 1.

rectum esse, tum angulum CBE, cum angulum CEB: ex quo sequitur, totum angulum AEF rectum esse.

Rursus, quoniam in triangulo BDF, rectangulo in D, angulus DBF; velut æqualis angulo CBE, semirectus est, erit alter angulus DFB pariter semirectus. Quare latera BD, DF, angulos illos subtendentia, etiam (1) æqualia erunt. Atque ita quoque, quoniam in triangulo EGF, rectangulo in G, semirectus est angulus GFE, erit itidem semirectus angulus alter GEF; proindeque latera EG, GF, quæ subtendunt angulos illos, inter se pariter æqualia erunt.

Præterea, quia triangulum ACE est rectangulum in C; erit (2) quadratum ex AE æquale quadratis, quæ fiunt ex AC, & CE. Sed duo ista quadrata sunt æqualia, quum ex constructione æquales sint ipsæ AC, CE. Itaque erit quadratum ex AE duplum quadrati ex AC. Eadem ratione, quia triangulum EGF est rectangulum in G, erit quadratum ex EF æquale quadratis, quæ fiunt ex EG, & GF; atque adeo, quum æqualia sint duo ista quadrata, erit quadratum ex EF duplum quadrati ex GF, seu CD.

Quum igitur ostensum sit, quadratum ex AE duplum esse quadrati ex AC, & quadratum ex EF duplum quadrati ex CD; erunt quadrata ex AE, & EF dupla quadratorum, quæ fiunt ex AC, & CD. Jam verò propter triangulum AEF, rectangulum in E, quadrata ex AE, & EF æqualia sunt quadrato ex

F 6

AF,

(1) Prop. 6. lib. 2.

(2) Prop. 47. lib. 1.

AF; quod rursus propter triangulum ADF, rectangulum in D, æquale est quadratis ex AD, & DF, sive etiam ex AD, & DB. Quadrata igitur ex AD, & DB dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex AC, & CD. Proindeque, si recta linea secta fuerit bifariam, & non bifariam, quadrata partium inæqualium dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex dimidia, & portione inter utramque sectionem interjecta. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M.


*Sit recta AB pedum decem, quæ quum secta sit bifariam in C, erit tam AC, quam BC pedum quinque. Secetur autem eadem AB subinde non bifariam in D, ut AD sit pedum septem, & DB pedum trium, adeo ut portio inter utramque sectionem interjecta CD sit pedum duorum. Erit igitur quadratum ex AD pedum quadratorum 49; quadratum ex DB pedum quadratorum 9; quadratum ex AC pedum quadratorum 25; & quadratum ex CD pedum quadratorum 4. Unde, quia priores duo numeri 49, & 9 simul additi conficiunt 58, posteriores autem 25, & 4 simul conjuncti dant 29, estque numerus 58 duplus ipsius 29; liquet, quadrata partium inæqualium AD, BD dupla esse quadratorum, quæ fiunt ex dimidia AC, & portione intermedia CD.*

## P R O P. X. T H E O R. X.

*Si recta linea secetur bifariam, eique alia in directum adjiciatur; quadrata duo, unum ex tota, & adjecta, velut ex unica linea, alterum ex ipsa adjecta, dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex dimidia, & ea, quæ componitur ex dimidia, & adjecta.*

Sic






Sit recta AB, secta bifariam in C, eique in directum sit adjecta alia BD. Dico, quadrata duo, alterum ex AD, quæ componi-

tur ex tota AB, & adjecta BD, alterum ex ipsa adjecta BD, dupla esse quadratorum, quæ fiunt ex AC dimidia, & ex CD, quæ componitur ex dimidia BC, & adjecta BD.

Erigatur etenim (1) ex puncto C perpendicularis CE, quæ ipsi AC, seu CB constituatur (2) æqualis. Jungantur deinde rectæ AE, BE; & erecta ex puncto D perpendiculari alia DF, quæ conveniat cum EB producta in F, jungatur AF; & ducatur (3) per punctum E recta EG, ipsi AB parallela, quæ cum FD producta conveniat in G.

Quia igitur ex constructione AC est æqualis CE, isosceles est triangulum ACE; adeoque angulus CAE æqualis (4) erit angulo CEA. Est autem angulus ACE rectus. Itaque, quum omnes anguli cujuscumque trianguli simul duobus rectis æquales (5) esse debeant, semirectus erit, tam angulus CAE, quàm angulus CEA. Eadem ratione ostendetur, semirectum esse, tum angulum CBE, cum an-

(1) Prop. 11. lib. 1. (2) Prop. 3. lib. 1.  
 (3) Prop. 31. lib. 1. (4) Prop. 5. lib. 1.  
 (5) Prop. 32. lib. 1.



angulum CEB:  
ex quo sequitur,  
totum angulum AEF re-  
ctum esse.

Rursus, quoniam in triangulo BDE, re-  
ctangulo in D,

angulus DBF, velut [1] æqualis angulo CBE, semirectus est, erit alter angulus DFB pariter semirectus. Quare latera DB, DF, angulos illos subtendentia, etiam (2) æqualia erunt. Atque ita quoque quoniam in triangulo EGF, rectangulo in G, semirectus est angulus GFE, erit itidem semirectus angulus alter GEF; proindeque latera EG, GF, quæ subtendunt angulos illos, inter se pariter æqualia erunt.

Præterea, quia triangulum ACE est re-  
ctangulum in C, erit [3] quadratum ex AE  
æquale quadratis, quæ fiunt ex AC, & CE.  
Sunt autem duo ista quadrata æqualia inter  
se, quum ex constructione æquales sint ipsæ  
AC, CE. Itaque erit quadratum ex AE du-  
plum quadrati ex AC. Eadem ratione, quia  
triangulum EGF est rectangulum in G, erit  
quadratum ex EF æquale quadratis, quæ  
fiunt ex EG, & GF; atque adeo, quum æqua-  
lia sint duo ista quadrata, erit quadratum ex  
EF duplum quadrati ex EG, seu CD.

Quum igitur ostensum sit, quadratum ex  
AE duplum esse quadrati ex AC, & quadra-  
tum

[1] Prop. 15. lib. 1.

[2] Prop. 6. l. 1.

[3] Prop. 47. l. 1.


tum ex  $EF$  duplum quadrati ex  $CD$ ; erunt quadrata ex  $AE$ , &  $EF$  simul dupla quadratorum, quæ fiunt ex  $AC$ , &  $CD$ . Jam verò propter triangulum  $AEF$ , rectangulum in  $E$ , quadrata ex  $AE$ , &  $EF$  simul æqualia sunt quadrato ex  $AF$ ; quod rursus propter triangulum  $ADF$ , rectangulum in  $D$ , æquale est quadratis ex  $AD$ , &  $DF$ , sive etiam ex  $AD$ , &  $DB$ . Quadrata igitur ex  $AD$ , &  $BD$  dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex  $AC$ , &  $CD$ . Proindeque, si recta linea secetur bifariam, eique alia in directum adjiciatur: quadrata duo, unum ex tota, & adjecta, velut ex unica linea, alterum ex ipsa adjecta, dupla erunt quadratorum, quæ fiunt ex dimidia, & ex ea, quæ componitur ex dimidia, & adjecta. Quod demonstrare oportebat.

## S C H O L I U M.

*Sit recta  $AB$  pedum octo, quæ quum seceta sit bifariam in  $C$ , erit tam  $AC$ , quàm  $BC$  pedum quatuor. Sit autem adjecta  $BD$  pedum duorum; ita, ut  $AD$ , quæ componitur ex tota, & adjecta, sit pedum decem; &  $CD$ , quæ componitur ex dimidia, & adjecta, sit pedum sex. Erit igitur quadratum ex  $AD$  pedum quadratorum 100, quadratum ex  $BD$  pedum quadratorum 4; quadratum ex  $AC$  pedum quadratorum 16, & quadratum ex  $CD$  pedum quadratorum 36. Unde, quia priores duo numeri 100, & 4 simul additi conficiunt 104, posteriores autem 16, & 36 simul conjuncti dant 52, estque numerus 104 duplus ipsius 52; liquet, quadrata ex  $AD$ , &  $BD$  dupla esse quadratorum, quæ fiunt ex  $AC$ , &  $CD$ .*

PROP.

*Datam rectam lineam subinde dividere, ut  
rectangulum, quod fit ex tota, & parte una,  
æquale sit quadrato partis alterius.*



Data sit recta AB.  
Oportet, eam subinde  
dividere in puncto ali-  
quo, ut rectangulum, sub  
tota, & parte una con-  
tentum, adæquet quadra-  
tum, quod describitur ex  
parte altera.

Describatur (1) super  
AB quadratum ABCD, &  
secetur [2] latus AD bi-  
fariam in E. Jungatur  
deinde BE, & extendatur  
DA usque in F, ut sit EF  
ipsi BE æqualis. Denique super AF describa-  
tur quadratum AFGH. Dico, rectam AB sub-  
inde divisam esse in H, ut rectangulum ex to-  
ta AB, & parte una BH æquale sit quadrato  
alterius partis AH.

Quoniam enim recta AD secta est bifariam  
in E, eique in directum est adjecta alia AF,  
erit rectangulum ex DF in FA, una cum qua-  
drato ex AE æquale (3) quadrato ex EF. Est  
autem quadratum ex EF æquale quadrato ex  
EB, quum ex constructione æquales sint ipsæ  
EB, EF. Itaque erit rectangulum ex DF in FA,  
una cum quadrato ex AE æquale quadrato,  
quod fit ex BE.

Jam

[1] Prop. 46. lib. I.

(2) Prop. 10. lib. I.

[3] Prop. 6. hujus.

Jam quadratum ex BE, propter triangulum BAE, rectangulum in A, est æquale (1) quadratis, quæ fiunt ex AB, & AE. Idem igitur rectangulum ex DF in FA, una cum quadrato ex AE, æquale erit quadratis, quæ fiunt ex AB, & AE. Quare ablato communi quadrato ex AE, supererit rectangulum ex DF in FA æquale quadrato ex AB.

Porro, quia AFGH quadratum est, erit FA ipsi FG æqualis; adeoque rectangulum DG, velut contentum sub lateribus DF, FG, illud erit, quod fit ex DF in FA. Est autem ABCD quadratum ex AB. Erit igitur rectangulum DG æquale ipsi ABCD. Unde ablato communi DH, fiet AG æquale ipsi BI.

Quum itaque AG sit quadratum ex AH, & rectangulum BI, velut contentum sub lateribus CB, BH, fiat ex AB in BH; erit rectangulum ex AB in BH æquale quadrato ex AH. Et propterea recta data AB subinde secta est in puncto H, ut rectangulum, quod fit ex tota AB, & parte una BH, æquale sit quadrato alterius partis AH. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Hæc propositio nullis numeris potest illustrari. Neque enim duos numeros licet reperire, qui hujusmodi sint; ut id, quod oritur, multiplicando summam ipsorum per unum eorumdem, æquale sit quadrato alterius numeri.*


## PROP. XI. THEOR. XI.

*In triangulis obtusangulis, quadratum, quod fit*

---

(1) Prop. 47. lib. 1.

fit ex latere, obtusum angulum subtendente, majus est quadratis; quæ fiunt ex lateribus, obtusum angulum continentibus, rectangulo bis contento sub uno dictorum laterum, & portione, quam prope angulum obtusum adjungit ei perpendicularis ex opposito angulo demissa.



Sit triangulum ABC, quod habeat in B angulum obtusum. Dico, quadratum ex latere AC, subtendente angulum obtusum, majus esse quadratis, quæ fiunt ex lateribus AB, BC, angulum obtu-

sum continentibus, rectangulo bis contento sub uno eorum laterum AB, & portione BD, quam prope angulum obtusum adjungit ei perpendicularis CD, quæ demittitur ex angulo opposito.

Quoniam enim recta AD secta est utcumque in B, erit (1) quadratum ex tota AD æquale quadratis partium AB, BD, una cum rectangulo bis contento sub ipsis partibus AB, BD. Apponatur commune quadratum ex DC. Et erunt quadrata ex AD, & DC æqualia quadratis ex AB, BD, & DC, una cum rectangulo bis contento sub AB, & BD.

Jam duo quadrata AD, DC, propter triangulum ADC, rectangulum in D, æqualia sunt [2] quadrato ex AC. Itaque erit quadratum ex AC æquale quadratis ex AB, BD, & DC, una cum rectangulo bis contento sub AB, & BD.

(1) Prop. 4. hujus. [2] Prop. 47. lib. I.

BD. Sunt autem propter triangulum BDC, rectangulum in D, quadrata ex BD, & DC æqualia quadrato ex BC. Quare erit quadratum ex AC æquale quadratis ex AB, & BC, una cum rectangulo bis contento sub AB, & BD.

Quum igitur quadratum ex AC æquale sit quadratis ex AB, & BC, una cum rectangulo bis contento sub ipsis AB, BD; erit quadratum ex AC majus quadratis ex AB, & BC eodem illo rectangulo bis contento sub AB, & BD. Proindeque in triangulis obtusangulis quadratum ex latere, obtusum angulum subtendente, majus est quadratis laterum, obtusum angulum comprehendentium, rectangulo bis contento sub uno dictorum laterum, & portione, quam prope angulum obtusum adjungit ei perpendicularis ex opposito angulo demissa. Quod erat demonstrandum.

## COROLLARIUM.


*Si perpendiculari CD in infinitum diminuta, vertex trianguli C ad basim accedat, fiet AC æqualis AD, & BC æqualis BD; proindeque propositio ista in quartam hujus vertetur. Nam, quum ostensum sit, quadratum ex AC æquale esse quadratis ex AB, & BC una cum rectangulo bis contento sub ipsis AB, BD; subrogatis loco ipsarum AC, BC lineis AD, BD, fiet quadratum totius AD æquale quadratis partium AB, BD, una cum rectangulo bis contento sub ipsis partibus AB, BD.*

## PROP. XIII. THEOR. XII.

*In triangulis acutangulis quadratum, quod fit ex latere, acutum angulum subtendente,*

mi-

minus est quadratis, quæ fiunt ex lateribus, acutum angulum continentibus, rectangulo iis contento sub uno dictorum laterum, & portione, quam prope angulum acutum abscindit ex eo perpendicularis ex opposito angulo demissa.



Sit triangulū ABC, habens angulum acutum in B. Dico, quadratum ex latere AC, subtendente angulum acutum B, minus esse quadratis laterum AB, BC, eundem angulum acutum comprehendentium, rectangulo bis contento sub uno eorum laterum AB, & portione BD, quam prope angulum acutum abscindit ex eo perpendicularis CD ex opposito angulo demissa.

Quoniam enim recta AB secta est utcumque in D, erunt [1] quadrata duo, unum ex tota AB, alterum ex parte BD æqualia rectangulo bis contento sub tota AB, & dicta parte BD, una cum quadrato alterius partis AD. Quare appposito communi quadrato ex CD, erunt quadrata tria, unum ex AB, alterum ex BD, tertium ex DC, æqualia rectangulo bis contento sub AB, & BD, una cum quadratis ipsarum AD, CD. Sunt autem duo ista quadrata, propter triangulum ADC, rectangulum in D, æqualia (2) quadrato ex AC. Itaque eadem tria quadrata ex AB, BD, & CD æqualia erunt rectangulo bis contento  
sub

(1) Prop. 7. hujus. (2) Prop. 47. lib. I.



sub AB, & BD, una cum quadrato ex AC.

Quadratum igitur ex AC una cum rectangulo bis contento sub AB, & BD æquale est quadratis, quæ fiunt ex AB, BD, & CD. Jam verò quadrata ex BD, & CD, ob triangulum BDC, rectangulum in D, æqualia sunt quadrato ex BC. Quare erit quadratum ex AC; una cum rectangulo bis contento sub AB, & BD æquale quadratis, quæ fiunt ex AB, & BC: proindeque quadratum ex AC minus erit quadratis, quæ fiunt ex AB, & BC rectangulo bis contento sub AB, & BD. In triangulis igitur acutangulis quadratum ex latere, acutum angulum subtendente, minus est quadratis laterum, acutum angulum comprehendentium, rectangulo bis contento sub uno dictorum laterum, & portione, quam prope angulum acutum abscindit ex eo perpendicularis ex opposito angulo demissa. Quod erat ostendendum.


### COROLLARIUM.

*Si perpendiculari CD in infinitum diminuta, accedat trianguli vertex ad basim, cadet AC super AD, & BC super BD: quare propositio ista vertetur in septimam hujus. Ostensum est enim, quadrata ex AB, & BC equalia esse rectangulo bis contento sub AB, & BD, una cum quadrato ex AC. Itaque substitutis loco ipsarum AC, BC portionibus AD, BD, fient quadrata duo, alterum ex tota AB, alterum ex parte BD, equalia rectangulo bis contento sub tota AB, & dicta parte BD, una cum quadrata alterius partis AD.*

PROP.

## PROP. XIV. PROBL. II.

*Dato rectilineo æquale quadratum constituere.*



Data sit figura quævis rectilinea A. Oportet, ei æquale quadratum constituere.

Describatur parallelogrammum BCD æquale (1) datæ figuræ rectilineæ A, habens angulum BCD rectum. Tum siquidem BC æqualis sit ipsi CD, erit eadem figura non solum rectangula, verum etiam æquilatera; adeoque, quum quadratum sit, ea problemati satisfaciet. Si verò BC non sit æqualis CD, extendatur BC versus E, & constituatur CE æqualis [2] CD. Porro secetur BE [3] bifariam in F, & descripto centro F, intervalloque FB, seu FE semicirculo BGE, extendatur DC usque in G. Dico, quadratum ex CG æquale, esse figuræ rectilineæ datæ A.

Jungatur enim FG. Et quoniam recta BE secta est bifariam in F, & non bifariam in C, erit (a) rectangulum ex partibus inæqualibus BC, CE, una cum quadrato portionis intermedix CF, æquale quadrato dimidiæ FE. Est autem FE æqualis FG, quum sint lineæ ductæ à centro ad circumferentiam: Idem igitur re-

[1] Prop. 45. lib. I.

(2) Prop. 3. lib. I.

[3] Prop. 10. lib. I.

[4] Prop. 5. hujus.

rectangulum ex BC in CE, una cum quadrato ex CF, æquale est quadrato ex FG. Sed, propter triangulum FCG, rectangulum in C, quadratum ex FG æquale est quadratis, quæ fiunt ex CF, & CG. Itaque rectangulum ex BC in CE, una cum quadrato ex CF, æquale erit quadratis, quæ fiunt ex CF, & CG. Auferatur commune quadratum ex CF, & remanebit [1] rectangulum ex BC in CE æquale quadrato ex CG. Est autem BD rectangulum ex BC in CE, quum ex constructione sit CD æqualis CE. Rectangulum igitur BD æquale est quadrato ex CG. Unde, quum idem rectangulum BD factum sit æquale figuræ A, erit eidem A æquale quoque quadratum ex CG. Et propterea datæ figuræ rectilineæ A constitutum est æquale quadratum ex CG. Quod erat faciendum.

## COROLLARIUM I.

*Ex ipsa autem problematis hujus demonstratione liquet, quod si ex puncto aliquo, in circuli circumferentia sumpto, perpendicularis ad diametrum demittatur, quadratum ejus æquale sit rectangulo, sub diametri segmentis comprehenso. Ostensum est enim, quadratum, quod fit ex CG, æquale esse rectangulo, quod fit ex BC in CE.*

## COROLLARIUM II.

*Vicissim verò, si quadratum ex CG æquale sit rectangulo ex BC in CE, locabitur punctum G, in*

---

[1] Axi. 3.

*G* in circumferentia circuli, quæ refertur ad diametrum *BE*. Nam, quum quadratum ex *CG* æquale sit rectangulo *BCE*, appposito communi quadrato ex *CF*, erunt quadrata ex *CG*, & *CF* æqualia rectangulo *BCE*, una cum *CF* quadrato. Sed quadrata ex *CG*, & *CF* æqualia sunt quadrato ex *FG*, & rectangulum *BCE*, una cum *CF* quadrato, æquale est quadrato ex *FE*. Quare erit quadratum ex *FG* æquale quadrato ex *FE*: & propterea, quum *FG* æqualis sit ipsi *FE*, locabitur punctum *G* in circumferentia circuli, quæ describitur centro *F*, intervalloque *FE*.




# GEOMETRIÆ PLANÆ ELEMENTORUM

## LIBER TERTIUS.

### DEFINITIONES.

#### I.

 Circuli æquales dicuntur illi, quorum radii, vel diametri sunt æquales. Oritur namque circulus ex revolutione radii circa suum centrum. Quare semper ac radii sunt æquales, æquales etiam necesse est, ut sint circuli, qui ex eorum radiorum revolutione describuntur.

#### II.

Recta linea dicitur tangere circulum, quum ei ita quidem occurrit, ut producta eum non secet. Quod si autem recta linea subinde circulum offendat, ut producta illum secet, tunc recta illa dicitur circulum secare.

#### III.

Circulus circulum contingere dicitur, quando ita quidem sibi mutuò occurrunt, ut portio unius non cadat intra portionem alterius. Quod si autem occurrant sibi invicem circuli duo, sed portio unius cadat intra portionem alterius, tunc dicentur duo illi circuli se mutuò secare.

#### G

#### IV.

Duæ rectæ lineæ dicuntur æqualiter distare à centro circuli, quum perpendiculares, quæ à centro super iis demittuntur, inter se sunt æquales. *Dimetiendæ sunt enim distantie per rectas omnium brevissimas, cujusmodi non aliæ sunt, quàm perpendiculares.*

V.

Quod si autem perpendicularis, quæ à centro super unam demittitur, major sit perpendiculari, quæ ab eodem centro ducitur super aliam, tunc illa dicetur magis à centro distare, quàm ista.

VI.

Angulus ad centrum vocatur ille, qui habet verticem in ipso centro. Is verò, cujus vertex est in circumferentia, angulus ad circumferentiam vocitatur. *Ostendetur autem in hoc libro, quod quum duo isti anguli super eundem arcum insistant, angulus ad centrum duplus sit anguli ad circumferentiam.*

VII.

Angulus in portione est angulus rectilineus, cujus vertex est in portione, latera verò transeunt per extremitates portionis. *Patebit autem ex inferius ostendendis, eos, qui in eadem portione sunt, angulos inter se æquales esse.*

VIII.

Angulus portionis est angulus mixtilineus, quem arcus ejus portionis constituit cum recta, quæ arcum illum subtendit. *Recta autem, quæ in circulo arcum aliquem subtendit, chorda ejus arcus vocitatur.*

IX.

Similes circulorum portiones dicuntur illæ,


illæ, quæ suscipiunt angulos æquales: hoc est, quando anguli in iis portionibus existentes sunt æquales inter se. In quo autem consistat hæc similitudo, libro sexto ostendetur.

X.

Sector circuli est portio ejus, quam duæ rectæ lineæ, è centro egredientes, & angulum ibidem constituentes, continent cum arcu, quem intercipiunt. Unde si duæ rectæ lineæ non egrediantur è centro, aut etiam angulum ibidem non constituent, portio circuli iis rectis, & intercepto arcu contenta, nequaquam sector appellabitur.

## PROP. I. PROBL. I.

*Dati circuli centrum invenire.*



Datus sit circulus ABC. Oportet, centrum ejus invenire.


Sumantur in ejus circumferentia duo quælibet puncta A, & B, quæ jungantur per rectam AB. Tum secetur (1) AB bifariam in puncto E, ex quo perpendicularis (2) erigatur EF, eaque

extendatur usque, donec circuli circumferentiam utrimque secet in C, & in D. Denique secetur ipsa CD bifariam quoque in puncto F. Dico, in CD esse centrum circuli,

G 2

&amp; esse

[ 1 ] Prop. 10. lib. 1. ( 2 ) Prop. 13. lib. 1.



& esse propriè punctum F.

Si enim fieri potest, sit centrum circuli extra rectam CD in G, & jungantur AG, EG, BG. Quia igitur ex constructione AE est æqualis BE, communis verò GE serunt duo latera AE, GE trianguli GEA æqua-

lia duobus lateribus BE, GE trianguli GEB, alterum alteri. Est etiam basis unius GA æqualis basi alterius GB, quum sint ductæ à puncto G, quod supponitur esse centrum circuli, ad circumferentiam ipsius. Quare erit (1) angulus GEA æqualis angulo GEB. Unde, quum recta GE efficiat cum AB angulos deinceps æquales, rectus erit (2) uterque æqualium angulorum. Rectus igitur est angulus GEA: Sed ex constructione rectus est angulus FEA. Quare erit angulus GEA æqualis angulo FEA: quod fieri non potest. Non igitur centrum circuli est extra rectam CD; proindeque erit in ipsa CD, eritque propriè punctum F, quod eam dividit bifariam. Et propterea dati circuli ABC inventum est centrum F. Quod erat faciendum.

### COROLLARIUM.

*hoc perspicuum est, quod si in circulo re-  
cta*


[ 1 ] Prop. 8. lib. 1. [ 2 ] Def. 10. lib. 1.



Est quaedam linea secet aliam rectam lineam bifariam, & ad angulos rectos, in secante sit centrum circuli. Ostensum est enim, centrum dati circuli ABC esse in recta CD, quae dividit ex constructione ipsam AB bifariam, & ad angulos rectos in E.

## PROP. II. THEOR. I.

Si in circuli circumferentia duo puncta sumantur: quae puncta ista conjungit recta linea, intra circulum cadet.



In circumferentia circuli BCD sumantur duo quævis puncta B, & C, quae jungantur per rectam BC. Dico, rectam istam BC intra circulum cadere.

Sumatur etenim in ipsa BC punctum aliquod E, & reperto (1) centro circuli A,


jungantur AB, AE, AC.

Quia igitur AB est æqualis AC, erit triangulum BAC isosceles; adeoque angulus ABC æqualis erit (2) angulo ACB. Jam autem in triangulo ABE latus BE productum est in C, atque adeo angulus AEC [3] major est angulo ABE. Idem igitur angulus AEC major erit quoque angulo ACE: & propterea, quia majori lateri [4] major angulus opponitur, erit

G 3

1] Prop. 1. hujus. [2] Prop. 5. lib. 1.

[3] Prop. 16. lib. 1. [4] Prop. 19. lib. 1.



erit AC major, quam AE. Unde, quum AC pertingat ad circuli circumferentiam, AE ad eam usque pertingere nequit. Cadit igitur punctum E intra circulum. Sed eadem est demonstratio de omnibus aliis punctis ipsius BC. Tota igitur BC intra circulum cadit.

Et propterea, si in circuli circumferentia duo puncta sumantur, quæ puncta ista coniungit recta linea, intra circulum cadet. Quod erat demonstrandum.

### COROLLARIUM.

*Liquet autem ex hoc theoremate, circuli circumferentiam concavitate sua centrum respicere. Nam omnis curva linea ad eam semper partem est concava, ad quam cadit recta linea, quæ duo ejus puncta contingit: Id, quod ex ipsa circuli generatione liquet etiam abundè.*

### COROLLARIUM II.

*Sed illud etiam ex hoc theoremate licet inferre, tangentem in unico tantum puncto circuli circumferentia occurrere. Nam, si ei occurreret in duobus punctis, caderet intra circulum; adeoque non tangens, sed secans esset.*

### PROP. III.

## PROP. III. THEOR. II.

*Si recta linea per centrum ducta aliam rectam lineam non ductam per centrum bifariam secet, secabit ad angulos rectos; & si secet ad angulos rectos, secabit bifariam.*



Per centrum circuli A ducatur recta DE, quæ secet aliam BG non ductam per centrum bifariam in F. Dico, secare quoque eam ad angulos rectos.

Jungantur enim rectæ AB, AG. Et quoniam ex hypothesi BF est æqualis GF, communis verò AF; erunt duo latera AF, BF trianguli AFB æqualia duobus lateribus AF, GF trianguli AFG, alterum alteri. Est etiam basis unius AB æqualis basi alterius AG, quum sint lineæ ductæ à centro ad circumferentiam. Quare erit (1) angulus AFB æqualis angulo AFG: & propterea, quum recta DE secet ipsam BG ad angulos æquales, secabit eandem ad angulos rectos (2).

Sed eadem recta DE, ducta per centrum circuli A, secet aliam BG ad angulos rectos in F. Dico, secare quoque eam bifariam.

Nam junctis adhuc rectis AB, AG, ob istarum æqualitatem, isosceles erit triangulum

G 4 BAG,

[1] Prop. 8. lib. 1.

[2] Def. 10. lib. 1.



BAG; adeoque angulus ABG æqualis erit angulo AGB. Est autem angulus AFB æqualis quoque angulo AFG, quum uterque ex hypothesi sit rectus. Duo igitur anguli ABF, AFB trianguli BAF æquales sunt duobus angulis AGF, AFG trianguli GAF, alter alteri. Unde, quum eadem triangula habeant latus AF commune, habebunt quoque [1] latus BF æquale lateri GF: & propterea recta BG secta erit bifariam in F.

Itaque, si in circulo recta linea, per centrum ducta, secet aliam non ductam per centrum bifariam, secabit eam ad angulos rectos; & si secet ad angulos rectos, secabit bifariam. Quod erat demonstrandum.

### S C H O L I U M.


*Hujus theorematis, ut vides, due sunt partes, quarum altera alteram convertit. Sed utraque convertit quoque id, quod in Corollario primæ hujus ostensum est. Unde non ab re erit hic advertere, quod quum in circulo aliqua recta linea secat aliam non ductam per centrum, tria contingere possint; primum, ut linea secans transeat per centrum circuli; al-*

[ 1 ] Prop. 26. lib. 1.

terum, ut secet aliam bifariam; & tertium, ut eandem secet ad angulos rectos. Ex his autem tribus si duo qualibet ponantur, tertium quoque necessario poni debet. Nempe primo, si transeat per centrum circuli, & secet aliam non transeuntem per centrum bifariam, secabit eam ad angulos rectos. Secundo, si transeat per centrum circuli, & secet aliam ad angulos rectos, secabit bifariam. Et tertio, si secet aliam cum bifariam, tum ad angulos rectos, transibit per centrum circuli.

PROP. IV. THEOR. III.

In circulo si duæ rectæ lineæ sese in centro non secent, utraq;e bifariam non secabitur.



In circulo BCDE, cujus centrum sit punctum A, rectæ duæ BD, CE se mutuo se cent in puncto F, quod diversum sit à puncto A, Dico, utranque earum rectarum bifariam non posse secari.


Si enim fieri potest, secetur utraque

ipfarum BD, CE bifariam in F, jungaturque AF. Quia igitur recta AF per centrum ducta secat ipsas BD, CE non ductas per centrum bifariam in F, secabit quoque eas ( 1 ] ad angulos rectos. Rectus itaque erit,

G S

tum

[a] Prop. 3. huius.



tum angulus AFB cum angulus AFC. Quod, quum fieri non possit, dicendum est, utramque ipsarum BD, CE non posse bifariam secari. Et propterea, si in circulo duæ rectæ lineæ sese in centro non secent, utraque bifariam non secabitur. Quod demonstrare oportebat.

### S C H O L I U M.


*In hac propositione sedulò notare oportet; duarum linearum, quæ in circulo sese in centro non secant, utramque quidem bifariam non secari. Nam, quin una secari queat bifariam, nulli dubium esse potest.*

### PROP. V. PROBL. IV.

*Circuli, qui se mutud secant, non possint unum, idemque centrum habere.*

**S**int duo circuli ABC, ADC, qui se mutud secent in punctis A, & C. Dico, duos istos circulos non posse unum, idemque centrum habere.

Si enim fieri potest, habeant unum, idemque centrum, & sit punctum E. Tum juncta AE, ducatur utcumque recta EDB, quæ utrius-



utriusque circumferentiam secet in punctis D, & B.

Quia igitur E centrum est circuli ABC, erit AE æqualis EB. Et similiter, quia E centrum est

circuli ADC, erit AE æqualis ED. Eidem igitur AE æqualis est tum EB, cum ED. Sed Quæ eidem sunt æqualia inter se sunt (1) æqualia. Erit igitur EB æqualis ED, quod fieri non potest. Non igitur duo circuli, qui se mutuo secant, possunt unum idemque centrum habere. Quod erat ostendendum.

### PROP. VI. THEOR. V.

*Si duo circuli sese intus contingant, non possunt unum, idemque centrum habere.*


**S**int duo circuli ABC, ADE, qui sese intus contingant in A. Dico, duos istos circulos non posse unum, idemque centrum habere.

Si enim fieri potest, habeant unum, idemque centrum, quod sit punctum F. Tum juncta AF, ducatur utcumque recta FDB, quæ secet utriusque circumferentiam in punctis D, & B.

G 6

Quia

(1) Axi. I.



Quia igitur  $F$  centrum est circuli  $ABC$ , erit  $AF$  æqualis  $FB$ . Pariterque, quia  $F$  centrum est circuli  $ADE$ , erit  $AF$  æqualis  $FD$ . Eidem igitur  $AF$  æqualis est, tum  $FB$ , cum  $FD$ . Sed quæ eidem sunt æqualia, inter se sunt [1] æ-

qualia. Erit igitur  $FB$  æqualis  $FD$ , quod fieri non potest. Non igitur duo circuli, qui intus sese contingunt, possunt unum, idemque centrum habere. Quod erat ostendendum.

### PROP. VII. THEOR. VI.

*Si in circuli diametro capiatur punctum aliquod, quod non sit centrum, & ex eo ducantur ad circumferentiam plures aliæ rectæ lineæ; earum omnium maxima quidem erit illa, quæ transit per centrum; minima verò reliqua portio diametri; aliarum autem, quæ maxima propinquiores sunt, majores erunt semper remotioribus; & ab illo eodem puncto nonnisi duæ rectæ lineæ æquales duci poterunt.*

**S**it circulus  $ABCD$ , cujus diameter recta  $AD$ , centrum punctum  $E$ . Sumatur in diametro  $AD$  punctum quodvis aliud  $F$ , ex quo ducantur ad circumferentiam plures aliæ

[1] Axio. 1.





liæ rectæ lineæ , ut  
 FB , FC . Dico pri-  
 mò, omnium istarum  
 linearum maximam  
 esse rectam FA , quæ  
 transit per centrum  
 circuli E .

Jungantur enim EB,  
 EC . Et quoniam EB  
 est æqualis EA , ad-  
 dita communi EF ,  
 erunt duæ EF , EB æ-

quales ( 1 ) ipsi FA . Sunt autem duæ EF , EB  
 majores, ( 2 ) quàm FB: nempe, quia in omni  
 triangulo duo latera sunt reliquo majora .  
 Quare FA eadem FB etiam major erit . Simi-  
 li ratiocinio , ostendetur FA majorem esse  
 quacumque alia recta lidea , quæ à puncto F  
 cadit ad circumferentiam . Igitur FA erit  
 omnium maxima .

Dico secundò , reliquam portionem dia-  
 metri FD esse omnium minimam .

Nam in triangulo CEF duo latera , EF , FC  
 majora sunt reliquo EC . Sed propter cir-  
 culum EC est æqualis ED . Duæ igitur EF ,  
 FC majores erunt ipsa ED : proindeque abla-  
 ta communi EF , erit FC major quoque quàm  
 FD ( 3 ) . Est igitur FD minor , quàm FC .  
 Unde , quum simili ratiocinio ostendatur ,  
 FD minorem esse quacumque alia recta li-  
 nea , quæ à puncto F cadit ad circumferen-  
 tiam , erit FD omnium minima .

Dico

[ 1 ] Axi. 2. [ 2 ] Prop. 20. lib. 1.

[ 3 ] Axi. 3.



Dico tertid, aliarum linearum, quæ ipsi FA propinquiores sunt, majores esse semper remotioribus, nempe FB majorem esse, quàm FC.

Nam quum propter circulum EB sit æqualis EC, communis verò EF; erunt duo latera EB, EF

trianguli BEF æqualia duobus lateribus EC, EF trianguli CEF, alterum alteri. Est autem angulus BEF, contentus sub lateribus illius major angulo CEF, qui sub illius lateribus continetur. Itaque erit basis FB major quoque [1] basi FC. Quumque eadem sit demonstratio de omnibus aliis rectis lineis, quæ à puncto F cadunt ad circumferentiam, dicendum est, rectas ipsi FA propinquiores majores esse remotioribus.

Dico denique, ab eodem puncto F non nisi duas rectas æquales duci posse: nempe ipsi FC unicam tantum ex parte altera duci posse æqualem, & non plures.

Fiat enim ad rectam AD, atque ad datum in ea punctum E angulus FEG æqualis [2] angulo FEC, & jungatur FG. Quia igitur duo latera EC, EF trianguli CEF æqualia sunt duobus lateribus EG, EF trianguli GEF, alterum alteri, & anguli sub lateribus illis comprehensi ex constructione pariter

[ 1 ] Prop. 24. lib. 1. [ 2 ] Prop. 23. lib. 1.

riter sunt æquales ; erunt quoque æquales [ 1 ] bases eorundem triangulorum FC, FG. Ipsi igitur FC ducta est ex parte altera alia æqualis FG. Plures autem duci non possunt. Nam, vel cadunt supernè, & velut ipsi FA propinquiore majoris sunt, quàm FG, atque adèd majores quoque, quam FC ; vel cadunt inferna, & per contrarium velut magis distantes ab FA minores sunt, quàm FG, ac propterea minores quoque, quam FC.


Concludamus igitur, quod si in circuli diametro sumatur punctum aliquod, quod non sit centrum, & ab eo ducantur ad circumferentiam plures aliæ rectæ lineæ ; omnium istarum linearum maxima quidem sit illa, quæ transit per centrum circuli ; minima verò reliqua portio diametri ; aliarum autem, quæ maximæ sunt propinquiore, majores sint semper remotioribus ; & ab illo eodem puncto non nisi duæ rectæ lineæ æquales duci possint. Quod erat demonstrandum.

### PROP. VIII. THEOR. VII.

*Si extra circulum sumatur punctum aliquod, ex quo ducantur plures rectæ lineæ, tum ad concavam, cum ad convexam circuli circumferentiam ; earum utique, quæ pertingunt ad concavam, maxima quidem erit illa, quæ transit per centrum, aliarum verò, quæ maximæ sunt propinquiore, majores erunt semper remotioribus ; vicissim autem illarum, quæ pertingunt ad convexam, minima quidem erit illa,*

[ 5 ] Prop. 4. lib. 1.

illa, quæ producta transit per centrum, aliarum vero, quæ minimæ sunt propinquiores, minores erunt semper remotioribus; & ab illo eodem puncto, tum ad concavam, cum ad convexam circuli circumferentiam nonnisi duæ rectæ lineæ æquales duci poterunt.



Ex puncto A, sumpto extra circulum BCD, ducantur primò ad concavam ejus circumferentiã plures rectæ lineæ AB, AC, AD, quarum prior AB transeat per centrũ circuli E. Dico, omnium istarum linearum maximam quidem esse ipsam AB, aliarum vero, quæ ipsi AB propinquiores sunt,

maiores esse semper remotioribus, nempe AC majorem esse, quàm AD.

Jungantur enim rectæ EC, ED. Et quoniam propter circulum EB est æqualis EC, communis vero AE, erit tota AB æqualis duabus AE, EC. Sed duæ istæ AE, EC majores sunt ipsa AC: in omni enim triangulo (1) duo latera simul reliquo majora sunt, quomodocumque sumpta. Igitur AB major quoque erit, quàm AC. Et quum eadem ratione ostendatur major quacumque alia recta

(1) Prop. 20. lib. 1.

Ita linea, quæ ab assumpto puncto A cadit ad concavam circuli circumferentiam, erit AB omnium maxima.

Deinde, quia propter circulum EC est æqualis ED, communis verò AE, erunt duo latera AE, EC trianguli AEC æqualia duobus lateribus AE, ED trianguli AED, alterum alteri. Est autem angulus AEC, contentus sub lateribus illius, major angulo AED, qui sub istius lateribus continetur. Itaque erit [ 1 ] basis AC major quoque basi AD. Quumque eadem sit demonstratio de omnibus aliis rectis lineis, quæ à puncto A cadunt ad concavam circuli circumferentiã, dicendum est, rectas ipsi AB propinquiores majores esse semper remotioribus.


Ex eodem puncto A ducantur secundò ad convexam circuli circumferentiam plures rectæ lineæ AF, AG, AH, quarum prior AF transeat producta per centrum E. Dico, omnium aliarum istarum linearum minimam esse rectam AF, reliquarum verò, quæ ipsi AF propinquiores sunt, minores esse semper remotioribus, nempe AG minorem esse, quàm AH.

Jungantur enim rectæ EG, EH. Et quoniam, propter triangulum AGE, duo latera AG, GE majora sunt [ 2 ] reliquo AE, estque, propter circulum, GE æqualis FE; erit AG major etiam, quam AF. Pariterque, quia, propter triangulum AHE, duo latera AH, HE majora sunt reliquo AE, estque propter circulum HE æqualis FE; erit AH major etiam, quàm AF. Quumque eadem ratione

osten-

---

[ 1 ] Prop. 24. lib. 1. [ 2 ] Prop. 20. lib. 1.



ostendatur, omnem  
 aliam rectam li-  
 neam, quæ ab as-  
 sumpto puncto A  
 cadit ad convexam  
 circuli circumfe-  
 rentiam, majorem  
 esse, quàm AF, erit  
 AF omnium mi-  
 nima.

Deinde quia  
 propter circulum  
 EH est æqualis EG  
 cõmunis verò AE;  
 erunt duo latera

AE, EH trianguli AEH æqualia duobus la-  
 teribus AE, EG trianguli AEG, alterum al-  
 teri. Est autem angulus AEH, contentus sub  
 lateribus illius, major angulo AEG, qui sub  
 illius lateribus continetur. Itaque erit basis  
 AH major quoque [ 1 ] basi AG. Quumque  
 eadem fit demonstratio de omnibus aliis re-  
 ctis lineis, quæ à puncto A cadunt ad con-  
 vexam circuli circumferentiam dicendum  
 est, rectas ipsi AF propinquiores minores  
 esse semper remotioribus.

Dico demum, ab eodem puncto A, tum  
 ad concavam, cum ad convexam circuli  
 circumferentiam nonnisi duas rectas æqua-  
 les duci posse: nempe cuique ipsarum AD,  
 AH unicam tantum ex parte altera duci pos-  
 se æqualem, & non plures.

Fiat enim ad rectam AB, atque ad datum  
 in

[ 1 ] Prop. 24. lib. 1.

in ea punctum E Angulus AEK æqualis [ 1 ] angulo AED, & jungatur EK. Quia igitur duo latera AE, ED trianguli AED æqualia sunt duobus lateribus AE, EK trianguli AEK, alterum alteri, & anguli sub lateribus illis comprehensi ex constructione pariter sunt æquales; erunt quoque æquales [ 2 ] bases eorundem triangulorum AD, AK. Ipsi igitur AD ducta est ex parte altera alia æqualis AK. Plures autem duci non possunt. Nam vel cadunt infernè, & velut ipsi AB propinquiore, majores sunt, quàm AK, atque adeò majores quoque, quàm AD; vel cadunt supernè, & per contrarium velut magis distantes ab eadem AB, minores sunt, quàm AK, & consequenter minores quoque, quàm AD.

Simili ratione hoc idem ostendetur relatè ad rectam AH. Nam siquidem ad rectam AB, atque ad datum in ea punctum E constituatur angulus AEL æqualis angulo AEH, jungaturque AL, æquales erunt inter se rectæ duæ AH, AL; adeoque ipsi AH ducta est ex parte altera alia æqualis AL. Plures autem duci non possunt. Nam eadem omnino ratione vel accedunt ad AF, & velut minores, quàm AL, minores quoque erunt, quàm AH; vel recedunt ab eadem AF, & quia majores sunt, quàm AL, majores etiam erunt, quàm AH.


Concludamus igitur, quod si extra circumlum sumatur punctum aliquod, & ex eo ducantur, tum ad concavam, cum ad convexam circuli circumferentiam plures rectæ lineæ,

[ 1 ] Prop. 23. lib. 1. ( 2 ] Prop. 4. lib. 1.

neæ, earum quidem, quæ pertingunt ad concavam, maxima sit illa, quæ transit per centrum; aliarum verò, quæ maximæ propinquiores sunt, majores sint semper remotioribus; vicissim autem illarum, quæ pertingunt ad convexam, minima sit illa, quæ producta transit per centrum, aliarum verò, quæ minimæ propinquiores sunt, minores sint semper remotioribus; & ab illo eodem puncto, tam ad concavam, quàm ad convexam circuli circumferentiam nonnisi duæ rectæ lineæ æquales duci possint. Quod erat demonstrandum.

## PROP. IX. THEOR. VIII.

*Si è puncto, intra circulum sumpto, cadant ad ejus circumferentiam plures, quàm duæ, rectæ lineæ æquales; assumptum punctum erit centrum circuli.*



Intra circulum ABC capiatur punctum aliquod D, ex quo cadant ad ejus circumferentiam tres rectæ lineæ æquales DA, DB, DC. Dico, assumptum punctum D esse centrum circuli.

Jungantur enim rectæ AB, BC, quæ secentur [ 1 ] bifariam in punctis E, & F, jungan-

[ 1 ] Prop. 10. lib. 1.



ganturque DE, DF, quarum utraque extendatur ulterius, illa quidem versus G, & H, ista autem versus k, & L.

Et quoniam ex constructione AE est æqualis BE, communis verò DE; erunt duo latera AE, DE trianguli ADE æqualia duobus lateribus BE, DE trianguli BDE, alterum alteri. Est autem ex hypothese basis illius DA æqualis basi istius DB. Itaque erit quoque (1) angulus DEA æqualis angulo DEB: & propterea, quum GH secet ipsam AB bifariam, & ad angulos rectos in E, in recta GH erit (2) centrum circuli.

Eadem ratione, quoniam ex constructione BF est æqualis CF, communis verò DF, erunt duo latera BF, DF trianguli BDF æqualia duobus lateribus CF, DF trianguli CDF, alterum alteri. Est autem ex hypothese basis illius DB æqualis basi istius DC. Erit igitur angulus DFB æqualis quoque angulo DFC; atque adeo, quum recta KL secet ipsam BC bifariam, & ad angulos rectos in F, in recta kL erit centrum circuli.

Est igitur centrum circuli ABC, tam in recta GH, quàm in recta KL. Quare erit in puncto, quod utrique earum linearum commune sit. Jam verò rectæ duæ GH, KL non aliud punctum commune habent, quàm D; quandoquidem duæ rectæ lineæ in unico puncto se secant. Punctum igitur D centrum est circuli ABC. Et propterea, si è puncto, intra circulum sumpto, cadant ad ejus circumferentiam plures, quàm duæ, rectæ lineæ æquales, assumptum punctum erit cen-

---

[ 1 ] Prop. 8. lib. 1. [ 2 ] Corol. 1. hujus.


166 ELEM. GEOM. PL.  
centrum circuli. Quod demonstrare oportebat.

### SCHOLIUM.

Poterat hoc idem ostendi per septimam hujus. Quum enim in ea ostensum sit, duas tantum rectas lineas æquales duci posse ad circumferentiam circuli è puncto, quod non sit centrum ejus; liquidò patet, debere esse centrum circuli punctum illud, ex quo cadunt ad ejus circumferentiam plures, quàm duæ, rectæ lineæ æquales.

### PROP. X. THEOR. IX.

Circulus circulum in pluribus, quàm duobus, punctis non secat.



Sint duo circuli ABCDE, AFCGE, qui se mutuo interfecerint. Dico, eos in pluribus, quàm duobus, punctis non posse secari.

Si enim fieri potest, se mutuo secent in tribus punctis

A, C, E. Et invento circuli ABCDE [1] centro H, jungantur rectæ HA, HC, HE, quæ quum ductæ sint à centro ad circumferentiam ipsius ABCDE, erunt eæ æquales inter se.

[1] Prop. 1. hujus.

se. Et quoniam intra circulum AFCGE sumptum est punctum H, & ab eo cadunt ad eius circumferentiam tres rectæ lineæ æquales HA, HC, HE, erit idem punctum H [ 1 ] centrum quoque circuli AFCGE, Duo igitur circuli ABCDE, AFCGE, qui se mutuò secant, habent unum idemque centrum H. Hoc autem fieri non potest: ostensum est enim circulos, qui se mutuò secant, non posse unum, idemque centrum habere [ 2 ]. Non igitur duo circuli ABCDE, AFCGE se secant in tribus punctis A, C, E. Proindeque circulus circulum in pluribus, quàm duobus, punctis non secat. Quod erat ostendendum.

## PROP. XI. THEOR. X.


*Si duo circuli sese intus contingant, recta conjungens centra ipsorum transibit per punctum contactus.*



Sint duo circuli ABC, ADE, qui sese intus contingant in A. Sit autem F centrū circuli ABC & G centrum alterius ADE. Dico, rectam FG, conjungentem centra illa, transire per punctū contactus A.

Si enim fieri potest, non transeat per punctum

[ 1 ] Prop. 9. hujus. [ 2 ] Prop. 5. hujus.



ctum A, sed secet  
circulum quidem  
ABC in punctis B,  
& C, circulum ve-  
rò ADE in punctis  
D, & E. Jungantur  
rectæ AF, AG.

Quia igitur F  
centrum est circu-  
li ABC, erit AF  
æqualis CF. Quare apposita communi FG,  
erunt duæ AF, FG simul [1] æquales toti CG;  
Duæ autem AF, FG majores sunt ipsa AG.  
in triangulo enim [2] duo latera simul reli-  
quo majora sunt, quomodocumque sumpta.  
Itaque CG major quoque erit, quam AG.  
Jam verò, quum G centrum sit circuli ADE,  
AG est æqualis GE. Eadem igitur CG erit  
etiam major, quam GE. Quod fieri non po-  
test.

Quod si ponatur, G esse centrum circuli  
ABC, F verò centrum alterius ADE, demon-  
stratio fiet ex parte altera. Nimirum, quum  
G centrum sit circuli ABC, erit AG æqua-  
lis BG. Quare apposita communi GF, erunt  
duæ AG, GF æquales toti BF. Sunt autem  
duæ AG, GF majores ipsa AF. Itaque BF  
major quoque erit, quam AF: atque adeo,  
quum rectæ duæ AF, DF velut ductæ à cen-  
tro F ad circumferentiam ADC inter se sint  
æquales, erit eadem BF major etiam, quàm  
DF. Quod adhuc fieri non potest. Igitur si  
duo circuli sese intus contingant, recta  
con-

[1] Axi. 2. [2] Prop. 20. lib. 1.

conjungens centra ipsorum transibit per punctum contactus. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. XII. THEOR. XI.

*Si duo circuli sese extra contingant; recta, conjungens contra ipsorum, transibit per punctum contactus.*



Sint duo circuli ABC, ADE, qui se extra contingant in A. Sit autem F centrum circuli ABC, G

verò centrum alterius ADE. Dico rectam FG, conjungentem centra illa, transire per punctum contactus A.

Si enim fieri potest, non transeat per punctum A, sed secet circulum quidem ABC in puncto B, circulum verò ADE in puncto D. Jungantur rectæ AF, AG.

Et quoniam in omni triangulo duo latera simul (†) sunt reliquo majora, quomodo cumque sumpta; erunt duæ AF, AG majores ipsa FG. Sunt autem puncta F, & G centra circulorum, atque adeo rectæ AF, AG æquales ipsis BF, DG. Duæ igitur BF, DG, simul majores sunt quoque ipsa FG: quod quum falsum sit, dicendum est, rectam FG transire per punctum A. Et propterea, si duo circuli sese extra contingant, recta conjungens ipsorum centra per punctum contactus transibit. Quod erat demonstrandum.


H

PROP.

(†) Prop. 20. lib. 1.

## PROP. XIII. THEOR. XII.

*Circulus circulum in pluribus, quam uno puncto, non contingit, sive intra, sive extra eum contingat.*



Circulum ABC contingat primo intra in puncto A circulus alter ADE. Dico, in solo puncto A eum contingere.

Esto etenim F centrum circuli ABC, & G centrum alterius ADE. Recta igitur FG, conjungens centra illa, transibit per punctum contactus A.

[1] Producat eadem usque ad C, & ex G ducatur utcumque recta GDB, quæ secet circulum quidem ABC in puncto B, circulum verò ADE in puncto D.

Et quoniam in AC diametro circuli ABC sumptum est punctum G, quod non est centrum, & ab eo cadunt ad circumferentiam plures rectæ lineæ GA, GB, GC, erit [2] omnium istarum linearum maxima quidem GC, quæ transit per centrum F, minima verò reliqua portio diametri GA. Est igitur GA minor, quam GB. Jam verò G centrum est circuli ADE, adeoque GA est æqualis GD. Itaque GD minor quoque erit, quam GB, & propterea punctum B erit ultra punctum D.

Simi-

[1] Prop. 11. hujus. [2] Prop. 7. hujus.

Simili ratione ostendetur, omnia alia puncta circuli ABC esse ultra puncta correspondentia alterius circuli ADE: Quare circulus ADE, contingens circumulum ABC intra in puncto A, in solo hoc puncto eum continget.

Sed eundem circumulum ABC contingat secundò extra circulus alter AHI in eodem puncto A. Dico quoque, in solo puncto A eum contingere.

Esto etenim F centrum circuli ABC, & K centrum alterius AHI. Recta igitur KF, jungens centra illa, transibit per punctum contactus A [1]. Ducatur autem ex K utcumque recta KHB, quæ secet circumulum quidem AHI in puncto H, circumulum verò ABC in puncto B.

Et quoniam extra circumulum ABC sumptum est punctum K, & ab eo ductæ sunt ad convexam circuli circumferentiam plures rectæ lineæ KA, KB; erit [2] omnium istarum linearum minima recta KA, quæ producta transit per centrum circuli F. Est igitur KA minor, quàm KB. Jam verò punctum K centrum est circuli AHI, adeoque KA est æqualis KH. Itaque KH minor quoque erit, quàm KB: & propterea punctum B erit infra punctum H. Simili ratione ostendetur, omnia alia puncta circuli ABC esse infra puncta correspondentia alterius circuli AHI. Duo igitur circuli ABC, AHI, sese extra contingentes in A, in solo isto puncto A sese mutuò contingunt. Et propterea circulus circumulum in pluribus, quàm uno puncto, non contingit, sive

H 2


in

(1) Prop. 12. hujus. [2] Prop. 8. hujus.

intra, sive extra eum contingat. Quod erat demonstrandum.

PROP. XIV. THEOR. XIII.

*In circulo æquales rectæ lineæ æqualiter a centro distant; & quæ æqualiter a centro distant, inter se sunt æquales.*



In circulo ABCD, cujus centrum est punctum F, constituentur primò duæ rectæ lineæ æquales AB, DC. Dico, eas æqualiter distare a centro F, hoc est æqualia esse perpendiculara FE, FG, quæ a centro super iis demittuntur.

Quoniam enim rectæ FE, FG transeunt per centrum, & secant alias AB, DC non transeuntes per centrum ad rectos angulos, secabunt eas [1] bifariam. Sunt igitur AE, DG semisses ipsarum AB, DC: & propterea, quum ex hypothesi duæ AB, DC inter se sint æquales, erunt etiam (2) æquales inter se duæ AE, DG. Jungantur AF, DF.

Et quoniam triangulum AFE rectum habet angulum in E, erit quadratum ex AF æquale [3] quadratis, quæ fiunt ex AE, & EF. Pariterque, quia triangulum DGE rectum habet angulum in G, erit quadratum ex DF æquale quadratis, quæ fiunt ex DG, & FG. Sunt

(1) Prop. 3. hujus.

(2) Axi. 7.

(3) Prop. 47. lib. I.



Sunt autem æqualia inter se quadrata ex AF, & DF, quum ipsæ AF, DF, velut ductæ à centro ad circumferentiam, inter se sint æquales. Quadrata igitur, quæ fiunt ex AE, & EF, æqualia quoque erunt quadratis ex DG, & GF: adeoque, quum AE quadratum æquale sit DG quadrato, erit etiam EF quadratum æquale GF quadrato; & consequenter EF, GF æquales erunt inter se.

Sint secundò rectæ duæ AB, DC æqualiter distantes à centro circuli F, ita nempe, ut æqualia sint perpendicularia FE, FG, quæ à centro super iis demittuntur. Dico, & ipsas AB, DC etiam inter se æquales esse.

Ob triangula etenim AFE, DFG rectangula in E, & G, ostendetur rursus, quadrata ex AE, & EF æqualia esse quadratis ex DG, & GF. Est autem modò EF quadratum æquale GF quadrato. Itaque quadratum ex AE etiam æquale erit quadrato ex DG: & propterea, quum æquales sint ipsæ AE, DG, erunt quoque æquales rectæ AB, DC, quæ illarum sunt duplæ.

In circulo igitur æquales rectæ lineæ æqualiter a centro distant; & per contrarium, quæ æqualiter a centro distant, inter se sunt æquales. Quod erat demonstrandum.

## PROP. XV. THEOR. XIV.

*In circulo maxima linearum in ipso ductarum est diameter, seu quæ transit per centrum; aliarum autem, quæ centro sunt propinquiores majores sunt semper remotioribus.*

**I**Ntra circulum ABC ducantur plures rectæ lineæ AB, CD, EF, quarum quidem  
H 3 AB



AB transeat per centrum  $G$ . Dico primò, rectam  $AB$  esse omniũ maximam.

Jungantur etenim, tum rectæ  $CG, DG$ , cū rectæ  $EG, FG$ . Et quoniam propter circulum  $CG$  est æqualis  $AG$ , &  $DG$  æqualis  $BG$ , erunt

duæ  $CG, DG$  æquales toti  $AB$ . Jam verò propter triangulum  $CGD$  duæ  $CG, DG$  simul majores sunt ipsa  $CD$  [1]. Erit igitur  $AB$  major quoque, quàm  $CD$ . Simili ratione ostendetur, eandem  $AB$  majorem esse, quàm  $EF$ . Nempe, quum propter circulum sit  $AG$  æqualis  $EG$ , &  $BG$  æqualis  $FG$ , erit tota  $AB$  æqualis duabus  $EG, FG$ . Sed propter triangulum  $EGF$  duæ  $EG, FG$  simul majores sunt ipsa  $EF$ . Erit igitur &  $AB$  major quoque, quàm  $EF$ : & propterea  $AB$  erit omnium maxima.

Dico secundò, quod si  $CD$  propinquior sit centro  $G$ , quàm  $EF$ ,  $CD$  major sit, quàm  $EF$ .

Nam, si ex centro  $G$  super ipsis  $CD, EF$  perpendicularia demittantur  $GH, GK$ , quia ex hypothesi  $EF$  magis distat à centro  $G$ , quàm  $CD$ , erit  $GK$  major, quàm  $GH$ . Quocirca, si ex  $GK$  abscindatur portio  $GL$  [2] æqualis  $GH$ , & per punctum  $L$  ducatur recta  $MN$  ipsi  $EF$  parallela [3]; rectæ duæ  $CD, MN$ , ve-

[1] Prop. 20. lib. 1. (2) Prop. 3. lib. 1.

[3] Prop. 30. lib. 1.

velut æqualiter distantes a centro  $G$ , æquales erunt (1) inter se. Est autem  $MN$  major, quàm  $EF$  [2]: sunt enim bases triangulorum  $MGN$ ,  $EGF$ , quæ habent duo latera  $MG$ ,  $NG$  æqualia duobus lateribus  $EG$ ,  $FG$  alterum alteri, & angulum  $MGN$  majorem angulo  $EGF$ : quare  $CD$  major quoque erit, quàm  $EF$ . Et propterea in circulo maxima linearum, intra ipsum ductarum, est diameter, seu quæ transit per centrum; aliarum autem, quæ centro propinquiores sunt, majores sunt semper remotioribus. Quod erat ostendendum.

## PROP. XVI. THEOR. XV.


*Si ex extremitate diametri perpendicularis ad eam erigatur, hæc tota cadet extra circumulum; & in locum ipsa, & circuli circumferentia contentum nulla alia recta linea duci poterit.*



Sit circulus  $ABC$ , cujus centrum sit punctum  $D$ , diameter recta  $AB$ . Erigatur ex extremitate diametri  $A$  perpendicularis ad eam  $AE$ . Dico, rectam istam  $AE$  cadere totam extra circumulum, adeoque in solo puncto  $A$  circumulum ipsum contingere

Capiatur etenim in  $AE$  punctum quodvis  
 $H$  4 vis

[1] Prop. 14. hujus. [2] Prop. 24. lib. 1.



vis  $F$ , & jungatur  $DF$ .  
 Quia igitur in triangulo  $DAF$  angulus  $DAF$  est rectus, & duo anguli ejusdem trianguli simul duobus rectis minores sunt [1]; erit angulus  $DFA$  recto minor. In omni autem triangulo (2) majori angulo majus latus opponitur. Latus igitur  $DF$ , oppositum angulo majori  $DAF$ , majus erit latere  $DA$ , quod opponitur angulo minori  $DEA$ . Sed propter circulum  $DA$  est æqualis  $DC$ . Itaque  $DF$  major quoque erit, quàm  $DC$ : & propterea punctum  $F$  erit extra circulum. Quumque eadem sit demonstratio de omnibus aliis punctis rectæ  $AE$ ; consequens est, ut recta  $AE$  tota cadat extra circulum: atque adeo, ut in solo puncto  $A$  eum contingat.

Dico secundò, in locum contentum tangente  $AE$ , & circuli circumferentia ex eodem puncto  $A$  aliam rectam lineam duci non posse.

Ducatur etenim ex puncto  $A$  supra ipsam  $AE$  alia quævis recta linea  $AH$ . Et quoniam angulus  $DAE$  rectus est, erit angulus  $DAH$  recto minor: proindeque, quum  $DA$  non sit perpendicularis ad  $AH$ , demittatur ex centro  $D$  super  $AH$  [3] perpendicularis  $DH$ . Quia igitur in triangulo  $DAH$  angulus  $DHA$

ma-

(1) Prop. 17. lib. 1. [2] Prop. 19. lib. 1.  
 (3) Prop. 12. lib. 1.

major est angulo DAH, erit latus DA, oppositum angulo majori, majus latere DH, quod opponitur angulo minori. Est autem propter circulum DA æqualis DC. Itaque DC major quoque erit, quàm DH: & propterea punctum H erit intra circuli circumferentiam. Non igitur recta AH cadit in locum contentum tangente AE, & circuli circumferentia. Quumque eadem sit demonstratio de qualibet alia recta linea; consequens est, ut in locum contentum tangente AE, & circuli circumferentia nulla recta linea duci possit ex puncto A.

Igitur, si ex extremitate diametri perpendicularis ad eam erigatur, hæc tota extra circulum cadet; & in locum ipsa, & circuli circumferentia contentum nulla alia recta linea duci poterit. Quod erat ostendendum.

## COROLLARIUM.

*Atque hinc nullo negotio ducetur tangens ad punctum in circuli circumferentia datum. Si enim A sit punctum datum, satis erit ex eo per Centrum ducere rectam ADB, & ad istam perpendicularem erigere ex eodem puncto A. Quod si autem ducenda sit tangens ad circulum ex puncto dato extra ipsum, id sequens propositio, quo pacto fieri possit, nobis ostendet.*

## SCHOLIUM.

*In hac propositione, præter ea, quæ posuimus, adjungi solent hæc alia duo: unum, quod angulus contactus, hoc est tangente, & circuli*

H s

cisa

circumferentia contentus, minor sit quocumque angulo acuto rectilineo: alterum, quod angulus semicirculi, hoc est diametro, & circuli circumferentia comprehensus, quocumque angulo acuto rectilineo sit major. Horum autem utrumque exinde deducitur, quod in locum tangente, & circuli circumferentia contentum alia recta linea ex puncto contactus duci non possit. Nam profecto semper ac ex puncto  $A$  non potest duci alia recta linea inter tangentem  $AE$ , & circuli circumferentiam  $AC$ ; necesse est, ut tam angulus, contentus sub tangente  $AE$ , & circuli circumferentia, minor sit quocumque angulo acuto rectilineo, quam angulus, contentus sub diametro  $AB$ , & eadem circuli circumferentia major sit quocumque angulo acuto rectilineo.

### S C H O L I U M.

Inde verò nolim inferatur, angulum contactus nullius esse quantitatis. Etsi enim angulus ille, velut minor quocumque angulo acuto rectilineo, sit indefinite parvus respectu anguli  $BAE$ , usque adeo, ut angulus semicirculi  $BAC$  considerari possit tamquam sensibiliter non differens ab ipso angulo  $BAE$ ; attamen, quin suam is habeat quantitatem, nemo ibi inficias, si sedulo attendat ad hæc duo. Primum, quod quantitatis nomine veniat apud Mathematicos id omne, quod plus, minusve suscipiens, augeri potest, ac minui. Et deinde, quod angulus contactus, etsi minui nequeat per rectam lineam, minui tamen optimè possit per aliam circuli circumferentiam descriptam per punctum  $A$  intervallo majore, quam  $AD$ .

PROP.

Ex dato extra circulum puncto tangentem  
 ad circulum ducere.



Sit punctum A da-  
 tum extra circulum  
 BC. Oportet, ex pun-  
 cto A ducere tangen-  
 tem ad ipsum circu-  
 lum BC.

Circuli BC inve-  
 niatur [1] centrum, &  
 sit punctum D. Tum  
 juncta DA, describa-  
 tur centro D, intervalloque DA circulus  
 alter AF. Porro ex puncto B, in quo recta  
 DA secat circulum BC, erigatur (2) super  
 DA perpendicularis BF, quæ secet circulum  
 AF in puncto F. Denique, ducta recta DF  
 quæ secet circulum BC in C, jungatur AC  
 Dico, rectam istam AC esse tangentem quæ  
 sitam.

Quoniam enim punctum D centrum est,  
 tam circuli BC, quàm circuli AF; erit tum  
 DC æqualis DB, cum DF æqualis DA. Qua-  
 re duo latera DA, DC trianguli ADC æqua-  
 lia erunt duobus lateribus DF, DB alterius  
 trianguli FDB, alterum alteri. Est autem  
 utrique triangulo communis angulus D, qui  
 sub æqualibus ipsorum lateribus continetur.  
 Itaque erit [3] angulus DBF æqualis angu-  
 lo DCA: adeoque, quum ex constructione  
 rectus sit angulus DBF, erit etiam rectus an-


H 6 gu-

[1] Prop. I. hujus. (2) Prop. II. lib. I.  
 (3) Prop. 4. lib. I.

gulus  $DCA$ . Unde, quum ex puncto  $C$ , extremitate semidiametri  $DC$ , erecta sit perpendicularis  $CA$ , hæc tota extra circulum (1) cadet; & consequenter tangens erit. Quare ex puncto  $A$ , dato extra circulum  $BC$ , ducta est ad circulum ipsum tangens  $AC$ . Quod erat faciendum.

PROP. XVIII. THEOR. XVI.

*Si circulum recta contingat linea; quæ centrum cum puncto contactus conjungit, perpendicularis erit ad tangentem.*



Sit circulus  $AB$ , cujus centrum sit punctum  $C$ , eumque contingat in  $A$  recta  $DE$ . Dico, lineam  $CA$ , conjungentem centrum  $C$  cum puncto contactus  $A$ , perpendicularem esse ad tangentem  $DE$ .

Si enim  $CA$  non sit perpendicularis super  $DE$ , demittatur (2) ex centro  $C$  perpendicularis ad ipsam  $DE$ , & sit  $CD$ , quæ secabit circulum in puncto aliquo  $B$ , propterea quod recta  $DE$ , velut tangens, tota cadit extra circulum.

Quia igitur angulus  $CDA$  rectus est, & duo anguli cujusque trianguli simul duobus rectis (3) minores sunt; erit angulus  $CAD$  recto

(1) Prop. 16. hujus. [2] Prop. 12. lib. 1.  
 (3) Prop. 17. lib. 1.



recto minor. Jam autem majori angulo major quoque latus (1) opponitur. Latus itaque CA, oppositum angulo majori CDA, major est latere CD, quod opponitur angulo minori CAD. Est autem propter circulum CA æqualis CB. Itaque CB major quoque erit, quàm CD. Quod, quum fieri non possit, consequens est, ut non quidem CD, sed CA perpendicularis sit super DE. Et propterea, si circulum recta contingat linea, quæ centrum cum puncto contactus conjungit, perpendicularis erit ad tangentem. Quod erat ostendendum.

## PROP. XIX. THEOR. XVII.

*Si circulum recta contingat linea, & ex puncto contactus perpendicularis ad tangentem erigatur; hæc transibit per centrum circuli.*



Circulum AB contingat in puncto A recta DE, ex quo erigatur ad ipsam DE perpendicularis AB. Dico, lineam istam AB transire per centrum circuli: adeo ut si ea secetur bifariam in C, erit punctum C centrum ipsius circuli.

Sit enim, si fieri potest, centrum circuli extra rectam AB, velut in F, & ducatur ex F ad A recta FA. Quia igitur FA conjungit cen-

(1) Prop. 19. lib. 1.

centrum circuli cum puncto contactus, ea erit (1) perpendicularis ad rectam DE. Quare rectus erit angulus FAD. Ex hypothese autem rectus est angulus BAD. Itaque angulus FAD æqualis erit (2) angulo BAD. Quod quum fieri non possit, consequens est, ut in ipsa AB sit centrum circuli. Et propterea si circumulum recta contingat linea, & ex puncto contactus perpendicularis ad tangentem erigatur; hæc transibit per centrum circuli. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.


*Si intra circumulum ponatur aliqua recta linea, & ex uno ejus extremo alia extra circumulum ducatur, tria contingere possunt: primò, ut linea intra circumulum posita sit diameter, seu transeat per centrum: secundò, ut ea, quæ ducitur extra circumulum, sit tangens: ac tertio demum, ut una alteri ad angulos rectos insistat. Jam per ea, quæ octensa sunt in propositione decimasexta, & duabus præcedentibus, si duo ex hisce tribus supponantur, tertium etiam habebitur. Nempe primò, si una earum linearum sit diameter, & altera ei insistat ad angulos rectos, erit ista tangens. Secundò, si una sit diameter, & altera tangens, hæc illi ad rectos angulos insistet. Et denique, si secunda sit tangens, eique prior insistet ad angulos rectos, erit hæc altera diameter.*

PROP.

[1] Prop. 18. hujus. (2) Prop. 12. hujus. (1)

## PROP. XX. THEOR. XVIII.

*Angulus ad centrum duplus est anguli ad circumferentiam, quum super eodem arcu insistent.*



Esto circulus ABC, ejusque centrum sit punctum D. Ad centrum hujus circuli D constituatur angulus BDC, ponaturque angulus alter ad circumferentiam BAC, qui insistant super eodem arcu BC. Dico, angulum ad centrum


BDC duplum esse anguli ad circumferentiam BAC.

Jungatur recta AD, quæ producta versus E cadat primò intra angulum BDC. Quia igitur AD est æqualis DB, erit triangulum ADB isosceles; adeoque angulus DAB (1) æqualis erit angulo DBA. Jam verò in triangulo ADB latus AD productum est in E; atque adeo angulus exterior BDE (2) æqualis est duobus interioribus, & oppositis DAB, DBA. Quum igitur duo anguli DAB, DBA æquales sint inter se, erit angulus BDE duplus unius DAB. Simili ratione ostendetur, angulum CDE duplum esse anguli DAC: ex quo sequitur, totum angulum ad centrum BDC duplum esse totius anguli ad circumferentiam BAC.

Ca-

[1] Prop. 5. lib. 1.

[2] Prop. 32. lib. 1.



Cadat secundo  
 recta AD producta  
 versus E extra an-  
 gulum BDC. Et ea-  
 dem omnino ratio-  
 ne ostendetur, tum  
 angulum BDE du-  
 plum esse anguli  
 DAB, cum angu-  
 lum CDE duplum anguli DAC. Quare, si ex  
 angulo CDE auferatur angulus BDE, & ex  
 angulo DAC auferatur angulus DAB, rema-  
 nebit angulus ad centrum BDC duplus quo-  
 que anguli ad circumferentiam BAC. Erit  
 igitur in omni casu angulus ad centrum du-  
 plus anguli ad circumferentiam, quum super  
 eodem arcu insistant. Quod erat demonstnan-  
 dum.

PROP. XXI. THEOR. XIX.

*Qui in eadem portione sunt anguli, inter se  
 sunt aequales.*



Esto circulus ABCDE,  
 in quo capiatur portio  
 aliqua AEDC. Ponan-  
 tur autem in ista por-  
 tione duo anguli AEC,  
 ADC. Dico, angulos  
 istos æquales esse in-  
 ter se.

Inveniatur etenim  
 (1) centrū circuli, cuius  
 sit

(1) Prop. i. hujus.

fit punctum  $F$ , junganturque rectæ  $AF$ ,  $CF$ . Quia igitur  $AFC$  est angulus ad centrum, &  $AEC$  est angulus ad circumferentiam, quorum uterque insistit super eodem arcu  $ABC$ ; erit angulus ad centrum  $AFC$  (1) duplus anguli ad circumferentiam  $AEC$ . Similiter, quia  $AFC$  est angulus ad centrum, &  $ADC$  est angulus ad circumferentiam, quorum uterque insistit super eodem arcu  $ABC$ ; erit angulus ad centrum  $AFC$  duplus anguli ad circumferentiam  $ADC$ . Eiusdem igitur anguli  $AFC$  semissis est tum angulus  $AEC$ , cum angulus  $ADC$ . Sed quæ ejusdem sunt dimidia, inter se sunt (2) æqualia. Erit igitur angulus  $AEC$  æqualis angulo  $ADC$ . Et propterea qui in eadem portione sunt anguli, inter se æquales sunt. Quod erat demonstrandum.

## SCHOLIUM.



*Fieri autem potest, ut rectæ  $AF$ ,  $CF$ , nullum angulum constituent in centro  $F$ , sed in directum jaceant. Hoc igitur quum contingit, ostendetur angulus  $AEC$  æqualis angulo  $ADC$  in hunc modum. Capiatur in altera*

*portione  $ABC$  punctum aliquod  $B$ , & jungantur rectæ  $BF$ ,  $BD$ ,  $BE$ . Quia igitur angulus  $AFB$  est ad centrum, & angulus  $ADB$  est ad circumferentiam; erit angulus ad centrum*  
 *$AFB$*

[1] Prop. 20. hujus. (2) Axi. 7.

*AFB duplus anguli ad circumferentiam ADB. Unde duo anguli AFB, BFC simul dupli erunt totius anguli ADC. Simili ratiocinio ostendetur, eosdem angulos AFB, BFC simul duplos esse anguli AEC: ex quo sequitur, angulum ADC equalem esse angulo AEC. Sed fieri quoque potest, ut eadem rectæ AF, CF constituent*



*quidem angulum in centro F, sed versus eam partem, in qua sunt ipsi anguli AED, ADC. Quo rursus in casu, poterit eadem, ac præcedentis casus, demonstratio adhiberi.*

**PROP. XXII. THEOR. XX.**

*Quadrilaterorum in circulo inscriptorum anguli oppositi duobus rectis sunt æquales.*



Esto circulus ABCD, in quo inscribatur figura aliqua quadrilatera ABCD. Dico, angulos ejus oppositos duobus rectis æquales esse.


Jungantur etenim rectæ AC, BD. Et quoniam anguli ABD, ACD sunt in eadem portione, erunt ii [1] æquales inter se. Pariterque, quia anguli ADB, ACB sunt in eadem por-

(1) Prop. 21. hujus.

portione, isti etiam inter se æquales erunt. Est igitur angulus ABD æqualis angulo ACD, & angulus ADB æqualis angulo ACB. Quare erunt duo anguli ABD, ADB simul æquales toti angulo BCD: & propterea appposito communi BAD, erunt tres anguli ABD, ADB, BAD æquales duobus angulis BCD, BAD. Sunt autem tres anguli ABD, ADB, BAD [1] æquales duobus rectis. Erunt igitur duobus rectis pariter æquales anguli duo BCD, BAD. Simili ratione ostendetur, duobus rectis æquales esse duos angulos ABC, ADC. Quare quadrilaterorum in circulo inscriptorum anguli oppositi duobus rectis æquales erunt. Quod erat demonstrandum.

## PROP. XXIII. THEOR. XXI.

*In eadem recta linea duæ circulorum portiones similes, & inæquales constitui non possunt.*




Sit recta AB, in qua constituatur aliqua circuli portio ACB. Dico, in eadem recta AB non posse consti-

tui aliam circuli portionem, quæ sit similis ipsi ACB, eidem autem inæqualis.

Si enim fieri potest, constituatur hæc altera portio circuli, & sit ADB. Ducatur autem ex puncto A recta ACD quæ utramque

(1) Prop. 32. lib. I.




que portionem se-  
cet in punctis C,  
& D; jungantur-  
que rectæ BC,  
BD.

Quia igitur portiones ACB, ADB ponun-  
tur similes, & similes circulorum portiones  
sunt illæ, quæ suscipiunt angulos æquales; erit  
angulus ACB, quem suscipit portio ACB, æ-  
qualis angulo ADB quem suscipit altera por-  
tio ADB. Hoc autem fieri non potest: in  
triangulo enim BDC latus DC productum est  
in A, adeoque angulus exterior ACB major  
est [1] interiore, & opposito ADB. Non igitur  
portio ADB similis est portioni ACB. Et  
propterea in eadem recta linea duæ circulo-  
rum portiones similes, & inæquales consti-  
tui non possunt. Quod erat demonstran-  
dum.

### PROP. XXIV. THEOR. XXII.

*In equalibus rectis lineis similes circulorum  
portiones constitutæ, sunt etiam æquales.*



Sint duæ re-  
ctæ lineæ æqua-  
les AB, CD, in  
quibus constitu-  
tæ sint duæ cir-  
culorum portio-  
nes AEB, CFD

similes inter se. Dico, easdem portiones ef-  
se etiam æquales.

Ca-


(1) Prop. 16. lib. 1.



Capiatur etenim cogitatione portio AEB, & ponatur super portione CFD hac lege, ut punctum A incidat in punctum C, recta verò AB in rectam CD. Et quoniam ex hypothese æquales sunt rectæ AB, CD, incidet quoque punctum B in punctum D. Unde necesse est, ut ipsa portio AEB incidat in portionem CFD: aliter enim in eadem recta linea constitui possent duæ circulorum portiones similes, & inæquales: quod fieri (1) nequit. Congruit itaque portio AEB cum portione CFD. Quæ autem congruunt, inter se [2] sunt æqualia. Æqualis est igitur portio AEB portioni CFD. Et propterea in æqualibus rectis lineis similes circulorum portiones constitutæ, sunt etiam æquales. Quod erat demonstrandum.

## PROP. XXV. PROBL. III.

*Circuli portione data, invenire centrum circuli, cujus ea est portio, & circulum perficere.*




Data sit circuli portio ABC. Oportet, invenire centrum circuli, cujus ea est portio, ipsumq; circulum perficere.

Ex puncto A ad punctum C ducatur recta AC, quæ secetur [3] bifariam in D. Excitetur porro super AC [4] perpendicularis DB, & jungatur AB. Et  
figui-


(1) Prop. 23. hujus. (2) Axi. 8.

(3) Prop. 10. lib. 1. & (4) Prop. 11. lib. 1.



siquidē angulus ABD  
æqualis sit angulo  
DAB. Erit D cen-  
trum circuli, cujus  
ABC est portio.


Nam semper ac an-  
gulus ABD æqualis  
est angulo DAB, erit  
etiam (1) DA æqualis DB. Est autem ex con-  
structione DA æqualis DC. Tres igitur DA,  
DB, DC æquales erunt inter se. Unde, quum  
intra circulum ABC sumptum sit punctum  
D, ex quo cadunt ad ejus circumferentiam  
plures, quàm duæ, rectæ lineæ æquales, erit  
D centrum (2) ipsius circuli.



Quod si autem  
angulus ABD non  
sit æqualis angulo  
DAB; tunc fiat ad  
lineam AB, atque  
ad datum in ea pun-  
ctum A angulus  
BAE æqualis an-  
gulo ABD, & pun-  
ctum E, in quo re-  
cta AE ipsi BD oc-  
currit, centrum erit circuli, cujus ABC est  
portio.

Nam, quum ex constructione æquales sint  
anguli ABE, BAE; erunt etiam æqualia la-  
tera EA, EB, quæ in triangulo AEB angulos  
illos subtendunt. Sunt autem duo latera  
AD, DE trianguli ADE æqualia duobus la-  
te-

[1] Prop. 6. lib. I. (2) Prop. 9. hujus.



teribus  $CD$ ,  $DE$  alterius trianguli  $CDE$ , alterum alteri, itemque angulus  $ADE$ , contentus sub lateribus illius, æqualis est angulo  $CDE$ , qui sub istius lateribus continetur, quum uterque ex constructione sit rectus. Itaque erit  $EA$  æqualis [1] etiam ipsi  $EC$ . & propterea tres  $EA$ ,  $EB$ ,  $EC$  æquales erunt inter se. Unde rursus, quum intra circulum  $ABC$  sumptum sit punctum  $E$ , ex quo cadunt ad ejus circumferentiam plures, quàm duæ, rectæ lineæ æquales, erit  $E$  centrum ipsius circuli.

Data itaque circuli portione  $ABC$ , inventum est centrum circuli, cujus ea est portio. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.


Patet igitur, problematis hujus tres esse casus. Vel enim angulus  $ABD$  æqualis est angulo  $DAB$ ; & tunc centrum circuli erit in recta  $AC$ , datam circuli portionem subtendente. Vel angulus  $ABD$  minor est angulo  $DAB$ ; & in isto casu locabitur centrum circuli intra datam portionem. Vel denique angulus  $ABD$  major est angulo  $DAB$ ; & quum id contingit, extra datam portionem circuli centrum reperietur. Distinguendi sunt autem tres isti casus, quia data circuli portio  $ABC$  potest esse vel semicirculus, vel semicirculo major, vel denique semicirculo minor.

PROP.

[1] Prop. 4. lib. 1.

## PROP. XXVI. THEOR. XXIII.

*In circulis æqualibus æquales anguli æqualibus arcibus insistent, sive ad centra, sive ad Circumferentias sint positi.*



Sint duo circuli æquales  $ABC$ ,  $DEF$ , quorum centra sint puncta  $G$ , &  $H$ . Ponantur autem

ad centra istorum circulorum duo anguli æquales  $BGC$ ,  $EHF$ ; vel etiam ponantur ad circumferentias, & sint  $BAC$ ,  $EDF$ . Dico, arcus  $BC$ ,  $EF$ , quibus anguli isti insistent, esse etiam æquales inter se.

Jungantur etenim rectæ  $BC$ ,  $EF$ . Et quoniam propter æqualitatem circulorum  $ABC$ ,  $DEF$  duo latera  $BG$ ,  $CG$  trianguli  $BGC$  sunt æqualia duobus lateribus  $EH$ ,  $FH$  alterius trianguli  $EHF$ , alterum alteri, suntque etiam ex hypothese æquales anguli  $BGC$ ,  $EHF$  sub iis lateribus contenti; erit quoque [1] basis  $BC$  æqualis basi  $EF$ . Jam vero portiones  $BAC$ ,  $EDF$  sunt similes inter se, quia ex hypothese æquales sunt anguli  $BAC$ ,  $EDF$ , quos illæ suscipiunt. Quum igitur eadem illæ portiones constitutæ sint in rectis æqualibus  $BC$ ,  $EF$ , eæ non modò similes, verum etiam

[1] Prop. 4. lib. 1.

etiam æquales (1) erunt inter se: adeoque, quia integræ circulorum circumferentiæ positæ sunt inter se æquales, erunt & reliquæ portiones BC, EF (2) pariter æquales inter se. Et propterea in circulis æqualibus æquales anguli æqualibus arcibus insistent, sive ad centra, sive ad circumferentias sint positi. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

Notetur autem hoc loco velim, quod etsi propositio disjunctiva sit, & loquatur vel de angulis positis ad centra circulorum æqualium, vel de angulis constitutis ad circumferentias eorundem circulorum; attamen si æquales ponantur illi, æquales quoque sint isti, & vicissim si isti ponantur æquales, illi etiam æquales esse debeant: quum ostensum sit superius, angulum ad centrum duplum esse anguli ad circumferentiam, quotiescumque super eodem arcu insistent. Id verò notare sedulo oportet, quia in demonstratione tum angulorum ad centra, cum eorum, qui sunt ad circumferentias, æqualitas adhibetur.


## PROP. XXVII. THEOR. XXIV.

In circulis æqualibus anguli, qui sive ad centra, sive ad circumferentias positi, æqualibus arcibus insistent, sunt etiam æquales inter se.

Sint duo circuli æquales ABC, DEF, quorum centra sint puncta G, & H. Capiantur

---

[1] Prop. 24. hujus. [2] Axi. 3.



tur autem  
in circum-  
ferentiis eo-  
rum circu-  
lorum duo  
arcus æ-  
quales BC,  
EF, quibus  
insistant

tum anguli BGC, EHF constituti ad centra,  
cum anguli BAC, EDF positi ad circumfe-  
rentias eorum circulorum. Dico, æquales esse  
inter se, tam angulos BGC, EHF, quàm an-  
gulos BAC, EDF.

Si enim anguli BGC, EHF non sint æqua-  
les inter se, alter ipsorum major erit. Sit  
itaque major angulus BGC, & fiat ad rectam  
BG, atque ad datum in ea punctum G (1)  
angulus BGK æqualis angulo EHF. Quia  
igitur anguli BGK, EHF, constituti ad cen-  
tra circulorum æqualium, inter se ex con-  
structione sunt æquales, erunt etiam æqua-  
les [2] arcus BK, EF, quibus in insistant. Est  
autem ex hypothese arcus EF æqualis arcui  
BC. Itaque erit BC (3) æqualis BK. Quod  
quum fieri non possit, dicendum est, angu-  
lum BGC æqualem esse angulo EHF. Est au-  
tem angulus BGC duplus [4] anguli BAC,  
itemque angulus EHF duplus anguli EDF.  
Quare erit angulus BAC (5) æqualis quoque  
angulo EDF. Et propterea in circulis æqua-  
libus

[1] Prop. 23. lib. 1. (2) Prop. 26. hujus.

(3) Axi. 1.

(4) Prop. 20. hujus.

[5] Axi. 7.

libus anguli, qui sive ad centra, sive ad circumferentias positi, æqualibus arcubus insistant, sunt etiam æquales inter se. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.


*Hæc propositio est conversa præcedentis. Ibi enim ostensum est, in circulis æqualibus æquales angulos æqualibus arcubus insistere, sive ad centra, sive ad circumferentias sint positi. Hic verò per contrarium demonstratur, in circulis æqualibus angulos, qui sive ad centra, sive ad circumferentias positi, æqualibus arcubus insistant, æquales etiam esse inter se.*

## PROP. XXVIII. THEOR. XXV.

*In circulis æqualibus æquales rectæ lineæ æquales arcus abscindunt, majorem quidem æqualem majori, minorem verò minori. Vide eandem Figuram.*

**S**int duo circuli æquales  $ABC$ ,  $DEF$ , quorum centra sint puncta  $G$ , &  $H$ . Ponantur autem in iis duæ rectæ  $BC$ ,  $EF$  æquales inter se. Dico, rectas istas æquales abscindere etiam arcus æquales, nempe majorem  $ABC$  æqualem majori  $DEF$ , minorem verò  $BC$  æqualem minori  $EF$ .

Jungantur etenim tum rectæ  $BG$ ,  $CG$ , cum rectæ  $EH$ ,  $FH$ . Et quoniam ex hypothesei æquales sunt circuli  $ABC$ ,  $DEF$ , erunt duo latera  $BG$ ,  $CG$  trianguli  $BGC$  æqualia duobus lateribus  $EH$ ,  $FH$  alterius trianguli  $EHF$ , alterum alteri. Sunt autem bases eorundem triangulorum  $BC$ ,  $EF$  ex hypothesei



etiam æ-  
quales in-  
ter se. Ita-  
que erit (1)  
angulus B-  
GC æqua-  
lis angulo  
EHF. Jam  
verò in cir-  
culis æqua-

libus æquales anguli [2] æqualibus insistent circumferentiis, sive ad circumferentias, sive ad centra sint positi. Erit igitur arcus BC æqualis arcui EF; atque adeo, quum æquales sint integræ circulorum circumferentiæ, erit quoque arcus BAC æqualis arcui EDF. Et propterea in circulis æqualibus æquales rectæ lineæ æquales arcus abscindunt, majorem quidem majori, minorem verò minori. Quod erat demonstrandum.

PROP. XXIX. THEOR. XXVI.

*In circulis æqualibus æquales arcus æquales rectæ lineæ subtendunt. Vide supra positam Figuram.*

**S**int duo circuli æquales ABC, DEF, quorum centra sint puncta G, & H. Abscindantur autem ex iis duo arcus æquales BC, EF. Dico, rectas BC, EF arcus illos æquales subtendentes esse etiam æquales inter se.

Jungantur etenim, tum rectæ BG, CG, cum rectæ EH, FH. Et quoniam ex hypothesi arcus BC æqualis est arcui EF, & in  
cir-

[1] Prop. 8. lib. 1. (2) Prop. 26. hujus.




circulis æqualibus anguli, qui sive ad centra, sive ad circumferentias positi, æqualibus arcubus insistant, æquales (1) sunt etiam inter se; erit angulus BGC æqualis angulo EHF. Unde, quum duo triangula BGC, EHF habeant duo latera BG, CG æqualia duobus lateribus EH, FH, alterum alteri, itemque æquales angulos sub lateribus illis comprehensos; habebunt quoque [2] basim BC æqualem basi EF. Et propterea in circulis æqualibus æquales arcus æquales rectæ lineæ subtendunt. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Hæc propositio est conversa præcedentis. Ibi enim ostensum est, in circulis æqualibus æquales rectas lineas æquales quoque arcus abscindere. Hic verò per contrarium demonstratur, in circulis æqualibus æquales arcus æquales quoque rectas subtendere.*

## PROP. XXX. PROBL. IV.


*Datam circuli portionem bifariam dividere.*



Data sit circuli portio ABC. Oportet, portionem istam bifariam dividere.

Ex puncto A ad punctum C ducatur recta AC, quæ secetur bifariam  
I 3 riam

[1] Prop. 27. hujus. [2] Prop. 4. lib. 1.



riam [1] in D. Erigatur deinde (2) super AC perpendicularis DB, quæ secet datam circuli portionem in B. Dico, portionem ABC sectam esse bifariam in B.

Jungantur enim rectæ AB, CB. Et quoniam ex constructione AD est æqualis CD, communis verò DB; erunt duo latera AD, DB trianguli ADB æqualia duobus lateribus CD, DB alterius trianguli CDB. Est etiam angulus ADB, contentus sub lateribus illius, æqualis angulo CDB, qui sub lateribus istius continetur, quum uterque ex constructione sit rectus. Itaque erit basis unius AB (3) æqualis quoque basi alterius CB. Ostensum est autem, in æqualibus circulis, & consequenter eò magis in eodem circulo, æquales rectas lineas æquales quoque arcus abscindere [4]. Erit igitur arcus AB æqualis arcui CB. Et propterea data circuli portio ABC secta est bifariam in B. Quod erat faciendum.


### PROP. XXXI. THEOR. XXVII.

*Angulus in semicirculo est rectus; qui verò est in portione majore, est recto minor; & qui in portione minore, est recto major,*

**E**Sto circulus ABCDE, habens pro centro punctum F. Ducatur in eo diameter BD,

(1) Prop. 10. lib. 1. [2] Prop. 11. lib. 1.

[3] Prop. 4. lib. 1. (4) Prop. 28. hujus.



BD, quæ eundem dividat in duos semicirculos; & in altero eorum, ut BAED, ponatur angulus BAD. Dico, angulum istum BAD rectum esse.

Jungatur etenim AF, & extendatur BA versus G. Quia igitur propter circulum AF est æqualis BF, triangulum AFB isosceles erit; atque adeo angulus BAF æqualis erit (1) angulo ABF. Similiratione, quia propter circulum AF est æqualis DF, erit triangulum AFD isosceles; & consequenter angulus DAF æqualis erit angulo ADF. Quum itaque sit angulus quidem BAF æqualis angulo ABF, angulus vero DAF æqualis angulo ADF; erit totus angulus BAD æqualis duobus ABF, ADF. Sed, quum in triangulo BAD latus BA productum sit in G, iisdem duobus angulis ABF, ADF æqualis est etiam [2] angulus DAG. Erit igitur (3) angulus BAD æqualis angulo DAG: & propterea, quum sint deinceps, uterque rectus erit. Rectus itaque est angulus BAD, qui existit in semicirculo BAED.


Ponatur secundò in portione ABCD, semicirculo majore, angulus alter ACD. Dico, angulum istum ACD esse acutum, seu minorem recto.

Quoniam enim in triangulo ABD angulus

I 4

BAD

[1] Prop. 5. lib. I. (2) Prop. 32. lib. I.  
 (3) Axi. I.



$BAD$  est rectus, erit alter  $ABD$  acutus, seu recto minor; quum in omni triangulo duo quilibet anguli simul duobus rectis minores sint (1). Est autem angulus  $ABD$  æqualis angulo  $ACD$ , quum sint in eadem

portione  $ABCD$  (2). Quale erit angulus  $ACD$  etiam acutus, seu recto minor.

Denique in portione  $AED$ , semicirculo minore, ponatur angulus  $AED$ . Dico, angulum istum  $AED$  esse obtusum, seu majorem recto.

Quoniam enim quadrilaterorum in circulo inscriptorum anguli oppositi sunt [3] æquales duobus rectis, &  $ACDE$  est figura quadrilatera inscripta in circulo  $ABCDE$ , erunt anguli ejus oppositi  $ACD$ ,  $AED$  simul æquales duobus rectis. Ostensum est autem, angulum  $ACD$  esse acutum, seu minorem recto. Erit igitur alter  $AED$  obtusus, seu recto major.

Quo circa angulus in semicirculo est rectus; qui verò est in portione majore, est recto minor; & qui in portione minore, est recto major. Quod erat demonstrandum.

SCHO-

[1] Prop. 17. lib. 1. (2) Prop. 21. hujus.  
[3] Prop. 22. hujus.

## SCHOLIUM I.

In hac propositione solent etiam apponi hæc alia duo. Primum, quod majoris quidem portionis angulus sit recto major. Et alterum, quod angulus minoris portionis sit recto minor. Horum autem utrumque ex eo vulgò deduci solet, quòd anguli deinceps, quos recta AD facit cum BG, prout ostensum est in prima parte hujus propositionis, sint recti. Inde enim sequitur, angulum, quem ipsa AD constituit cum portione ABCD, semicircula majore, esse recto majorem; angulum verò, quem eadem AD constituit cum portione AED, semicirculo minore, esse recto minorem. Quorsum autem hæc adjiciantur, & ostendantur nescio, num omnibus peræquè notum sit. Nimirum, quum alibi ostensum sit, angulum contactus minorem esse quocumque angulo acuto rectilineo; sequitur exinde, angulum portionis, quæ semicirculum adæquat, majorem esse omni angulo acuto rectilineo, atque adeo posse velut angulum rectum considerari. At verò, quum ostenditur hic, majoris quidem portionis angulum esse recto majorem, angulum autem minoris portionis esse recto minorem; ostenduntur hæc in hunc finem, ut sciamus, utrumque eorum angulorum ita quidem differre ab angulo recto, ut neuter possit unquam velut rectus considerari.

## SCHOLIUM II.

Hinc ea, de quibus est questio, congruentius ostendentur in hunc modum. Esto circulus ABCDE, qui dividatur per rectam AD in

I 5

duas



duas portiones inaequales, quarum altera  $ABCD$  sit semicirculo major, altera  $AED$  semicirculo minor. Ducatur ad punctum  $A$  tangens  $FG$ , cui perpendicularis erigatur  $AC$ , quæ quæ transcat per centrum circuli, erit diameter, dividetque adeo eundem circulum in duos semicirculos. Itaque, quia ex  $A$  duci possunt intra angulum  $CAD$ , non una, sed infinitæ rectæ lineæ; multum abest, ut ipse angulus  $CAD$  minor sit quocumque angulo acuto rectilineo: proindeque angulus majoris portionis  $DAB$  sensibiliter major erit angulo semicirculi  $CAB$ . Quare etsi, ob angulum contactus  $BAF$  omni angulo acuto rectilineo minorem, angulus semicirculi  $CAB$  non differat sensibiliter ab angulo recto  $CAF$ ; ipse tamen majoris portionis angulus  $DAB$  sensibiliter major erit angulo recto  $CAF$ . Simili ratione angulus minoris portionis  $DAE$  sensibiliter minor est angulo semicirculi  $CAE$ . Itaque etsi, ob angulum contactus  $EAG$  omni angulo acuto rectilineo minorem, angulus semicirculi  $CAE$  non differat sensibiliter ab angulo recto  $CAG$ ; ipse tamen minoris portionis angulus  $DAE$  sensibiliter minor erit angulo recto  $CAG$ .

### PROP. XXXII. THEOR. XXVIII.

Si circulum recta contingat linea, & ex puncto contactus alia utcumque circulum secans duca-

ducatur; anguli sub tangente, & secante contenti æquales erunt iis, qui in alternis circuli portionibus constituuntur.



Circulum ABCD contingat recta FG in puncto A, ex quo ducatur recta alia AD, quæ dividat circulum in duas portiones ABCD, AED. Dico, angulos tangente, & secante contentos æquales esse eis, qui in iis circuli portionibus alternatim constituuntur: nempe angulum DAF æqualem esse angulo ABD constituto in portione ABCD; & angulum DAG æqualem angulo AED constituto in portione AED.

Ex puncto etenim contactus A erigatur [1] super FG perpendicularis AC, quæ quum [2] transeat per centrum circuli, erit diameter, atque adeo dividet circulum in duos semicirculos. Quia igitur CDEA semicirculus est, juncta CD, erit (3) angulus CDA rectus. Sunt autem cujuscumque trianguli anguli omnes simul (4) duobus rectis æquales. Erunt itaque alii duo anguli ACD, DAC simul uni recto æquales: & propterea, quum rectus sit ex constructione angulus CAF, erit angulus CAF æqualis duobus angulis ACD, DAC; & consequenter, ablato communi DAC, erit angulus DAF [5] æqualis angulo

I 6 10

[1] Prop. 11. lib. 1. [2] Prop. 19. hujus.

[3] Prop. 31. hujus. [4] Prop. 32. lib. 1.

[5] Axi. 3.



lo  $ACD$ . Jam verò  
 angulus  $ACD$  æqualis  
 est [1] angulo  $ABD$ ,  
 quum sit in eadem  
 portione  $ABCD$ . Qua-  
 re idem angulus  $DAF$   
 æqualis quoque erit  
 angulo  $ABD$ .

Rursus, quia  $ABDE$   
 est figura quadrilatera  
 inscripta in circulo  $ABCDE$ , & quadrilate-  
 rorum in circulo inscriptorum anguli op-  
 positi simul (2) duobus rectis sunt æquales;  
 erunt duo anguli  $ABD$ ,  $AED$  simul duobus  
 rectis æquales. Sunt autem duo anguli  $DAF$ ,  
 $DAG$  simul etiam (3) æquales duobus rectis.  
 Erunt igitur duo anguli  $DAF$ ,  $DAG$  æqua-  
 les duobus angulis  $ABD$ ,  $AED$ : & propte-  
 rea, quum ostensum sit, angulum  $DAF$  æqua-  
 lem esse angulo  $ABD$ , erit alter angulus  
 $DAG$  æqualis alteri angulo  $AED$ . Quocir-  
 ca, si circulum recta contingat linea, & ex  
 puncto contactus alia utcumque circulum  
 secans ducatur; anguli tangente, & secante  
 contenti æquales erunt iis, qui in alternis  
 circuli portionibus constituuntur. Quod  
 erat demonstrandum.

### SCHOLIUM.

*Fieri autem potest, ut recta, que circulum  
 secat, sit perpendicularis ipsa  $AC$ , quo casu,  
 an-*

[1] Prop. 21. hujus. [2] Prop. 22. hujus.  
 (3) Prop. 13. lib. 1.



angulos tangente, & secante contentos æquales esse eis, qui in alternis circuli portionibus constituuntur, nullo negotio ostendetur. Est enim uterque eorum angulorum rectus ex hypothesis, & profecto recti sunt etiam anguli, qui constituuntur in portionibus ABC, ADC: quandoquidem recta AC, velut perpendicularis ad tangentem FG, transibit per centrum circuli; adeoque, tamquam diameter, dividet circulum in duos semicirculos, in quibus angulos, qui constituuntur, rectos esse, iam superius ostensum fuit.

PROP. XXXIII. PROBL. V.


In data recta linea describere portionem circuli, quæ suscipiat angulum æqualem angulo dato.



Data sit recta AB, datus verò angulus C. Oportet, in data recta AB describere portionem circuli, quæ suscipiat angulum, æqualem dato angulo C.

Ad rectam AB, atque ad datum in ea punctum A constituitur [1] angulus BAD æqualis angulo C. Tum super AD erigatur [2] ex puncto A perpendicularis AE; & secta AB [3] bifariam in F, erigatur super AB perpendicularis altera FE,

(1) Prop. 23. lib. 1. [2] Prop. 11. lib. 1.  
 (3) Prop. 10. lib. 1.



FE, conveniens cum AE in puncto E, jungaturque BE.

Quia igitur ex constructione AF est æqualis BF, communis verò FE; erunt duo latera AF, FE trianguli AFE æqualia duobus lateribus

BF, FE trianguli BFE, alterum alteri. Sunt etiam æquales anguli, qui sub lateribus iis continentur, quum uterque ex constructione sit rectus. Erit igitur basis unius AE (1) æqualis basi alterius BE: & propterea si centro E, intervalloque EA circulus describatur AGH, transibit circulus iste per punctum B. Sed descripto hoc circulo, dico, portionem ejus AHB suscipere angulum æqualem dato angulo C.

Quoniam enim AE est circuli semidiameter, eique ad rectos angulos insitit AD, erit AD circuli tangens [2]. Est autem AB secans. Quare angulus tangente, & secante contentus BAD æqualis [3] erit ei, qui constituitur in alterna circuli portione AHB. Jam verò ex constructione angulus BAD æqualis est angulo C. Angulus, igitur, qui constituitur in portione AHB, æqualis quoque erit angulo C. Et propterea in data recta AB descripta est circuli portio AHB, quæ suscipit angulum, æqualem dato angulo C. Quod erat faciendum.

SCHO-

[1] Prop. 4. lib. 1.      (2) Prop. 16. hujus.

[3] Prop. 32. hujus.

## SCHOLIUM.

Quia recta  $AE$ , perpendiculariter erecta super  $AD$ , cadit intra angulum  $BAD$ , quum est obtusus, & extra eundem angulum, quum est acutus; liquet, centrum descripti circuli  $E$  esse extra portionem  $AHB$ , quotiescumque datus angulus  $C$  est obtusus, & intra portionem, ubi idem angulus  $C$  est acutus. Quod si autem angulus  $C$  fuerit rectus, tunc, quia rectus est etiam angulus  $BAD$ , cadet  $AE$  super  $AB$ , & concidentibus punctis  $E$ , &  $F$ , fiet  $F$  centrum circuli, quod proinde erit in ipsa recta  $AB$ , quæ subtendit portionem  $AHB$ . Unde hoc casu, ut problemati fiat satis, satis erit, rectam  $AB$  dividere bifariam in  $F$ , & centro  $F$ , intervalloque  $FA$ , vel  $FB$  describere semicirculum  $AHB$ . Nam, quum angulus in semicirculo sit rectus, suscipiet semicirculus iste angulum æqualem dato angulo  $C$ .

## PROP. XXXIV. PROBL. VI.


Ex dato circulo abscindere portionem, quæ suscipiat angulum æqualem angulo dato.

**D**atus sit circulus  $ABC$ , datus verò angulus  $D$ . Oportet, ex circulo  $ABC$  abscindere portionem, quæ suscipiat angulum, æqualem dato angulo  $D$ .

Ducatur recta  $EF$ , [1] quæ circulum contingat in puncto aliquo  $A$ . Tum ad rectam  $AF$ , atque ad datum in ea punctum  $A$  constitutatur (2) angulus  $EAC$  æqualis angulo  $D$ .  
Dico,

---

(1) Prop. 17. hujus. (2) Prop. 23. lib. 1.



Dico , portionem ABC , abscissam ex circulo per rectam AC ad partem alteram anguli EAC , suscipere angulum æqualem angulo D .

Quoniam enim ex constructione EF est tangens circuli , AC verò secans , erit angulus EAC tangente , & secante contentus æqualis [1] angulo , qui constituitur in altera circuli portione , ABC . Est autem ex constructione angulus EAC æqualis angulo D . Angulus igitur , qui constituitur in portione ABC , æqualis est quoque angulo D . Et propterea ex dato circulo abscissa est portio , quæ suscipit angulum æqualem angulo dato D . Quod erat faciendum .

### SCHOLIUM.


*Hoc problema est conversum præcedentis . Ibi enim querebatur circulus , in quo si data recta ponatur , abscindat ex eo portionem , quæ suscipiat angulum , æqualem angulo dato . Hic verò quæritur per contrarium recta , quæ posita in dato circulo , abscindat ex eo portionem , quæ dati anguli sit capax .*

PROP.

[1] Prop. 32. hujus.

LIBER TERTIUS. 209  
 PROP. XXXV. THEOR. XXIX.

*Si in circulo duæ rectæ lineæ se mutuo secent;  
 erit rectangulum sub segmentis unius æquale re-  
 ctangulo sub segmentis alterius.*



In circulo ABCD  
 rectæ duæ AC, BD se  
 secent in E. Dico, re-  
 ctangulum contentum  
 sub segmentis unius  
 AE, EC æquale esse ei,  
 quod sub segmentis  
 alterius BE, ED con-  
 tinetur.

Transseat primò utra-  
 que linearum per centrum circuli, vel quod  
 idem est, sit punctum E, in quo duæ rectæ  
 AC, BD se mutuo secant, ipsius circuli cen-  
 trum. Et quoniam æquales sunt rectæ omnes,  
 quæ ducuntur a centro ad circumferentiam,  
 æqualia erunt inter se earum rectarum seg-  
 menta omnia: & propterea rectangulum con-  
 tentum sub segmentis unius AE, EC æquale  
 erit quoque rectangulo, quod sub segmentis  
 alterius BE, ED continetur.



Transseat secundò  
 earum linearum una  
 quidem AC per cen-  
 trum circuli F, alte-  
 ra verò BD nequa-  
 quam. Et siquidem  
 AC secat BD ad an-  
 gulos rectos, seca-  
 bit [1] eandem bifa-  
 riam: adeoque, quum rectangulum sub ipsis  
 BE,

(1) Prop. 3. huius.

BE, ED idem sit, ac BE quadratum; eò res redit, ut ostendamus, BE quadratum æquale esse rectangulo, quod sit ex AE in EC. Id, quod jam alibi a nobis ostensum est: nempe, quum ex ultima propositione libri præcedentis velut corollarium deduximus, quod si ex puncto aliquo in circuli circumferentia sumpto perpendicularis ad diametrum demittatur, quadratum ejus æquale sit rectangulo sub diametri segmentis comprehenso,



Quod si verò recta AC transiens per cẽtrum circuli F non fecet ad angulos rectos: aliam BD non transeuntem per centrum; tum ex centro F super BD (1) perpendicularis demittatur FG, quæ eandem secabit bifariam in G, & jungatur BF. Quia igitur recta AC secta est bifariam in F, & non bifariam in E; erit [2] rectangulum sub partibus inæqualibus AE, EC, una cum quadrato portionis intermediæ EF, æquale quadrato, quod sit ex dimidia CF, seu BF. Est autem propter angulum rectum BGF quadratum quidem ex EF [3] æquale quadratis ex EG, & GF, quadratum verò ex BF æquale quadratis ex BG, & GF. Quare erit rectangulum ex AE in EC, una cum quadratis ex EG, & GF, æquale quadratis ex BG, & GF:

(1) Prop. 12. lib. 1.

(2) Prop. 5. lib. 2.

(3) Prop. 47. lib. 1.

GE: proptereaque dempto communi quadrato ex GF, erit rectangulum ex AE in EC, una cum EG quadrato, æquale quadrato ex BG. Jam vero, quum recta BD secta sit bifariam in G, & non bifariam in E, quadratum ex BG æquale est rectangulo ex BE in ED, una cum EG quadrato. Itaque erit rectangulum ex AE in EC, una cum EG quadrato, æquale rectangulo ex BE in ED, una cum eodem quadrato, quod fit ex EG. Auferatur commune istud quadratum. Et erit rectangulum ex AE in EC æquale rectangulo ex BE in ED.




Denique, si neutra linearum AC, BD transeat per centrum circuli F, tunc jungatur EF, quæ extendatur usque donec circumferentiam secet in punctis G, & H. Quia igitur recta GH transit per centrum circuli F, & secat in E aliam AC

non transeuntem per centrum; erit rectangulum ex GE in EH æquale rectangulo ex AE in EC. Et similiter, quia recta GH transiens per centrum circuli F secat in E aliam BD non transeuntem per centrum, erit rectangulum ex GE in EH æquale rectangulo ex BE in ED. Eidem igitur rectangulo ex GE in EH æquale est, tum rectangulum ex AE in EC, cum rectangulum ex BE in ED. Sed quæ eidem sunt æqualia, inter se sunt æqualia. Rectangulum igitur ex AE in EC æquale est rectangulo ex BE in ED. Et propterea

pterea si in circulo duæ rectæ lineæ se mutuo secent, erit rectangulum sub segmentis unius æquale rectangulo sub segmentis alterius. Quod erat ostendendum.

PROP. XXXVI. THEOR. XXX.

*Si extra circulum sumatur punctum aliquod, & ex eo ducantur duæ rectæ lineæ, quarum una circulum contingat, altera eundem utcumque secet; rectangulum sub secante tota, & portione extra circulum existente contentum æquale erit quadrato, quod fit ex tangente.*




Extra circulum BCD, cujus centrum est punctum E, sumatur punctum aliquod A, ex quo ducantur duæ rectæ lineæ AC, AD, quarum ista circulum tangat in D, illa verò circulum utcumque secet in punctis B, & C. Dico, rectangulum, quod fit ex AC in AB, æquale esse quadrato tangentis AD. Transeat namque primò secans AC per centrum circuli E, & jungatur DE. Quia igitur BC secta est bifariam in E, eique in directum adjecta alia AB, erit rectangulum ex AC in AB, una cum quadrato ex BE, æquale (1) quadrato ex AE. Est autem ob tangentem [2] AD angulus ADE rectus; adeoque quadratum ex AE æquale (3) quadratis, quæ fiunt

(1) Prop. 6. lib. 2. [2] Prop. 18. hujus.  
[3] Prop. 47. lib. 2.



funt ex AD, & DE. Quare erit rectangulum ex AC in AB, una cum quadrato ex BE, æquale quadratis, quæ fiunt ex AD, & DE. Unde, quum propter circulum BE quadratum æquale fit DE quadrato, iis ablatis, supererit rectangulum ex AC in AB æquale quadrato tangentis AD.



Quod si verò secans AC non transeat per cētrum circuli E, tunc demittatur super AC (1) perpendicularis EF, quæ secabit BC [2] bifariam in F, junganturque AE, BE, DE. Et quoniam BC secta est bifariam in F, eique in directum adjecta alia AB; erit rursus rectangulum ex AC in

AB, una cum BF quadrato, æquale quadrato, quod fit ex AF: proindeque appposito communi quadrato ex EF, erit rectangulum ex AC in AB, una cum quadratis ex BF, & EF, æquale quadratis, quæ fiunt ex AF, & EF. Sunt autem propter angulum rectum AFE quadrata quidem ex BF, & FE æqualia quadrato ex BE, quadrata vero ex AF, & FE æqualia quadrato ex AE. Erit igitur rectangulum ex AC in AB, una cum BE quadrato, æquale quadrato, quod fit ex AE. Jam verò propter tangentem AD angulus ADE est rectus; adeoque quadratum ex AE æquale est quadratis, quæ fiunt ex AD, & DE. Quare erit rectangulum ex AC in AB, una cum BE qua-

(1) Prop. 12. lib. 1. [2] Prop. 3. hujus.

quadrato, æquale quadratis, quæ fiunt ex AD, & DE. Unde rursus, quum propter circulum BE quadratum æquale sit DE quadrato; his ablatis, supererit reſtångulum ex AC in AB æquale quadrato tangentis AD. Et propterea, si extra circulum capiatur punctum aliquod, ex quo ducantur duæ rectæ lineæ, quarum altera circulum contingat, altera eum utcumque secet; reſtångulum subsecante tota, & portione extra circulum existente contentum æquale erit quadrato, quod fit ex tangente. Quod erat demonstrandum.

### COROLLARIUM.

*Hinc si extra circulum BCD capiatur punctum aliquod A, & ex eo ducantur duæ rectæ lineæ AC, AH, quæ circulum secent; erit reſtångulum ex AC in AB æquale reſtångulo ex AH in AG. Nam, si ex eodem puncto A ducatur recta AD, quæ circulum contingat in D; erit per istam propositionem quadrato ex AD æquale, tum reſtångulum ex AC in AB, cum reſtångulum ex AH in AG. Jam verò equalia sunt inter se, quæ eidem sunt equalia. Reſtångulum igitur ex AC in AB æquale erit reſtångulo ex AH in AG.*


### SCHOLIUM.

*Unde non abs re erit hoc loco animadverti id, quod propositione antecedenti ostensum est de rectis, quæ intra circulum se mutuo secant, Verum esse etiam de rectis, quæ extra circulum sibi in vicem occurrunt. Nempe,*

quemadmodum quum duæ rectæ lineæ se mutuo intra circulum secant, & utrimque ad circumferentiam terminantur, æqualia sunt rectangula, quæ fiunt ex earum segmentis, hoc est ex partibus puncto sectionis, & circuli circumferentia interceptis; ita quoque si rectæ duæ utrimque ad circumferentiam circuli terminatæ, sibi mutuo extra circulum occurrant, æqualia erunt rectangula, quæ fiunt ex earum portionibus, sumptis a puncto occursis, & ad circuli circumferentiam terminatis.


## PROP. XXXVII. THEOR. XXXI.

Si extra circulum sumatur punctum aliquod, & ex eo ducantur duæ rectæ lineæ, quarum una circulum secet, altera incidat in eum, sitque rectangulum sub secante tota, & portione extra circulum existente contentum æquale quadrato incidentis; incidens ista recta linea tangens erit.



Extra circulum BCD capiatur punctum aliquod A, ex quo ducantur duæ rectæ lineæ AC, AD, quarum illa circulum secet in punctis B, & C, ista incidat in eum, ipsi occurrens in D. Dico, quod si rectangulum ex AC in AB æquale sit quadrato ipsius AD, recta ista AD circulum contingat in D.

Ducatur etenim ex puncto A recta AE, quæ



quæ circulum con-  
tingat in E (1). Tum  
invento centro cir-  
culi F [2] jungantur  
DF, AF, EF. Quia igitur  
AE est tangens,  
erit (3) rectangulum  
ex AC in AB æquale  
quadrato ipsius AE.  
Est autem ex hypo-

thesi idem rectangulum ex AC in AB æqua-  
le quadrato rectæ AD. Itaque erit AE qua-  
dratum æquale AD quadrato, & propterea  
erit AE æqualis AD. Unde, quum propter  
circulum æquales fiant EF, DF; erunt duo  
latera AE, EF trianguli AEF æqualia duo-  
bus lateribus AD, DF trianguli ADF, alte-  
rum alteri. Est verò basis AF communis.  
Quare erit angulus AEF contentus sub la-  
teribus illius æqualis [4] angulo ADF, qui  
sub istius lateribus continetur. Quumque  
propter tangentem AE rectus sit (5) angu-  
lus AEF, erit quoque rectus angulus alter  
ADF. Unde, quum ex puncto D, extremi-  
tate semidiametri DF, erecta sit perpendicu-  
laris DA, hæc tota [6] extra circulum cadet,  
atque adeo tangens erit. Et propterea si  
extra circulum capiatur punctum aliquod,  
ex quo ducantur duæ rectæ lineæ, quarum  
una circulum secet, altera incidat in eum,  
sitque rectangulum ex secante tota, & por-  
tione

[1] Prop. 17. hujus.

(2) Prop. 1. hujus.

[3] Prop. 36. hujus.

[4] Prop. 8. lib. 1.

[5] Prop. 18. hujus.

(6) Prop. 16. hujus.

tionem extra circulum existente æquale quadrato incidentis; incidens ista recta linea tangens erit. Quod demonstrare oportebat.

## COROLLARIUM.

Patet autem ex hac propositione, æquales esse tangentes, quæ ex eodem puncto ad circulum ducuntur. Ostensum est enim, æquales esse rectas  $AD$ ,  $AE$ , quarum utraque circulum contingit: id, quod etiam ostendi potest in hunc modum. Quoniam  $AD$ ,  $AE$  sunt tangentes, rectus erit uterque angulorum  $ADF$ ,  $AEF$ . Unde, quum sit  $AF$  quadratum æquale tum quadratis, quæ fiunt ex  $AD$ , &  $DF$ , cum quadratis, quæ fiunt ex  $AE$ , &  $EF$ ; erunt quadrata ex  $AD$ , &  $DF$  equalia quadratis ex  $AE$ , &  $EF$ . Est verò propter circulum  $DF$  quadratum æquale  $EF$  quadrato. His igitur ablatis, supererit  $AD$  quadratum æquale  $AE$  quadrato: & propterea  $AD$  ipsi  $AE$  æqualis erit.

## SCHOLIUM.

Ceterum hæc propositio est conversa præcedentis. Quemadmodum enim ibi ex eo, quod  $AD$  sit tangens, ostensum est, rectangulum ex  $AC$  in  $AB$  æquale esse quadrato, quod fit ex  $AD$ ; ita hic per contrarium ex eo, quod rectangulum ex  $AC$  in  $AB$  æquale sit quadrato ex  $AD$ , ostenditur, ipsam  $AD$  circulum contingere in puncto  $D$ .

218  
G E O M E T R I Æ P L A N Æ  
E L E M E N T O R U M

L I B E R Q U A R T U S,

---

D E F I N I T I O N E S.

I.



Figura rectilinea in figura rectilinea describi dicitur, quando unusquisque figuræ, quæ describitur, angulus unumquodque figuræ, in qua describitur, latus contingit.

II.

Vicissim verò figura rectilinea circa figuram rectilineam describi dicitur, quando unumquodque figuræ, quæ describitur, latus unumquemque figuræ, circa quam describitur, angulum contingit.

III.

Similiter autem figura rectilinea in circulo describi dicitur, quando unusquisque figuræ, quæ describitur, angulus contingit circumferentiam circuli, in quo describitur.

IV.

Atque ita quoque figura rectilinea circa circulum describi dicitur, quando unumquodque figuræ, quæ describitur, latus contingit circumferentiam circuli, circa quem describitur.

V.

Ad hæc: circulus in figura rectilinea describi dicitur, quando circumferentiam ejus

CON-

contingit unumquodque latus figuræ, in qua describitur.

VI.


Vicissim verò circulus circa figuram rectilineam describi dicitur, quando circumferentiam ejus contingit unusquisque angulus figuræ, circa quam describitur.

VII.

Recta linea in circulo aptari dicitur, quando ita quidem ponitur intra circulum, ut extrema ejus in circuli circumferentia reperiuntur.

## PROP. I. PROBL. I.

*In dato circulo aptare rectam lineam, quæ alteri datæ sit æqualis. Oportet autem, ut datæ recta linea non sit major diametro dati circuli.*



Datus sit circulus ABC, data verò recta DE, non major diametro dati circuli. Oportet, in circulo ABC aptare rectam lineam, quæ sit æqualis ipsi DE.

Ducatur in circulo diameter AB. Et siquidem AB sit æqualis datæ DE, quoniam extrema ipsius AB sunt in circuli circumferentia, ea problemati satisfaciet. Quod si verò illa non sit æqualis, abscindatur ex AB portio AF (1) æqualis DE. Tum centro A, intervalloque AF circulus describatur FCG, qui alium secet in C, jungaturque AC. Dico, AC esse rectam quæsitam.

K 2

Quia

(1) Prop. 3. lib. 1.

Quum enim  $A$  centrum sit circuli  $FCG$ , erit  $AF$  æqualis  $AC$ . Est autem ex constructione  $AF$  æqualis  $DE$ . Erit igitur  $AC$  æqualis  $DE$ . Sunt verò extrema ejusdem  $AC$  in circumferentia circuli  $ABC$ . Aptata est igitur in circulo  $ABC$  recta  $AC$  æqualis datæ  $DE$ . Quod erat faciendum.

### SCHOLIUM.

*Necesse est autem, ut data recta linea, cui æqualis altera aptari debet in dato circulo, major non sit diametro dati circuli, ob id, quod ostensum est propositione decima quinta libri præcedentis, nempe quod diameter sit maxima omnium rectarum, quæ intra circumulum aptari possunt.*

### PROP. II. PROBL. II.

*In dato circulo describere triangulum æquiangulum alteri triangulo dato.*



Datus sit circulus  $ABC$ , datum verò triângulum  $DEF$ . Oportet, in circulo  $ABC$  describere triangulum, quod ipsi  $DEF$  sit æquiangulum, ita nempe, ut singuli anguli unius æquales sint singulis angulis alterius.

Ducatur [1]  $GH$ , quæ circumulum contingat

[1] Prop. 17. lib. 3.



gat in A. Tum ad rectam GH, atque ad datum in ea punctum A constituatur (1) primò angulus GAC æqualis angulo DEF, deinde angulus HAB æqualis angulo DFE. Denique jungantur puncta B, & C, in quibus rectæ AB, AC secant circumferentiam dati circuli, per rectam BC. Dico, ABC esse triangulum quæsitum.

Quoniam enim GH est tangens, AC verò secans, erit [2] angulus GAC tangente, & secante contentus æqualis angulo ABC, constituto in alterna circuli portione. Est autem ex constructione angulus GAC æqualis angulo DEF. Erit igitur angulus ABC æqualis quoque angulo DEF.

Simili ratione, quoniam GH est tangens, AB verò secans, erit angulus BAH tangente, & secante contentus æqualis angulo ACB, constituto in alterna circuli portione. Est autem ex constructione angulus BAH æqualis angulo DFE. Itaque erit angulus ACB æqualis quoque angulo DFE.

Rursus, quia omnes anguli cujuscumque trianguli simul [3] duobus rectis æquales sunt; erunt anguli omnes simul sumpti trianguli ABC æquales angulis omnibus simul sumptis trianguli DEF. Ostensum est autem, angulum quidem ABC æqualem esse angulo DEF, angulum verò ACB æqualem angulo DFE. Erit igitur reliquus angulus BAC æqualis reliquo angulo EDF.

Est itaque triangulum ABC æquiangulum triangulo DEF. Estque etiam descriptum

K 3

in


(1) Prop. 23. lib. 1. [2] Prop. 32. lib. 3.

[3] Prop. 32. lib. 1.

in dato circulo : omnes etenim anguli ejus circumferentiam dati circuli contingunt. In dato igitur circulo ABC descriptum est triangulum ABC æquiangulum dato triangulo DEF. Quod erat faciendum.

PROP. III. PROBL. III.

*Circa datum circulum describere triangulum æquiangulum alteri triangulo dato.*



Datus sit circulus ABC, datum verò triangulum DEF. Oportet, circa datū circulum ABC describere triangulum, quod ipsi DEF sit æquiangulum; ita nempe, ut singuli unius

anguli æquales sint singulis angulis alterius.

Extendatur EF utrimque versus G, & H. Tum invento [1] circuli centro K, actoque radio KA, fiat (2) tam angulus AKB æqualis angulo DEG, quam angulus BKC æqualis angulo DFH. Deinde ex punctis A, B, C ipsis KA, KB, KC perpendiculares respectivè erigantur [3] LM, MN, NL convenientes in punctis L, M, N. Dico, LMN esse triangulum quæsitum.

Quoniam enim quadrilaterum AKBM per diagonalem AB, vel KM dividitur in duo trian-

[1] Prop. 1. lib. 3. (2) Prop. 23. lib. 1.  
[3] Prop. 11. lib. 1.


triangula, erunt quatuor ejus anguli simul sumpti rectis totidem æquales, quam omnes anguli cujuscumque trianguli simul duos rectos (1) adæquent. Est autem ex constructione rectus; tum angulus  $KAM$ , cum angulus  $KBM$ . Itaque alii duo anguli  $AKB$ ,  $AMB$  simul duobus rectis æquales erunt: & propterea, quum duo anguli  $DEG$ ,  $DEF$  pariter duobus rectis æquales sint; erunt duo anguli  $AKB$ ,  $AMB$  æquales duobus angulis  $DEG$ ,  $DEF$ : atque adeo, quia ex constructione angulus  $AKB$  æqualis est angulo  $DEG$ , erit alter angulus  $AMB$  æqualis alteri angulo  $DEF$ . Simili ratione, ope quadrilateri  $KBNC$ , ostendetur angulus  $BNC$  æqualis angulo  $DFE$ : ex quo fit, ut tertius angulus  $EDF$  etiam sit æqualis tertio angulo  $ALC$ . Quare triangulum  $LMN$  æquiangulum erit triangulo  $DEF$ . Est autem idem triangulum  $LMN$  descriptum circa circulum  $ABC$ ; quandoquidem latera ejus  $LM$ ,  $MN$ ,  $NL$  contingunt ejus circuli circumferentiam, propterea quod ex constructione radiis  $KA$ ,  $KB$ ,  $KC$  ad rectos angulos insistant. Circa datum itaque circulum  $ABC$  descriptum est triangulum  $LMN$  æquiangulum dato triangulo  $DEF$ . Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Perpendicularares  $LM$ ,  $MN$ ,  $NL$ , quæ ex punctis  $A$ ,  $B$ ,  $C$  super radiis  $KA$ ,  $KB$ ,  $KC$  respectivè eriguntur, debere sibi mutuo occurrere, haud difficile erit ostendere. Quum enim ex constructione recti sint anguli  $KAM$ ,  $KBM$ , si jungantur puncta  $A$ , &  $B$  per rectam  $AB$ ,*

$K$  4 an-

(1) Prop. 32. lib. I.




anguli, quos perpendicularicula  $AM$ ,  $BM$  cum recta ista  $AB$  constituunt, erunt simul duobus rectis minores; atque adeo per axioma decimum tertium eadem perpendicularicula

producta convenient tandem in puncto aliquo  $M$ , similiter, quum rectus sit ex constructione uterque angulorum  $KBN$ ,  $KCN$ , junctis punctis  $B$ , &  $C$  per rectam  $BC$ , erunt anguli, quos perpendicularicula  $BN$ ,  $CN$  constituunt cum recta ista  $BC$ , simul duobus rectis minores; adeoque per idem axioma decimum tertium eadem perpendicularicula producta convenient tandem in puncto aliquo  $N$ . Major est difficultas de perpendicularibus  $ML$ ,  $NL$ . Verum, quum ostensum sit, angulum  $AMB$  equalem esse angulo  $DEF$ , & angulum  $BNC$  equalem angulo  $DFE$ ; erunt duo anguli  $AMB$ ,  $BNC$  aequales duobus angulis  $DEF$ ,  $DFE$ . Sunt autem per decimam septimam primi duo anguli  $DEF$ ,  $DFE$  simul duobus rectis minores. Quare erunt etiam minores duobus rectis anguli duo  $AMB$ ,  $BNC$ : proptereaque per axioma decimum tertium perpendiculariculae  $ML$ ,  $NL$  productae convenient, tandem in puncto aliquo  $L$ . Quum igitur perpendiculariculae tria  $LM$ ,  $MN$ ,  $NL$  sibi mutuo occurrant, eadem mutuo ipsorum occursum quaesitum triangulum constituere, nemo non videt.

PROP. IV. PROBL. IV.

In dato triangulo circulum describere.

**E**Sto triangulum  $ABC$ . Oportet, in triangulo isto  $ABC$  describere circulum. Se.



Secentur anguli  $ABC$ ,  $BCA$  (1) bifariam per rectas  $BD$ ,  $CD$ , quæ occurrant sibi mutuo in  $D$ . Tum ex puncto  $D$  ipsis  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$  perpendiculares respectivè [2] demittantur  $DE$ ,  $DF$ ,  $DG$ . Dico,

circulum, qui describitur centro  $D$ , intervalloque  $DE$ , esse circulum quæsitum,

Quoniam enim ex constructione æquales sunt tum anguli  $DEB$ ,  $DFB$ , cum anguli  $DBE$ ,  $DBF$ ; erunt duo anguli  $DEB$ ,  $DBE$  trianguli  $BDE$ , æquales duobus angulis  $DFB$ ,  $DBF$  trianguli  $BDF$ , alter alteri. Est autem latus  $BD$  utrique triangulo commune. Itaque æqualia quoque erunt (3) latera  $DE$ ,  $DF$ . Simili ratione, ope triangulorum  $CDF$ ,  $CDG$ , ostendentur æqualia latera  $DF$ ,  $DG$ . Tres igitur  $DE$ ,  $DF$ ,  $DG$  æquales sunt inter se. Et propterea circulus, qui describitur centro  $D$ , intervalloque  $DE$ , transibit etiam per puncta  $F$ , &  $G$ . Contingunt autem circuli hujus circumferentiam latera trianguli  $AB$ ,  $BC$ ,  $CA$ : idem igitur circulus descriptus erit in triangulo  $ABC$ . Adeoque in dato triangulo  $ABC$  descriptus est circulus  $EFG$ . Quod erat faciendum.


K 5

PROP.

(1) Prop. 9. lib. 1. [2] Prop. 12. lib. 1.  
 (3) Prop. 26. lib. 1.

## PROP. V. PROBL. V.

*Circa datum triangulum circulum describere.*



Esto tria ngulū ABC. Oportet, circa triāgulū istud ABC describere circulum.

Secentur latera AB, AC [1] bifariam in punctis D, & E, ex quibus erigantur (2)



super iisdem AB, AC perpendiculares DF, EF, sibi mutuò occurrentes in F. Dico, circulum, qui describitur centro F, intervalloque FA, esse circulum quæsitum.

Jungantur etenim rectæ FA, FB, FC. Et quoniam ex constructione AD est æqualis BD, communis verò DF; erunt duo latera AD, DF trianguli ADF æqualia duobus lateribus BD, DF trianguli BDF, alterum alteri. Sunt autem æquales quoque anguli sub lateribus iis comprehensi, quum uterque ex constructione sit rectus. Quare erit (3) basis unius FA æqualis basi alterius FB. Simili ratione, ope triangulorum AEF, CEF, ostendetur FA æqualis FC. Tres igitur FA, FB, FC æquales sunt inter se: & propterea circulus, qui describitur centro F, intervalloque FA, quum transeat quoque per puncta B, & C, descriptus erit circa triangulum ABC. Quod erat faciendum.

SCHO.

[1] Prop. 10. lib. 1. [2] Prop. 11. lib. 1.  
[3] Prop. 4. lib. 1.

## SCHOLIUM.



Perpendiculares  $DF$ ,  
 $EF$ , quæ ex punctis  $D$ ,  
 $E$  super ipsis  $AB$ ,  
 $AC$  eriguntur, debere  
 si mutuo occurrere in  
 puncto aliquo  $F$ , nemo  
 non videt. Sunt enim  
 anguli  $ADF$ ,  $AEF$  re-  
 cti. Quare si jungantur  
 puncta  $D$ ,  $E$  per  
 rectam  $DE$ , anguli,  
 quos cum recta ista  $DE$   
 eadem perpendiculares  
 efficiunt, erunt duobus  
 rectis minores: atque  
 adeo per axioma deci-  
 mum tertium productæ  
 tandem convenient in-

ter se. Jam punctum  $F$ , in quo perpendiculares  
 illæ sibi mutuo occurrunt, potest esse vel intra  
 triangulum, vel in basi ipsius, vel denique extra  
 triangulum: nempe prout angulus  $BAC$  vel est  
 acutus, vel rectus, vel obtusus.

## PROP. VI. PROBL. VI.


*In dato circulo quadratum describere.*

**D**atus sit circulus  $ABCD$ . Oportet, in eo  
 quadratum describere.

Ducantur in circulo duæ diametri  $AC, BD$ ,  
 quæ in centro  $E$  se secent ad angulos rectos.

K 6

Tunc



Tum jungantur rectæ  
 $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DA$ .  
 Dico,  $ABCD$  esse qua-  
 dratum quæsitum.

Quoniam enim  $E$  cen-  
 trum est circuli  $ABCD$ ,  
 erit  $AE$  æqualis  $CE$ . Est  
 autem  $BE$  communis.  
 Erunt igitur duo latera

$AE$ ,  $BE$  trianguli  $AEB$  æqualia duobus late-  
 ribus  $CE$ ,  $BE$  trianguli  $CEB$ , alterum alteri.  
 Sunt etiam æquales anguli sub lateribus iis  
 contenti, quum uterque ipsorum ex con-  
 structione sit rectus. Quare erit [1] basis  
 unius  $AB$  æqualis basi alterius  $BC$ . Simili-  
 ratione ostendetur &  $BC$  æqualis  $CD$ , &  $CD$   
 æqualis  $DA$ . Quatuor igitur  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  
 $DA$  æquales erunt inter se: proptereaque  
 figura  $ABCD$  æquilatera erit. Est etiam re-  
 ctangula. Sunt enim  $AC$ ,  $BD$  diametri;  
 adeoque quum unaquæque ipsarum dividat  
 circulum in duos semicirculos, erit quilibet  
 angulus figuræ  $ABCD$  in semicirculo, &  
 consequenter (2) rectus. Figura igitur  $ABCD$ ,  
 quum æquilatera sit, & rectangula, qua-  
 dratum erit. Proindeque in dato circulo de-  
 scriptum est quadratum  $ABCD$ . Quod erat  
 faciendum.

### PROP. VII. PROBL. VII.


*Circa datum circulum quadratum describere.*

**E**sto circulus  $ABCD$ . Oportet, circa  
 ipsum quadratum describere.

Du-

[1] Prop. 4. lib. 1. [2] Prop. 31. lib. 3.





Ducantur etiam  
binæ diametri AC,  
BD, quæ in centro  
E se secant ad angu-  
los rectos. Tum ex  
punctis A, B, C, D  
ipsis AC, BD per-  
pendiculares [1] re-  
spectivè erigantur


FG, GH, HI, IF, quæ conveniant in punctis  
F, G, H, I. Dico, FGHI esse quadratum quæ-  
situm.

Quoniam enim rectæ GF, BD, HI insistant  
ad angulos rectos super AC, eæ parallelæ  
erunt inter se. Et similiter quoniam rectæ  
FI, AC, GH insistant ad angulos rectos super  
BD, istæ quoque inter se parallelæ erunt. Quum  
igitur CF, CG parallelogramma sint, erit  
(2) ipsi AC æqualis tam FI, quàm GH. Quum-  
que similiter parallelogramma sint BF, BI,  
erit ipsi BD æqualis utraq; ipsarum GF, HI.  
Sunt autem AC, BD, tanquam diametri ejus-  
dem circuli, æquales inter se. Quatuor itaque  
FG, GH, HI, IF etiam inter se æquales erunt:  
proptereaque figura FGHI æquilatera erit. Est  
etiam rectangula, quum propter parallelo-  
gramma EF, EG, EH, EI anguli ejus æqua-  
les sint iis, quos binæ diametri AC, BD mu-  
tua sectione constituunt in centro E. Erit  
igitur figura FGHI æquilatera simul, & re-  
ctangula; adeoque quadratum erit. Itaque  
circa datum circulum descriptum est quadra-  
tum FGHI. Quod erat faciendum.

PROP.

[1] Prop. 12. lib. 1. (2). Prop. 34. lib. 1.

230 ELEM. GEOM. PL.  
 PROP. VIII. PROBL. VIII.  
*In dato quadrato circulum describere.*



Datum sit quadratum  $ABCD$ . Oportet, in ipso circulum describere.

Secentur latera  $AB, BC$  bifariam [1] in  $E, \& F$ , ex quibus super iisdem  $AB, BC$  perpendiculares excitentur [2]  $EG, FH$ ,

se mutuo secantes in  $I$ . Dico, circulum, qui describitur centro  $I$ , intervalloque  $IE$ , esse circulum quaesitum.


Quoniam enim  $ABCD$  quadratum est, erit  $AB$  aequalis  $BC$ . Sunt autem ex constructione duae  $AB, BC$  sectae bifariam in  $E, \& F$ . Quatuor igitur  $AE, EB, BF, FC$  aequales erunt inter se. Jam vero unumquodque ipsorum  $AI, BI, CI, DI$  parallelogrammum est; adeoque [3]  $AE$  est aequalis  $HI$ ,  $EB$  aequalis  $IF$ ,  $BF$  aequalis  $EI$ , &  $FC$  aequalis  $IG$ . Itaque quatuor  $HI, IF, EI, IG$  etiam inter se aequales erunt. Et propterea circulus, qui describitur centro  $I$ , intervalloque  $IE$ , transibit etiam per puncta  $F, G, H$ . Contingunt autem circuli hujus circumferentiam latera dati quadrati  $AB, BC, CD, DA$ , quum diametris  $EG, FH$  ad rectos angulos insistant. Quare in dato quadrato  $ABCD$  descriptus est circulus  $EFGH$ . Quod erat faciendum.

PROP.

[1] *Prop. 10. lib. 1.* [2] *Prop. 11. lib. 1.*  
 [3] *Prop. 34. lib. 1.*

## PROP. IX. PROBL. IX.

*Circa datum quadratum circulum describere.*



Esto quadratum ABCD . Oportet, circa ipsum describere circulum.

Ducantur diagonales AC , BD , se mutud secantes in E . Dico , circulum , qui describitur centro E , intervalloque EA ,

esse circulum quaesitum.

Quoniam enim ABCD quadratum est, erit AB æqualis BC ; adeoque , quum isosceles sit triangulum ABC , erit (1) angulus BAC æqualis angulo BCA . Sunt autem anguli omnes cujuscumque trianguli simul [2] duobus rectis æquales . Quum igitur propter quadratum rectus sit angulus ABC , semirectus erit tum angulus BAC , cum angulus BCA . Simili ratione ostendetur semirectos esse angulos ABD , ADB : ex quo sequitur, angulos quadrati sectos esse bifariam per diagonales AC , BD ; adeoque non modò ipsos, verum etiam & eos , in quos secti sunt, æquales esse inter se . Quum igitur anguli BAE , ABE æquales inter se sint , erunt etiam (3) æqualia latera EA , EB , quæ angulos illos


[1] Prop. 5. lib. 1. (2) Prop. 32. lib. 1.

[3] Prop. 6. lib. 1.

los subtendunt. Quumque eadem ratione ostendatur  $EB$  æqualis  $EC$ , &  $EC$  æqualis  $ED$ ; erunt quatuor  $EA, EB, EC, ED$  æquales inter se; atque adeo circulus, qui describitur centro  $E$ , intervalloque  $EA$ , transibit etiam per puncta  $B, C, D$ . Unde, quum anguli dati quadrati contingant circuli hujus circumferentiam, idem descriptus erit circa quadratum. Quod erat faciendum.

PROP. X. PROBL. X.

*Equicrure triangulum constituere, cujus uterque angulorum ad basim duplus sit anguli verticalis.*



Exponatur recta quævis  $AB$ , quæ secetur subinde in  $C$ , [1] ut rectangulum ex  $AB$  in  $BC$  æquale sit quadrato ex  $AC$ . Tum centro  $A$ , intervalloque  $AB$  descripto circulo  $BDE$ , applicetur (2) in circulo isto recta  $BD$  æqualis ipsi  $AC$ , jungaturque  $AD$ . Dico,  $ABD$  esse triangulum isosceles, seu æquicrure quæsitum.

Jungatur etenim  $CD$ , & circa triangulum  $ACD$  (3) circulus describatur. Quia igitur rectangulum ex  $AB$  in  $BC$  æquale est quadrato ex  $AC$ , estque ex constructione  $AC$  æqualis

[1] Prop. 11. lib. 2. [2] Prop. 1. hujus.

[3] Prop. 5. hujus.


his  $BD$ ; erit idem rectangulum ex  $AB$  in  $BC$  æquale quadrato ex  $BD$ . Unde, quum extra circulum  $ACD$  sumptum sit punctum  $B$ , ex quo cadunt ad ejus circumferentiam duæ rectæ lineæ  $BA$ ,  $BD$ , & rectangulum ex  $AB$  in  $BC$  æquale sit quadrato ex  $BD$ ; erit recta ista  $BD$  (1) tangens ejus circuli: adeoque angulus  $BDC$ , tangente, & secante contentus, æqualis erit [2] angulus  $CAD$ , in alterna circuli portione constituto; & consequenter appposito communi  $CDA$ , erit totus angulus  $BDA$ , sive etiam  $DBA$ , æqualis duobus angulis  $CAD$ ,  $CDA$ . Jam verò in triangulo  $ACD$  latus  $AC$  productum est in  $B$ ; atque adeo iisdem duobus angulis  $CAD$ ,  $CDA$  æqualis est etiam angulus exterior  $BCD$  (3). Itaque erit angulus  $DBA$  æqualis angulo  $BCD$ . Et propterea latera  $BD$ ,  $CD$ , quæ subtendunt angulos illos, æqualia erunt [4] inter se. Est verò  $BD$  æqualis  $AC$ . Quare &  $CD$  ipsi  $CA$  æqualis erit. Unde, quum isosceles sit triangulum  $ACD$ , erit angulus  $CDA$  æqualis angulo  $CAD$ . Ostensus est autem angulus  $CDB$  æqualis eidem angulo  $CAD$ . Totus itaque angulus  $BDA$ , sive  $DBA$  duplus erit ipsius  $CAD$ . Et propterea constitutum est triangulum isosceles  $BAD$ , cujus uterque angulorum ad basim duplus est anguli verticalis. Quod erat faciendum.

## PROP.

[1] Prop. 37. lib. 3. (2) Prop. 32. lib. 3.  
 [3] Prop. 32. lib. 1. [4] Prop. 6. lib. 1.

## PROP. XI. PROBL. XI.

*In dato circulo pentagonum æquilaterum,  
& equiangulum describere.*



Datus sit circulus ABCDE. Oportet, in eo describere pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, hoc est figuram, quæ habeat tum quinque latera, ex quibus constet, æqualia, cum angu-

los, quos latera illa mutuo occurſu conſtituunt, æquales.

Conſtituatur triangulum iſoſceles GFH, cujus uterque angulorum ad baſim duplus ſit anguli verticalis (1). Tum in dato circulo ABCDE describatur (2) triangulum CAD æquiangulum ipſi GFH, quod proinde ſimiliter iſoſceles erit, eritque etiam in eo uterque angulorum ad baſim duplus anguli verticalis. Deinde ſecentur anguli ACD, ADC biſariam (3) per rectas CE, DB, junganturque puncta A, B, C, D, E per rectas, AB, BC, CD, DE, EA. Dico, ABCDE eſſe figuram quæſitam.

Quoniam enim uterque angulorum ACD, ADC duplus eſt anguli CAD, iidemque anguli

---

(1) Prop. 10. hujus. [2] Prop. 2. hujus.  
[3] Prop. 9. lib. 1.

guli  $ACD$ ,  $ADC$  secti sunt bifariam per re-  
ctas  $CE$ ,  $DB$ ; erunt quinque anguli  $ADB$ ,  
 $BDC$ ,  $CAD$ ,  $DCE$ ,  $ECA$  æquales inter se.  
Sed in æqualibus circulis, atque adeo eò ma-  
gis in eodem circulo, æquales anguli æquali-  
bus arcibus insistant, sive ad centra, sive ad  
circumferentias sint positi [1]. Quinque igitur  
arcus  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$ , quibus infi-  
stunt ii quinque anguli, æquales erunt inter  
se. Quare æqualia quoque erunt inter se ipsa  
quinque figuræ latera  $AB$ ,  $BC$ ,  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$ ;  
quum in æqualibus circulis, & consequenter  
eò magis in eodem circulo, æquales arcus æ-  
quales quoque rectæ subtendant (2). Est igitur  
figura  $ABCDE$  æquilatera. Sed est etiam  
æquiangula. Quum enim arcus  $BC$  æqualis  
sit arcui  $EA$ , appposito communi  $CDE$ , erit  
arcus  $BCDE$  æqualis quoque arcui  $CDEA$ . In  
æqualibus autem circulis anguli, qui sive ad  
centra, sive ad circumferentias positi, æqua-  
libus arcibus insistant, æquales (3) sunt inter  
se. Erit igitur angulus  $BAE$  æqualis angulo  
 $CBA$ . Eademque ratione & reliqui figuræ  
anguli inter se æquales ostendentur. In dato  
itaque circulo  $ABCDE$  descriptum est penta-  
gonum æquilaterum, & æquiangulum. Quod  
erat faciendum.


## PROP. XII. PROBL. XII.

*Circa datum circulum pentagonum æquilate-  
rum, & æquiangulum describere.*

**D**atus sit circulus  $ABCDE$ . Oportet,  
circa eum pentagonum æquilaterum,  
& æquian-

(1) Prop. 26. lib. 3. (2) Prop. 29. lib. 3.

[3] Prop. 27. lib. 3.



& æquiangulum describere.

Describatur (1) primum in eo pentagonum equilaterum, & æquiangulum; sintque A, B, C, D, E puncta circūferentiæ, quæ illud determinant, ita, ut æquales sint

arcus AB, BC, CD, DE, EA. Tum invento [2] circuli centro F, ducantur radii AF, BF, CF, DF, EF, quibus ex punctis A, B, C, D, E perpendiculares (3) respectivè erigantur GH, HI, IK, KL, LG, quæ conveniant inter se in punctis G, H, I, K, L. Dico GHIKL esse figuram quæsitam.

Jungantur etenim rectæ FG, FH, FI, FK, FL. Et quoniam triangula FAH, FBH sunt rectangula ex constructione, erit [4] quadratum ex FH æquale, tum quadratis, quæ sunt ex AF, & AH, cum quadratis, quæ sunt ex BF, & BH. Quare quadrata ex AF, & AH æqualia erunt quadratis ex BF, & BH. Est autem AF quadratum æquale BF quadrato. His igitur demptis, supererit AH quadratum æquale BH quadrato. Et propterea AH ipsi BH æqualis erit. Unde, quum sint duo latera AF, AH trianguli FAH æqualia duobus lateribus BF, BH trianguli FBH, alterum alteri, & æquales quoque anguli sub  
iis

[1] Prop. 11. hujus. (2) Prop. 1. lib. 3.

[3] Prop. 11. lib. 1. [4] Prop. 74. lib. 1.



his lateribus contenti, utpote recti ex constructione; erit (1) tum angulus  $A\hat{F}H$  æqualis angulo  $B\hat{F}H$ , cum angulus  $A\hat{H}F$  æqualis angulo  $B\hat{H}F$ : adeoque uterque ipsorum  $A\hat{F}B$ ,  $A\hat{H}B$  sectus erit bifariam per rectam  $FH$ . Nec dissimiliter ostendetur, sectum esse bifariam per rectam  $FI$  utrumque angulorum  $B\hat{F}C$ ,  $B\hat{I}C$ .

Et quoniam æquales sunt arcus  $AB$ ,  $BC$ , erunt (2) etiam æquales anguli  $A\hat{F}B$ ,  $B\hat{F}C$ , qui arcibus illis insistant. Ex ostensis autem anguli illi secti sunt bifariam per rectas  $FH$ ,  $FI$ . Erit igitur angulus  $B\hat{F}H$  æqualis angulo  $B\hat{F}I$ . Sed æquales pariter sunt anguli  $F\hat{B}H$ ,  $F\hat{B}I$ , quum uterque ex constructione sit rectus. Duo igitur triangula  $B\hat{F}H$ ,  $B\hat{F}I$  habent duos angulos duobus angulis æquales, alterum alteri. Unde, quum habeant latus  $BF$  commune, habebunt quoque [3] latus  $BH$  æquale lateri  $BI$ , & latus  $FH$  æquale lateri  $FI$ . Est igitur  $HI$  secta bifariam in  $B$ . Similiter autem ostendetur, &  $GH$  sectam esse bifariam in  $A$ . Quare, quum sit  $A\hat{H}$  æqualis  $B\hat{H}$ , erit tota  $GH$  toti  $HI$  pariter æqualis. Quumque eadem ratione ostendantur æqualia inter se reliqua figuræ latera; figura  $GHIKL$  æquilatera erit.

Rursus, quum duæ  $FH$ ,  $FI$  ostensæ sint æquales inter se, triangulum  $HFI$  isosceles erit. Quare angulus  $F\hat{H}I$  æqualis erit (4) angulo  $F\hat{I}H$ . Ostensum est autem, angulos  $A\hat{H}B$ ,  $B\hat{I}C$  sectos esse bifariam per rectas  $FH$ ,  $FI$ , atque adeo duplos esse angulorū  $F\hat{H}I$ ,  $F\hat{I}H$ .  
Itaque


[1] Prop. 4. lib. 1. [2] Prop. 27. lib. 3.

[3] Prop. 26. lib. 1. [4] Prop. 5. lib. 1.

Itaque & ipsi anguli  $AHB$ ,  $BIC$  inter se æquales erunt. Quumque eadem ratione ostendantur æquales inter se reliqui figuræ anguli; erit figura  $GHIKL$  æquiangula. Ostensum autem est, eandem figuram esse etiam æquilateram. Erit igitur figura  $GHIKL$  æquilatera simul, & æquiangula. Et propterea circa datum circulum  $ABCDE$  descriptum est pentagonum æquilaterum, & æquiangulum. Quod erat faciendum.

PROP. XIII. PROBL. XIII.

*In dato pentagono æquilatero, & æquiangulo circulum describere.*



Datum sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum  $ABCDE$ . Oportet, in eo circulum describere.

Secentur (1) anguli  $ABC$ ,  $BCD$  bifariam per rectas  $BF$ ,  $CF$ , quæ inter se conveniant in

$F$ , & super  $BC$  perpendicularis (2) demittatur  $FG$ . Dico, circulum, qui describitur centro  $F$ , intervalloque  $FG$ , esse circulum quæsitum.

Jungantur etenim rectæ  $AF$ ,  $EF$ ,  $DF$ , & super aliis pentagoni lateribus  $CD$ ,  $DE$ ,  $EA$ ,  $AB$  perpendicula respectivè demittantur  $FH$ ,  $FI$ ,  $FK$ ,  $FL$ . Quia igitur ex hypothese pentagonum est æquilaterum, erit  $AB$  æqualis

(1) Prop. 9. lib. 1. [2] Prop. 12. lib. 1.

is BC. Est verò communis BF. Quare duo latera BA, BF trianguli ABF æqualia erunt duobus lateribus BC, BF trianguli CBF, alterum alteri. Sunt autem æquales quoque anguli sub iis lateribus contenti, quum ex constructione angulus ABC sectus sit bifariam per rectam BF. Erit igitur [1] angulus BAF æqualis angulo BCF. Et propterea, quemadmodum angulus BCF semissis est ipsius BCD, ita quoque erit angulus BAF semissis ipsius BAE; quum propter pentagonum æquilaterum simul, & æquiangulum æquales sint anguli BDC, BAE. Ex quo sequitur, angulum BAE etiam sectum esse bifariam per rectam AF.


Simili autem ratiocinio ostendetur, sectos esse quoque bifariam per rectas EF, DF angulos AED, CDE. Unde facile erit ostendere, æqualia esse inter se demissa perpendicularia FG, FH, FI, FK, FL. Si enim considerentur, exempli gratia, triangula duo CGF, CHF, hæc habere comperientur duos angulos duobus angulis æquales, alterum alteri, & latus CF commune. Quare erit etiam (2) FG æqualis FH. Ita igitur quoque ostendetur FH æqualis FI, FI æqualis FK, & FK æqualis FL: proindeque, quum omnes FG, FH, FI, FK, FL inter se sint æquales; circulus, qui describitur centro F, intervalloque FG, transibit non modò per punctum G. verum etiam per puncta H, I, K, L. Contingunt autem circuli hujus circumferentiam latera BC, CD, DE, EA, AB, quum radiis FG, FH, FI, FK, FL ad rectos

[1] Prop. 4. lib. 1. [2] Prop. 26. lib. 1.

rectos angulos insistant. Itaque circulus  $GHIKL$  descriptus erit in dato pentagono æquilatero, & æquiangulo  $ABCDE$ . Quod erat faciendum.

## PROP. XIV. PROBL. XIV.

*Circa datum pentagonum æquilaterum, & æquiangulum circulum describere,*



Datum sit pentagonum æquilaterum, & æquiangulum  $ABCDE$ . Oportet, circa ipsum circulum describere.

Secentur anguli (1)  $ABC$ ,  $BCD$  bifariam per rectas  $BF$ ,  $CF$ , quæ inter se conveniant in

$F$ . Dico, circulum, qui describitur centro  $F$ , intervalloque  $FB$ , esse circulum quaesitum.


Jungantur etenim rectæ  $AF$ ,  $EF$ ,  $DF$ . Et perinde, ac in antecedente, ostendetur quoque sectos esse bifariam per rectas istas angulos  $BAE$ ,  $AED$ ,  $EDC$ . Ex quo sequitur, æquales esse inter se, non modo angulos pentagoni dati, verum etiam eos, in quos ii secti sunt. Unde facile erit ostendere, æquales esse inter se rectas  $AF$ ,  $BF$ ,  $CF$ ,  $DF$ ,  $EF$ : nempe, quia triangula  $AFB$ ,  $BFC$ ,  $CFD$ ,  $DFE$ ,  $EFA$  ob angulos, quos ad bases habent æquales, fiunt [2] isoscelia. Quum autem æquales sint rectæ  $AF$ ,  $BF$ ,  $CF$ ,  $DF$ ,  $EF$ , circulus, qui describitur centro  $F$ , inter-

(1) Prop. 9. lib. 1. (2) Prop. 6. lib. 1.

tervalloque  $FB$ , transibit non modò per punctum  $B$ , verum etiam per puncta  $C, D, E, A$ ; & consequenter descriptus erit circa datum pentagonum æquilaterum, & æquiangulum. Quod erat faciendum.

## PROP. XV. PROBL. XV.

*In dato circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum describere.*




Datus sit circulus  $ABCDEF$ . Oportet, in eo describere hexagonum æquilaterum, & æquiangulum, hoc est figuram, quæ habeat æqualia, tum sex

latera, ex quibus constat, cum sex angulos, quos latera illa mutuo occurſu conſtituunt.

Per centrum circuli  $G$  ducatur diameter  $AD$ . Tum centro  $D$ , intervalloque  $DG$  describatur circulus alius  $GCE$ , priorem secans in punctis  $C$ , &  $E$ . Jungantur porro rectæ  $CG$ ,  $EG$ , quæ producantur usque donec dati circuli circumferentiam secent in  $F$ , &  $B$ . Denique puncta  $A, B, C, D, E, F$  jungantur per rectas totidem  $AB, BC, CD, DE, EF, FA$ . Dico, figuram  $ABCDEF$ , his rectis comprehensam, esse hexagonum quæsitum.

Quum enim  $G$  centrum sit circuli  $ACE$ , rectæ  $GC, GD, GE$ , velut ductæ à centro ad circumferentiam, æquales erunt inter se. Et similiter, quia  $D$  centrum est circuli  $CGE$ , erunt rectæ  $DC, DG, DE$  etiam ductæ a centro ad circumferentiam, atque adeo pariter

æqua-



æquales inter se. Eadem igitur DG æqualis est tam utraque ipsarum GC, GE, quàm utraque ipsarum DC, DE. Quare & omnes DC, CG, GD, GE, DE

inter se æquales erunt. Et propterea utrumque triangulorum CDG, DEG æquilaterum erit.

Jam triangulum æquilaterum est etiam æquiangulum: adeoque, quum omnes anguli cujuscumque trianguli simul [1] duos rectos adæquent, uterque angulorum CGD, DGE duorum rectorum tertia pars erit. Sunt autem duo anguli BGC, CGE simul (2) duobus rectis æquales. Quare duorum rectorum tertia quoque pars erit angulus BGC. Et propterea tres anguli BGC, CGD, DGE æquales erunt inter se, quibus quum sint æquales [3] totidem alii anguli EGF, FGA, AGB, velut ad verticem cum iis constituti; erunt sex anguli AGB, BGC, CGD, DGE, EGF, FGA omnes inter se æquales: & consequenter æquales quoque erunt inter se, tum arcus AB, BC, CD, DE, EF, FA (4), quibus insistent anguli illi; cum rectæ AB, BC, CD, DE, EF, FA, quæ [5] arcus illos subtendunt.

Est igitur figura ABCDEF æquilatera. Sed est etiam æquiangula. Nam quum arcus CD

(1) Prop. 32. lib. 1. (2) Prop. 13. lib. 1.

(3) Prop. 15. lib. 1. [4] Prop. 26. lib. 3.

(5) Prop. 29. lib. 3.

æqualis sit arcui  $AB$ ; appposito communi  $DEFA$ , erit arcus  $CDEFA$  æqualis arcui  $DEFAB$ . Et propterea, quia æqualibus arcibus (1) æquales quoque anguli insistant, sive ad centra, sive ad circumferentias sint positi; erit angulus  $ABC$  æqualis angulo  $BCD$ . Nec dissimiliter ostendetur, æquales esse inter se reliquos figuræ angulos. Itaque in dato circulo descriptum est hexagonum æquilaterum, & æquiangulum  $ABCDEF$ . Quod erat faciendum.

## COROLLARIUM.

*Patet autem, latus prædicti hexagoni  $CD$  æquale esse radio ipsius circuli  $DG$ ; atque adeo in praxi longe facilius describi posse in dato circulo hexagonum æquilaterum, & æquiangulum: nempe, si sumpto radio circuli, is circino ex uno circumferentiæ puncto eousque intra circumferentiam aptetur, donec ad primum illud punctum perveniatur. Sed liquet etiam, circuli circumferentiam magis, quàm ter, diametrum continere. Sex enim latera hexagoni triplum diametri constituunt, quæ tamen simul minora sunt circumferentia circuli.*

## SCHOLIUM.

*Quemadmodum post problema de describendo pentagono æquilatero, & æquiangulo in dato circulo subjunxit Euclides tria alia problemata, unum de eo describendo circa datum*

L. 2

cir-

---

(1) Prop. 27. lib. 3.

*circulum ; alterum de circulo in ipso describendo ; & tertium de circulo circa idem describendo : ita quoque post appositum problema de describendo hexagono æquilatero , & æquiangulo in dato circulo , subnectenda erant tria alia ejusdem generis problemata ; hoc est unum de descriptione ejus circa datum circulum ; alterum de descriptione circuli in data illa figura ; & tertium de descriptione circuli circa eandem datam figuram . At hæc omisit Euclides , non quod de iis non cogitaverit , sed fortè quia novit , ea facili negotio solvi posse eadem omnino ratione , qua eadem soluta sunt , quum de pentagono æquilatero , & æquiangulo questio erat . Unde monitum Lectorem hîc velim , in hac materia problema , quod omnem involuit difficultatem , esse de describenda figura , que æquilatera , & æquiangula sit , in dato circulo . Nam quantum ad problemata de descriptione ejusdem figure circa datum circulum , vel de descriptione circuli in ipsa , vel circa ipsam , hæc nullam habent difficultatem ; quum methodus ea solvendi sit ipsissima illa , qua soluta fuerunt , quum de pentagono agebatur .*

**PROP. XVI. PROBL. XVI.**

*In dato circulo quindecagonum æquilaterum , & æquiangulum describere .*

**D**atus sit circulus ABCDE . Oportet , in eo describere quindecagonum æquilaterum , & æquiangulum , hoc est figuram quindecim laterum æqualium , & totidem angulorum similiter æqualium .

**Res**





Res igitur eo redit, ut datam circumferentiã in quindecim partes æquales dividamus. Quod quidem obtinebimus has ratione. Describatur primò in dato circulo (1) triangulum æ-

quilaterum, sitque AD unum ex ejus lateribus. Quindecim itaque partium, in quas dividenda est tota circuli circumferentia, quinque continebit arcus AD. Describatur deinde in eodem circulo dato (2) pentagonum æquilaterum, & æquiangulum, sitque AB unum ex ejus lateribus. Et earundem quindecim partium tres erunt in arcu AB; atque adeo duæ in arcu reliquo BD. Et propterea, si arcus iste BD (3) secetur bifariam in C, erit BC, aut CD una ex quindecim illis partibus. Unde, si cœteræ omnes capiantur, & in iis subtensæ ducantur, figura subtensis istis contenta erit quindecagonum æquilaterum, & æquiangulum quæstum.

L 3

GEO.

(1) Prop. 2. hujus. (2) Prop. 11. hujus.  
 (3) Prop. 30. lib. 3.

<sup>246</sup>  
G E O M E T R I Æ P L A N Æ  
E L E M E N T O R U M

L I B E R Q U I N T U S .

---

D E F I N I T I O N E S .

I.



*Ars est magnitudo magnitudinis, minor majoris, quando minor majorem metitur; hoc est, quando minor aliquoties sumpta majorem adæquat. Sic numerus 2 est pars numeri 10; quia quinquies sumptus, conficit 10. Et numerus 3 est pars numeri 12; quia quater acceptus adæquat 12.*

Hujuscemodi pars, quæ totum, ad quod refertur, exacte metitur, vocatur speciatim pars aliquota: idque ad differentiam partis aliquantæ, quæ totum suum nequaquam metitur exacte, sed aliquoties sumpta, vel illud excedit, vel ab eo deficit; veluti est numerus 2 respectu alterius 9; vel numerus 3 relate ad alium 12.

Quod si contingat; magnitudinem aliquam minorem duas, aut plures alias majores metiri; tunc magnitudo illa minor vocabitur pars communis aliarum. Sic numerus 2 est pars communis numerorum 6, 8, 10; quia usumquemque istorum exacte metitur.

Sed si fuerint duæ magnitudines minores, quæ æque metiantur duas alia majores; tunc

tunc eæ dicentur partes similes, aut æque partes istarum; veluti sunt numeri 2, & 3 respectu numerorum 8, & 12: nam sicuti 2 quater metitur 8, ita 3 quater etiam metitur 12.

## II.

*Multiplex verò est magnitudo magnitudinis, major minoris, quando majorem metitur minor; hoc est, quando majorem adæquat minor aliquoties sumpta. Sic numerus 10 est multiplex numeri 2; quia si iste quinquies sumatur, prodibit 10. Atque ita quoque numerus 12 est multiplex numeri 3; quia iste quater acceptus conficit 12.*

Hujusmodi totum, quod a parte, ad quam refertur, exacte mensuratur, vocari quoque potest totum aliquorum: idque ad differentiam alterius totius, quod a parte sua nequam mensuratur exacte, quodque proinde totum aliquantum potest appellari; veluti est numerus 9 respectu alterius 1; vel numerus 13 relate ad alium 3.

Quod si contingat, magnitudinem aliquam majorem a duabus, aut pluribus aliis minoribus mensurari; tunc magnitudo illa major vocabitur multiplex communis aliarum. Sic numerus 12 est multiplex communis numerorum 2, 3, 4, 6; quia ab horum unoquoque exacte mensuratur.

Sed si fuerint duæ magnitudines majores, quas æque metiantur duæ aliæ magnitudines minores; tunc illæ dicentur multiplices similes, aut æque multiplices istarum; velut sunt numeri 8, & 12 respectu numerorum 2, & 3: nam sicuti 2 quater metitur 8, sic 3 quater etiam metitur 12.

*Ratio est duarum magnitudinum ejusdem generis mutua quadam secundum quantitatem habitudo. Nempe, si comparentur inter se magnitudines duæ ejusdem generis, & in earum comparatione non ad aliud attendatur, quàm ad ipsarum quantitates; ejuscemodi comparatio rationis vocabulo appellabitur.*

Ex quo colliges, comparationem duarum magnitudinum vocandam esse rationem, quotiescumque habentur hæc duo. Primum, ut magnitudines, quæ comparantur inter se, sint ejusdem generis: quæ quidem quales sint, sequens ostendet definitio. Et deinde, ut in his comparandis non ad aliud, quàm ad proprias ipsarum quantitates attendatur.

Cæterum ex magnitudinibus, inter quas ratio subsistit, ea, quæ confertur, vocatur antecedens; illa verò, cum qua confertur, consequens rationis nuncupatur. Ita si ratio sit inter duas magnitudines, quas voco A, & B, conferaturque A cum B; dicetur A antecedens rationis, & B consequens appellabitur.

## IV.

*Magnitudines dicuntur esse ejusdem generis, quum multiplicatæ [ hoc est aliquoties acceptæ, ] possunt se mutuo superare. Unde non inter alias magnitudines ratio subsistere potest, quàm inter eas, quæ ejusmodi sunt, ut si minor ipsarum aliquoties capiatur, valeat tandem majorem superare.*

Linea igitur est ejusdem generis cum alia linea, & consequenter comparatæ inter se ratione quantitatis, possunt rationem habere: quandoquidem linea minor, si aliquoties  
su-

sumatur, hoc est bis, ter, quater, &c. poterit tandem lineam majorem superare. Et eadem ratione, tam duæ superficies, quam corpora duo dici debent magnitudines ejusdem generis.

Linea autem cum superficie nequaquam est ejusdem generis, nec proinde comparatæ inter se mutuò ratione quantitatis, possunt inter se rationem habere: nam tantum abest, ut linea aliquoties sumpta superficiem excedat, ut neque etiam in superficiem verti possit. Atque ita quoque nec linea, nec superficies est ejusdem generis cum corpore.

## V.

*Proportio autem est duarum rationum æqualitas, seu identitas.* Nempe, si habeantur duæ rationes, quæ sint eadem, seu æquales inter se; æqualitas, seu identitas ista earum rationum proportionis vocabulo appellabitur. Quæ verò rationes dicendæ sint eadem, seu æquales inter se, sequens definitio nobis explicabit.

Ex eo autem, quod proportio sit æqualitas, seu identitas duarum rationum, fit, ut in omni proportione sint duo antecedentes, & duo consequentes. Ita si ratio, quam habet A ad B, æqualis sit rationi, quam habet C ad D; adeo, ut A sit ad B, veluti est C ad D: erunt A, & C duo antecedentes, B autem, & D duo consequentes.

## VI.

*Due rationes dicuntur eadem, seu æquales inter se, quum antecedentium æque multiplicia quævis vel una deficiunt, vel una adæquant, vel una superant æque multiplicia consequentium*

*tium utcumque sumpta*. Sic ratio, quam habet A ad B, dicetur æqualis rationi, quam habet C ad D, si antecedentium A, & C æquemultiplicia quælibet M, & N vel una deficient, vel una adæquent, vel una superent consequentium B, & D æquemultiplicia utcumque sumpta P, & Q.

Sedulo autem notare hoc loco oportet, quod ut duæ rationes juxta hanc definitionem dicantur eadem, seu æquales inter se; haud quidem satis sit, aliqua antecedentium æquemultiplicia, vel una deficere, vel una adæquare, vel una excedere aliqua consequentium æquemultiplicia: sed necesse sit, ut id de omnibus omnino æquemultiplicibus, quæ sumi possunt, tam respectu antecedentium, quàm respectu consequentium, verum sit. Nam si utique vel in uno casu id locum non habuerit, procul est, ut duæ rationes dici possint eadem, seu æquales inter se.

## VII.

*Una ratio dicitur altera major, quum talia reperire licet æquemultiplicia antecedentium, & consequentium, ut multiplex antecedentis prioris rationis excedat multiplex sui consequentis, sed multiplex antecedentis alterius rationis non excedat multiplex sui consequentis*. Ita ratio, quàm habet A ad B, dicetur major ratione, quam habet C ad D, si utique reperiri possint antecedentium A, & C talia æquemultiplicia M, & N, nec non & consequentium B, & D talia æquemultiplicia, P, & Q, ut M superet P, sed N non superet Q.

Atque hic quoque notare sedulo oportet, quod,

quod, ut una ratio juxta hanc definitionem dicatur altera major, haud quidem necesse sit, omnia, tum antecedentium, cum consequentium æquemultiplicia esse talis naturæ, ut multiplex antecedentis prioris rationis excedat multiplex sui consequentis, multiplex verò antecedentis alterius rationis non excedat multiplex sui consequentis; sed satis sit, si id vel in uno tantum casu reperiatur.

## VIII.

*Magnitudines, quæ eandem rationem inter se habent, dicuntur proportionales.* Ita si ratio, quam habet A ad B, æqualis sit rationi, quam habet C ad D; quatuor magnitudines A, B, C, D dicentur proportionales. Quod si autem ratio, quæ est inter A, & B, non sit æqualis rationi, quæ est inter C, & D; tunc quatuor magnitudines A, B, C, D nequaquam dicendæ sunt proportionales.

## IX.

*Proportio autem in tribus paucissimis terminis consistit.* Etsi enim proportio, velut duarum rationum æqualitas, natura sua quatuor terminos exigat, hoc est duos antecedentes, & duos consequentes; attamen, ut ista docet definitio, potest in tribus quoque consistere: scilicet, quum terminus medius fungitur munere consequentis in prima ratione, & munere antecedentis in secunda.

Ita, si ratio, quam habet A ad B, æqualis sit rationi, quam habet B ad C; harum rationum æqualitas consistet in tribus terminis, qui sunt A, B, C. Sed perspicuum est, id exinde contingere, quia terminus medius B tenet locum consequentis in prima ratione, & vic-

ciffim locum antecedentis in secunda.

Hinc autem colliges, proportionem duplicem esse posse, discretam unam, continuam alteram. Erit enim proportio discreta, quæ quatuor habet terminos distinctos; veluti, si ratio, quam habet A ad B, æqualis fuerit rationi, quæ est inter C, & D. Erit verò proportio continua, quæ in tribus tantum terminis subsistit; ut, si ratio, quam habet A ad B, æqualis sit ei, quæ est inter B, & C.

X.

*Homologæ, seu similes ratione magnitudines dicuntur, antecedentes quidem antecedentibus, & consequentes consequentibus. Ita, si quatuor magnitudines A, B, C, D proportionales fuerint, adeo ut A ad B habeat eandem rationem, quam C ad D; dicentur magnitudines homologæ, seu similes ratione, tum antecedentes A, & C, cum consequentes B, & D.*

XI.

*Permutata ratio est sumptio antecedentis cum antecedente, & consequentis cum consequente. Ita, si A ad B habeat eandem rationem, quam C ad D; erit permutando, ut A ad C, ita B ad D.*

XII.

*Inversa ratio est sumptio antecedentis ut consequentis, consequentis verò ut antecedentis. Ita, si A sit ad B, ut est C ad D; erit inver-tendo, ut B ad A, ita D ad C.*

XIII.

*Compositio rationis est sumptio antecedentis cum consequente ad ipsam consequentem. Ita, si A ad B habeat eandem rationem, quam C ad D; erit componendo, ut A & B simul ad B, ita C & D simul ad D.*

XIV.



## XIV.

*Divisio rationis est sumptio excessus, quo antecedens superat consequentem ad ipsam consequentem. Ita, si A sit ad B, ut est C ad D; erit dividendo, ut excessus, quo A superat B, ad B, ita excessus, quo C superat D, ad D.*

## XV.

*Conversio rationis est sumptio antecedentis ad excessum, quo antecedens superat consequentem. Ita, si A ad B habeat eandem rationem, quam C ad D; erit convertendo, ut A ad excessum, quo C superat D.*

## XVI.

*Plures magnitudines dicuntur esse in ordinata ratione cum aliis totidem magnitudinibus, quum illarum rationes directe correspondent rationibus istarum. Ita magnitudines A, B, C, D dicentur esse in ordinata ratione cum magnitudinibus E, F, G, H, si fuerit, ut A ad B, ita E, ad F; ut B ad C, ita F ad G; & ut C ad D, ita G ad H.*

## XVII.

*Vicissim verò plures magnitudines dicuntur esse in perturbata ratione cum aliis totidem magnitudinibus, quum rationes illarum in verse correspondent rationibus istarum. Qua ratione eadem magnitudines A, B, C, D dicentur esse in perturbata ratione cum iisdem magnitudinibus E, F, G, H, si fuerit, ut A ad B, ita G ad H; ut B ad C; ita F ad G; & ut C ad D, ita E ad F.*


## XVIII.

*Quum plures magnitudines sunt in eadem, sive ordinata, sive perturbata ratione cum aliis totidem magnitudinibus, sumptio extremarum per subtractionem mediarum dicitur  
æqua*

*æqualitas rationis*. Ita, si magnitudines A, B, C, D sint in eadem, sive ordinata, sive perturbata ratione cum magnitudinibus E, F, G, H; erit *ex æquali*, sive *ordinando*, sive *perturbando*, ut A ad D, ita E ad H.

PROP. I. THEOR. I.

*Si fuerint quotcumque magnitudines quotcumque magnitudinum, æqualium numero, singula singularum æquemultiplices; quotuplex est una unius, totuplices erunt & omnes omnium.*



multuplex A B ipsius E, vel CD ipsius F.

Quum enim AB, CD sint ex hypothese æquemultiplices ipsarum E, F, quoties E metitur AB, toties F metietur CD. Et propterea quot partes sunt in AB æquales ipsi E, totidem erunt in CD æquales ipsi F. Dividatur itaque AB in partes AG, GB, æquales ipsi E; pariterque CD dividatur in partes CH, HD æquales ipsi F. Et quoniam multitudo partium, quæ sunt in AB æquales ipsi E, est æqualis multitudini partium, quæ sunt in CD æquales ipsi F; erunt etiam in ipsis AB, CD simul tot partes æquales ipsis E, & F simul, quot sunt in AB æquales ipsi E, vel in CD æquales ipsi F. Quare E, & F simul toties metientur AB, & CD simul, quoties E

me-

metitur AB, vel F metitur CD. Et propterea magnitudines AB, CD simul tam multiples erunt magnitudinum E, F simul, quàm est multiplex AB ipsius E, vel CD ipsius F. Quod erat demonstrandum.

## PROP. II. THEOR. II.

*Si prima secundæ fuerit tam multiplex, quàm tertia quartæ; fuerit autem & quinta secundæ tam multiplex, quàm sexta quartæ; erit composita ex prima, & quinta tam multiplex secundæ, quàm composita ex tertia, & sexta multiplex quartæ.*



Sit prima AB tam multiplex secundæ C, quàm est tertia DE multiplex quartæ F. Rursus quinta BG sit etiam tam multiplex secundæ C, quàm est sexta EH multiplex quartæ F. Dico, compositam ex prima, & quinta AG tam multi-


plicem esse secundæ C, quàm est composita ex tertia, & sexta DH multiplex quartæ F.

Quoniam enim ex hypothesi AB, DE sunt æquemultiplices ipsarum C, F; erunt in AB tot partes æquales ipsi C, quot sunt in DE æquales ipsi F. Et similiter, quoniam ex hypothesi earundem C, F sunt etiam æquemultiplices BG, EH; erunt in BG tot partes æquales ipsi C, quot sunt in EH æquales ipsi F. Unde etiam in tota AG erunt tot partes æquales ipsi C, quot sunt in DH æquales ipsi F. Et propterea AG tam multiplex erit ipsius C, quàm est DH multiplex ipsius F. Quod erat demonstrandum.

PROP.

## PROP. III. THEOR. III.

*Si prima secunda tam multiplex fuerit, quam tertia quarta; æquemultiplices primæ, & tertiæ erunt etiam æquemultiplices secundæ & quartæ.*



Prima A secundæ B tam multiplex sit, quam tertia C quartæ D. Sint autem EF, GH æquemultiplices primæ A, & tertiæ C. Dico, easdem EF, GH esse quoque æque-

multiplices secundæ B, & quartæ D.

Quoniam enim EF, GH sunt æquemultiplices ipsarum A, & C; erunt in EF tot partes æquales ipsi A, quot sunt in GH æquales ipsi C. Dividatur itaque tam EF in partes EK, KF æquales ipsi A, quam GH in partes GL, LH æquales ipsi C. Et quoniam KF, LH æquales sunt ipsis A, & C; atque sunt A, & C æquemultiplices ipsarum B, & D; erunt KF, LH earundem B, & D etiam æquemultiplices. Pariterque, quia EK, GL æquales sunt ipsis A, & C, quæ sunt æquemultiplices ipsarum B, & D; erunt EK, GL earundem B, & D similiter æquemultiplices. Et propterea (1) tota EF tam multiplex erit ipsius B, quam est tota GH multiplex ipsius D. Quod demonstrare oportebat.


PROP.

[1] Prop. 2. hujus.

*Si prima ad secundam eandem habuerit rationem, quam tertia ad quartam; æquemultiplices prima, & tertia ad æquemultiplices secunda, & quarta eandem quoque rationem habebunt.*



Prima A ad secundam B habeat eandem rationem, quam tertia C ad quartam D. Sint autem E, & F æquemultiplices primæ A, & tertiæ C; atq; G, & H æquemultiplices secundæ B, & quartæ D. Dico, E ad G habere quoque eandem rationem, quam F ad H.



Sumantur etenim ipsarum E, & F æquemultiplices K, & L; nec non ipsarum G, & H æquemultiplices M, & N. Et quoniam E, & F sunt æquemultiplices magnitudinum A, & C; sumptæ sunt autem K, & L æquemultiplices ipsarum E, & F: erunt K & L æquemultiplices quoque [1] primarum magnitudinum A, & C. Atque ita quoque, quia G, & H sunt æquemultiplices magnitudinum B, & D; sumptæ sunt autem M & N æquemultiplices ipsarum G, & H: erunt M, & N æquemultiplices etiam primarum magnitudinum B, & D. Et

[1] Prop. 3. hujus.

Et quoniam ex hypothefi prima  $A$  est ad secundam  $B$ , ut est tertia  $C$  ad quartam  $D$ ; suntque  $K$ , &  $L$  æquemultiplices primæ, & tertiæ; itemque  $M$ , &  $N$  æquemultiplices secundæ, & quartæ: fiet hinc (1) ut si  $K$  superet  $M$ , etiam  $L$  superet  $N$ ; vel si  $K$  deficiat ab  $M$ , etiam  $L$  deficiat ab  $N$ ; vel denique si  $K$  sit æqualis  $M$ , etiam  $L$  sit æqualis  $N$ . Unde, quum habeantur quatuor magnitudines  $E$ ,  $G$ ,  $F$ ,  $H$ , & ostensum sit  $K$ , &  $L$ , quæ sunt æquemultiplices primæ, & tertiæ, vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare  $M$  &  $N$ , quæ sunt æquemultiplices secundæ, & quartæ: habebit (2)  $E$  ad  $G$  eandem rationem, quam  $F$  ad  $H$ . Quod erat demonstrandum.

### C O R O L L A R I U M.

*Ex hac propositione manifestum est, quod si quatuor magnitudines  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $D$  proportionales sint, eadem invertendo etiam sint proportionales. Nam, quemadmodum  $K$ , &  $L$ , quæ sunt æquemultiplices primæ  $A$ , & tertiæ  $C$ , vel una superant, vel una deficiunt, vel una adæquant  $M$ , &  $N$ , quæ sunt æquemultiplices secundæ  $B$ , & quartæ  $D$ ; sic per contrarium  $M$ , &  $N$  vel una majores, vel una minores, vel una æquales erunt ipsis  $K$ , &  $L$ : proindeque erit, ut  $B$  ad  $A$  ita  $D$  ad  $C$ .*

**PROP.**

[1] Def. 6. hujus. (2) Def. 6. hujus.

## PROP. V. THEOR. V.

*Si tota totius tam multiplex sit, quàm ablata  
ablata; erit reliqua reliquæ tam multiplex; quàm  
tota totius.*



Tota AB tam multiplex sit totius CD, quàm ablata AE est multiplex ablatae CF. Dico, reliquam EB reliquæ FD esse quoque tam multiplicem, quàm tota AB, est multiplex totius CD.

Ponatur enim EB tam multiplex ipsius CG, quàm est AB ipsius CD, vel AE ipsius CF. Et


quoniam AE, EB æquemultiplicis sunt ipsarum CF, CG; erit [1] tota AB totius FG tam multiplex, quàm est AE ipsius CF. Ex hypothesi autem AE est tam multiplex ipsius CF, quàm tota AB totius CD. Quare eadem AB tam erit multiplex ipsius FG, quam est ipsius CD: atque idcirco æquales erunt CD, FG. Unde ablata communi CF, æquales quoque erunt CG, FD. Posita est autem EB tam multiplex ipsius CG, quàm est AB ipsius CD. Erit igitur eadem EB tam multiplex quoque ipsius FD, quàm est AB ipsius CD. Quod demonstrare oportebat.

PROP.

[1] Prop. 1. hujus.

## PROP. VI. THEOR. VI.

*Si duæ magnitudines æquemultiplices fuerint duarum magnitudinum, & ex iis ablata quædam sint earundem æquemultiplices: erunt & reliquæ, vel iisdem æquales, vel earundem æquemultiplices.*



Sint  $AB$ ,  $CD$  æquemultiplices ipsarum  $E$ ,  $F$ , quarum quoque æquemultiplices sint detractæ quædam ex iis  $AG$ ,  $CH$ . Dico, reliquas  $GB$ ,  $HD$ , vel esse æquales ipsis  $E$ ,  $F$ ; vel esse earundem æquemultiplices.

Quoniam enim eisdem  $E$  multiplex est tam tota  $AB$ , quam ablata  $AG$ ; erit reliqua  $GB$ , vel æqualis ipsi  $E$ , vel multiplex eiusdem. Sit itaque primum  $GB$  æqualis  $E$ . Dico, &  $HD$  esse etiam æqualem  $F$ .

Ponatur namque  $CK$  æqualis  $F$ . Et quoniam ex hypothese  $AG$ ,  $CH$  sunt æquemultiplices ipsarum  $E$ ,  $F$ , quibus quoque æquales sunt  $GB$ ,  $CK$ ; erunt  $AB$ ,  $KH$  earundem  $E$ ,  $F$  etiam æquemultiplices. Erit igitur  $AB$  tam multiplex ipsius  $E$ , quam est  $KH$  ipsius  $F$ . Ex hypothese autem  $AB$  tam est multiplex ipsius  $E$ , quam est  $CD$  ipsius  $F$ . Quare eiusdem  $F$  æquemultiplices erunt  $CD$ ,  $KH$ ; ideoque æquales erunt inter se. Unde ablata communi  $CH$ , remanebunt  $HD$ ,  $CK$  etiam inter se æqua-



æquales. Posita est autem CK æqualis F. Quare & HD eidem F pariter æqualis erit.

Sit secundò GB multiplex ipsius E. Dico, & HD esse æquemultiplicem ipsius F.

Ponatur namque CK tam multiplex ipsius F, quàm est GB ipsius E. Et quoniam ipsarum E, F æquemultiplices sunt tam AG, CH, quàm GB, CK; erunt [1] AB, KH earundem E, F etiam æquemultiplices. Unde, quum adhuc oriantur æquales CD, KH, ablata rursus communi CH, remanebit quoque HD æqualis CK, Posita est autem CK tam multiplex ipsius F, quàm est GB ipsius E. Quare & HD ipsius F erit quoque tam multiplex, quàm est GB ipsius E.

Si igitur duæ magnitudines æquemultiplices fuerint duarum magnitudinum, & ex iis ablatae quaedam sint earundem æquemultiplices; erunt & reliquæ, vel iisdem æquales, vel earundem æquemultiplices. Quod erat demonstrandum.

## PROP. VII. THEOR. VII.

*Æquales ad eandem eandem habent rationem: & eadem ad æquales.*

**S**int A, & B duæ æquales magnitudines, sitque tertia quævis C. Dico primò, quod A ad C habeat eandem rationem, quam B ad C.

Sumantur enim ipsarum A, & B æquemultiplices D, & E; ipsius verò C multiplex utcumque capiatur, & sit F. Quia igitur A, & B po-

---

(1) Prop. 2. huius.



B ponuntur æquales inter se; ipsarum æquemultiplices D, & E inter se etiam æquales erunt. Et propterea vel una excedent, vel una deficient, vel una adæquabunt F. Quum ergo habeantur quatuor magnitudines. A prima, C secunda, B tertia, C quarta, & æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una excedant, vel una deficient, vel una adæquent æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebit (1) A ad C eandem rationem, quam B ad C.

Dico secundò, quod C ad A habeat quoque eandem rationem, quam C ad B.

Nam sumptis rursus, tum ipsarum A, & B æquemultiplicibus D, & E, cum ipsius C multiple quovis F; quia propter æquales A, & B, æquales sunt etiam D, & E, perspicuum est, F vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare ipsas D, & E. Unde, quum etiam habeantur quatuor magnitudines, C prima, A secunda, C tertia, B quarta, & æquemultiplices primæ & tertiæ, vel una excedant, vel una deficient, vel una adæquent æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebit (2) C ad A eandem rationem, quam C ad B.


Æquales igitur ad eandem eandem habent rationem: & eadem ad æquales. Quod erat demonstrandum.

PROP.

(1) Def. 6. hujus. [2] Def. 6. hujus.

PROP. VIII. THEOR. VIII.

*Inæqualium magnitudinum major ad eandem majorem habet rationem : & eadem ad minorem .*



Sint AB, & C duæ magnitudines inæquales, AB major, & C minor ; fitque D tertia quævis magnitudo . Dico primò, quòd AB ad D majorem habeat rationem, quàm C ad D.

Quoniã enim AB major est, quàm C,

abscindatur ex AB portio aliqua AE, ita ut reliqua EB sit æqualis ipsi C. Tum ipsarum AE, EB æquemultiplices capiantur FG, GH hac lege, ut FG multiplex ipsius AE major sit, quàm D. Ipsius vero D multiplex sumatur IK, excedens GH magnitudine non majore, quàm D.

Et quoniam FG, GH æquemultiplices sunt ipsarum AE, EB ; erit (1) FH tam multiplex ipsius AB, quàm est GH multiplex ipsius EB, seu C. Et rursus, quoniam IK excedit GH magnitudine non majore, quàm D, atque est FG major, quàm D ; erit FH major, quàm IK. Quum ergo habeantur quatuor magnitudines, AB prima, D secunda, C ter-

(1) Prop. 1. hujus.



C tertia, D quarta;  
& sumptæ sint ta-  
les æquemultiplici-  
ces primæ, & ter-  
tiæ, & tales secun-  
dæ, & quartæ, ut  
multiplex primæ  
superet multipli-  
cem secundæ, at  
multiplex tertiæ  
non superet mul-  
tiplicem quartæ;

habebit (1) AB ad D majorem rationem,  
quàm C ad D.

Dico secundò, quòd D ad C majorem  
habeat rationem, quàm D ad AB.


Fiat etenim eadem constructio, & rursus  
ostendetur, quòd IK multiplex ipsius D exce-  
dat quidem GH multiplicem ipsius C, sed  
non excedat FH multiplicem ipsius AB. Un-  
de, quum habeantur quatuor magnitudines, D  
prima, C secunda, D tertia, AB quarta; &  
sumptæ sint tales æquemultiplices primæ,  
& tertiæ, & tales secundæ, & quartæ, ut  
multiplex primæ superet multiplicem se-  
cundæ, at multiplex tertiæ non superet mul-  
tiplicem quartæ; habebit (2) D ad C májo-  
rem rationem, quàm D ad AB.

Inæqualium igitur magnitudinum major  
ad eandem majorem habet rationem; & ea-  
dem ad minorem. Quod demonstrare oport-  
tebat.

PROP.

[1] Def. 7. hujus. [2] Def. 7. hujus.]

*Quæ ad eandem eandem habent rationem, inter se sunt æquales: & ad quas eadem eandem rationem habet, etiam inter se æquales sunt.*



Habeat primò A ad C eandem rationem, quam B ad C. Dico, A, & B æquales esse inter se.

Si enim inter se non sint æquales, altera ipsarum major erit. Sit igitur A major. Et quoniam inæqualium magnitudinum major ad eandem majorem (1) habet rationem; habebit A ad C majorem rationem, quam B ad C. Sed hoc est contra hypothesim: positum est enim, quod A ad C habeat eandem rationem, quam B ad C. Non igitur A, & B inter se sunt inæquales, sed æquales.

Habeat secundò C ad B eandem rationem, quam C ad B. Dico, A, & B esse etiam æquales inter se.

Si enim inter se non sint æquales, altera ipsarum minor erit. Sit igitur A minor. Et quoniam eadem majorem habet rationem (2) ad minorem, quàm ad majorem; habebit C ad A majorem rationem, quam C ad B. Sed hoc est contra hypothesim: positum est enim, quod C ad A habeat eandem rationem, quàm C ad B. Non igitur A, & B inter se sunt inæquales, sed æquales.

M

Quæ

[1] Prop. 8. hujus.

(2) Prop. 8. hujus.

Quæ igitur ad eandem eandem habent rationem inter se sunt æquales, & ad quas eandem eandem rationem habet, etiam inter se æquales sunt. Quod erat ostendendum.

PROP. X. THEOR. X.

*Ad eandem magnitudinem rationem habentiam, quæ majorem rationem habet, illa major est: ad quam verò eadem majorem habet rationem, illa est minor.*



Habeat primò A ad C majorem rationem, quàm B ad C. Dico, A majorem esse, quàm B.

Si enim non est major, erit vel ei æqualis, vel eadem minor. Sit igitur primò A æqualis B. Et quoniam æquales [1] ad eandem eandem habent rationem; habebit A ad C eandem rationem, quàm B ad C; quod est contra hypothefim. Sit deinde A minor, quàm B. Et quoniam [2] minor ad eandem minorem habet rationem; habebit A ad C minorem rationem, quàm B ad C: quod etiam est contra hypothefim. Quare reliquum est, ut A major sit, quàm B.

Habeat secundò C ad B majorem rationem, quàm C ad A. Dico, B minorem esse, quàm A.

Si enim non est minor, erit vel ei æqualis, vel eadem major. Sit igitur primò B æqualis A. Et quoniam eadem ad æquales (3) eam-

(1) Prop. 7. hujus. (2) Prop. 8. hujus.

(3) Prop. 7. hujus.

eamdem habet rationem; habebit C ad B eamdem rationem, quàm C ad A : quod est contra hypothefim. Sit deinde B major, quàm A. Et quoniam eadem ad majorem (1) minorem habet rationem; habebit C ad B minorem rationem, quàm C ad A : quod etiam est contra hypothefim. Quare reliquum est, ut B minor fit, quàm A.

Ad eamdem itaque magnitudinem rationem habentium, quæ majorem rationem habet, illa major est : ad quàm verò eadem majorem habet rationem, illa est minor. Quod erat demonstrandum.

PROP. XI. THEOR. XI.

*Rationes, quæ eidem sunt æquales, inter se sunt etiam æquales.*



Rationi, quæ est inter B, & E, æqualis sit, tum ea, quæ est inter A, & D, cum illa, quæ est inter C, & F : aded nempe, ut A sit ad D; veluti est B ad E; & B sit ad E, ut est C ad F. Dico, rationem, quæ est inter A, & D esse æqualem rationi, quæ est inter C & F; hoc est A esse ad D, ut est C ad F.

Sumantur etenim æquemultiplices, tum antecedentium A, B, C, quæ sint G, H, I; cum consequentium D, E, F, quæ sint K, L, M. Et quoniam

M 2

A est

(1) Prop. 8. hujus.



A est ad D, ut B ad E; fiet hinc (1), ut G, & H, æquemultiplices ipsarum A, & B, vel una superent, vel una deficient, vel una adæquent K, & L, æquemultiplices ipsarum D, & E. Atque ita quoque, quia B est ad E, ut C ad F; fiet hinc, ut H, & I, æquemultiplices ipsarum B, & C, vel una majores, vel una minores, vel una æquales sint L, & M, æquemultiplicibus ipsarum E, & F. Unde etiam, sublatis mediis H, & L,

erunt G, & I vel una majores, vel una minores, vel una æquales K, & M. Quum ergo habeantur quatuor magnitudines, A prima, D secunda, C tertia, F quarta, & ostensum sit, æquemultiplices primæ, & tertiæ, vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare æquemultiplices secundæ, & quartæ; erit (2) ut A ad D, ita C ad F. Quod erat demonstrandum.

### PROP. XII. THEOR. XII.

*Si fuerint quotcumque magnitudines proportionales; erit, ut una antecedentium ad unam consequentium, ita omnes antecedentes ad omnes consequentes.*

**S**int quotcumque magnitudines proportionales A, D, B, E, C, F: ita nempe, ut  
A sit

(1) Def. 6. hujus. (2) Def. 6. hujus.



A sit ad D, veluti est B ad E, & B sit ad E, ut est C ad F. Dico omnes antecedentes A, B, C ad omnes consequentes D, E, F habere eandem rationem, quàm habet una antecedentium ad unam consequentium, hoc est vel A ad D vel B ad E, vel C ad F.

Capiantur etenim æquemultiplices tam antecedentium A, B, C, quæ sint G, H, I, quàm consequentium D, E, F, quæ sint K, L, M. Et quoniam A est ad D, ut B ad E; æquemultiplices ipsarum A, & B, quæ sunt G, & H, erunt (1) vel una majores, vel una minores, vel una æquales æquemultiplicibus ipsarum D, & E, quæ sunt K, & L. Atque ita quoque, quia B est ad E, ut C ad F; æquemultiplices ipsarum B, & C, quæ sunt H, & I, erunt vel una majores, vel una minores, vel una æquales æquemultiplicibus ipsarum E, & F, quæ sunt L, & M. Unde etiam omnes G, H, I perinde excedent, deficient, vel adæquabunt omnes K, L, M, ac una G excedit, deficit, vel adæquat unam K.

Rursus, quia G, H, I sunt æquemultiplices ipsarum A, B, C; erunt omnes G, H, I tam multiplices omnium A, B, C quàm est [2] una G multiplex unius A. Atque ita quoque, quia K, L, M sunt æquemultiplices ipsarum D, E, F; erunt omnes K, L, M tam multiplices omnium D, E, F, quàm est una K multiplex unius D. Unde quum habeantur quatuor magnitudines, prima, quæ componitur ex A, B, C, secunda, quæ componitur ex D, E, F, tertia A, & quarta D, & ostensum sit æquemultiplices primæ, & ter-

M 3

tix


---

(1) Def. 6. hujus. [2] Prop. 1. hujus.

tia vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebunt omnes A, B, C [1] ad omnes D, E, F eandem rationem, quàm habet una A ad unam D. Quod erat ostendendum.

PROP. XIII. THEOR. XIII.

*Si prima habuerit ad secundam eandem rationem, quam tertia ad quartam: tertia autem ad quartam habuerit rationem majorem, quam quinta ad sextam; & prima ad secundam majorem quoque rationem habebit; quam quinta ad sextam.*



Prima A ad secundam B habeat eandem rationem, quam tertia C ad quartam D. Tertia verò C ad quartam D habeat majorem rationem, quàm quinta E ad sextam F. Dico, & primam A ad secundam B habere quoque rationem majorem, quàm quinta E ad sextam F.

Quoniam enim C ad D habet majorem rationem, quàm E ad F; sumi poterunt (2) tales æquemultiplices ipsarum C, & E, & tales ipsarum D, & F, ut si ea, quæ refertur ad C, excedat illam, quæ refertur ad D, vicissim ea, quæ refertur ad E, non exce-

(1) Def. 6. hujus. [2] Def. 7. hujus.

excedat illam, quæ refertur ad F. Sumantur itaque hujusmodi æquemultiplices; & ipsarum quidem C, & E sint G, & H; ipsarum verò D, & F sint K, & L. Deinde fiat, ut M tam multiplex sit ipsius A, quàm est multiplex G ipsius C. vel H ipsius E; & ut N tam sit multiplex ipsius B, quàm est K ipsius D, vel L ipsius F.

Ex constructione igitur G superat K, sed H non superat L. Jam vero ex hypothesi C est ad D, ut A ad B; atque aded [1] si G superat K, etiam M superat N. Quare M superante N, H non superat L. Quum ergo habeantur quatuor magnitudines A prima, B secunda, E tertia, F quarta; & sumptæ sint tales æquemultiplices primæ, & tertiæ, & tales secundæ, & quartæ, ut multiplex primæ superet multiplicem secundæ, sed multiplex tertiæ non superet multiplicem quartæ; habebit A ad B majorem [2] rationem, quàm E ad F. Quod erat ostendendum.

PROP. XIV. THEOR. XIV.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint; prima, & secunda erunt vel una æquales, vel una majores, vel una minores tertia, & quarta.*

**S**int A, B, C, D quatuor magnitudines proportionales. Dico primò, quòd si A sit æqualis C, etiam B sit æqualis D.

Quum enim A sit æqualis C, habebit (3)

M 4	A ad
-----	------

(1) Def. 6. hujus. (2) Def. 7. hujus.  
 (3) Prop. 7. hujus.



A ad B eandem rationem, quam C ad B. Sed A est ad B, ut C ad D. Quare C ad B habebit (1) eandem rationem, quam C ad D : proindeque B [2] æqualis erit D.

Dico secundo, quòd si A major sit, quàm C, etiam B major sit, quàm D.

Quoniam enim A major est, quàm C ; habebit (3) A ad B majorem rationem, quàm C ad

B. Sed A est ad B, ut C ad D. Quare C ad D majorem quoque [4] habebit rationem, quàm C ad B : proindeque B (5) major erit, quàm D.

Dico denique, quòd si A minor sit, quàm C, etiam B minor sit, quàm D.

Quoniam enim A minor est quàm C ; habebit C ad B [6] majorem rationem, quàm A ad B. Sed A est ad B, ut C ad D. Quare C ad B (7) majorem quoque rationem habebit, quàm C ad D : proindeque B (8) minor erit, quàm D.

Si igitur quatuor magnitudines proportionales fuerint; prima, & secunda erunt vel una æquales, vel una majores, vel una minores tertia, & quarta. Quod erat ostendendum.

PROP.

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (1) Prop. 11. hujus. | (2) Prop. 9. hujus.  |
| (3) Prop. 8. hujus.  | [4] Prop. 12. hujus. |
| [5] Prop. 10. hujus. | (6) Prop. 8. hujus.  |
| [7] Prop. 13. hujus. | [8] Prop. 10. hujus. |

## PROP. XV. THEOR. XV.

*Partes cum suis æquemultiplicibus comparatæ eandem cum iis servant rationem.*



Partium A, B æquemultiplices sint CF, GK. Dico, A esse ad B, ut est CF ad GK.

Quoniam enim CF, GK sunt æquemultiplices ipsarum A, B; quot partes sunt in CF æquales A, tot erunt in GK æquales B. Dividatur ergo tam CF in partes CD, DE, EF æquales A, quàm GK in partes GH, HL, LK æquales B. Et quoniam æquales [1] ad eandem, vel etiam ad æquales

eandem habent rationem; erit ut CD ad GH, ita DE ad HL; & ut DE ad HL, ita EF ad LK. Et propterea omnes CD, DE, EF ad omnes GH, HL, LK habebunt (2) eandem rationem, quàm una CD ad unam GH. Est igitur, ut CF ad GF, ita CD ad GH. Sed CD est æqualis A, & GH æqualis B. Quare erit etiam, ut CF ad GH, ita A ad B. Quod erat demonstrandum.


M 5

PROP.

(1) Prop. 7. hujus. (2) Prop. 12. hujus.

## PROP. XVI. THEOR. XVI.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint; & permutando etiam proportionales erunt.*



Sit A ad B, ut C ad D: Dico, permutando A esse ad C, ut est B ad D.


Sumantur enim ipsarum A, & B æquemultiplices E, & F; ipsarum verò C, & D æquemultiplices G, & H; eritque (1) tum E ad F, ut A ad B; cum G ad H, ut C ad D. Sed ex hypothesis A est ad B, ut C ad D. Quare erit (2) ut E ad F, ita G ad H. Et propterea (3) E, & F erunt vel una æquales, vel una majores, vel una minores ipsis G, & H. Quum ergo habeantur quatuor magnitudines, A prima, C secunda, B tertia, D quarta, & ostensum sit æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebit (4) A ad C eandem rationem, quàm B ad D. Quod erat ostendendum.

PROP.

[1] Prop. 12. hujus. (2) Prop. 15. hujus.  
 (3) Prop. 11. hujus. (4) Def. 6. hujus.

## PROP. XVII. THEOR. XVII.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint ; & dividendo etiam proportionales erunt .*



Habeat AB ad BC eandem rationem , quàm DE ad EF . Dico , dividendo AC esse ad CB , ut est DF ad FE .

Ipsarum AC , CB , DF , FE capiantur eodem ordine æquemultiplices : & sint GH , HI , LM , MN . Ipsarum autem CB , FE aliæ quævis æquemultiplices sumantur , & sint IO , NP .


Quia igitur ipsarum AC , CB æquemultiplices sunt GH , HI ; erit (1) tota GI tam multiplex totius AB , quàm est una GH unius AC . Atque ita quoque , quia ipsarum DF , FE æquemultiplices sunt LM , MN ; erit tota LN tam multiplex totius DE , quàm est una LM unius DF . Est autem ex constructione GH tam multiplex ipsius AC , quàm est LM ipsius DF . Quare & GI tam quoque multiplex erit ipsius AB , quàm est LN ipsius DE .

Rursus quia earundem CB , FE æquemultiplices sunt ex constructione , tam HI , MN , quàm IO , NP ; erit (2) & HO tam multiplex

M 6

tiplex

[1] Prop. 1. hujus. (2) Prop. 2. hujus.



tiplez ipsius  $CB$ , quàm est  $MP$  ipsius  $FE$ . Sunt igitur  $GI$ ,  $LN$  æquemultiplices ipsarum  $AB$ ,  $DE$ , &  $HO$ ,  $MP$  æquemultiplices ipsarum  $CB$ ,  $FE$ . Est autem ex hypothesi, ut  $AB$  ad  $BC$ , ita  $DE$  ad  $EF$ . Quare (1)  $GI$ ,  $LN$  erunt vel una majores, vel una minores, vel una æquales  $HO$ ,  $MP$ ; atque adeo demptis communibus  $HI$ ,  $MN$  erunt etiam reliquæ  $GH$ ,  $LM$  vel una majores, vel una minores, vel una æquales reliquis  $IO$ ,  $NP$ . Sunt autem  $GH$ ,  $LM$  æquemultiplices ipsarum  $AC$ ,  $DF$ ; suntque etiam  $IO$ ,  $NP$  æquemultiplices ipsarum  $CB$ ,  $FE$ . Quum ergo habeantur quatuor magnitudines  $AC$  prima,  $CB$  secunda,  $DF$  tertia,  $FE$  quarta, & ostensum sit æquemultiplices primæ, & tertiæ, vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebit (2)  $AC$  ad  $CB$  eandem rationem, quàm  $DF$  ad  $FE$ . Quod erat ostendendum.

PROP.

(1) Def. 6. hujus. (2) Def. 6. hujus.



PROP. XVIII. THEOR. XVIII.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint ; & componendo etiam proportionales erunt .*



Habeat AB ad BC eandem rationem , quàm DE ad EF . Dico, componendo AC esse ad CB, ut est DF ad FE.

Si enim AC non sit ad CB, ut est DF ad FE ; fit ut AC ad CB, ita DF ad FG . Et quoniam AC est CB, ut DF ad FG ; erit dividendo [1] ut AB ad BC, ita DG ad GF . Ex hypothese autem AB est ad BC, ut DE ad EF . Quare erit (2) ut DG ad GF , ita DE ad EF : quod quidem est absurdum ; quum si quatuor magnitudines proportionales fuerint , prima & secunda debeant (3) esse vel una æquales , vel una majores tertia , & quarta . Non igitur AC est ad CB , ut DF ad FG . Et propterea erit ut AC ad CB , ita DF ad FE . Quod demonstrare oportebat.

PROP. XIX. THEOR. XIX.

*Si fuerit, ut tota ad totam , ita ablata ad ablatam ; erit & reliqua ad reliquam , ut tota ad totam.*

**T**Ota AB ad totam CD habeat eandem rationem , quàm ablata AE ad ablatam CF.

(1) Prop. 14. hujus. [2] Prop. 11. hujus.  
 (3) Prop. 16. hujus.



CF. Dico, & reliquam EB ad reliquam FD habere quoque eandem rationem, quam habet tota AB ad totam CD.

Quoniam enim ex hypothese AB est ad CD, ut AE ad CF; erit [1] permutando, ut AB ad AE, ita CD ad CF; atque adeo dividendo (2), ut EB ad AE, ita FD ad CF. Unde, quum rursus permutando sit ut EB ad FD, ita AE ad CF; atque ex hypothese AE sit ad CF, ut est AB ad CD; erit tandem [3], ut EB ad FD, ita AB ad CD. Quod erat demonstrandum.

### COROLLARIUM.

*Atque hinc facile colligi potest, quod si quatuor magnitudines proportionales fuerint, eadem convertendo etiam proportionales sint. Sit enim, ut AB ad AE, ita CD ad CF. Dico, convertendo esse, ut AB ad EB, ita CD ad FD. Quum enim AB sit ad AE, ut CD ad CF; erit permutando, ut AB ad CD, ita AE ad CF; atque adeo per hanc propositionem erit, ut EB ad FD, ita AB ad CD; sive etiam, ut AB ad CD, ita EB ad FD. Unde rursus permutando erit, ut AB ad EB, ita CD ad FD.*

### PROP. XX. THEOR. XX.

*Si tres magnitudines fuerint in ordinata ratione cum aliis totidem; primae ipsarum erunt*

---

(1) Prop. 16. hujus. (2) Prop. 17. hujus.  
[3] Prop. 11. hujus.

erunt vel una æquales, vel una majores, vel una minores ultimis earumdem.



Sint tres magnitudines A, B, C in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus D, E, F: ita nempe, ut A sit ad B, veluti est D ad E; & B sit ad C, ut est E ad F. Dico primò, quod si A sit æqualis C, etiam D sit æqualis F.

Quoniam enim A est æqualis C; habebit [1] A ad B eandem rationem, quàm C ad B. Sed A est ad B, ut est D ad E; & ex eo, quòd B sit ad C, ut E ad F, est invertendo, ut C ad B, ita F ad E. Quare erit (2) ut D ad E, ita F ad E: proindeque [3] D æqualis erit F.

Dico secundò, quòd si A major sit, quàm C, etiam D sit major, quàm F.

Quoniam enim A est major, quàm C; habebit [4] A ad B majorem rationem, quàm C ad B. Sed A est ad B, ut D ad E; & ex eo, quòd B sit ad C, ut E ad F; est invertendo, ut C ad B, ita F ad E. Quare D ad E (5) majorem quoque habebit rationem, quàm F ad E: proindeque [6] D major erit, quàm F.

Dico denique, quòd si A minor sit, quàm C, etiam D sit minor, quàm F.

Quoniam enim A minor est, quàm C; ha-  
be-

(1) Prop. 7. hujus. (2) Prop. 11. hujus.

(3) Prop. 9. hujus. [4] Prop. 8. hujus.

[5] Prop. 13. hujus. (6) Prop. 10. hujus.



bebit (1) C ad B majorem rationem, quàm A ad B. Sed A est ad B, ut D ad E; & ex eo, quòd B sit ad C, ut E ad F, est invertendo, ut C ad B, ita F ad E. Quare F ad E majorem [2] quoque rationem habebit, quàm D ad E. Et propterea (3) D minor erit, quàm F.

Si igitur tres magnitudines fuerint in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus; primæ ipsarum erunt, vel una æquales, vel una majores, vel una minores ultimis earundem. Quod erat ostendendum.

### PROP. XXI. THEOR. XXI.

*Si tres magnitudines fuerint in perturbata ratione cum aliis tribus magnitudinibus; primæ ipsarum quoque erunt, vel una æquales, vel una majores, vel una minores ultimis earundem.*

**S**int tres magnitudines A, B, C in perturbata ratione cum aliis tribus magnitudinibus D, E, F: ita nempe, ut A sit ad B, veluti est E ad F; & B sit ad C, ut est D ad E. Dico primò, quòd si A sit æqualis C, etiam D sit æqualis F.

Quoniam enim A est æqualis C; erit (4) ut

(1) Prop. 8. hujus. (2) Prop. 13. hujus.  
 (3) Prop. 10. hujus. [4] Prop. 7. hujus.

ut A ad B, ita C ad B. Sed A est ad B, ut E ad F; & ex eo, quod B sit ad C, ut D ad E, est invertendo, ut C ad B, ita E ad D. Quare erit (1), ut E ad F, ita E ad D: proindeque (2) D æqualis erit F.

Dico secundò, quod si A sit major, quàm C, etiam D major sit, quàm F.

Quoniam enim A major est, quàm C; habebit (3) A ad B majorem rationem, quàm C ad B. Sed A est ad B, ut E ad F; & ex eo, quod B sit ad C, ut D ad E, est invertendo, ut C ad B, ita E ad D. Quare E ad F majorem (4) quoque rationem habebit, quàm E ad D: proindeque (5) D major erit, quàm F.

Dico denique, quod si A sit minor, quàm C, etiam D minor sit, quàm F.

Quoniam enim A minor est, quàm C; habebit (6) C ad B majorem rationem, quàm A ad B. Sed A est ad B, ut E ad F; & ex eo, quod B sit ad C, ut D ad E, est invertendo, ut C ad B, ita E ad D. Quare E ad D habebit quoque (7) majorem rationem, quàm E ad F. Et propterea (8) D minor erit, quàm F.

Si igitur tres magnitudines fuerint in perturbata ratione cum aliis tribus magnitudinibus; primæ ipsarum erunt, vel una æquales, vel una majores, vel una minores ultimis eorundem. Quod erat demonstrandum.

## PROP.

- 
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (1) Prop. 11. hujus. | (2) Prop. 9. hujus.  |
| (3) Prop. 8. hujus.  | (4) Prop. 13. hujus. |
| (5) Prop. 10. hujus. | (6) Prop. 8. hujus.  |
| (7) Prop. 13. hujus. | (8) Prop. 10. hujus. |

## PROP. XXII. THEOR. XXII.

*Si tres magnitudines fuerint in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus; prima ipsarum ad ultimas ex aequali in eadem ratione erunt.*



Sint tres magnitudines A, B, C in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus D, E, F: ita nempe, ut A sit ad B, veluti est D ad E; & B sit ad C, ut E ad F. Dico, ex æquali A esse ad C, ut est D ad F.

Capiantur enim ipsarum quidem A, & D æquemultiplices G, & L; ipsarum verò B, & E æquemultiplices H, & M; ac denique ipsarum C, & F æquemultiplices K, & N. Quia ergo A est ad B, ut D ad E; erit etiam (1) ut G ad H, ita L ad M. Pariterque, quia B est ad C, ut E ad F; erit quoque ut H ad K, ita M ad N. Unde tres magnitudines G, H, K erunt etiam in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus L, M, N. Et propterea G, & L erunt (2) vel una æquales, vel una majores, vel una minores K, & N. Quum itaque habeantur quatuor magnitudines, A prima, C secunda, D tertia, F quarta, & ostensum sit, æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una

(1) Prop. 4. hujus. [2] Prop. 20. hujus.

una excedere, vel una deficere, vel una adæquare æquemultiplices secundæ, & quartæ; habebit (1) A ad C eandem rationem, quàm D ad F. Quod erat demonstrandum.

## COROLLARIUM.

*Quod si magnitudines, quæ sunt in ordinatâ ratione cum a iis totidem, plures fuerint, quàm tres; adhuc primæ ipsarum ad ultimas ex æquali in eadem ratione erunt. Ponatur enim, quod non modo A sit ad B, ut D ad E; & B ad C, ut E ad F; verum etiam, quod C sit ad aliam quæ vocetur N, ut F ad aliam quæ vocetur O. Dico, ex æquali A esse ad N, ut est D ad O. Nam in tribus magnitudinibus ostensum jam est, A esse ad C, ut est D ad F. Quum ergo C sit ad N, ut est F ad O; erunt tres magnitudines A, C, N in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus D, F, O. Et propterea per hanc propositionem A erit ad N, ut est D ad O.*

## PROP. XXIII. THEOR. XXIII.

*Si tres magnitudines fuerint in perturbatâ ratione cum aliis totidem magnitudinibus; primæ ipsarum ad ultimas ex æquali in eadem ratione erunt.*

**S**int tres magnitudines A, B, C in perturbata ratione cum aliis tribus magnitudinibus D, E, F: ita nempe, ut A sit ad B, veluti est E ad F; & B sit ad C, ut D ad E. Dico, ex æquali A esse ad C, ut est D ad F.

Su-

---

[1) Def. 6. hujus.



Sumantur etenim, ipsarum quidem A, B, D æquemultiplices G, H, L; ipsarum verò C, E, F æquemultiplices K, M, N. Et quoniam G, & H sunt æquemultiplices ipsarum A, & B; erit, ut G ad H (1), ita A ad B. Pariterque, quia M, & N sunt æquemultiplices ipsarum E, & F; erit, ut M ad N, ita E ad F. Est autem

ex hypothesis, ut A ad B, ita E ad F. Quare erit (2) quoque, ut G ad H, ita M ad N.

Rursus, quia ex hypothesis B est ad C, ut D ad E, & ipsarum quidem B, & D æquemultiplices sunt H, & L, ipsarum verò C, & E æquemultiplices sunt K, & M; erit quoque (3) ut G ad K, ita L ad M. Ostensum est autem, G esse ad H, ut est M ad N. Tres ergo magnitudines G, H, K sunt etiam in perturbata ratione cum aliis tribus magnitudinibus L, M, N; & idcirco G, & K erunt (4) vel una æquales, vel una majores, vel una minores L, & N.

Quum ergo habeantur quatuor magnitudines, A prima, C secunda, D tertia, F quarta, atque primæ, & tertiæ æquemultiplices G, & K vel una excedant, vel una deficient, vel una adæquent æquemultiplices

[1] Prop. 15. hujus. (2) Prop. 11. hujus.

[3] Prop. 4. hujus.

(4) Prop. 21. hujus.



ces secundæ, & quartæ L, & N; habebit [1]  
 A ad C eandem rationem, quàm D ad F.  
 Quod erat ostendendum.

## COROLLARIUM.

Quod si magnitudines, quæ sunt in perturbata ratione cum aliis totidem, plures fuerint, quàm tres; adhuc primæ ipsarum ad ultimas ex æquali in eadem ratione erunt. Sint enim quatuor magnitudines A, B, C, N in perturbata ratione cum quatuor magnitudinibus D, E, F, O; ita nempe, ut A sit ad B, veluti est F ad O; B ad C, ut E ad F; & C ad N, ut D ad E. Dico, ex æquali esse, ut A ad N, ita D ad O. Nam in tribus magnitudinibus ostensum jam est, A esse ad C, ut est E ad O. Quum ergo C sit ad N, ut est D ad E; erunt tres magnitudines A, C, N in perturbata ratione cum tribus magnitudinibus D, E, O. Et propterea per hanc propositionem A erit ad N, ut est D ad O.

## PROP. XXIV. THEOR. XXIV.

Si prima ad secundam habuerit eandem rationem, quam tertia ad quartam: fuerit autem, ut quinta ad secundam, ita sexta ad quartam; erit composita ex prima, & quinta ad secundam, ut composita ex tertia, & sexta ad quartam.

**P**Rima A B ad secundam C habeat eandem rationem, quàm tertia D E ad quartam F.  
 Quin-

---

(1) Def. 6. hujus.



Quinta autem BG ad secundam C habeat quoque eandem rationem, quàm sexta EH ad quartam F. Dico, compositam ex prima, & quinta AG esse ad secundam C, ut est composita ex tertia, & sexta DH ad quartam F.

Quoniam enim BG est ad C, ut EH ad F; erit invertendo, ut C ad BG, ita F ad EH. Unde, quum sit ut AB ad C, ita DE ad F; erunt tres magnitudines AB, C, BG in ordinata ratione cum tribus magnitudinibus DE, F, EH: proindeque ex æquali ordinando [1] erit, ut AB ad BG, ita DE ad EH; atque aded, componendo (2), ut AG ad BG, ita DH ad FH. Est autem, ut BG ad C, ita EH ad F. Tres itaque magnitudines AG, BG, C erunt etiam in ordinata ratione cum aliis tribus magnitudinibus DH, EH, F. Unde rursus ex equali ordinando erit, ut AG ad C, ita DH ad F. Quod erat demonstrandum.

PROP. XXV. THEOR. XXV.

*Si quatuor magnitudines proportionales fuerint; maxima, & minima simul reliquis duabus majores erunt.*

**H**abeat AB ad CD eandem rationem, quàm E ad F; sitque AB omnium maxima,

[1] Prop. 22. hujus. (2) Prop. 18. hujus.



xima, & F omnium minima. Dico, duas AB, & F simul sumptas majores esse reliquis duabus CD, & E simul etiam acceptis.

Auferantur ex AB quidem portio AG æqualis E, ex CD verd portio CH æqualis F. Et quoniam ex hypothese AB est ad CD ut E ad F, atque est AG æqualis E, & CH æqualis F; erit etiam, ut AB ad CD, ita AG ad CH. Unde, quum sit, ut tota AB ad totam CD, ita ablata AG ad ablatam CH; erit quoque (1) ut tota AB ad totam CD, ita reliqua GB ad reliquam HD. Et propterea, quemadmodum AB, velut omnium maxima, major est, quàm CD, ita [2] erit GB major, quàm HD. Sunt autem ex constructione æquales inter se, tum AG, & E, cum F, & CH. Quare, si istæ iis addantur, fient AB, & F majores, quàm CD, & E: ac proinde, si quatuor magnitudines proportionales fuerint; maxima, & minima reliquis duabus majores erunt. Quod erat demonstrandum.

### M O N I T U M.

*Quæ sequuntur Propositiones Euclidis non sunt, sed a Campano, & aliis adjectæ, quæ apud*

---

(1) Prop. 19. hujus. (2) Prop. 14. hujus.


*apud gravissimos Auctores frequens est usus ipsarum, nec minus, quàm præcedentes, quasi Euclidis essent, citari solent.*

**PROP. XXVI. THEOR. XXVI.**

*Si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quam tertia ad quartam; habebit invertendo secunda ad primam minorem vicissim rationem, quam quarta ad tertiam.*



Habeat A ad B majorem rationem, quàm C ad D. Dico, invertendo B ad A habere vicissim minorem rationem, quàm D ad C.



Intelligatur etenim E esse ad B, ut est C ad D. Et quoniam ex hypothesis A ad B habet majorem rationem, quàm C ad D; habebit (1) etiam A ad B majorem rationem, quàm E ad B: proindeque A major (2) erit, quàm E. Quùm igitur A major sit, quàm E, habebit [3] B ad E majorem rationem, quam B ad A. Sed invertendo B est ad E [4] ut D ad C. Quare D ad C (5) majorem quoque rationem habebit, quàm B ad A. Et propterea, si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quàm tertia ad quartam; habebit invertendo secunda ad primam minorem vicissim rationem, quàm quarta ad tertiam. Quod erat demonstrandum.

**SCHO.**

- (1) Prop. 1. hujus. [2] Prop. 10. hujus.  
 (3) Prop. 8. hujus. [4] Coroll. 4. hujus.  
 (5) Prop. 15. hujus.

*Simili autem ratione ostendetur, quòd si prima ad secundam habuerit minorem rationem, quam tertia ad quartam; invertendo secunda ad primam habeat vicissim majorem rationem, quam quarta ad tertiam.*

PROP. XXVII. THEOR. XXVII.

*Si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quam tertia ad quartam; habebit permutando prima ad tertiam majorem quoque rationem, quam secunda ad quartam.*

A B E

Habeat A ad B majorem rationem, quàm C ad D. Dico, permutando A ad C habere quoque majorem rationem, quàm B ad D.

C D

Intelligatur etenim E esse ad B, ut est C ad D. Et quoniam ex hypothesi A ad B majorem rationem habet, quàm C ad D; habebit etiam (1) A ad B majorem rationem, quàm E ad B: proindeque A major (2) erit, quàm E. Quum igitur A major sit, quàm E; habebit [3] A ad C majorem rationem, quam E ad C. Est autem permutando [4] ut E ad C, ita B ad D. Quare A ad C (5) majorem quoque rationem habebit, quàm B ad D. Et propterea, si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quàm tertia ad quartam; habebit permutando prima ad tertiam majorem quoque rationem, quàm se-

N cun-

(1) Prop. 1. hujus. [2] Prop. 10. hujus.

(2) Prop. 8. hujus. [4] Prop. 16. hujus.

(3) Prop. 13. hujus.


cunda ad quartam . Quod erat demonstrandum ,

### S C H O L I U M .

*Simili autem ratione ostendetur, quòd si prima ad secundam habuerit minorem rationem, quam tertia ad quartam; permutando prima ad tertiam minorem quoque rationem habeat, quam secunda ad quartam.*

### PROP. XXVIII. THEOR. XXVIII.

*Si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quam tertia ad quartam; habebit componendo prima cum secunda ad secundam majorem quoque rationem, quam tertia cum quarta ad quartam,*



Habeat AB ad BC majorem rationem, quàm DE ad EF. Dico, componendo AC ad BC habere quoque majorem rationem, quàm DE ad EF.

Intelligatur etenim, GB esse ad BC, ut DE ad EF. Et quoniam ex hypothese AB ad BC majorem rationem habet, quàm DE ad EF; habebit [1] etiam AB ad BC majorem rationem, quam GB ad BC: proindeque AB major [2] erit quàm GB; additaque communi BC, erit etiam AC major quàm GC. Quum igitur AC major sit, quàm GC; habebit [3] AC ad BC majorem rationem, quàm

---

[1] Prop. 13. hujus. [2] Prop. 10. hujus.  
[3] Prop. 8. hujus.

quàm GC ad BC. Sed componendo GC est ad BC, ut (1) DF ad EF. Quare AC, ad BC (2) majorem quoque rationem habebit, quàm DF ad FE. Et propterea, si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quàm tertia ad quartam; habebit componendo prima cum secunda ad secundam majorem quoque rationem, quàm tertia cum quarta ad quartam. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Simili autem ratione ostendetur, quòd si prima ad secundam habuerit minorem rationem, quam tertia ad quartam: componendo prima cum secunda ad secundam minorem quoque rationem habeat, quam tertia cum quarta ad quartam.*

## PROP. XXIX. THEOR. XXIX.

*Si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quam tertia ad quartam; habebit dividendo excessus, quo prima superat secundam ad secundam majorem quoque rationem, quam excessus, quo tertia superat quartam ad quartam.*

**H**abeat AC ad BC majorem rationem, quàm DF ad EF. Dico, dividendo AB ad BC habere quoque majorem rationem quàm DE ad EF.

Intelligatur etenim GC esse ad BC, ut est DF ad EF. Et quoniam ex hypothesi AC

N 2 est

---

(1) Prop. 18. hujus. (2) Prop. 13. hujus.

est ad BC in maiore ratione, quàm DF ad EF; habebit etiam (1) AC ad BC maiorem rationem, quàm GC ad BC: proindeque AC (2) major erit, quàm GC; & ideò ablata communi BC, erit etiam AB major, quàm CB. Quum igitur AB major sit, quàm GB; habebit AB ad BC (3) maiorem rationem, quam GB ad BC. Est autem dividendo (4), ut GB ad BC., ita DE ad EF; quare AB ad BC [5] maiorem quoque rationem habebit, quàm DE ad EF. Et propterea, si prima ad secundam habuerit maiorem rationem, quàm tertia ad quartam; habebit dividendo excessus, quo prima superat secundam ad secundam maiorem quoque rationem, quàm excessus, quo tertia superat quartam ad quartam. Quod demonstrare oportebat.

### S C H O L I U M,

*Simili autem ratione ostendetur, quòd si prima ad secundam habuerit minorem rationem, quam tertia ad quartam; dividendo excessus, quo prima superat secundam ad secundam minorem quoque habeat rationem, quam excessus, quo tertia superat quartam ad quartam.*

### PROP. XXX. THEOR. XXX.


*Si prima ad secundam habuerit maiorem rationem, quàm tertia ad quartam; habebit*

con-

- 
- (1) Prop. 13. hujus    (2) Prop. 10. hujus.  
 (3) Prop. 8. hujus.    (4) Prop. 17. hujus.  
 (5) Prop. 23. hujus.



convertendo prima ad excessum, quo prima superat secundam, minorem vicissim rationem, quam tertia ad excessum, quo tertia superat quartam.



Habet AC ad BC majorem rationem; quam DF ad EF. Dico, con-

vertendo AC ad AB habere vicissim minorem rationem, quam DF ad DE.

Quoniam enim ex hypothese AC ad BC habet majorem rationem, quam DF ad EF; habebit (1) dividendo AB ad BC majorem quoque rationem, quam DE ad EF. Unde, quum invertendo (2) BC ad AB habeat vicissim minorem rationem, quam EF ad DE; habebit componendo [3] AC ad AB minorem quoque rationem, quam DF ad DE: proindeque, si prima ad secundam habuerit majorem rationem, quam tertia ad quartam; habebit convertendo prima ad excessum, quo prima superat secundam minorem vicissim rationem, quam tertia ad excessum, quo tertia superat quartam. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M.

*Simili autem ratione ostendetur, quod si prima ad secundam habuerit minorem rationem: quam tertia ad quartam; convertendo prima ad excessum, quo prima superat secundam, habeat vicissim majorem rationem quam*

N 3

ter-

[1] Prop. 29. hujus. [2] Prop. 26. hujus.

[3] Prop. 28. hujus.

*tertia ad excessum, quo tertia superat quartam.*

PROP. XXXI. THEOR. XXXI.

*Si tres magnitudines habuerint cum aliis tribus rationem ordinatam majorem; habebit ex æquali ordinando prima priorum ad ultimam majorem quoque rationem, quam prima posteriorum ad ultimam.*



Tres magnitudines A, B, C cum aliis tribus D, E, F ferrent rationem ordinatam majorem: ita nempe, ut A ad B habeat majorem rationem, quàm D ad E; & B ad C majorem, quàm E ad F. Dico, ex æquali ordinando A ad C habere quoque majorem rationem, quam D ad F.

Intelligatur etenim G esse ad C, ut est E ad F. Et quoniam ex hypothesis B ad C majorem rationem habet, quàm E ad F; habebit quoque (1) B ad C majorem rationem, quàm G ad C; proindeque (2) B major erit, quàm G. Quum igitur B major sit, quàm G; habebit (3) A ad G majorem rationem, quàm ad B: ex hypothesis autem A ad B majorem rationem habet, quam D ad E. Quare A ad G multò majorem rationem habebit, quàm D ad E.

In-

---

(1) Prop. 13. hujus. (2) Prop. 10. hujus.  
(3) Prop. 8. hujus.

Intelligatur rursus H esse ad G, ut est D ad E. Et quoniam ex ostensis A ad G majorem rationem habet, quàm D ad E; habebit A ad G majorem quoque rationem, quàm H ad G: proindeque A major erit, quàm H; eritque propterea A ad C in majore ratione, quàm H ad C. Jam verò ex æquali ordinando H ad C habet eandem rationem, quàm D ad F [1]. Quare A ad C majorem quoque rationem (2) habebit, quàm D ad F. Et propterea, si tres magnitudines servant cum aliis tribus rationem ordinatam majorem; habebit ex æquali ordinando prima priorum ad ultimam majorem quoque rationem, quàm prima posteriorum ad ultimam. Quod erat ostendendum.

## S C H O L I U M I.

*Quod si magnitudines servant rationem ordinatam majorem cum aliis totidem plures fuerint, quàm tres; ostendetur, primam priorum ad ultimam habere quoque majorem rationem, quam prima posteriorum ad ultimam, idque eadem methodo, qua usi sumus in Scholio propositionis vigesima secunda.*

## S C H O L I U M II.

*Simili autem ratione ostendemus, quod si plures magnitudines cum aliis totidem fuerint in ratione ordinata minore, ex æquali ordinando prima priorum ad ultimam minorem quoque rationem habeat, quam prima posteriorum ad ultimam.*

N 4

PROP.

[1] Prop. 22. hujus. (2) Prop. 13. hujus.

## PROP. XXXII. THEOR. XXXII.

*Si tres magnitudines servant cum aliis tribus rationem perturbatam majorem; habebit ex æquali perturbando prima priorum ad ultimam majorem quoque rationem, quam prima posteriorum ad ultimam.*



Tres magnitudines A, B, C servant cum aliis tribus D, E, F rationem perturbatam majorem: ita nempe, ut A ad B habeat majorem rationem, quàm E ad F: & B ad C majorem, quàm D ad E. Dico; ex æquali perturbando A ad C habere quoque majorem rationem, quàm D ad F.

Intelligatur enim G esse ad C, ut est D ad E. Et quoniam ex hypothese B ad C majorem rationem habet, quàm D ad E; habebit quoque (1) B ad C majorem rationem, quàm G ad C; proindeque (2) B major erit, quàm G. Quum igitur B major sit, quàm G; habebit [3] A ad G majorem rationem, quàm A ad B. Ex hypothese autem A habet ad B majorem rationem, quàm E ad F. Quare A ad G multò majorem rationem habebit, quàm E ad F.

Intelligatur rursus H esse ad G, ut est E ad F. Et quoniam ex ostensis A ad G habet majorem rationem, quàm E ad F; habebit  
A ad

(1) Prop. 13. hujus. [2] Prop. 10. hujus.

(3) Prop. 8. hujus.

A ad G majorem quoque rationem, quàm H ad G: proindeque A major erit, quàm H; eritque propterea A ad C in majore ratione, quàm H ad C. Jam verò ex æquali perturbando (1) H est ad C, ut D ad F. Quare A ad C (2) majorem quoque rationem habebit, quàm D ad F: proindeque, si tres magnitudines cum aliis tribus fuerint in ratione perturbata majore; ex æquali perturbando prima priorum ad ultimam majorem quoque rationem habebit, quàm prima posteriorum ad ultimam. Quod erat ostendendum.

## SCHOLIUM I.

*Quod si magnitudines servantes rationem perturbatam majorem cum aliis totidem fuerint plures, quàm tres; ostendemus primam priorum ad ultimam majorem quoque rationem habere, quam prima posteriorum ad ultimam, idque eadem omnino methodo, qua usi sumus in Scholio propositionis vigesima tertiæ.*

## SCHOLIUM II.

*Simili autem ratione ostendemus, quod si plures magnitudines cum aliis totidem fuerint in ratione perturbata minore, ex æquali perturbando prima priorum ad ultimam minorem quoque habeat rationem, quam prima posteriorum ad ultimam.*

N 5

PROP.

---

[1] Prop. 23. hujus. (2) Prop. 15. hujus.

## PROP. XXXIII. THEOR. XXXIII.

*Si tota ad totam habeat majorem rationem, quam ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam majorem quoque rationem habebit, quam tota ad totam.*



Habeat tota AB ad totam CD majorem rationem, quam ablata AE ad ablatam CF. Dico, reliquam EB ad reliquam FD majorem quoque rationem habere, quam tota AB ad totam CD.

Quoniam enim ex hypothese AB ad CD habet majorem rationem, quam AE ad CF; habebit permutando AB ad AE majorem quoque rationem [1], quam CD ad CF. Jam verò convertendo (2) AB ad EB minorem rationem habet, quam CD ad FD. Quare rursus permutando AB ad CD habebit minorem quoque rationem, quam EB ad FD. Et propterea ratio, quam habet EB ad FD, major erit ratione, quam habet AB ad CD. Si igitur tota ad totam habuerit majorem rationem, quam ablata ad ablatam; & reliqua ad reliquam majorem quoque rationem habebit, quam tota ad totam. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Ex ipso autem demonstrandi modo patet, quod si tota ad totam habuerit minorem ratio-*

(1) Prop. 27. hujus. (2) Prop. 30. hujus.

tionem, quam ablata ad ablatam; reliqua ad reliquam minorem quoque rationem habeat, quam tota ad totam.

PROP. XXXIV. THEOR. XXXIV.

*Si quotcumque magnitudines comparatae cum aliis totidem constituent rationes, quarum antecedens subsequente semper major sit; habebunt omnes priores ad omnes posteriores maiorem quidem rationem, quam ultima priorum ad ultimam posteriorum; minorem vero, quam prima priorum ad primam posteriorum.*



Sint magnitudines A, B, C, & aliæ iis numero æquales D, E, F; habeatque A ad D maiorem, rationem quàm B ad E; itemque B ad E maiorem, quàm C ad F. Dico primo, quod omnes A, B, C ad omnes D, E, F habeant maiorem rationem, quàm C ad F.

Quoniam enim ex hypothese A ad D maiorem habet rationem, quàm B ad E; habebit permutando (1) A ad B maiorem quoque rationem, quàm D ad E; & consequenter componendo [2] A, & B simul ad B maiorem adhuc rationem habebunt, quàm D, & E simul ad E. Et quoniam ex hypothese B ad E maiorem habet rationem, quàm C ad F; habebit permutando B ad C maiorem quoque rationem, quàm E ad F. Unde ex

N 6

æqua-

[1] Prop. 27. huius. (2) Prop. 28. huius.



æquali ordinando (1) A, & B simul ad C habebunt majorem adhuc rationem, quàm D, & E simul ad F. Quumque rursus componendo habeant A, B, C simul ad C majorem rationem, quàm D, E, F simul ad F; habebunt tandem permutando omnes A, B, C ad omnes D, E, F majorem quoque rationem, quàm C ad F.

Dico secundò, quod omnes A, B, C ad omnes D, E, F minorem habeant rationem, quàm A ad D.

Quoniam enim ex hypothese B ad E majorem habet rationem, quàm C ad F; habebit permutando B (2) ad C majorem quoque rationem, quàm E ad F; & consequenter componendo (3) B, & C simul ad C majorem adhuc rationem habebunt, quàm E, & F simul ad F. Unde, quum convertendo (4) B, & C simul ad B minorem habeant rationem, quàm E, & F simul ad E, & invertendo (5) B ad A minorem habeat rationem, quàm E ad D; habebunt ex æquali ordinando [6] B, & C simul ad A minorem quoque rationem, quàm E, & F simul ad D. Quare, quum rursus componendo omnes A, B, C ad A minorem habeant rationem, quàm omnes D, E, F ad D; habebunt tandem per-

mu-

(1) Prop. 31. hujus. (2) Prop. 27. hujus.

(3) Prop. 28. hujus. [4] Prop. 30. hujus.

(5) Prop. 26. hujus. (6) Prop. 31. hujus.



## LIBER QUINTUS. 301

mutando omnes A, B, C ad omnes D, E, F  
minorem adhuc rationem, quam A ad D.

Si igitur quotcumque magnitudines comparatæ cum aliis totidem constituent rationes, quarum antecedens subsequente semper major sit; habebunt omnes priores ad omnes posteriores majorem quidem rationem, quam ultima priorum ad ultimam posteriorum; minorem verò quam prima priorum ad primam posteriorum. Quod erat demonstrandum.

### S C H O L I U M.

*Non dissimiliter autem ostendetur, quod si quotcumque magnitudines comparatæ cum aliis totidem constituent rationes, quarum antecedens subsequente semper minor sit; omnes priores ad omnes posteriores minorem quidem rationem habeant, quam ultima priorum ad ultimam posteriorum; majorem verò, quam prima priorum ad primam posteriorum.*

### SCHOLIUM GENERALE.

*In tradenda proportionum doctrina, ab Euclidis methodo eam per æquemultiplicia ostendentis, nihil quidem recessimus: quod sanè nemo, opinor, vitio nobis vertet; quum, si res attentè perpendatur, ejusmodi proportionum doctrina Euclidea nullo vitio laborare comperiatur. Neque enim alia ratione doctrinam istam putant communiter Recentiores mancam esse, ac imperfectam, quàm quia lex illa æquemultiplicium, qua cognoscuntur magnitudines proportionales, velut principium ab Eu-*  
cli-

clide fuit assumpta, quum tamen ex ipsorum sententia sua deberet ratione fulciri. Sed immeritò ab Euclide id exigunt, ut qui magno mentis acumine talem cuderit rationis definitionem, ut sine illa lege quæ sint quatuor magnitudines proportionales, seu eandem rationem habentes in systemate suo nemo cognoscere queat. Jure id autem exigent ab iis, qui vocantes rationem, comparationem duarum magnitudinum ejusdem generis, factam ratione continentia, sine ulla demonstratione eandem illam legem usurparent. Nam, qui ita se gererent, jam quatuor magnitudinum proportionalium duas notas diversas assumerent, unam nempe, quum prima toties continet secundam, quoties tertia continet quartam; & alteram, quum æquemultiplicia primæ, & tertiæ, vel una superant, vel una deficiunt, vel una adæquant æquemultiplicia secundæ, & quartæ. Itaque quum apud Recentiores jam invaluerit, rationem definire, comparationem duarum magnitudinum ejusdem generis institutam ratione continentia; atque aded vocare magnitudines proportionales, quæ ejusmodi sunt, ut quoties prima continet secundam, toties tertia contineat quartam: proinde, ut doctrina Euclidæ etiam juxta has rationis, ac proportionis definitiones subsistere possit, visum est sequentia theoremata hoc loco subjungere.

### T H E O R. I.

*Si prima toties contineat secundam, quoties tertia continet quartam; æquemultiplices primæ, & tertiæ, vel una excedent, vel una deficient, vel una adæquabunt æquemultiplices secundæ, & quartæ.*

Pri-



Prima  $A$  toties continet secundam  $B$ , quoties tertia  $C$  continet quartam  $D$ . Sumantur autem ipsarum quidem  $A$ , et  $C$  æquemultiplices  $E$ , et  $F$ ; ipsarum verò  $B$ , et  $D$  æquemultiplices  $G$ , et  $H$ . Dico,  $E$ , et  $F$  vel una excedere, vel una deficere, vel una adæquare  $G$ , &  $H$ .

Ponamus etenim primò, quod  $E$  major sit, quàm  $G$ . Jamque, si  $F$  non sit major, quàm  $H$ ; sed vel minor, vel æqualis; continebit  $E$  magis  $G$ , quàm  $F$  continet  $H$ . Sed  $G$ , &  $H$  sunt æquemultiplices ipsarum  $B$ , et  $D$ ; atque aded  $G$  toties continet  $B$ , quoties  $H$  continet  $D$ . Quare etiam  $E$  magis continebit  $B$ , quàm  $F$  continet  $D$ . Ex hypothese autem  $B$  toties continetur in  $A$ , quoties  $D$  continetur in  $C$ . Quare rursus  $E$  magis continebit  $A$ , quàm  $F$  continet  $C$ : quod quidem est falsum; quum  $E$ , et  $F$  sint æquemultiplices ipsarum  $A$ , et  $C$ .

Ponamus secundò, quod  $E$  minor sit, quàm  $G$ . Jamque si  $F$  non sit minor, quam  $H$ , sed vel major, vel æqualis; continebit  $E$  minus  $G$ , quàm  $F$  continet  $H$ . Sed  $G$ , et  $H$  sunt æquemultiplices ipsarum  $B$ , et  $D$ ; atque aded  $G$  toties continet  $B$ , quoties  $H$  continet  $D$ . Quare etiam  $E$  minus continebit  $B$ , quàm  $F$  continet  $D$ . Ex hypothese autem  $B$  toties continetur in  $A$ , quoties  $D$  continetur in  $C$ . Quare rursus  $E$  minus continebit  $A$ , quàm  $F$  continet  $C$ : quod quidem adhuc est falsum; quum  $E$ , et  $F$  sint æquemultiplices ipsarum  $A$ , et  $C$ .

Pe-


Ponamus denique, quod  $E$  sit æqualis  $G$ . Jamque, si  $F$  non sit æqualis  $H$ ; erit vel major, vel minor. Unde, quum in primo casu  $E$  minus contineat  $G$ , quam  $F$  continet  $H$ , & in secundo  $E$  magis contineat  $G$ , quam  $F$  continet  $H$ ; semper ostendetur,  $E$  non perinde continere  $A$ , ac  $F$  continet  $C$ : quod quum falsum sit, concludendum est, quod si prima toties contineat secundam, quoties tertia continet quartam; æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una excedant, vel una deficiant, vel una aequent æquemultiplices secundæ, & quartæ. Quod erat demonstrandum.

## T H E O R. II.

Si prima magis contineat secundam, quam tertia continet quartam, sumi poterunt tales æquemultiplices primæ, & tertiæ, itemque tales secundæ, & quartæ, ut si multiplex primæ excedat multiplicem secundæ, multiplex tertiæ non excedat multiplicem quartæ.

Prima  $AB$  magis contineat secundam  $D$ , quam tertia  $E$  continet quartam  $F$ . Dico, tales æquemultiplices sumi posse ipsarum  $AB$ , &  $E$ , itemque tales ipsarum  $D$ , &  $F$ , ut si multiplex ipsius  $AB$  excedat multiplicem ipsius  $D$ , multiplex ipsius  $E$  non excedat multiplicem ipsius  $F$ .

Quoniam enim ex hypothesi  $AB$  magis continet  $D$ , quam  $E$  continet  $F$ , abscindi potest ex  $AB$  portio aliqua  $BC$ , ita ut reliqua  $CA$  toties contineat  $D$ , quoties  $E$  continet  $F$ . Tum ipsarum  $BC$ ,  $CA$ , &  $E$  æquemultiplices capiantur  $GH$ ,  $HI$ , &  $L$ , hac tamen lege, ut  $GH$  multiplex ipsius  $BC$  major sit, quam  $D$ . Denique ipsarum  $D$ , &  $F$  sumantur æquemultiplices  $M$ , &  $N$ , hac rursus lege, ut  $M$  multiplex ip-  
sius



sus  $D$  superet  $HI$  magnitudine non majore, quàm  $D$ , sed vel æquali, vel minore.


Et quoniam  $GH$ ,  $HI$  sunt æquemultiplices ipsarum  $BC$ ,  $CA$ ; erit per primam hujus  $GI$  tam multiplex ipsius  $AB$ , quam est  $GH$  ipsius  $BC$ , vel  $HI$  ipsius  $CA$ , vel denique  $L$  ipsius  $E$ . Sunt igitur  $GI$ , &  $L$  æquemultiplices ipsarum  $AB$ , &  $E$ . Suntque etiam ex constructione  $M$ , &  $N$  æquemultiplices ipsarum  $D$ , &  $F$ . Dico itaque, quod  $GI$  excedat  $M$ , sed vicissim

$L$  non excedat  $N$ .

Quod enim  $GI$  excedat  $M$ , id liquet abundè. Nam, ex constructione,  $M$  superat  $HI$  magnitudine non majore, quam  $D$ . Sed posuimus  $GH$  majorem esse quam  $D$ . Itaque  $M$  superat  $HI$  magnitudine minore, quàm  $GH$ : & propterea tota  $GI$  excedet  $M$ . Quod verò vicissim  $L$  non excedat  $N$ , demonstrabimus id quidem hoc pacto.

Si fieri potest  $L$  excedat  $N$ . Et quoniam  $HI$  minor est, quàm  $M$ , continebit  $L$  magis  $N$ , quàm  $HI$  continet  $M$ . Sed  $M$ , &  $N$  sunt æquemultiplices ipsarum  $D$ , et  $F$ ; atque aded  $M$  toties continet  $D$ , quoties  $N$  continet  $F$ . Quare etiam  $L$  magis continebit  $F$ , quàm  $HI$  continet  $D$ . Ex constructione autem  $D$  toties

con-



continetur in  $CA$ , quoties  $F$  continetur in  $E$ . Quare rursus  $L$  magis continebit  $E$ , quàm  $HI$  continet  $CA$ : quod quidem est falsum: quum  $HI$ , &  $L$  sint æquemultiplices ipsarum  $CA$ , &  $E$ .

Concludamus igitur, quod si prima magis contineat secundam, quam tertia continet quartam; tales æquemultiplices sumi possint primæ, & tertiæ, itemq; tales secundæ, & quartæ, ut si multiplex primæ excedat, multiplicem secundæ, multiplex tertiæ non excedat multiplicem quartæ: Quod erat demonstrandum.

### T H E O R. III.

Si æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una excedant, vel una deficient, vel una adæquent æquemultiplices secundæ, & quartæ; continebit prima toties secundam, quoties tertia continet quartam.

Nam si ita non sit, sed prima magis contineat secundam, quam tertia continet quartam; jam per theorema secundum sumi poterunt tales æquemultiplices primæ, & tertiæ, itemque tales secundæ, & quartæ, ut si multiplex primæ excedat multiplicem secundæ, multiplex

plex tertiæ non excedat multiplicem quartæ :  
 Posuimus autem, æquemultiplices primæ, &  
 tertiæ vel una excedere, vel una deficere, vel  
 una adæquare æquemultiplices secundæ, &  
 quartæ. Necessè est igitur, ut prima toties  
 contineat secundam, quoties tertia continet  
 quartam. Quod erat demonstrandum.

## T H E O R. IV.

Si sumi possunt tales æquemultiplices primæ,  
 & tertiæ, itemque tales secundæ, & quartæ, ut  
 multiplex primæ excedat multiplicem secundæ,  
 sed multiplex tertiæ non excedet multiplicem  
 quartæ; prima magis continebit secundam,  
 quam tertia continet quartam.

Sint quatuor magnitudines, AB prima, D  
 secunda, E tertia, & F quarta, Dico, quod si  
 sumi possint tales æquemultiplices primæ, &  
 tertiæ, itemque tales, secundæ, & quartæ, ut  
 multiplex primæ superet multiplicem secundæ,  
 at multiplex tertiæ non superet multiplicem  
 quartæ, prima AB magis contineat secundam  
 D, quam tertia E continet quartam F.

Sumantur enim ejusmodi æquemultiplices;  
 & ipsarum quidem AB, & E, sint GI, & L;  
 ipsarum: verò D, & F sint M, & N. Quo-  
 niam igitur ex hypothesi GI superat M, sed L  
 non superat N; continebit GI magis M, quam  
 L continet N. Jam verò M, & N sunt æque-  
 multiples ipsarum D, & F; atque adeo quo-  
 ties M continet D, toties N continet F. Qua-  
 re etiam GI magis continebit D, quam L con-  
 tinet F. Sunt autem GI, & L æquemultipli-  
 ces ipsarum AB, & E; ac proinde quoties GI  
 continet AB, toties L continet F. Quare  
 etiam

etiam *AB* magis continebit *D*, quam *E* continet *F*. Et propterea, si fuerint quatuor magnitudines, & sumi possint tales æquemultiplices primæ, & tertiæ, itemque tales secundæ, & quartæ, ut multiplex primæ superet multiplicem secundæ, sed multiplex tertiæ non superet multiplicem quartæ; prima magis continebit secundam, quàm tertia continet quartam. Quod erat demonstrandum.





ELEMENTORUM

LIBER SEXTUS.

DEFINITIONES.

I.



*Similes figuræ rectilineæ sunt, quæ  
 & angulos, singulos singulis,  
 æquales habent, & latera circum  
 æquales angulos proportionalia.  
 Unde ad adstruendam duarum  
 figurarum rectilinearum simili-*

*tudinem, duo quidem ostendi debent. Pri-  
 mum, ut habeant angulos, singulos singulis,  
 æquales. Deinde, ut habeant latera, quæ cir-  
 cum æquales angulos sunt proportionalia.  
 Quocirca, si anguli unius figuræ, æquales fue-  
 rint angulis alterius figuræ, singuli singulis,  
 at latera circa æquales angulos existentia non  
 fuerint proportionalia; vel contra latera  
 unius figuræ proportionem respondeant la-  
 teribus alterius figuræ, sed anguli, circa  
 quos sunt latera proportionalia; non fuerint  
 æquales: ejuscemodi figuræ nequaquam si-  
 miles dici possunt.*

II,

*Reciproca autem figuræ sunt, quum in utra-  
 que ipsarum sunt antecedentes, & consequen-  
 tes*

*res rationum*. Vel clarius, quum in una quidem figura est antecedens primæ rationis, & consequens secundæ; in altera verò figura est consequens primæ rationis; & antecedens secundæ. Num autem termini isti diversarum rationum debeant esse circum æquales angulos; id nec ipsa definitio indicat, nec Interpretum quisquam advertit. Sed crediderim, hanc quoque conditionem requiri, ut figuræ dicantur reciproæ; quemadmodum colligere licet ex propositionibus decimaquarta, & decimaquinta hujus libri, in quibus de his figuris disseritur.

## III.

*Recta linea, dicitur secari extrema ac media ratione, quum ita quidem dividitur, ut tota recta linea sit ad majus segmentum, ut est majus ad minus*. Patebit autem inferius, secari quidem rectam lineam extrema, ac media ratione, si per undecimam secundi ita quidem dividatur, ut rectangulum, quod fit ex tota, & uno segmentorum, æqualæ sit quadrato alterius segmenti. Cœterum lineæ hoc modo divisæ utilitates innumeræ penè sunt: unde nonnulli rationem, qua linea hoc pacto dividitur, divinam appellarunt. Sed dicitur vulgò divisa extrema, ac media ratione; quia unum segmentorum, in quæ dividitur, fit medius terminus proportionis continuæ, alterum terminus extremus.

## IV.

*Altitudo cujuscumque figuræ; est perpendicularis, quæ a vertice ad basim demittitur*: nempe quia perpendicularis est minima omnium rectarum, quæ à vertice ad basim duci possunt; & utpote talis, est certæ, ac de-

determinatæ longitudinis; cujusmodi profectò debent esse rerum mensuræ. Hinc itaque patet, duas figuras æquales altitudines habere, si utique æquales fuerint perpendiculares, quæ ex ipsarum verticibus ad bases demittuntur. Erunt verò dictæ perpendiculares æquales, quum bases figurarum, & vertices vel sunt in iisdem parallelis, vel saltem in iisdem parallelis constitui possunt.

## V.

*Quantitas, seu exponens, vel denominator rationis est id, quod indicat, quoties antecedens continet consequentem.* Sic quantitas rationis, quam habet 10 ad 2, est 5; quia 10 quinques continet 2. Pariterque quantitas rationis, quàm habet 12 ad 3, est 4; quia 12 quater continet 3. Unde patet, rationes æquales eandem quantitatem habere. Nam vocantur rationes æquales, quum antecedentium æquemultiplicia quævis vel una deficient, vel una adæquant, vel una superant æquemultiplicia consequentium utcumque sumpta: quod profectò quum accidit, ostensum fuit à nobis, antecedentem unius rationis toties continere suum consequentem, quoties consequentem suum continet antecedens alterius rationis.

## VI.

*Ratio dicitur componi ex duabus, aut pluribus rationibus, quum ejus quantitas prodit ex multiplicatione quantitatum illarum rationum.* Sic ratio, quàm habet 18 ad 3, componitur ex ratione, quàm habet 4 ad 2, & ex ratione, quàm habet 12 ad 4; nam quantitas illius est 6, quantitates verò istarum sunt 2, & 3: profectò autem, si 2 mul-

ti-

triplicetur per 3, prodibit 6. Atque ita quoque ratio, quam habet 48 ad 2, componitur ex ratione, quàm habet 4 ad 2, ex ratione, quàm habet 9. ad 3, & ex ratione, quàm habet 12 ad 3, nam quantitas illius quæ est 24, oritur multiplicando inter se quantitates istarum, quæ sunt 2, 3, & 4.

Ex quo patet, quod si fuerint plures magnitudines, ratio, quam prima habet ad ultimam, componatur ex rationibus, quas eæ, excepta ultima, habent ad suas subsequentes. Ut si fuerint plures magnitudines 48, 12, 6, 2; habebit 48. ad 2 rationem compositam ex rationibus, quas habent 48 ad 12, 12 ad 6, & 6 ad 2, Nam quantitas rationis, quàm habet 48 ad 2, est 24: quæ quidem oritur, multiplicando inter se quantitates rationum, quas habent 48 ad 12, 12 ad 6, & 6 ad 2, quæ sunt 4, 2, & 3.

## VII.

*Ratio, quæ componitur ex duabus rationibus æqualibus, dicitur duplicata cujusque illarum; quemadmodum triplicata quum componitur ex tribus rationibus æqualibus; quadruplicata, quum ex quatuor; atque ita deinceps.* Ita ratio, quàm habet 18 ad 2, componitur ex rationibus, quas habent 6 ad 2, & 12 ad 4. Unde, quia duæ istæ rationes sunt æquales inter se; dicetur illa duplicata cujusque istarum. Atque ita quoque, quia ratio, quàm habet 54 ad 2, componitur ex tribus rationibus æqualibus, quas habent 6 ad 2, 2 ad 4, & 15 ad 5; dicetur illa triplicata cujusque istarum.


Ex quo patet, quod si fuerint tres magnitudines continuè proportionales A, B, C, ita nempe,

nempe ut A sit ad B, veluti est B ad C; ratio, quam habet prima A ad tertiam C duplicata sit ejus, quam habet vel prima A ad secundam B, vel secunda B ad tertiam C. Nam ratio, quam habet A ad C, componitur ex rationibus, quas habent A ad B, & B ad C. Unde quum ex hypothese duæ istæ rationes sint æquales inter se; erit cujusque ipsarum duplicata ratio, quam habet A ad C.


Similiter autem, si fuerint quatuor magnitudines continuè proportionales A, B, C, D, ita nempe, ut A sit ad B, veluti est B ad C, & B sit ad C, veluti est C ad D; ratio, quam habet prima A ad quartam D triplicata erit ejus, quam habet vel prima A ad secundam B, vel secunda B ad tertiam C, vel tertia C ad quartam D. Nam ratio, quam habet A ad D componitur ex rationibus, quas habent A ad B, B ad C, & C ad D. Unde quum tres istæ rationes sint æquales inter se; erit cujusque ipsarum triplicata ratio, quam habet A ad D.

PROP. I. THEOR. I.

*Triangula, & parallelogramma eandem altitudinem habentia inter se sunt ut bases.*



Sint primum duo triangula ABC, ACD, quæ posita super eandem rectam BD habeant eundem verticem A, & consequenter eandem altitudinē: dico triangulum ABC esse ad triangulum



gulum  $ACD$  ut est  
basis  $BC$  ad basim  
 $CD$ .

Extendatur enim  
tum  $BC$  in directum  
versus  $H$ , quum  $DC$   
in directum versus  
 $I$  : deinde super  
 $CH$  capiantur por-  
tiones  $BG$ ,  $GH$

æquales ipsi  $BC$ , & super  $CI$  portio  $DI$  æqua-  
lis  $CD$ . Denique jungantur  $AG$ ,  $AH$ ,  $AI$ .

Et quoniam ex constructione æquales inter  
se sunt tum rectæ  $CB$ ,  $BG$ ,  $GH$ , quum rectæ  
 $CD$ ,  $DI$  : erunt æqualia etiam inter se tum  
triangula  $ACB$ ,  $ABG$ ,  $AGH$ , quum triangula  
 $ACD$ ,  $ADI$  ; quare quoties  $BC$ ,  $CD$  me-  
tiuntur  $CH$ ,  $CI$ , toties triangula  $ABC$ ,  $ACD$   
metientur triangula  $ACH$ ,  $ACI$ . Jam vero  
triangulum  $ACH$  est æquale, majus, vel mi-  
nus triangulo  $ACI$  pro ut basis  $CH$  est æqua-  
lis, major, vel minor basi  $CI$ . Itaque quum  
habeantur quatuor magnitudines triangulum  
 $ABC$  prima, triangulum  $ACD$  secunda, basis  
 $BC$  tertia, & basis  $CD$  quarta; & ostensum sit  
æquemultiplices primæ, & tertiæ vel una ex-  
cedere, vel una deficere, vel una adæquare  
æquemultiplices secundæ, & quartæ, erit ut  
triangulum  $ABC$  ad triangulum  $ACD$  ita ba-  
sis  $BC$  ad basim  $CD$ .

Sint secundò duo parallelogramma  $AB$ ,  
 $AD$ , quæ sint constituta inter easdem parallas  
 $BD$ ,  $EF$ , & consequenter, non secus ac trian-  
gula, eandem habeant altitudinem. Dico,  
parallelogrammum  $AB$  ad parallelogram-  
mum

num AD esse etiam, ut basis BC ad basim CD.

Quoniam enim diagonalis dividit parallelogrammum [1] in duo triangula æqualia; erit am parallelogrammum AB duplum trianguli ABC, quàm parallelogrammum AD duplum trianguli ACD. Quare erit, ut parallelogrammum AB ad parallelogrammum AD; ita triangulum ABC ad triangulum ACD. Ostensum est autem, triangulum ABC esse ad triangulum ACD, ut est basis BC ad basim CD. Erit igitur quoque (2) ut parallelogrammum AB ad parallelogrammum AD, ita basis BC ad basim CD.

Triangula igitur, & parallelogramma, quæ eandem habent altitudinem, inter se sunt ut bases. Quod erat demonstrandum.

## PROP. II. THEOR. II.

*Si uni laterum trianguli parallela recta lineæ ducatur, ea secabit alia duo latera proportionaliter; & vicissim si secet proportionaliter duo latera trianguli, ea tertio lateri parallela erit.*



Sit triangulum ABC, in quo ducatur recta DE, quæ secans latera AB, AC in punctis D, & E parallela sit ipsi BC. Dico, rectam istam DE proportionaliter secare latera AB, AC: ita nempe, ut AD sit ad DB, ut est AE ad EC.

O 2

Jun-

[1] Prop. 34. lib. 1. (2) Prop. 11. lib. 5.

Jungantur etenim rectæ BE, CD. Et quoniam triangula BDE, CDE habent eandem basim DE, & constituta sunt in iisdem parallelis DE, BC; erit triangulum BDE [1] æquale triangulo CDE. Quare erit (2), ut triangulum ADE ad triangulum BDE, ita idem triangulum ADE ad triangulum CDE. Jam verò triangulum ADE est ad triangulum BDE (3), ut est AD ad BD; itemque triangulum ADE est ad triangulum CDE, ut est AE ad EC. Quare erit [4] ut AD ad DB, ita AE ad EC.

Sed secet vicissim recta DE proportionaliter latera AB, AC in punctis D, & E. Dico rectam DE parallelam esse ipsi BC.

Jungantur similiter rectæ BE, CD. Et quoniam ex hypothese AD est ad DB, ut AE ad EC; atque est AD ad DB [5], ut triangulum ADE ad triangulum BDE; & AE ad EC, ut triangulum ADE ad triangulum CDE; erit ut triangulum ADE ad triangulum BDE (6), ita idem triangulum ADE ad triangulum CDE: proindeque triangulum BDE (7) æquale erit triangulo CDE. Unde, quum duo ista triangula habeant eandem basim DE, & sint ad eandem partem posita; erunt etiam (8) in iisdem parallelis. Et propterea DE parallela erit ipsi BC.

Si igitur uni laterum trianguli parallela recta linea ducatur, ea secabit alia duo latera proportionaliter; & vicissim si secet pro-

(1) Prop. 37. lib. 1. (2) Prop. 7. lib. 5.

(3) Prop. 1. hujus. [4] Prop. 11. lib. 5.

(5) Prop. 1. hujus. (6) Prop. 11. lib. 5.


[7] Prop. 9. lib. 5. (8) Prop. 39. lib. 1.



portionaliter duo trianguli latera, ea parallela erit lateri tertio. Quod erat demonstrandum.

## PROP. III. THEOR. III.

*Recta, quæ secat angulum, verticalem alicujus trianguli bifariam, secabit basim in ratione laterum; & vicissim recta, quæ secat basim alicujus trianguli in ratione laterum, secabit angulum verticalem bifariam.*



Sit triangulum  $ABC$ , ejusque angulus verticalis  $BAC$  secetur bifariam per rectam  $AD$ . Dico, rectam istam  $AD$  secare basim  $BC$  in ratione laterum  $AB$ ,  $AC$ : ita nempe, ut  $BD$  sit ad  $DC$  velu-


ti est latus  $AB$  ad latus  $AC$ .

Ducatur enim (1) per punctum  $C$  recta  $CE$  ipsi  $AD$  parallela, quæ conveniat cum latere  $AB$  producto in  $E$ . Et quoniam rectæ  $AD$ ,  $CE$  sunt parallelæ, & in ipsas incidit  $AC$ ; erunt (2) anguli alterni  $DAC$ ,  $ACE$  æquales inter se. Est autem ex hypothesi angulus  $DAC$  æqualis angulo  $BAD$ . Quare eisdem angulo  $BAD$  æqualis quoque erit angulus  $ACE$ . Jam verò, propter easdem parallelas  $AD$ ,  $CE$ , angulus  $BAD$  æqualis est angulo  $AEC$ . Quare erit angulus  $AEC$

O 3

æqua-

[1] Prop. 31. lib. 1. (2) Prop. 29. lib. 1.



æqualis angulo  $\text{ACE}$ . Et propterea latera  $\text{AC}$ ,  $\text{AE}$  angulos illos subtendentia [1] æqualia erunt inter se. Quum igitur  $\text{AC}$  sit æqualis  $\text{AE}$ , habebit [2]  $\text{AB}$  ad  $\text{AC}$  eandem rationem,

quam  $\text{AB}$  ad  $\text{AE}$ . Sed  $\text{AB}$  est ad  $\text{AE}$  (3), ut  $\text{BD}$  ad  $\text{DC}$ . Erit itaque (4) ut  $\text{AB}$  ad  $\text{AC}$ , ita  $\text{BD}$  ad  $\text{DC}$ .

Sed recta  $\text{AD}$  fecet vicissim basim  $\text{BC}$  in ratione laterum  $\text{AB}$ ,  $\text{AC}$ . Dico, eandem rectam  $\text{AD}$  secare quoque bifariam angulum verticalem  $\text{BAC}$ .

Nam ex hypothefi  $\text{BD}$  est ad  $\text{DC}$ , ut  $\text{AB}$  ad  $\text{AC}$ . Sed [5]  $\text{BD}$  est ad  $\text{DC}$ , ut  $\text{AB}$  ad  $\text{AE}$ . Quare erit (6) ut  $\text{AB}$  ad  $\text{AC}$ , ita  $\text{AB}$  ad  $\text{AE}$ . Et propterea  $\text{AC}$ ,  $\text{AE}$  æquales erunt inter se (7). Quum itaque triangulum  $\text{CAE}$  isosceles sit, erit (8) angulus  $\text{ACE}$  æqualis angulo  $\text{AEC}$ . Sed propter parallelas  $\text{AD}$ ,  $\text{CE}$  [9] angulus  $\text{ACE}$  æqualis est angulo  $\text{CAD}$ , & angulus  $\text{AEC}$  æqualis est angulo  $\text{BAD}$ . Quare erit angulus  $\text{CAD}$  æqualis quoque angulo  $\text{BAD}$ : & idem angulus  $\text{BAC}$  sectus erit bifariam per rectam  $\text{AD}$ .

Re-

(1) Prop. 6. lib. 1.

(2) Prop. 7. lib. 5.

(3) Prop. 2. hujus.

[4] Prop. 11. lib. 5.

(5) Prop. 2. hujus.

[6] Prop. 11. lib. 5.

(7) Prop. 9. lib. 5.


(8) Prop. 5. lib. 1.

(9) Prop. 29. lib. 1.

Recta igitur, quæ secat angulum verticalem alicujus trianguli bifariam, secabit basim in ratione laterum; & vicissim recta, quæ secat basim alicujus trianguli in ratione laterum, secabit angulum verticalem bifariam.

## PROP. IV. THEOR. IV.

*Triangula æquiangula habent latera circum æqualēs angulos proportionalia; & homologa sunt latera illa, quæ æquales angulos subtendunt.*



Sint  $ABC$ ,  $DCE$  duo triangula æquiangula, quæ nempe habeant angulum  $ABC$  æqualem angulo  $DCE$ , angulum  $BCA$  æqualem an-


gulo  $CED$ , & angulum  $CAB$  æqualem angulo  $EDC$ . Dico, eadem triangula habere quoque latera circum æquales angulos proportionalia, & illa quidem latera, proportionem sibi correspondere, quæ angulos æquales subtendunt; hoc est esse, ut  $AB$  ad  $BC$ , ita  $DC$  ad  $CE$ ; ut  $BC$  ad  $CA$ , ita  $CE$  ad  $ED$ ; & ut  $CA$  ad  $AB$ , ita  $ED$  ad  $DC$ .

Disponantur etenim triangula  $ABC$ ,  $DCE$  ita quidem, ut latera  $BC$ ,  $CE$  jaceant in directum. Et quoniam duo anguli [1]  $ABC$ ,  $BCA$  sunt minores duobus rectis, atque est ex hypothese angulus  $BCA$  æqualis angulo  $CED$ ; erunt duo anguli  $ABC$ ,  $CED$  simili-

O 4

ter

[1] Prop. 17. lib. 1.



ter duobus rectis  
minores. Quum igitur  
in rectas AB,  
DE incidat tertia  
BE, & efficiat an-  
gulos internos ad  
eamdem partem

duobus rectis minores; rectæ AB, DE nequa-  
quam (1) erunt parallelæ, sed convenient pro-  
ductæ ad eam partem, in qua fiunt anguli mi-  
nores duobus rectis. Producantur itaque re-  
ctæ AB, DE, & convenient in F.

Et quoniam ex hypothese in rectas BF, CD  
tertia incidens BE efficit angulum exteriorem  
DCE æqualem interiori, & opposito ad eam-  
dem partem ABC; erunt (2) rectæ BF, CD  
inter se parallelæ. Similiter, quia in rectas  
CA, EF tertia incidens BE efficit ex hypo-  
thesi angulum exteriorem BCA æqualem in-  
teriori, & opposito ad eamdem partem CED;  
erunt rectæ CA, EF etiam inter se parallelæ.  
Quare parallelogrammum erit ACDF; erit-  
que adeò [3] tum AC æqualis FD, cum AF  
æqualis CD.

Et quoniam in triangulo BFE ducta est  
AC ipsi EF parallela, erit (4) ut AB ad AF,  
ita BC ad CE. Est autem AF æqualis CD.  
Quare erit quoque, ut AB ad CD, ita BC  
ad CE. Et propterea permutando erit [5] ut  
AB ad BC, ita DC ad CE. Similiter, quia  
in eodem triangulo BEF ducta est CD ipsi  
BF

(1) Axio. 13.

(2) Prop. 28. lib. 1.

(3) Prop. 34. lib. 1.

(4) Prop. 2. hujus.

(5) Prop. 16. lib. 5.

BF parallela, erit ut BC ad CE, ita DF ad DE. Est autem DF æqualis AC. Quare erit quoque ut BC ad CE, ita AC ad DE; atque adeò permutando erit, ut BC ad CA, ita CE ad ED. Quum igitur ostensum sit, AB esse ad BC, ut est DC ad CE, & BC esse ad CA, ut est CE ad ED; erit etiam ex æquali ordinando [1] ut AB ad AC, ita DC ad DE; atque adeò invertendo, ut CA ad AB, ita ED ad DC. Quod erat demonstrandum.

Triangula igitur æquiangula habent etiam latera circum æquales angulos proportionalia, & homologa sunt latera illa, quæ angulos æquales subtendunt.

COROLLARIUM.

*Ex quo patet, triangula æquiangula esse etiam similia inter se. Nam figuræ similes dicuntur illæ, quæ habent angulos angulis æquales, singulos singulis, & latera circum æquales angulos proportionalia. Quum igitur ostensum sit, triangula æquiangula habere quoque latera circa angulos æquales proportionalia; consequens est, ut triangula æquiangula sint etiam inter se similia.*

PROP. V. THEOR. V.

*Triangula, quæ latera habent proportionalia, erunt etiam æquiangula; & æquales habebunt eos angulos, quos homologa latera subtendunt.*


**S**int duo triangula ABC, DEF, quæ habeant latera proportionalia; hoc est AB sit ad BC,

O 5

BC,

---

[1] Prop. 21. lib. 1.



BC, ut DE ad EF; & BC sit ad CA, ut EF ad FD. Dico, eadem triangula esse etiam æquiangulara, & æquales habere angulos illos, qui ab homologis lateribus subtenduntur: nempe angulum BAC æ-

qualem esse angulo EDF, angulum ABC æqualem angulo DEF, & angulum ACB æqualem angulo DFE.

Fiat enim (1) angulus FEG æqualis angulo ABC, & angulus EFG æqualis angulo ACB, conveniantque rectæ EG, FG in G, eritque reliquus angulus EGF, æqualis quoque reliquo angulo BAC. Quum igitur duo triangula ABC, GEF sint æquiangulara; erit [2] ut AB ad BC, ita GE ad EF; & ut BC ad CA, ita EF ad FG. Sed ex hypothese AB est ad BC, ut DE ad EF; & BC est ad CA, ut EF ad FD. Quare erit [3], ut DE ad EF, ita GE ad EF; & ut EF ad FD, ita EF ad FG. Quum itaque DE, GE habeant ad EF eandem rationem; erunt [4] DE, GE æquales inter se. Pariterque, quum eadem EF habeat eandem rationem ad FD, quàm ad FG; erunt FD, FG etiam inter se æquales. Quare, quum duo triangula DEF, GEF habeant duo latera DE, DF æqualia duobus lateribus GE, GF, alterum alteri, nec non

(1) Prop. 23. lib. 1. (2) Prop. 4. huius.  
 (3) Prop. 11. lib. 5. (4) Prop. 9. lib. 5.

non basim EF communem; habebunt quoque [1] angulum EDF æqualem angulo EGF; atque adeò æquales pariter (2) reliquos angulos, singulos singulis, hoc est angulum DEF æqualem angulo GEF, & angulum DFE æqualem angulo GFE. Est autem ex constructione angulus EGF æqualis angulo BAC, angulus GEF æqualis angulo ABC, & angulus GFE æqualis angulo ACB. Quare erit angulus BAC æqualis angulo EDF, angulus ABC æqualis angulo DEF, & angulus ACB æqualis angulo DFE. Et propterea triangu-  
la, quæ latera habent proportionalia, erunt etiam æquiangula, & æquales habebunt angulos illos, quos homologa latera subtendunt. Quod erat demonstrandum.

## COROLLARIUM.


*Ex quo patet, triangu-  
la, quæ latera habent  
proportionalia, esse etiam similia inter se. Nam  
figuræ similes dicuntur illæ, quæ non modo late-  
ra habent proportionalia, verùm etiam æquales  
angulos, circa quos sunt latera proportionalia.  
Quum igitur ostensum sit, triangu-  
la, quæ latera  
proportionalia habent, esse etiam æquiangula, &  
æquales habere angulos illos, quos homologa la-  
tera subtendunt; consequens est, ut triangu-  
la, quæ latera proportionalia habent, sint etiam si-  
milia inter se.*

## PROP. VI. THEOR. VI.

*Triangu-  
la, quæ unum angulum uni angu-  
lo æqualem habent, & latera circum illos an-  
gulos*

[1] Prop. 8. lib. 1. [2] Prop. 4. lib. 1.

gulos proportionalia, sunt etiam æquiangula, & æquales habent angulos illos, quos homologa latera subtendunt.



Sint duo triangula ABC, DEF, quæ habeant angulum BAC æqualem angulo EDF, nec non latera circum istos angulos proportionalia: ita nempe, ut BA sit ad AC, ut est ED ad DF. Dico, eadẽ triangula esse etiam æquiangula, & æquales habere angulos illos, quos homolo-

ga latera subtendunt; hoc est angulum ABC æqualem esse angulo DEF, angulum verò ACB æqualem angulo DFE.

Fiat enim (1) angulus FDG æqualis angulo BAC, seu EDF, & angulus DFG æqualis angulo ACB; convenientque rectæ DG, FG in G; eritque reliquus angulus DGF æqualis quoque reliquo angulo ABC. Quum igitur duo triangula ABC, DGF ex constructione sint æquiangula; erit (2) ut AB ad AC, ita DG ad DF. Est autem ex hypothesi,  
ut

(1) Propr. 32. lib. 1. (2) Prop. 4. hujus.



ut AB ad AC, ita DE ad DF. Quare erit [1] ut DE ad DF, ita DG ad DF. Et propterea, quum duæ DE, DG habeant ad DF eandem rationem, erunt (2) DE, DG æquales inter se. Unde, quia duo triangula DEF, DGF habent duo latera DE, DF æqualia duobus lateribus DG, DF, alterum alteri, nec non æquales angulos sub æqualibus lateribus contentos; habebunt quoque [3] reliquos angulos reliquis angulis æquales, singulos singulis, hoc est angulum DGF æqualem angulo DEF, & angulum DFG æqualem angulo DFE. Jam verò ex constructione angulus DGF æqualis est angulo ABC, & angulus DFG æqualis est angulo ACB. Quare erit angulus ABC æqualis angulo DEF, & angulus ACB æqualis angulo DFE: proindeque triangula, quæ unum angulum uni angulo æqualem habent, & latera circum istos angulos proportionalia, erunt etiam æquiangula, & æquales habebunt angulos illos, quos homologa latera subtendunt, Quod erat ostendendum.

## COROLLARIUM.


*Ex quo patet, triangula, quæ habent unum angulum uni angulo æqualem, & latera circum istos angulos proportionalia, esse etiam similia inter se. Nam hujusmodi triangula ostensa sunt inter se æquiangula. Sed triangula æquiangula sunt pariter similia. Quare & ipsa illa triangula similia erunt inter se.*

PROP.

(1) Prop. 11. lib. 5. [2] Prop. 9. lib. 5.  
[3] Prop. 4. lib. 1.

## PROP. VII. THEOR. VII.

Triangula, quæ unum angulum uni angulo æqualem habent, latera verò circum alios angulos proportionalia, & reliquos angulos proportionalia, & reliquos angulos ejusdem speciei inter se, hoc est vel utrumque acutum, vel utrumque obtusum, erunt etiam æquiangula, & æquales habebunt angulos illos, circa quos sunt latera proportionalia.



Sint duo triangula ABC, DEF quæ habeant angulum BAC æqualem angulo EDF. Sint

deinde proportionalia latera, quæ sunt circa angulos ABC, DEF; hoc est AB sit ad BC, ut est DE ad EF. Denique reliqui anguli ACB, DFE sint ejusdem speciei inter se; hoc est, vel ambo acuti, seu recto minores, vel ambo obtusi, seu recto majores. Dico, eadem triangula esse etiam æquiangula inter se, & æquales habere angulos illos, circa quos sunt latera proportionalia, nempe angulum ABC æqualem esse angulo DEF.

Si enim angulus ABC non sit æqualis angulo DEF, alter ipsorum major erit. Sit itaque major angulus ABC. Quare fiat angulus ABG [1] æqualis angulo DEF. Quumque

[1] Prop. 23. lib. 1.

que angulus BAC positus sit æqualis angulo EDF; erit reliquus angulus AGB æqualis reliquo angulo DFE; atque adedò duo triangula ABG, DEF quum æquiangula sint, erit [1] ut AB ad BG, ita DE ad EF. Est autem ex hypothesis, ut AB ad BC, ita DE ad EF. Quare erit (2), ut AB ad BC, ita AB ad BG. Et propterea, quum eadem AB habeat eandem rationem ad BC, quam ad BG; erunt [3] CB, BG æquales inter se. Isofceles est itaque triangulum BCG; eritque adedò (4) angulus BCG æqualis angulo BGC. Jam verò ex hypothesis angulus BCG est ejusdem speciei cum angulo EFD, qui ex constructione adæquat angulum BGA. Quare angulus CGB erit etiam ejusdem speciei cum angulo BGA; eruntque adedò ambo vel recto minores, vel recto majores. Sed hoc fieri non potest: debent enim simul (5) duos rectos adæquare. Non igitur angulus ABC major est, sed æqualis angulo DEF. Et propterea triangula, quæ unum angulum uni angulo æqualem habent, latera verò circum alios angulos proportionalia; & reliquos angulos ejusdem speciei inter se, erunt etiam æquiangula, & æquales habebunt angulos illos, circa quos sunt latera proportionalia. Quod erat demonstrandum.

## COROLLARIUM.

*Ex quo patet, triangula, quæ unum angulum uni angulo æqualem habent, latera verò circum alios*

- 
- [1] Prop. 4. hujus. [2] Prop. 11. lib. 5.  
 [3] Prop. 9. lib. 5. [4] Prop. 5. lib. 1.  
 [5] Prop. 13. lib. 1.


*alios angulos proportionalia, & reliquos angulos ejusdem speciei inter se, esse etiam similia. Nam hujusmodi triangula ostensa sunt inter se equiangula. Sed triangula equiangula sunt pariter similia. Quare & ipsa illa triangula similia erunt inter se.*

### S C H O L I U M.

*Vides igitur, similitudinem duorum triangulorum quatuor modis ostendi posse. Primò nempe, si triangula sint equiangula. Secundò, si habeant latera proportionalia. Tertio, si habeant unum angulum uni angulo æqualem, & latera circum istos angulos proportionalia. Et quartò demum, si habeant unum angulum uni angulo æqualem, latera verd circum alios angulos proportionalia, & reliquos angulos ejusdem speciei inter se.*

### PROP. VIII. THEOR. VIII.

*Si in triangulo rectangulo ex angulo recto ad basim perpendicularis demittatur; hæc dividet triangulum in duo alia triangula, quæ tum toti, quum inter se similia erunt.*



Sit triangulum ABC, rectum habens angulum in A, ex quo demittatur ab basim BC perpendicularis AD. Dico, perpendicularem istam AD

AD dividere triangulum ABC in duo alia triangula ABD, ACD, quæ similia sunt, tum toti triangulo ABC, quum etiam inter se.

Quoniam enim in triangulis ABC, ABD anguli BAC, ADB sunt recti, itemque angulus B communis; erunt & reliqui anguli ACB, BAD etiam æquales inter se. Quare triangula ABC, ABD æquiangula erunt; atque aded similia. Similiter, quia in triangulis ACB, ACD anguli BAC, ADC sunt recti, itemque angulus C communis; erunt & reliqui anguli ABC, CAD etiam æquales inter se: proindeque triangula ACB, ACD æquiangula erunt; atque aded similia. Denique, quum in triangulis ADB, ADC ostensi sint æquales, tum anguli ABD, CAD, quum anguli BAD, ACD, sintque reliqui anguli ADB, ADC recti; erunt triangula ADB, ADC etiam æquiangula; atque aded pariter similia inter se. Quare, si in triangulo rectangulo demittatur ex angulo recto ad basim perpendicularis, hæc dividet triangulum in duo alia triangula, quæ tum toti, quum inter se similia erunt. Quod erat demonstrandum.

### C O R O L L A R I U M I.

*Hinc patet primò, unumquodque latus trianguli rectanguli medium esse proportionale inter hypotenusam, & segmentum, quod ei adjacet: nempe latus AB medium esse proportionale inter hypotenusam BC, & segmentum BD; latus verò AC medium esse proportionale inter hypotenusam BC, & segmentum CD. Quum enim triangula ABC, ABD ostensa sint æquiangula; habebunt latera circa æquales angulos propor-*  
*tiona-*


tionalia; eritque aded, ut  $BC$  ad  $AB$ , ita  $AB$  ad  $AD$ . Atque ita quoque, quum ex ostensis equi-  
angula sint triangula  $ACB, ACD$ ; erit ut  $BC$  ad  
 $AC$ , ita  $AC$  ad  $CD$ .

## COROLLARIUM II.

Liquet secundo, demissam perpendicularem  
 $AD$  mediam esse proportionalem inter segmenta  
 $BD, CD$ . Triangula enim  $ADB, ADG$   
ostensa sunt inter se equiangula. Quare late-  
ra habebunt circum equales angulos propor-  
tionalia. Et propterea erit, ut  $BD$  ad  $AD$ , ita  
 $AD$  ad  $CD$ .

## PROP. IX. PROBL. I.

A data recta linea optatam partem abscin-  
dere.



Data sit re-  
cta  $AB$ . O-  
portet ab ea  
optatam quam-  
vis partem,  
puta tertiam,  
abscindere.

Ex puncto  
A ducatur recta  $AC$ , quæ efficiat cum  $AB$   
quemvis angulum  $BAC$ . Tum super  $AC$   
capiantur tot partes æquales cujusvis ma-  
gnitudinis, quota pars abscindenda est ex  
 $AB$ : nempe in proposito exemplo capian-  
tur tres partes æquales, quæ sint  $AD, DE,$   
 $EF$ . Denique, juncta  $BE$ , ei per punctum  
D pa-

D parallela (1) agatur DG. Dico, AG esse tertiam partem ipsius AB.

Quoniam enim in triangulo ABF ducta est recta DG parallela lateri BF; ea [2] secabit latera AB, AF proportionaliter in punctis G, & D; eritque propterea, ut AG ad GB, ita AD ad DF, sive etiam invertendo, ut GB ad AG, ita DF ad AD. Est autem componendo (3) ut AB ad AG, ita AF ad AD. Quare quemadmodum AF tripla est ipsius AD, ita & AB tripla erit ipsius AG. Ex data igitur recta AB abscissa est tertia pars AG, Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.


*Quod, sit ex AB abscindenda sit portio, quæ sit ad AB, non ut unitas ad datum numerum, sed ut unus numerus ad alium, puta, ut 2 ad 3; tunc ducta similiter recta AC faciente cum AB angulum BAC, & sumptis adhuc super AC tribus portionibus equalibus AD, DE, EF, ducenda erit per punctum E recta EH parallela ipsi BF. Nam quemadmodum AE ad AF est, ut 2 ad 3; ita in hac eadem ratione erit quoque AH ad AB.*

## P R O P. X. P R O B L. II.

*Datam rectam lineam secare in partes proportionales partibus, in quas secta est alia data recta lineæ.*

**S**It recta AB infecta, AC verò secta in partes AD, DE, EC. Oportet, rectam  
AB

(1) Prop. 31. lib. 5. (2) Prop. 2. hujus.  
[3] Prop. 18. lib. 5.



AB secare in partes, quæ proportionales sint partibus AD, DE, EC.

Jungantur duæ datæ rectæ lineæ

AB, AC ita, ut faciant angulum BAC, & à B ad C ducatur recta BC. Tum huic BC (1) parallelæ agantur DF, EG. Dico partes AF, FG, GB proportionales esse partibus AD, DE, EC.

Agatur enim per punctum D recta DH ipsi AB parallela. Et quoniam parallelogramma sunt DG, IB; erit (2) tum DI æqualis FG, cum IH æqualis GB: quare erit, ut DI ad IH [3] ita FG ad GB. Est autem (4) DI ad IH, ut DE ad EC. Erit igitur [5] ut FG ad GB ita DE ad EC. Et propterea partes FG, GB proportionales sunt partibus DE, EC. Sed partes AF, FG proportionales quoque sunt partibus AD, DE; quum sit ut AF ad FG, ita AD ad DE. Divisa est igitur AB in partes AF, FG, GB proportionales partibus AD, DE, EC, in quas secta est altera AC. Quod erat faciendum.

### S C H O L I U M.

*Hoc problema viam nobis aperit, dividendi datam rectam AB in quocumque partes æqua-*


- 
- (1) Prop. 31. lib. 1. [2] Prop. 34. lib. 1.  
 (3) Prop. 7. lib. 5. [4] Prop. 2. hujus.  
 (5) Prop. 11. lib. 5.



*æquales. Si enim alteram ei adjungamus AC, facientem cum ipsa angulum BAC, super qua capiamus tot partes æquales AD, DE, EC, &c. in quot ipsa AB est dividenda; eò res redibit, ut dividamus AB in partes proportionales partibus AD, DE, EC, &c. Quod qua fiat ratione, jam in hoc problemate ostensum est.*

## PROP. XI. PROBL. III.

*Duabus datis rectis lineis, tertiam proportionalem invenire.*



Sint datæ duæ rectæ lineæ AB, BC. Oportet, invenire tertiam, ad quam BC ita se habeat, quemadmodum est AB ad BC.

Datae rectæ lineæ AB, BC disponantur in directum. Tum ipsi AC alia addatur AE, quæ faciat cum ea angulum CAE. Super AE porrò capiatur portio AD æqualis ipsi BC. Ac denique, juncta BD, huic per punctum C (1) parallela agatur CE, conveniens cum AE in puncto E. Dico, DE esse tertiam proportionalem quæsitam.

Quoniam enim in triangulo CAE ducta est recta BD parallela lateri CE; erit quidem (2) ut AB ad BC, ita AD ad DE. Est autem ex constructione AD æqualis BC. Quare erit, ut AB ad BC, ita BC ad DE.


Da-

(1) Prop. 31. lib. I. (2) Prop. I. hujus.

Datis igitur duabus rectis lineis  $AB$ ,  $BC$  inventa est tertia  $DE$ , ad quam  $BC$  ita se habet, quemadmodum est  $AB$  ad  $BC$ . Quod erat faciendum.

PROP. XII. PROBL. IV.

*Tribus datis rectis lineis, quartam proportionalem invenire.*



Sint datæ tres rectæ lineæ,  $AB$  prima,  $BC$  secunda,  $AD$  tertia. Oportet, invenire quartam, ad quam  $AD$  ita se habeat, quemadmodum est  $AB$  ad  $BC$ .

Disponantur in directum duæ primæ  $AB$ ,  $BC$ . Dum ipsi  $AG$  addatur tertia  $AD$ , quæ faciat cum ea angulum  $CAD$ . Jungatur porro  $BD$ . Ac denique per punctum  $C$  ducatur (1) recta  $CE$  parallela ipsi  $BD$ , quæ conveniat cum  $AD$  in puncto  $E$ . Dico,  $DE$  esse quartam proportionalem quæsitam.


Quoniam enim in triangulo  $CAE$  ducta est recta  $BD$  parallela lateri  $CE$ ; erit (2) ut  $AB$  ad  $BC$ , ita  $AD$  ad  $DE$ . Quare datis tribus rectis lineis  $AB$ ,  $BC$ ,  $AD$  inventa est quarta  $DE$ , ad quam  $AD$  eandem habet rationem, quam  $AB$  ad  $BC$ . Quod erat faciendum.

PROP.

(1) Prop. 31. lib. 1. (2) Prop. 2. hujus.

## PROP. XIII. PROBL. V.

*Duabus datis rectis lineis, mediam proportionalem invenire.*



Datae sint duae rectae AB, BC. Oportet, invenire mediam proportionalem, hoc est aliam rectam lineam, ad quam AB habeat eandem rationem, quam ipsa habet ad BC.

Disponantur in directum duae datae rectae lineae AB, BC. Tum secta AC [1] bifariam in D, describatur centro D, & intervallo DA, seu DC semicirculus AEC. Ac denique ex puncto B erigatur perpendicularis BE (2), quae occurrat circumferentiae descripti semicirculi in E. Dico perpendicularem istam BE esse mediam proportionalem quaesitam.

Jungantur enim rectae AE, CE; & rectus erit [3] angulus AEC, velut in semicirculo existens. Unde, quum in triangulo rectangulo AEC ex angulo recto ad hypotenusam demissa sit perpendicularis EB; erit [4] ut AB ad BE, ita BE ad BC, Et propterea datis duabus rectis lineis AB, BC inventa est media proportionalis BE. Quod erat faciendum.


PROP.

(1) Prop. 10. lib. 1. (2) Prop. 11. lib. 1.

[3] Prop. 31. lib. 3. (4) Coroll. 2. prop. 8. hujus.

## PROP. XIV. THEOR. IX.

*Parallelogramma, quæ æqualia sunt, & habent unum angulum uni angulo æqualem, habent quoque latera circum æquales angulos reciprocè proportionalia. Et vicissim parallelogramma, quæ circum æquales angulos latera habent reciprocè proportionalia, sunt etiam æqualia inter se.*



Sint duo parallelogramma æqualia AC, BF, quæ habeant angulum ABC æqualē angulo EBG. Dico, eadem parallelogramma habere quoque latera circum æquales angulos reciprocè pro-

portionalia, hoc est esse, ut AB ad BG, ita EB ad BC.

Conjungantur parallelogramma ad angulos æquales, ita ut latera AB, BG jaceant in directum. Et quoniam æquales sunt anguli ABC, EBG; erunt [1] etiam in directum latera EB, BC. Extendantur denique DC, FG usque donec conveniant in H, tertiumque constituent parallelogrammum BH.

Quia igitur parallelogramma AC, BF æqualia sunt inter se; erit (2) ut AC ad BH, ita BF ad BH. Sed AC est ad BH [3], ut AB ad

[1] *Recol. prop. 15. lib. 1.* [2] *Prop. 7. lib. 1.*

[3] *Prop. 1. hujus.*

ad BG ; itemque BF est ad BH , ut EB ad BC .  
Quare erit [1] ut AB ad BG , ita EB ad BC .

Sed eadem parallelogramma AC , BF habeant per contrarium circa æquales angulos ABC , EBG latera reciprocè proportionalia : adedè nempe , ut AB sit ad BG , veluti est EB ad BC . Dico parallelogrammum AC æquale esse parallelogrammo BF .

Fiat enim eadem constructio ; eritque ut AB ad BG , ita parallelogrammum AC ad parallelogrammum BH [2] ; pariterque ut EB ad BC , ita parallelogrammum BF ad parallelogrammum BH . Est autem ex hypothesi , ut AB ad BG , ita EB ad BC . Quare erit [3] ut parallelogrammum AC ad parallelogrammum BH , ita parallelogrammum BF ad idem parallelogrammum BH . Et propterea , quum parallelogramma duo AC , BF habeant eandem rationem ad tertium BH ; erit [4] parallelogrammum AC æquale parallelogrammo BF .

Parallelogramma igitur , quæ æqualia sunt , & habent unum angulum uni angulo æqualem , habent quoque latera circum æquales angulos reciprocè proportionalia . Et vicissim parallelogramma , quæ circum æquales angulos latera habent reciprocè proportionalia , sunt etiam æqualia inter se . Quod erat demonstrandum .

PROP. XV. THEOR. X.


*Triangula , quæ æqualia sunt , & habent unum angulum uni angulo æqualem , habent quoque latera circum æquales angulos reciprocè*

P cè

(1) Prop. 11. lib. 5. [2] Prop. 1. hujus.

[3] Prop. 11. lib. 5. [4] Prop. 9. lib. 5.

*cè proportionalia, Et vicissim triangula, quæ circum æquales angulos latera habent reciprocè proportionalia; sunt etiam æqualia inter se.*



Sint duo triāgula æqualia ABC, DBE, quæ habeant angulum ABC æqualē angulo DBE. Dico, eadem triangula habere quoque latera circum æquales angulos proportionalia reciprocè; hoc

est esse, ut AB ad BE, ita DB ad BC.

Conjungantur triangula ad angulos æquales, ita ut latera AB, BE jaceant in directum. Et quoniam æquales sunt anguli ABC, DBE; erunt [1] etiam in directum latera CB, BD. Denique jungatur AD ita ut oriatur tertium triangulum ABD.

Quia igitur triangula ABC, DBE æqualia sunt inter se; erit (2) ut triangulum ABC ad triangulum ABD, ita triangulum DBE ad idem triangulum ABD. Sed triangulum ABC est ad triangulū ABD, ut CB ad BD [3]; itemque triangulum DBE est ad triangulum ABD, ut EB ad BA. Quare erit (4) ut CB ad BD ita EB ad BA,

Sed

(1) Sch. prop. 15. lib. 1. [2] Prop. 7. lib. 5.

(3) Prop. 1. hujus. [4] Prop. 11. lib. 5.

Sed eadem triangula ABC, DBE habeant per contrarium circa æquales angulos ABC, DBE latera reciprocè proportionalia: aded nempe, ut AB sit ad BE, veluti est DB ad BC. Dico, triangulum ABC æquale esse triangulo DBE.

Fiat enim eadem constructio; eritque ut AB ad BE, ita triangulum ABD ad triangulum DBE [1]; pariterque, ut DB ad BC, ita triangulum ABD ad triangulum ABC. Est autem ex hypothesi, ut AB ad BE, ita DE ad BC. Quare erit [2] ut triangulum ABD ad triangulum DBE, ita idem triangulū ABD ad triangulum ABC. Et propterea, quum ad triangula ABC, DBE habeat eandem rationem idem triangulum ABD; erit (3) triangulum ABC æquale triangulo DBE.

Triangula igitur, quæ æqualia sunt, & habent unum angulum uni angulo æqualem, habent quoque latera circum æquales angulos reciprocè proportionalia. Et vicissim triangula, quæ circum æquales angulos latera habent reciprocè proportionalia, sunt etiam æqualia inter se, Quod erat demonstrandum.


## PROP. XVI. THEOR. XI.

*Si sint quatuor rectæ lineæ proportionales; erit rectangulum ex mediis æquale rectangulo ex extremis. Et vicissim, si rectangulum ex mediis æquale sit rectangulo ex extremis, quatuor rectæ lineæ proportionales erunt.*

Sint quatuor rectæ lineæ proportionales  
 AB prima, CD secunda, GE tertia, & AF  
 P 2 quar-

(1) Prop. 1. hujus. [2] Prop. 11. lib. 5.

(3) Prop. 9. lib. 5.



quarta  
ita nē-  
pe, ut  
AB sit  
ad CD,  
ut est  
CE ad  
AF. Di-  
co, re-  
ctāgu-

lum contentum sub mediis CD, CE æquale esse rectangulo contento sub extremis AB, AF. Esto enim AG rectangulum contentum sub extremis AB, AF, & CH rectangulū contentum sub mediis CD, CE. Quia igitur AG, CH sunt duo parallelograma, quæ rectos habent angulos FAB, ECD, & in quibus AB est ad CD, ut CE ad AF; habebunt ea circum æquales angulos latera reciprocè proportionalia. Quare parallelogrammum AG æquale (1) erit parallelogrammo CH; hoc est rectangulum sub extremis AB, AF æquale erit rectangulo sub mediis CD, CE.

Sed vicissim sint æqualia inter se parallelogramma duo rectangula AG, CH. Dico, proportionales esse quatuor rectas lineas AB, CD, CE, AF; hoc est AB esse ad CD, ut est CE ad AF. Quoniam enim parallelogramma duo AG, CH sunt æqualia, & habent etiam angulos FAB, ECD rectos, adedque æquales; habebunt quoque [2] latera circum æquales angulos reciprocè proportionalia. Quare erit, ut AB ad CD, ita EC ad AF.

Si igitur sint quatuor rectæ lineæ propor-  
tio-

(1) Prop. 14. huius. [2] Prop. 14. huius.



tionales; erit rectangulum ex mediis æquale  
rectangulo ex extremis. Et vicissim si re-  
ctangulum ex mediis æquale sit rectangulo  
ex extremis; quatuor rectæ lineæ propor-  
tionales erunt. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Vera est etiam hæc propositio, si parallelo-  
gramma facta ex mediis, & extremis non sint  
rectangula, sed utcumque equiangula: dum-  
modo tamen æquales sint anguli illi, qui sub  
ipsis rectis lineis continentur. Nam perspi-  
cuum est eandem demonstrationem etiam in  
hoc casu sibi locum vindicare.*

## PROP. XVII. THEOR. XII.

*Si sint tres rectæ lineæ proportionales; erit  
rectangulum ex extremis æquale quadrato,  
quod describitur à media. Et vicissim, si rectan-  
gulum ex extremis, æquale sit quadrato à media  
descripto; tres rectæ lineæ proportionales erunt.*

**S**int tres rectæ lineæ proportionales, AB  
prima, CD secunda, AF tertia: ita nem-  
pe, ut AB sit ad CD, ut est CD ad AF. Dico,  
rectangulum AG contentum sub extremis  
AB, AF æquale esse quadrato CH descripto  
super media CD.

Quoniam enim AG, CH sunt duo paralle-  
logramma, quæ rectos habent angulos FAB,  
ECD, & in quibus AB est ad CD, ut CE, seu  
CD ad AF; habebunt ea circum æquales an-  
gulos latera reciprocè proportionalia. Qua-  
re parallelogrammum AG (1) æquale erit  
parallelogrammo CH; hoc est rectangulum  
sub extremis AB, AF æquale erit quadrato,  
P 3 quod

(1) Prop. 14. hujus.

quod describitur à media CD.

Sed vicissim sit rectangulum AG contentum sub extremis AB, AF æquale quadrato CH, quod describitur à media CD. Dico, proportionales esse tres rectas lineas AB, CD, AF; hoc est AB esse ad CD, ut est CD ad AF.

Quoniam enim parallelogramma duo AG, CH sunt æqualia, & habent etiam angulos FAB, ECD rectos, adeòque æquales; habebunt quoque latera circum æquales angulos [1] reciprocè proportionalia. Quare erit, ut AB ad CD, ita CE ad AF. Est autem CH, quadratum descriptum ex CD; adeòque CE est æqualis CD. Erit igitur, ut AB ad CD, ita CD ad AF.

Si igitur sint tres rectæ lineæ proportionales; erit rectangulum ex extremis æquale quadrato, quod describitur à media; & vicissim, si rectangulum ex extremis æquale sit quadrato à media descripto; tres rectæ lineæ proportionales erunt. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Vera est etiam hæc propositio, si parallelogrammum factum ex extremis, non sit rectangulum, sed utcumque obliquangulum; & à media non quadratum, sed rhomboides ei æquiangula describatur. Nam eandem demonstrationem etiam in hoc casu sibi locum vindicare, nemo non videt*


## PROP. XVIII. PROBL. VI.

*A data recta linea dato rectilineo simile similiterque positum rectilineum describere.*

Da-

---

[1] Prop. 14. hujus.



Data sit recta linea AB, datum verò rectilineum CDEF. Oportet, super AB describere rectilineum, quod sit simile, similiterque positum rectilineo dato CDEF.

Dividatur rectilineum datum per rectam CF in duo triangula CDE, CEF. Deinde fiat an-

gulus (1) ABH æqualis angulo CDF, & angulus BAH æqualis angulo DCF; coeantque rectæ AH, BH in H, ubi efficient angulum AHB æqualem angulo CFD; ipsumque aded triangulum ABH æquiangulum erit triangulo CDF. Similiter autem fiat angulus GAH æqualis angulo ECF, & angulus AHG æqualis angulo CFE; coeantque rectæ AG, HG in G, ubi constituent angulum AGH æqualem angulo CEF; eritque aded triangulum AGH æquiangulum triangulo CEF. Hoc facto, dico, rectilineum ABGH esse simile, similiterque positum rectilineo dato CDEF.

Quum enim ex constructione angulus BAH æqualis sit angulo DCF, & angulus GAH æqualis angulo ECF; erit totus angulus BAG æqualis toti angulo DCE. Atque ita quoque, quia ex constructione angulus AHB æqualis est angulo CFD, & angulus AHG æqualis angulo CFE; erit totus angulus BHG æqualis toti angulo DFE. Est autem & angulus ABH æqua-

P 4

æqua-

[1] Prop. 23. lib. 1.

æqualis angulo CDF, nec non angulus AGH æqualis angulo CEF. Quare rectilineum ABGH æquiangulum erit rectilineo CDEF.

Rursus, quum triangula ABH, CDF æquiangula sint, erit ut AB ad BH (1), ita CD ad DF; & ut BH ad HA, ita DF ad FC. Sed, propter triangula AGH, CEF similiter æquiangula, AH est ad GH, ut GF ad EF, & GH est ad GA, ut EF ad EC. Quare erit (2) ut BH ad GH, ita DG ad EF, & ut GA ad AB, ita QC ad CD. Unde, quum rectilinea duo ABGH, CDEF, non modo sint æquiangula, verum etiam latera habeant circum æquales angulos proportionalia; erunt ea similia, similiterque descripta. Et propterea super datam rectam AB descriptum est rectilineum ABGH simile, similiterque positum dato rectilineo CDEF. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Nè Tyrones hinc hæreant, monendi sunt, quod duo rectilinea, super rectas duas descripta, dicantur à Geometris similia, similiterque posita, quando super ipsas rectas constituuntur anguli æquales, & reliqui æquales eodem semper ordine sese consequuntur: ita, ut & latera homologa ab iisdem rectis incipiant, eodemque quoque ordine semper subsequantur. Cæterùm, si datum rectilineum contineat plura latera, quàm quatuor; tunc ex aliquo ejus angulo ad omnes angulos oppositos ducendæ sunt totidem rectæ lineæ. Nam, quum*  
*adhuc*


---

[1] Prop. 4. hujus. [2] Prop. 22. lib. 5.

*adhuc reſtilineum in plura triangula diviſum  
oriatur ; fiet problemati ſatis , ſi ſingulis illis  
triangulis alia æquiangula totidem eadem or-  
dine diſpoſita deſcribantur .*

## PROP. XIX. THEOR. XIII.

*Triangula ſimilia ſunt inter ſe in ratione du-  
plicata laterum homologorum .*



Sint ABC,  
DEF duo trian-  
gula ſimilia, quæ  
nempe habeant  
angulum ABC  
æqualem angu-  
lo DEF, angulū  
BCA æqualem  
angulo EFD, &  
angulum CAB

æqualem angulo FDE, & in quibus ſit etiam  
ut AB ad BC, ita DE ad EF; ut BC ad CA,  
ita EF ad FD; & ut CA ad AB, ita FD ad  
DE. Dico, triangula ABC, DEF habere  
inter ſe rationem duplicatam ejus, quam ha-  
bent latera homologa BC, EF.

Ponatur enim BG (1) tertia proportiona-  
lis in ordine duarum BC, EF: aded nempe,  
ut BC ſit ad EF ut eſt EF ad BG; jungatur-  
que AG. Et quoniam AB eſt ad BC, ut DE,  
ad EF; erit (2) permutando, ut AB ad DE,  
ita BC ad EF. Eſt autem ex conſtructione  
ut BC ad EF, ita EF ad BG. Quare erit, ut  
AB ad DE, ita EF ad BG (3). Et propterea,  
quum duo triangula ABG, DEF habeant la-

P 5

tera

[1] Prop. 11. hujus. [2] Prop. 16. lib. 5.  
[3] Prop. 11. lib. 5.

tera circum æquales angulos reciproce proportionalia, erit triangulum  $ABG$  [1] æquale triangulo  $DEF$ .

Jam triangula  $ABC, ABG$  habent eandem altitudinem. Quare erit (2) ut triangulum  $ABC$  ad triangulum  $ABG$ ; ita basis  $BC$  ad basim  $BG$ . Ostensum est autem triangulum  $ABG$  æquale triangulo  $DEF$ . Erit igitur quoque, ut triangulum  $ABC$  ad triangulum  $DEF$ , ita  $BC$  ad  $BG$ . Sed, ob rectas  $BC, EF, BG$  in continua proportione existentes, ratio, quam habet  $BC$  ad  $BG$ , duplicata est ejus, quam habet  $BC$  ad  $EF$ . Quare triangulum  $ABC$  ad triangulum  $DEF$  [3] erit etiam in duplicata ratione ejus, quam habet  $BC$  ad  $EF$ . Similia igitur triangula inter se sunt in duplicata ratione laterum homologorum. Quod erat demonstrandum.

#### C O R O L L A R I U M.

*Patet hinc, quod si tres recte lineæ fuerint proportionales; triangula similia, similiterque descripta super primam, & secundam habere inter se eandem rationem, quam habet prima ad tertiam. Tres etenim recte lineæ  $BC, EF, BG$  sunt proportionales ex constructione: & ostensum est in hoc theoremate triangulum  $ABC$  esse ad triangulum  $DEF$ , ut est  $BC$  ad  $BG$ .*


#### PROP. XX. THEOR. XIV.

*Polygona similia dividuntur in triangula numero equalia similia, & homologa totis; duplicatamq; habent rationem laterum homologorum.*

**S**int  $ABCDE, FGHK$  duo polygona similia, habentia angulum  $ABC$  æqualem angulo

(1) Prop. 27. hujus [2] Prop. 30. hujus.

(3) Prop. 4. lib. 1.




gulo  $FGH$ , angulum  $BCD$  æquale angulo  $GHI$ , atque ita deinceps; & in quibus  $AB$  sit ad  $BC$ , ut  $FG$  ad  $GH$ ;  $BC$  sit ad  $CD$ , ut  $GH$  ad  $HI$ ; atque ita de aliis. Dico primo, polygona ista dividi in triangula numero æqualia.

Ex punctis enim  $A$ , &  $F$ , in quibus consistunt anguli æ-

quales  $BAE$ ,  $GFK$ , ducantur ad angulos oppositos rectæ totidem. Et quoniam, propter similitudinem polygonorum, quot anguli in polygono  $ABCDE$  oppositi sunt angulo  $BAE$  totidem in polygono  $FGHIK$  opponuntur angulo  $GFK$ ; fiet hinc, ut si in uno duci possint ex puncto  $A$  duæ rectæ  $AC$ ,  $AD$ , in altero ex puncto  $F$  duæ etiam  $FH$ ,  $FI$  duci queant & non plures; & propterea, quemadmodum polygonum  $ABCDE$  per ductas rectas scinditur in tria triangula  $ABC$ ,  $ACD$ ,  $ADE$ ; ita quoque polygonum  $FGHIK$  per ductas rectas dividetur in tria, & non plura triangula, quæ erunt  $FGH$ ,  $FHI$ ,  $FIK$ .

Dico secundò, triangula ista esse similia inter se; hoc est triangulum  $ABC$  simile triangulo  $FGH$ , triangulum  $ACD$  simile triangulo  $FHI$ , & triangulum  $ADE$  simile triangulo  $FIK$ .

Nam in triangulis  $ABC$ ,  $FGH$  ex hypothese



angulus ABC æqualis est angulo FGH, & latera AB, BC proportionalia sūt lateribus FG, GH. Quare, quū ea habeant unū angulū uni angulo æqualē, & latera circum æquales angulos proportionalia; habebūt quoque reliquos angulos BAC, BCA æquales reliquis GFH, GHF; & ipsa aded triangula ABC,

FGH similia erunt inter se (1). Simili ratione ostendentur similia triangula ADE, FIK; quum habeant ex hypothesi angulum DEA æqualem angulo IKF, & latera DE, EA proportionalia lateribus IK, KF: propter quorum triangulorum similitudinem erit angulus DAE æqualis angulo IFK, & angulus ADE æqualis angulo FIK. Quum autem anguli BCD, CDE ex hypothesi æquales sint angulis GHI, HIK, & anguli ACB, ADE ostensi sint æquales angulis FHG, FIK; erunt reliqui anguli ACD, ADC æquales reliquis angulis FHI, FIH. Quare triangula ACD, FHI æquiangulara erunt, habebuntque latera circum æquales angulos proportionalia, atque aded similia (2) erunt inter se.

Dico tertid, triangula ista esse homologa polygonis totis; hoc est, quodlibet triangulorum unius polygoni esse ad triangulum sibi correspondens alterius polygoni, ut est  
pri-

(1) Prop. 6. hujus. (2) Prop. 4. hujus.



primum polygonum ad secundum.

Quum enim triangula  $ABC$ ,  $FGH$  ostensa sint similia inter se; erit (1) triangulum  $ABC$  ad triangulum  $FGH$  in duplicata ratione laterum homologorum  $AC$ ,  $FH$ . Et similiter, quia ex ostensis similia sunt triangula  $ACD$ ,  $FHI$ ; erit triangulum  $ACD$  ad triangulum  $FHI$  in duplicata ratione eorundem laterum homologorum  $AC$ ,  $FH$ . Quare erit (2) ut triangulum  $ABC$  ad triangulum  $FGH$ , ita triangulum  $ACD$  ad triangulum  $FHI$ . Non dissimili autem ratione ostendetur, triangulum  $ACD$  esse ad triangulum  $FHI$ , ut est triangulum  $ADE$  ad triangulum  $FIK$ . Erunt igitur triangula unius polygoni proportionalia triangulis alterius: ita quidem, ut triangula unius sint antecedentia, triangula alterius consequentia. Jam verò, si fuerint quotcumque magnitudines, quotcumque magnitudinibus proportionales, ut est una antecedentium ad unam consequentium, ita sunt omnes antecedentes ad omnes consequentes [3]. Erit igitur, ut quodlibet triangulum polygoni  $ABCDE$  ad correspondens sibi triangulum polygoni  $FGHIK$ , ita polygonum  $ABCDE$  ad polygonum  $FGHIK$ .

Dico denique, polygona ipsa habere inter se duplicatam rationem ejus, quam habent inter se duo ipsorum latera homologa  $AB$ ,  $FG$ .

Ostensum est enim, polygonum  $ABCDE$   
esse

[1] *Prop. 19. hujus.*

(2) *Prop. 11. lib. 5.*

(3) *Prop. 12. lib. 5.*

esse ad polygonum  $FGHIK$ , ut est triangulū  $ABC$  ad triangulum  $FGH$ . Sunt autem ex ostensis triangula  $ABC$ ,  $FGH$  similia inter se; atque aded triangulum  $ABC$  est ad triangulum  $FGH$  in duplicata ratione laterum homologorum  $AB$ ,  $FG$ . Quare in eadem duplicata ratione erit etiam polygonum  $ABCDE$  ad polygonum  $FGHIK$ . Et propterea polygona similia, non modò dividuntur in triangula numero æqualia, similia, & homologa totis, verùm etiam duplicatam habent rationem laterum homologorum. Quod erat demonstrandum.

### C O R O L L A R I U M.


*Atque hinc modò patet, quod si fuerint tres rectæ lineæ proportionales, polygona similia, similiterque descripta super primam, & secundam habeant inter se eandem rationem, quam prima habet ad tertiam. Sunt enim per hoc theorema in duplicata ratione ejus, quæ est inter primam, & secundam. Sed in hac eadem duplicata ratione est etiam prima ad tertiam; quum tres rectæ lineæ ponantur proportionales: Quare & ipsa polygona erunt inter se, ut prima ad tertiam.*

### P R O P. XXI. THEOR. XV.

*Quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt.*

**E** Idem rectilineo  $A$  simile sit tam rectilineum  $B$ , quam rectilineum  $C$ . Dico, rectilinea  $B$ , &  $C$  similia esse inter se.

Quum enim, propter similitudinem, angulis rectilinei  $A$  æquales sint tum anguli rectilinei  $B$ , cum anguli rectilinei  $C$ ; erunt anguli rectilinei  $B$  æquales angulis rectilinei  $C$ . Et rursus, quia, ob eandem similitudinem,




dinem, lateribus rectilinei A proportionalia sunt, tum latera rectilinei B, cum latera rectilinei C; erunt [1] latera rectilinei B proportionalia lateribus rectilinei C. Unde, quum duo rectili-

nea B, & C sint æquiangula, habeantque latera circum æquales angulos proportionalia; similia ea erunt inter se. Et propterea, quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se similia sunt. Quod erat demonstrandum.


PROP. XXII. THEOR. XVI.

*Si quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint; erunt rectilinea similia, similiterq; ab eis descripta etiam proportionalia. Et vicissim, si rectilinea proportionalia sunt; ipsæ rectæ lineæ etiam proportionales erunt.*



Sint quatuor rectæ lineæ proportionales AB prima, CD secunda, EF tertia, GH quarta. Describantur autem super primam, & secundâ duo quæcumque rectilinea AIB, CKD simi-

(1) Prop. 11. lib. 5.



similia, similiterque posita; & alia duo ELMF, GNOH itidem similia, similiterque posita super tertiam, & quartam. Dico, rectilineum AIB esse ad rectilineum CKD, ut est re-

ctilineum ELMF ad rectilineum GNOH.

Inveniatur enim, tum rectis AB, CD tertia proportionalis, quæ dicatur P, cum rectis EF, GH tertia proportionalis, quæ dicatur Q (1). Erit igitur, ut AB ad CD, ita CD ad P; & ut EF ad GH, ita GH ad Q. Est autem ex hypothesis, ut AB ad CD, ita EF ad GH. Quare erit etiam [2] ut CD ad P, ita GH ad Q; atque aded ex æquali ordinando (3) erit ut AB ad P, ita EF ad Q. Jam verò rectilineum AIB est ad rectilineum CKD, ut AB ad P (4); itemque rectilineum ELMF est ad rectilineum GNOH, ut EF ad Q. Quare erit (5) ut rectilineum AIB ad rectilineum CKD, ita rectilineum ELMF ad rectilineum GNOH.

Per contrarium autem ponantur proportionalia quatuor rectilinea similia, similiterque descripta à rectis AB, CD, EF, GH. Dico, rectas istas etiam inter se proportionales esse aded nempe, ut AB sit ad CD, veluti est EF ad GH.

In-

(1) Prop. 11. hujus.

(2) Prop. 11. lib. 5.

(3) Prop. 22. lib. 5.

(4) Corol. prop. 20. hujus.

(5) Prop. 11. lib. 5.

Inveniatur enim tribus rectis lineis AB, CD, EF quarta proportionalis RS (1), super quam describatur rectilineum RTVS simile, similiterque positum rectilineo ELMF [2]. Et quoniam AB est ad CD, ut EF ad RS; per ea, quæ jam ostensa sunt, erit ut rectilineum AIB ad rectilineum CKD, ita rectilineum ELMF ad rectilineum RTVS. Ex hypothese autem, ut est rectilineum AIB ad rectilineum CKD, ita est rectilineum ELMF ad rectilineum GNOH. Erit igitur, ut rectilineum ELMF ad rectilineum RTVS (3), ita idem rectilineum ELMF ad rectilineum GNOH: proindeque rectilinea duo RTVS, GNOH æqualia erunt inter se (4). Sunt autem duo ista rectilinea similia, similiterque descripta à rectis RS, GH; quum utrumque sit simile, similiterque positum rectilineo ELMF, descripto à recta EF. Quare æquales quoque erunt rectæ RS, GH. Et propterea, quum sit AB ad CD, ut EF ad RS; erit etiam AB ad CD, ut EF ad GH.

Si igitur quatuor rectæ lineæ proportionales fuerint; erunt rectilinea similia, similiterque ab eis descripta etiam proportionalia. Et vicissim, si rectilinea proportionalia sunt; ipsæ rectæ lineæ etiam proportionales erunt. Quod ostendere oportebat.

## S C H O L I U M.

*Quod autem æqualia rectilinea similia similiterque descripta, æqualia sunt RTVS, GNOH, consistant super rectas æquales RS, GH, ostendetur in hunc modum. Quoniam enim duo illa*

---


(1) Prop. 12. hujus. [2] Prop. 18. hujus.

(3) Prop. 11. lib. 5. (4) Prop. 9. lib. 5.

la rectilinea sunt similia, similiterque descripta à rectis  $RS$ ,  $GH$ ; erunt ea inter se in duplicata ratione ipsarum  $RS$ ,  $GH$ . Sed ratio rectilineorum est æqualitatis; quum eadem rectilinea ponantur etiam æqualia. Quare duplicata ratio rectarum  $RS$ ,  $GH$  pariter æqualitatis erit: quod fieri non potest, nisi ipsæ rectæ  $RS$ ,  $GH$  fuerint æquales.

PROP. XXIII. THEOR. XVII.

Parallelogramma equiangula habent inter se rationem ex lateribus compositam.



Sint parallelogramma duo  $AC$ ,  $BG$ , quæ habeant angulum  $ABC$  æqualem angulo  $EBF$ . Dico, eam habere rationem inter se duo ista parallelogramma, quæ componitur ex lateribus eorundem, hoc est

ex  $AB$  ad  $BE$ , & ex  $CB$  ad  $BF$ .

Conjungantur parallelogramma ad angulos æquales, ita ut  $AB$ ,  $BE$  jaceant in directum. Et quoniam æquales sunt anguli  $ABC$ ,  $EBF$ ; erunt etiam (1) in directum rectæ  $CB$ ,  $BF$ . Producantur deinde latera  $DC$ ,  $GE$  usque donec conveniant in  $H$ , & constituent tertium parallelogrammum  $BH$ .

Sumatur jam rectæ quælibet  $M$ ; & fiat [2], ut  $AB$  ad  $BE$ , ita  $M$  ad  $N$ ; itemque ut  $CB$  ad  $BF$ , ita  $N$  ad  $O$ . Quia igitur  $AC$  est ad  $BH$ ,  
ut


[1] Sch. Prop. 15. lib. 1. (2) Prop. 12. hujus.

ut AB ad BE; & AB est ad BE, ut M ad N: erit  
(1) ut AC ad BH, ita M ad N. Rursus quia BH  
est ad BG, ut CB ad BF; & CB est ad BF,  
ut N ad O: erit, ut BH ad BG, ita N ad O.

Et quoniam AC est ad BH, ut M ad N; &  
BH est ad BG, ut N ad O: erit ex æquali ordi-  
nando [2], ut AC ad BG, ita M ad O. Jam  
verò M est ad O in ratione composita ex M ad  
N, & ex N ad O; sive etiam in ratione com-  
posita ex AB ad BE, & ex CB ad BF, qua-  
re AC ad BG (3) erit etiam in ratione com-  
posita ex AB ad BE, & ex CB ad BF. Et  
propterea parallelogramma æquiangula ha-  
bent inter se rationem ex lateribus compositam.  
Quod erat ostendendum.

PROP. XXIV. THEOR. XVIII.

*Parallelogramma, quæ sunt circa diametrum  
alterius, cum toti, cum inter se similia sunt.*



Sit parallelogram-  
mum ABCD, in quo  
ducatur diameter AC,  
& per quodlibet ejus  
punctum I agantur re-  
ctæ EF, GH parallelæ  
lateribus parallelo-  
grammi. Dico, pa-  
rallelogramma circa

diametrum EG, FH, similia esse, cum toti  
BD, cum etiam inter se.

Quoniam enim rectæ EF, BC sunt paral-  
lelæ; erit (4) angulus exterior AEI æqualis  
interiori, & opposito ad eandem partem  
ABC. Pariterque, quia rectæ GH, DC sunt

pa-

(1) Prop. 11. lib. 5. (2) Prop. 22. lib. 5.


(3) Prop. 11. lib. 5. (4) Prop. 29. hujus.

parallelæ; erit angulus exterior AGI æqualis interiori, & opposito ad eandem partem ADC. Unde, quum duo parallelogramma EG, BD habeant communem angulum A & præterea duos alios angulos æquales duobus aliis angulis, alterum alteri; habebunt quoque quartum æqualem quarto. Et propterea æquiangula erunt inter se. Sed habent etiam latera circum æquales angulos proportionalia, quam sit [1] ut AB ad EI, ita AB ad BC; & ut AG ad GI, ita AD ad DC. Quare parallelogramma duo EG, BD similia erunt inter se.

Eadem ratione ostendetur, parallelogrammum FH esse etiam simile parallelogrammo BD. Sed quæ eidem rectilineo sunt similia, & inter se (2) similia sunt. Quare parallelogramma EG, FH etiam similia erunt inter se. Et propterea parallelogramma, quæ sunt circa diametrum alterius, cum toti, tum inter se similia sunt. Quod demonstrare oportebat.

## PROP. XXV. PROBL. VII.

*Rectilineum constituere, quod sit simile uni dato, & æquale alteri dato.*



Data sint duo rectilinea C, & D. Oportet, constituere tertium, quod simile quidem sit ipsi C, æqua-

(1) Prop. 2. huius. (2) Prop. 21. huius.



æquale verò alteri D.

Super AB unum latus rectilinei C (1) constituatur parallelogrammum AF in quovis angulo, æquale ipsi rectilineo C. Et super BF constituatur aliud parallelogrammum BH, æquale alteri rectilineo D, quod tamen habeat angulum FBG æqualem angulo EAB. Inveniatur deinde inter AB, & BG (2) media proportionalis X, super quam constituatur rectilineum X (3) simile, similiterque positum ipsi C. Dico X esse rectilineum quæsitum.

Quum enim rectæ AB; X, BG sint proportionales, erit rectilineum C ad rectilineum X (4), ut AB ad BG. Sed AB est ad BG [5], ut parallelogrammum AF ad parallelogrammum BH, sive etiam ut rectilineum C ad rectilineum D. Quare erit (6) ut rectilineum C ad rectilineum X, ita idem rectilineum C ad rectilineum D. Et propterea rectilineum X æquale erit (7) rectilineo D. Est autem idem rectilineum X simile ipsi C. Datis igitur duobus rectilineis C, & D, constitutum est tertium X, simile quidem ipsi C, æquale verò ipsi D, Quod erat faciendum.

PROP. XXVI. THEOR. XIX.


*Si ex parallelogrammo aliud auferatur, quod communem cum eo angulum habens, sit eidem simile, similiterque positum; consistet etiam cum illo circa eandem diagonalem.*

**S**it parallelogrammum ABCD, ex quo auferatur aliud parallelogrammum ACFG, quod

(1) Prop. 13. hujus. (2) Prop. 18. hujus.

(3) Coroll. prop. 20. hujus. [4] Prop. 1. hujus.

(5) Prop. 11. lib. 5. (6) Prop. 9. lib. 5.



quod habens cum eo communem angulum A, sit eidem simile, similiterque positum. Dico, ablatum parallelogrammum EG consistere circa eandem diago-

nalem cum toto BD.

Sit enim AC diagonalis ipsius BD, quæ si non transeat per punctum F, secet latus GF, productum si opus in I, ex quo ducatur (1) IH ipsi EF parallela. Et quoniam BD, HG sunt parallelogramma, quæ consistunt circa eandem diametrum AIC; erunt ea (2) similia similiterque posita inter se. Sed eidem parallelogrammo BD est etiam ex hypothese simile, similiterque positum parallelogrammum EG. Quare parallelogramma duo EG, HG erunt similia (3) similiterque posita inter se. Et propterea erit, ut AG ad AE, ita AG ad AH: unde sequitur (4) AE, AH æquales esse inter se: quod est absurdum. Non igitur diagonalis AC transit per aliud punctum, quam F: & proinde si ex parallelogrammo aliud auferatur, quod communem cum eo angulum habens, sit eidem simile, similiterque positum; consistet etiam cum illo circa eandem diagonalem. Quod ostendere oportebat.


PROP. XXVII. THEOR. XX.

*Omniū parallelogrammorum, quæ ad eandem*

[1] Prop. 3. lib. 1. [2] Prop. 24. hujus.

[3] Prop. 21. hujus. [4] Prop. 9. lib. 3.

*dem rectam applicata, deficiunt parallelogram-  
mis alicui dato similibus, maximum est illud,  
quod applicatur super dimidiam.*



Detur recta AB, & intel-  
ligatur mente parallelogram-  
mū aliquod Z. Dico, omnium  
parallelogram-  
morum, quæ  
applicata ad re-  
ctam AB defi-  
ciunt paralle-  
logrammis ipsi

Z similibus, maximum esse illud, quod ap-  
plicatur super dimidiam ipsius AB.

Secetur enim recta AB bifariam in C, &  
super BC constituatur parallelogrammum  
BCED simile ipsi Z. Ducatur deinde in hoc  
parallelogrammo diagonalis BD, per cuius,  
etiam si vis productæ, punctū aliquod G, vel K  
ducantur rectæ OR, LQ, IH, KT, ipsæ AB, BE  
parallelæ; eritque tum parallelogrammum  
BRGQ quum parallelogrammum BHKT si-  
mile quoque ipsi Z, quum sint circa eandem  
diagonalem parallelogrammi BCDE. Quo-  
circa, si compleantur parallelogramma duo  
AG, AK; ambo applicata ad eandem rectam  
AB, ea deficient parallelogrammis similibus  
dato Z: proindeque eo res redit, ut ostenda-  
mus parallelogramma AG, AK majora esse  
parallelogrammo AD.

Et quidem, quum punctum G est in ipsa  
diagonali BD, ostendetur id in hunc modum.

Quo-

Quoniam  $CG$  est æquale [1]  $GE$ ; appposito communi  $QR$ , erit  $CR$  æquale  $QE$ . Est autem  $CR$  [2] æquale  $AP$ , quum sint parallelogramma duo in æqualibus basibus, & in iisdem parallelis constituta. Quare erit  $AP$  æquale  $QE$ . Et propterea appposito rursus communi  $CG$ , erit  $AG$  æquale gnomoni  $KGS$ . Sed  $AD$  est æquale  $CE$ , quod majus est gnomone  $KGS$ . Quare erit  $AD$  majus quoque, quàm  $AG$ .

Quotiescumque verò punctum  $K$  est in diagonali producta, idem ostenditur hoc pacto. Producat  $DE$  usque donec cum  $AI$  in  $F$  conveniat. Et quoniam  $AC$  est æqualis  $CB$ , erit etiam  $FD$  æqualis  $DE$ ; & propterea parallelogramma duo  $FM$ ,  $DH$  inter se æqualia erunt. Est autem  $DH$  æquale  $DT$ ; quum sint supplementa in parallelogrammo  $TH$ . Quare erit  $FM$  æquale  $DT$ ; atque adeo  $DT$  majus, quam  $Fk$ : Unde addito communi  $AN$ , erit  $AD$  majus quoque quam  $Ak$ .


Omniū itaque parallelogrammorum, quæ ad eandem rectam lineam applicata deficiunt parallelogrammis alicui dato similibus, maximum est illud, quod applicatur super dimidiam. Quod erat demonstrandum.

PROP. XXVIII. PROBL. VIII.

*Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, deficiens parallelogrammo, quod alteri dato sit simile. Oportet autem, ut datum rectilineum non majus sit eo parallelogrammo, quod applicatum super dimidiam datæ rectæ lineæ, deficit parallelogrammo, quod eidem dato sit simile.*

Data

(1) Prop. 43. lib. 1. [2] Prop. 36. lib. 1.



Data sit  
 recta AB,  
 datum re-  
 ctilineum  
 C, & datū  
 parallelo-  
 grammū  
 D. Sit au-  
 tem recti-  
 lineum C  
 non majus  
 parallelo-  
 grāmo AF  
 quod ap-

plicatum super AE dimidiam ipsius AB, de-  
 ficiat parallelogrammum EG, simili dato  
 D. Oportet, super AB applicare parallelo-  
 grammum æquale dato rectilineo C, & defi-  
 ciens parallelogrammo alio, quod sit simile  
 dato D, vel etiam ipsi EG.

Quoniam enim datum rectilineum C non  
 est majus parallelogrammo AF; proinde erit,  
 vel ei æquale, vel eodem minus. Itaque, si  
 rectilineum C sit æquale parallelogrammo  
 AF, quia idem est applicatum super rectam  
 AB, & deficit parallelogrammo EG, quod est  
 simile dato D; erit AF parallelogrammum  
 quæsitum. Quod si verò rectilineum C mi-  
 nus sit parallelogrammo AF, inveniatur istius  
 super illud excessus, qui vocetur X. Tum  
 constituatur parallelogrammum KLMN (1)  
 æquale excessui invento X, & simile ipsi D,  
 vel EG: ita, ut propter similitudinem sit, ut  
 EF ad FG, ita NK ad KL. Abcendantur de-  
 inde

(1) Prop. 25. hujus.

inde (1) ex  $EF$ , &  $EG$  portiones  $OF$ ,  $FQ$  æquales ipsis  $NK$ ,  $KL$ ; & completo parallelogrammo  $OFQP$ , erit hoc æquale parallelogrammo superius constituto  $KLMN$ , itemque simile, similiterque positum ipsi  $EG$ : quare cum eodem  $EG$  (2) consistet etiam circa eandem diametrum  $BF$ . Denique producatum recta  $PO$  in directum versus  $R$ , &  $S$  cum recta  $QP$  in directum versus  $Z$ . Et dico,  $AZPS$  esse parallelogrammum quæsitum.

Nam, quod ita sit applicatum super rectam  $AB$ , ut deficiat parallelogrammo simili dato  $D$ ; id quidem patet. Est enim ejus defectus parallelogrammum  $ZR$ , quod est simile [3], similiterque positum ipsi  $EG$ , quum consistant circa eandem diametrum  $BF$ . Quod vero sit æquale dato rectilineo  $C$ , id ostendetur in hunc modum. Quoniam parallelogrammum  $OQ$ , velut æquale ipsi  $NL$ , seu  $X$ , est excessus, quo parallelogrammum  $AF$ , seu  $EG$  superat datum rectilineum  $C$ ; erit Gnomon reliquus ipsi  $C$  æqualis. Sed, propter æqualitatem supplementorum  $PE$ ,  $PG$ , est  $BO$ , seu  $AO$  æquale  $BQ$ ; atque adeo  $AP$  æquale gnomoni. Quare erit parallelogrammum  $AP$  æquale rectilineo  $C$ . Et propterea ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicatum est, deficiens parallelogrammo simili alteri dato. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Conditio illa, ut datum rectilineum non sit  
ma-*

[1] Prop. 31. lib. 1. [2] Prop. 26. hujus.

[3] Prop. 24. hujus.

majus eo parallelogrammo, quod applicatum super dimidiam datæ rectæ lineæ, deficit parallelogrammo simili eidem dato, non est frustra ab Euclide appositæ. Quum enim per propositionem præcedentem ejuscemodi parallelogrammum sit maximum omnium applicatorum, dummodo defectus sint similes; perspicuum est ad datam rectam lineam non posse ullum applicari, quod æquale sit dato rectilineo, sed omnia minora fore.

## S C H O L I U M.

Excessus duorum rectilineorum facile invenietur, si super eandem rectam lineam, ad eandem partem, & ad eundem angulum constituentur per propositionem quadragesimam quintam libri primi parallelogramma duo æqualia datis rectilineis; nam excessus horum parallelogrammorum, qui ex ipsa constructione habetur, erit etiam excessus rectilineorum.


## P R O P. XXIX. P R O B L. IX.

Ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicare, excedens parallelogrammo, quod alteri dato sit simile.

**D**ata sit recta AB, datum rectilineum C, & datum parallelogrammum D. Oportet, super AB applicare parallelogrammum, æquale dato rectilineo C, excedens parallelogrammo alio, quod sit simile ipsi D.

Secetur AB bifariam in E, & super EB (1) constituatur parallelogrammum EG, simile ipsi D. Tum addantur in unum, datum rectilineum C, & constitutum parallelogrammum EG, voceturque X summa ipsorum. Fiat deinde parallelogrammum IKSH  
 Q 2 æqua-

(1) Prop. 18. hujus.



(1) æquale ipsi  
 X, & simile,  
 similiterque  
 positum ipsi  
 D, vel EG:  
 ita ut propter  
 similitudinem  
 sit, ut EF ad  
 FG, ita IH ad  
 IK. Produ-  
 cantur porro  
 rectæ FE, FG,  
 usque ad L,  
 & M, ita ut  
 FL, FM æ-  
 quales fiant

ipsis IH, IK: & completo parallelogram-  
 mo FLNM, erit hoc æquale parallelogram-  
 mo superius constituto IKHS, itemque si-  
 mile, similiterque positum ipsi EG: quare  
 cum eodem EG (2) consistet etiam circa eam-  
 dem diametrum BF. Denique extendatur AB  
 versus P, NL versus R, ducaturque AR,  
 ipsi FL parallela. Et dico, ARP<sup>N</sup> esse lo-  
 grammum quæsitum.

Nam, quod ita sit applicatum super rectam  
 AB, ut excedat parallelogrammo simili da-  
 to D; id quidem patet. Est enim ejus exces-  
 sus parallelogrammum OP, quod est simile,  
 similiterque positum [4] ipsi EG, quum sint  
 circa eandem diagonalem BF. Quod verò  
 fit æquale dato rectilineo C; id ostendetur  
 in hunc modum. Quoniam parallelogram-  
 mum

[1] Prop. 18. hujus. (2) Prop. 25. hujus.

[3] Prop. 26. hujus. (4) Prop. 24. hujus.



num LM, velut æquale ipsi HK, seu X, est summa rectilinei C, & parallelogrammi EG; dempto communi parallelogrammo EG, erit gnomon reliquus æqualis rectilineo C. Sed, quum BM sit æquale ipsi BL, seu AL, erit idem gnomon æquale parallelogrammo AN. Quare erit parallelogrammum AN æquale rectilineo C. Et propterea ad datam rectam lineam dato rectilineo æquale parallelogrammum applicatum est, excedens parallelogrammo simili alteri dato. Quod erat faciendum.

## S C H O L I U M.

*Summa duorum rectilinearum facile invenietur, si super eandem rectam lineam ad contrarias partes in angulis, qui simul duobus rectis sint æquales, constituentur per propositionem quadragesimam quintam libri primi parallelogramma duo æqualia datis rectilineis. Nam summa horum parallelogrammorum, quæ ex ipsa constructione habetur, erit etiam summa rectilinearum.*

## P R O P. XXX. P R O B L. X.

*Datam rectam lineam terminatam extrema, ac media ratione dividere.*


**D**ATA sit recta terminata AB. Oportet, eam extrema, ac media ratione dividere; hoc est ea lege, ut tota recta linea sit ad majus segmentum, ut est majus segmentum ad minus.

Describatur super AB(1) quadratum ABCD. Tum super rectam AD [2] constituatur parallelogrammum DH, æquale quadrato AC, & excedens alia figura quadrata AH. Dico, rectam

Q 3

ctam

(1) Prop. 46. lib. 1. (2) Prop. 29. hujus.



etiam AB  
secta esse  
extrema,  
ac media  
ratione  
in puncto  
H.

Quum  
enim ex  
constru-

ctione æqualia sint DH, AC; ablato communi DG, erit AH æquale CG. Est autem AF quadratum ex AG, itemque CG rectangulum ex AB in BG. Quare erit rectangulum ex AB in BG æquale quadrato ex AG; & propterea, quum sit [1] ut AB ad AG, ita AG ad BG, erit recta AB secta extrema, ac media ratione in puncto G. Data igitur recta linea divisa est extrema, ac media ratione. Quod erat faciendum.

### SCHOLIUM.


*Ejusdem problematis solutio potest etiam haberi per undecimam secundi. Nempe, si data recta AB subinde dividatur in G, ut rectangulum, quod fit ex tota AB, & parte una BG, sit æquale quadrato alterius partis AG. Nam erit rursus, ut AB ad AG, ita AG ad BG.*

### PROP. XXXI. THEOR. XXI.

*In triangulis rectangulis figura quævis, à latere rectum angulum subtendente descripta æqualis erit figuris, quæ illi similes, & similiter positæ, describuntur à lateribus, rectum angulum continentibus.*

Sit

[1] Prop. 17. hujus.



Sit trian-  
gulum  
A B C  
rectan-  
gulū in  
A, su-  
per cu-  
jus late-  
ribus  
descri-  
bantur  
figuræ  
totidem  
similes,

similiterque positæ inter se. Dico, figuram descriptam super BC æqualem esse figuris descriptis super AB, AC.

Nam propter similitudinem figurarum, figura descripta super BC est ad figuram descriptam super AB in duplicata ratione laterum BC, AB [1]. Sed quadrata ex iisdem lateribus, quum sint etiam similia inter se, sunt in eadem duplicata ratione. Quare erit [2] ut figura descripta super BC ad figuram descriptam super AB, ita quadratum ex BC ad quadratum ex AB.

Simili ratione ostendetur, figuram descriptam super BC esse ad figuram descriptam super AC, ut est quadratum ex BC ad quadratum ex AC. Quare erit [3] ut figura descripta super BC ad figuras descriptas super AB, AC, ita quadratum ex BC ad quadrata ex AB, AC, Est autem quadratum ex BC æquale qua-

(1) Prop. 20. hujus. (2) Prop. 11. lib. 5.

(3) Prop. 24. lib. 5.

quadratis [1], quæ fiunt ex  $AB$ ,  $AC$ . Quare figura descripta super  $BC$  figuris descriptis super  $AB$ ,  $AC$  etiam æqualis erit.


In triangulis itaque rectangulis figura quævis, à latere rectum angulum subtendente descripta, æqualis erit figuris, quæ illi similes, ac similiter positæ describuntur à lateribus rectum angulum continentibus. Quod erat demonstrandum.

## S C H O L I U M.

*Hoc theorema est longe universalius eo, quod in penultima primi continetur. Illud enim solo quadrata includit, hoc autem ad omnes figuras similes, similiterque descriptas se extendit. Sed quemadmodum in illo obtinet etiam conversum, quod ostensum est in ultima primi; sic & istud quoque converti poterit: nec dissimilis à converso illius erit ejus demonstratio.*

## P R O P. XXXII. T H E O R. XXII.

*Si duo triangula habeant duo latera duobus lateribus proportionalia, & composita ad eundem angulum habeant quoque latera homologa parallela; reliqua eorum latera in directum erunt.*



Sint duo triangula  $ABC$ ,  $DCE$  habentia latera  $AB$ ,  $AC$  proportionalia lateribus  $DC$ ,  $DE$ : ita quidem, ut  $AB$  sit ad

$AC$ , ut  $DC$  ad  $DE$ . Componantur triangula ista ad angulum  $ACD$ , & sic composita, habeant quoque latera homologa parallela. Dico, reliqua ipsorum latera  $BC$ ,  $CE$  in directum esse.

Quo-

(1) Prop. 47. lib. 1.

Quoniam enim  $AB, CD$  sunt parallelæ, erit [1] angulus  $BAC$  æqualis angulo  $ACD$ . Et similiter, quia  $AC, DE$  sunt parallelæ, erit eidem angulo  $ACD$  æqualis quoque angulus  $CDE$ . Et propterea angulus  $BAC$  æqualis erit angulo  $CDE$ . Unde, quum duo triangula  $ABC, DCE$  habeant circa æquales angulos latera proportionalia; erunt ea [2] æquiangula inter se; eritque proinde angulus  $ABC$  æqualis angulo  $DCE$ . Ostensus est autem angulus  $BAC$  æqualis angulo  $ACD$ . Quare erit totus angulus  $ACE$  æqualis duobus angulis  $ABC, BAC$ ; atque adeo appposito communi  $ACB$ , erunt duo anguli  $ACE, ACB$  æquales tribus angulis  $ABC, BAC, ACB$ . Sed isti tres anguli, quum ad idem triangulum pertineant, simul sunt æquales [3] duobus rectis. Quare erunt etiam duobus rectis æquales duo anguli  $ACE, ACB$ : ac proinde rectæ duæ  $BC, CE$  [4] in directum erunt.

Si igitur duo triangula habeant duo latera duobus lateribus proportionalia, & composita ad eundem angulum, habeant quoque latera homologa parallelæ; reliqua eorum latera in directum erunt. Quod erat demonstrandum.



## PROP. XXXIII. THEOR. XXIII.

*In æqualibus circulis anguli, sive ad centra, sive ad circumferentias positi, eandem habent rationem cum arcibus, quibus insistent; similiter autem, & sectores.*

**S**int duo circuli æquales  $ABC, EFG$ . quorum centra sint puncta  $D, & H$ . Constituan-

(1) Prop. 29. lib. 1. [2] Prop. 6. huius.

(3) Prop. 32. lib. 1. (4) Prop. 14. lib. 1.



tuantur primò ad centra ista duo quilibet anguli BDC, FHG. Dico, angulum BDC esse ad angulum FHG, ut est arcus BC ad arcum FG.

Fiant etenim ad eadem centra plures alii anguli, æquales ipsis BDC, FHG; hoc est, vitandæ confusionis causa, unus quidem ad centrum D, qui sit CDI; duo vero ad centrum H, qui sint GHL, LHP. Itaque, quemadmodum æquales sunt anguli BDC, CDI, ita quoque æquales erunt

arcus HC, CI, quibus insistant anguli illi. Et similiter, quemadmodum æquales sunt anguli FHG, GHL, LHP, ita pariter æquales erunt arcus FG, GL, LP, quibus ii anguli insistant. Quare angulus BDI tam multiplex erit anguli BDC, quam arcus HI est multiplex arcus BC; & similiter angulus FHP tam multiplex erit anguli FHG, quam arcus FP est multiplex arcus FG. Jam verò angulus BDI est æqualis, major, vel minor angulo FHP, prout arcus BI, est æqualis, major, aut minor arcu FP. Quare erit, ut angulus BDC ad angulum FHG, ita arcus BC ad arcum FG.

Con-

Constituantur secundò ad circumferentias eorundem, circulorum duo quilibet anguli BAG, FEG. Dico, angulum BAC ad angulum FEG habere quoque eandem rationem, quam habet arcus BC ad arcum FG.

Fiant etenim ad centra eorum circulorum anguli BDC, FHG, qui insistant iisdem arcibus BC, FG, quibus insistant anguli BAC, FEG, constituti ad circumferentias. Et quoniam anguli BAC, FEG sunt semisses angulorum [1] BDG, FHG; erit ut angulus BAC ad angulum FEG, ita angulus BDC ad angulum FHG [2]. Ostensum est autem, angulum BDC esse ad angulum FHG, ut est arcus BC ad arcum FG. Quare erit [3] ut angulus BAC ad angulum FEG, ita arcus BC ad arcum FG.

Denique in iisdem circulis æqualibus capiantur duo quilibet sectores BCD, FGH. Dico, sectorem BCD ad sectorem FGH habere etiam eandem rationem, quam habet arcus BC ad arcum FG.

Jungantur etenim rectæ BC, FG, & in iisdem circulis aptentur [4] plures aliæ rectæ, æquales ipsis BC, FG; hoc est, vitandæ confusionis causa, una quidem in circulo ABC, quæ sit CI; duæ verò in circulo EFG, quæ sint GL, LF. Et quoniam in eodem circulo æquales rectæ [5] æquales arcus abscindunt; erit arcus BAC æqualis arcui CAI. Et propterea in segmentis BC, CI constitutis duobus angulis BMC, CNI, fient anguli isti æquales inter se [6]; atque adeo ipsa segmenta BC, CI

[1] Prop. 20. lib. 3. [2] Prop. 15. lib. 5.

[3] Prop. 11. lib. 5. [4] Prop. 1. lib. 4.

[5] Prop. 28. lib. 3. [6] Prop. 27. lib. 3.

CI similia erunt. Sunt autem segmenta ista constituta super rectis æqualibus. Quare erunt etiam æqualia: proindeque additis triangulis BDC, CDI similiter æqualibus, fiet sector BCD æqualis sectori CID. Et propterea sector BID tam multiplex erit sectoris BCD, quam arcus BI est multiplex arcus BD. Simili ratione ostendetur, æquales esse sectores FGH, GLH, LPH, totumque sectorem FPH tam multiplicem esse sectoris FGH, quam arcus FP est multiplex arcus FG. Jam verò sector BID est æqualis, major, vel minor sectore FPH, prout arcus BI est æqualis, major, vel minor arcu FP; Quare erit, ut sector BCD ad sectorem FGH, ita arcus BC ad arcum FG.

In æqualibus itaque circulis anguli, sive ad centra, sive ad circumscientias positi, eandem habent rationem cum arcubus, quibus insistant; similiter autem & sectores. Quod erat demonstrandum.

### C O R O L L A R I U M.

*Angulus itaque ad centrum constitutus cum ipso arcu, cui insistit, proportionaliter augetur. Unde pro mensura anguli rectilinei adhiberi potest arcus circuli ex vertice anguli tamquam centro descriptus, & inter latera ejusdem anguli comprehensus: quippe qui metietur anguli quantitatem tam longitudine sua, quàm numero partium, quas continet, quum datum est intervallum; & verò metietur eam solo suarum partium numero, quum intervallum utcumque assumitur.*

F I N I S.





1  
7  
1

UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 06388 9045

**A 543938**

